

يعنى علاج بالمثل

جدیدایریش مشمل جلداوّل ودوم (ترمیم داضافوں کے ساتھ)

مسلم ٹیلی ویژن احمد بیہ انٹر نیشنل پر نشر کئے گئے حضرت مرزا طاہراحمد امام جماعت احمد بیہ کے لیکیج ز کامجموعہ

هو ميو بيتھي- يعنی علاج بالمثل

جدیدایدیش - جلداوّل ودوم (ترمیم واضافه کے ساتھ)

Homoeopathy Vol: 1 & 2

(Urdu) Fully revised

Televised Lectures of Hadhrat Mirza Tahir Ahmad Head of the worldwide Ahmadiyya Muslim Community

© Islam International Publications Ltd.

Vol: 1 was first published in UK in 1996 and third (revised) edition was published in 1998 Present edition Vol: 1 & 2 (fully revised) published in UK in 1999

Published by:

Islam International Publications Ltd. Islamabad,
Sheephatch Lane
Tilford, Surrey GU10 2AQ
United Kingdom

Printed in UK by:

Biddles Ltd Guildford and King's Lynn

Composed by:

Tahir Mahmood Ahmad Faheem Ahmad Khalid Tariq Nafees Cheema

ISBN 1 85372 668 0

لِسُمِ اللَّهِ الرَّظْنِ الرَّطْنِ الرَّطِيمُ



اور جب میں یمار ہو تا ہول تووہ مجھے شفادیتاہے۔

فهرست

ويباچه

		ن کے متعلق کچھ ضروری باتیں	اس نځایڈیشر	
1	Abrotanum		ابراثينم	
5	Absinthium		ابسنتھیم ایسیطک ایسٹر	-2
7	Acetic Acid		ایسیٹِک ایسٹر	-3
9	Aconitum Napell	lus	ا يكونائث	-4
15	Actaea Racemosa	a l	اکٹیار کییمور ایڈرینالین	-5
19	Adrenalin		ایڈرینالین	-6
21	Aesculus Hippoc		ايسكولس	-7
25	Aethusa Cynapiu	ım	ایتھوزا ایگیر میس	-8
29	Agaricus Muscar		ایگیرییس	-9
35	Agnus Castus	C	ایگنس کاسٹس	
37	Allium Cepa		ايليم سيبإ	-11
41	Aloe		ابلو	-12
45	Alumen	رسی)	اليومن(پھطکر	-13
49	Alumina		اليومينا	
55	Ambra Grisea		ایمبرا گریبا	-15
57	Ammonium Carb	b	امونيم كارب	-16
61	Anthracinum		انتفراسينم	-17

63	 Anthrakokali	انتقرا كوكلي	-18
65	 Antimonium Crudum	اینٹی مونیم کروڈ	
67	 Apis Mellifica	اييي	
71	 Argentum Metallicum	ارجنع مثيليكم	
77	 Argentum Nitricum	ارجنثم نائيثريم	-22
83	 Arnica	آرنيكا	-23
93	 Arsenicum Album	آ رسينك البم	
101	 Arsenicum Iodatum	آرسينك آئيود ييم	-25
105	 Arsenicum Sulphuratum Flavum	آ رسینک سلف	-26
107	 Arum Triphyllum	آ رم ٹرائی فلم	-27
109	 Asafoetida	اسافو ٹیڈا	-28
111	 Aurum Metallicum	، مثیلیم آرم	-29
117	 Aurum Muriaticum	آ رم میور	-30
121	 Baptisia	ببيشيا	-31
125	 Baryta Carb	برائليا كارب	-32
133	 Belladonna	بيلا ڈونا	-33
143	 Bellis Perennis	بيلس	
145	 Benzoicum Acidum	بينز وئيكم ايسلرم	-35
149	 Berberis Vulgaris	پر پرس س	-36
153	 Bismuthum	بینز وئیکم ایسڈم بربرس بسمتھم بوریکس	-37
155	 Borax	بور نیس	-38

157	Bovista	بووسثا	
159	Bromium	بروميم	-40
161	Bryonia alba	برائيونيا	-41
173	Bufo	بوفو	
177	Cactus Grandiflorus	كيكش	
181	Cadmium Sulf	كيدميم سلف	-44
185	Caladium	كيليديم	-45
187	Calcarea Arsenica	كلكيريا آرس	
191	Calcarea Carbonica	كلكيريا كارب	-47
199	Calcarea Fluorica	كلكيريا فلور	-48
203	Calcarea Iodide	كلكيريا آبوڈائيڈ	-49
205	Calcarea Phosphorica	كلكيريا فاس	-50
209	Calcarea Sulphurica	كلكيريا سلف	-51
215	Calendula Officinalis	كيانثه ولا	-52
217	Camphora	كيمفر	-53
223	Cannabis Indica	كينابس انڈيكا	
227	Cannabis Sativa	كينابس سائيوا	-55
229	Cantharis	كنية تقرس	-56
233	Capsicum	کیپسیکم	-57
237	Carbo Animalis	کیپسیکم کار بوانیمیلس کار بوونځ	-58
241	Carbo Vegetabilis	كار بووتج	-59

249	Carbolic Acid	كاربا لك ايسته	-60
251	Carboneum Sulphuratum	كاربونيم سلف	
255	Carcinosin	كارسينوس	
259	Cardus Marianus	كارڈس مریانس	
261	Caulophyllum	کولو فائیلم	-64
263	Causticum	كاستيكم	
267	Ceanothus	سيا نوخفس	-66
269	Chamomilla	ڪيموميلا	
275	Chelidonium Majus	چىلى ۋونىم	-68
279	Chenopodium	چينو پوڙيم	-69
283	Chininum Arsenicosum	چیننه به رس چینینم آرس	-70
289	Cholesterinum	كولسترينم	
291	Cicuta Virosa	سيكوثا وروسا	-72
295	Cina	سائنا	
299	Cinchona Officinalis (China)	سنكونا آفيشى نيلس (جإئنا) سسشس كينا ڈينسس ككيميشس	-74
303	Cistus Canadensis	سسٹس کینا ڈینسس	-75
307	Clematis Erecta	كليمييس	-76
309	Cocculus	کا کولس	-77
313	Coccus Cacti	كوكس كهكطا في	-78
315	Coffea Cruda	كافيا كروڈا	-79
319	Colchicum	کافیا کروڈا کافیا کروڈا کالچیکم	-80

323	Colocynthis	كولوسنته	-81
325	Conium Maculatum	كوينيم	-82
331	Crotalus Horridus	کروٹیکس ہری ڈس	-83
337	Croton Tiglium	روس مرورون کروٹن کلیم	-84
341	Cuprum Metallicum	کیو پرمٹیلیکم سائیکلیمن	-85
345	Cyclamen Europaeum	سانيكليمن	-86
349	Digitalis	ڑ یجی ٹ یلس	-87
355	Dioscorea Villosa	ڈ ائسکو ریا ولوسا	-88
357	Diphtherinum	وفتھیرینم	-89
359	Drosera Rotundifolia	ڈروسرا	-90
363	Dulcamara	وْ لِكَا مارا	-91
367	Electricitas	الىيىشرىيى ٹاس	
369	Electricity	الىيكٹرىسٹى	
371	Eupatorium Perfoliatum	يو پاڻوريم	-94
375	Euphrasia	يوفريزيا	-95
379	Ferrum Metallicum	فيرم يثيليكم	
383	Ferrum Phosphoricum	فيرم فاس	-97
389	Fluoricum Acidum	فلور مکم ایسڈیم	-98
395	Gelsemium	فلور کیم ایسڈیم حبلسیمیم گلونائن	-99
401	Glonoine	گلونائن	-100
407	Graphites	گریفائیٹس	-101

413	 Gratiola	102- گريىثولا
417	 Guaiacum	103- گائيگم
423	 Haematoxylon	104- يما ٹاکسى لان
425	 Hedeoma	405- ہیڈی اوما
427	 Hekla Lava	106- ميڪلالاوا
431	 Helleborus Niger	107- ہیلی بورس
435	 Helonias	108- ہیلونیس
437	 Hepar Sulphuris Calcareum	109- ہیپرسلف
443	 Hura Braziliensis	110- ہورابرازیل
445	 Hydrangea	111- بائيڈرنجيا
447	 Hydrastis	112- ہائیڈراسٹس
451	 Hydrocotyle	113- ہائیڈروکوٹائل
453	 Hydrocyanic Acid	114- ہائیڈروسائینک ایسڈ
455	 Hydrophobinum	115- بائيڈروفويينم
457	 Hyoscyamus	116- ہائیوسائیمس
463	 Ignatia	117- اگنیثیا
467	 Insulin	118- انسولين
469	 Iodum	119- آيوڙم
475	 Ipecacuanha	120- ا پي کاک
479	 Iris Tenax	121- آئرس ٹینکس 122- آئرس ورسیکل
483	 Iris Versicolor	122- آئرُس ورسيڪل

485	 Kali Bichromicum	123- كالى بائتكروم
495	 Kali Carbonicum	124- كالى كارب
503	 Kali Muriaticum	125- كالى ميور
505	 Kali Phosphoricum	126- كالى فاس
515	 Kali Sulphuricum	127- كالى سلف
521	 Kreosotum	128- كرئيوزوڻم
525	 Lac Caninum	129- ليك كينا نينم
531	 Lac Defloratum	130- ليک ڈیفلوریٹم
539	 Lachesis	131- كىكىيىس
553	 Lactic Acid	132- كىكىك ايسەر
555	 Laurocerasus	133- لاروسيراسس
559	 Ledum	134- ليڙم
565	 Lillium Tigrinum	135- لليُم مُك
569	 Magnesia Carbonica	136- ميگنيشيا کارب
571	 Malandrinum	137- ميلنڈرينم
575	 Malaria Officinalis	138- مليريا آفيسي نيلس
577	 Manganum	139- مىنگىينم
583	 Medorrhinum	140- ميڈورائينم
591	 Mercurius	۔ 141- مرکری کے مرکبات
601	 Millefolium	142- ملى فولىم
605	 Morgon Co	143- مورگن کو

607	Muriaticum Acidum	144- ميورينڪ ايسڙ
611	Natrum Carbonicum	145- نیٹرم کارب
617	Natrum Muriaticum	146- نيٹرم ميور
627	Natrum Phosphoricum	147- نيٹرم فاس
633	Natrum Sulphuricum	148- نيٹرم سلف
637	Nux Vomica	149-
645	Opium	150- اوپیم
651	Phosphorus	151- فاسفورس
663	Phytolacca	152- فائتۇلاكا
667	Picricum Acidum	153- پکرک ایسڈ
671	Piper Nigrum	154- پائيپر نائيگر
673	Platinum	155- پلاڻينم
675	Plumbum Metallicum	156- للمبرمثيليكم
681	Psorinum	157- سورانينم
687	Pulex Irritans	158- پ ي يس
689	Pulsatilla	159- پلسٹیلا
699	Pyrogenium	160- پائيروجينم
703	Radium Bromide	161- ریڈیم برومائیڈ
705	Rhus Glabra	162- رس گلابرا
707	Rhus Tosxicodendron	163- رسٹاکس
715	Rumex Crispus	164- ريونکس کرسپس

719	Ruta Graveolens	165- روٹا
723	Sabadilla	166- سباۋىيلا
727	Sabina	167- سبائنا
731	Sanguinaria	168- سينگونيريا
735	Secale Cornutum	169- سيكيل كورنيثم
741	Senecio Aureus	170- سينيثوآرس
743	Senega	171- سييگا
745	Sepia	172- سپيا
749	Silicea	173- سليثيا
761	Spigelia	174- سپإئی جيليا
765	Spongia Tosta	175- سپونجياڻوسڻا
769	Stannum	176- سٹینم
773	Staphysagria	177- سڻيفي سيگريا
777	Strontium Carbonicum	178- سٹروشیم کارب
779	Sulphur	179- سلفر
787	Sulphuricum Acidum	180- سلفيورك ايسار
791	Tarentula Hispania	181- ٹیرینٹولاہسپانیہ
797	Tuberculinum	182- ٹیوبر کولینم 183- وریٹرم البم
801	Veratrum Album	183- وريثرم البم
805	Zincum Metallicum	184- زنک انڈیکس تشخیص امراض
813	Rapertory	انڈیکس تشخیص امراض

ويباچه 1

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ديباچه

ہومیو پلیتی میں میری دلچیں کے اسباب کی داستان دلچیپ ہے۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد پاکستان بننے کے ابتدائی سالوں کی بات ہے کہ مجھے بار بارسر درد کے دورے پڑا کرتے تھے جسے اگریزی میں میگرین (Migraine) اور اردو میں در دِ شقیقہ کہتے ہیں۔ یہ بہت شدید درد ہوتا ہے جس کے ساتھ متلی ، قے اور اعصابی بے چینی بہت ہوتی ہے۔ میں کئی گئی دن اس بیاری میں مبتلار ہتا تھا۔ علاج کے طور پر اسپرین استعال کرتا جس کی وجہ سے معدہ کی جھلی اور گردوں پر برااثر پڑتا اور دل کی دھڑکن بھی تیز ہوجاتی۔ میرے والد مرحوم ایک ایلو پلیتھک دواسینڈول (Sandol) اپنے پاس کی دھڑکن بھی تیز ہوجاتی۔ میرے والد مرحوم ایک ایلو پلیتھک دواسینڈول (Sandol) اپنے پاس کی دھا کرتے تھے جس کی انہیں خود بھی ضرورت پڑتی تھی۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد یہ دوا پاکستان میں نہیں ماتی تھی بلکہ کلکتہ سے منگوانی پڑتی تھی۔ اس سے مجھے جلدا آرام آ جا تا۔

ایک دفعہ جب مجھے سر در دکی شدید تکلیف ہوئی تو ابا جان مرحوم کے پاس سینڈول موجود نہ تھی اس لئے آپ نے اس کی بجائے کوئی ہومیو پانتھاک دوائی بھجوادی۔ مجھے اس وقت ہومیو پلیتھی پر کوئی یقین نہیں تھا لیکن تبر کا میں نے میدوا کھالی۔ مجھے اچا نک احساس ہوا کہ در دبالکل ختم ہوگیا ہے اور میں بے وجہ آئکھیں بند کئے لیٹا ہوں۔ اس سے پہلے بھی کسی دواکا مجھے پر ایسا غیر معمولی اور اتنا تیز انر نہیں ہوا تھا۔

اس کے بعدایک اور واقعہ ہومیو پیتھی میں میری دلچیپی کا موجب یہ بنا کہ جب میری شادی ہوئی تو میری اہلیہ آصفہ بیگم (رحمہا اللہ) کوایک برانی تکلیف تھی جس کا انہوں نے مجھے سے ذکر کیا۔ حضرت اباجان کے پاس ہومیو پیتھی کی کتابیں بہت تھیں۔ میں نے سوچا کہ ان میں سے کوئی دوائی ڈھونڈ تا ہوں۔اللہ تعالیٰ کا ابیا تصرف ہوا کہ پہلی کتاب کوجس جگہ سے میں نے کھولا وہاں ایک دوائی نیٹرم میور (Natrum Mur) کی جوعلامات درج تھیں وہ بالکل وہی تھیں جو آصفہ بیگم نے بتائی تھیں ۔وہ دوامیں نے اونچی طاقت میں انہیں دی۔ان کواس کی ایک خوراک سے ہی ایسا آ رام آیا کہ پھر کبھی زندگی جروہ تکلیف دوہارہ نہیں ہوئی۔اس سے مجھے یقین ہوگیا کہ ہومیو پیتھی خواہ میری سمجھ میں آئے یا نہآئے ،اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے اور اس میں ضرور کچھ حقیقت ہے۔اس کے بعد میں نے حضرت ابا جان کی لائبر ریمی سے ہومیو پیتھی کی کتابیں لے کریڈ ھنا شروع کیں بعض اوقات ساری ساری رات انہیں پڑھتا رہتا۔لمیا عرصہ مطالعہ کے بعد میں نے دوائیوں اور ان کے مزاج سے واقفيت حاصل كي اوران كے استعال اورخصوصیات كا اچھى طرح ذبهن میں نقشه جمایا اور پھرمریضوں كا علاج شروع کیا۔

ہومیوبیتھی کی ایجا د

ہومیو پیتھی کے موجد کانام ڈاکٹر ہائیمن ہے جو 1755ء میں Saxony میں پیدا ہوا۔ اس کا پورانام سیموئیل کرسچن فرائیڈرک ہائیمن (Samuel Christian Friedrich Hannemann) سیموئیل کرسچن فرائیڈرک ہائیمن (شاہد جینا نچہ اس نے آٹھ زبانوں پر عبور حاصل کیا اور ابھی اس کی عمر صرف 12 سال کی تھی کہ اس نے یونانی (Greek) زبان پڑھانی شروع کر دی اور اس طرح چھوٹی عمر میں ہی زبانوں کا استاد بن گیا۔ اس نے لائیسگ (Leipzig) (آسٹریا) میں ڈاکٹری پڑھنی

شروع کی۔ پھریہ وی آنا (Vienna) گیا اور وہاں سے ایرلانگن (Erlangen) گیا جہاں 1779ء میں یہ میڈیکل ڈاکٹر بنااور ڈیسڈن (Dresden) میں پر یکٹس شروع کر دی۔

چونکہ پریکٹس کے دوران بہغریبوں پر بہت احسان کرتا تھااس لئے اس کی آمدزیادہ نہیںتھی۔ لہٰذااس نے پریکٹس کے ساتھ ساتھ زبانوں کے ترجیے کا کام بھی جاری رکھا۔ایلوپیتھک ڈاکٹر بننے کے گیارہ سال بعداس نے ہومیو پیتھک طریق علاج دریافت کیا۔ چھسال زیادہ تر اپنے اوپر اور ا پیغ قریبی عزیز وں پر تج بے کرتا رہااور 1796ء میں پہلی بارطبی رسالوں میں مضامین کے ذریعے اس نے اپنے ہومیوں پینی فلسفہ سے دنیا کوآگاہ کیا۔1810ء میں اس نے پہلی باراینی مشہور عالم طبی کتاب Organon of Rational Medicine شائع کی جسے ہانیمن کا آرگنان کہاجاتا ہےاور 1811ء تا 1821ء کے عرصہ میں اس نے میٹیریا میڈیکا (Materia Medica) تیار کی۔ اس وقت کے تمام روایتی معالجین نے اس کی سخت مخالفت شروع کر دی۔1820ء میں مخالفین کے دباؤ کے نتیجہ میں حکومت نے اس کے طریقۂ علاج کوغیر قانونی قرار دے کراس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کیالیکن پہلے اس سے کہاس فیصلے برعملدرآ مدہوتا اس نے آسٹریا کے شنرادہ کارل شوارزن برگ (Karl Schwarzenberg) كولائيسك (Leipzig) بلاكركاميابي سے اس كا علاج كيا۔ يرنس کواس علاج سے اتنا فائدہ پہنچا کہ اس نے آسٹریا کے King Friedrich سے درخواست کی کہ ہومیو پلیتی کے خلاف ہر یا ہندی کوختم کر دیا جائے اور آئندہ بھی کوئی یا بندی نہ لگائی جائے ۔ مگر ہانیمن کی برنشمتی ہے یہی شنزادہ ٹھیک ہونے برفوراً عیاثی اور شراب نوشی میں مبتلا ہو گیااوراسی سال پھر بہار یڑا تو ایلو پیتھک علاج شروع کیالیکن تھوڑی مدت میں ہی دم تو ڑ گیا۔اس کا ساراالزام آسٹریا کی حکومت نے ہانیمن پرتھونپ دیا۔اس کا رعایا پرالیا سخت ردمل ہوا کہاس کی کتابیں جگہ جلائی جانے

لگیں اور مانیمن کواس ملک سے فرار ہوکر کوتھن (Cothen) میں پناہ لینی پڑی۔ یہاں ڈیوک آف کوتھن (Duke of Cothen) نے اس کی سر برستی کی ۔ وہ چودہ سال کوتھن میں رہااوراس عرصہ میں مزمن بیاریوں پر گہرانحقیقی کام کیا۔اس تحقیقی کام کی پہلی جلد 1828ء میں شائع ہوئی۔1830ء میں اس کی ہیوی کی وفات ہوئی اور 1835ء میں اس نے ایک فرانسیسی خاتون سے شادی کی اورپیرس منتقل ہوگیا۔ 1835ء سے لے کر 1843ء لینی اپنی وفات تک پیفرانس میں رہ کر ہومیو پیتھی کی یر بیٹس کرتار ہا۔1835ء وہی سال ہے جس میں جماعت احدید کے بانی مرزاغلام احمدیدیا ہوئے۔ ہومیو پیتھی سے مرادعلاج بالمثل ہے یعنی بیاریوں کا ملتی جلتی بیاریاں پیدا کرنے والے مادودں سے علاج ۔ یہ علاج پانیمن کے وقت تک رائج علاج کے بالکل برعکس اصول برمپنی تھا۔ یہ درست ہے کہ گئی بیاریوں کے رائج علاج ایسے بھی تھے جو دراصل ہومیو پیتھک اصل کے مطابق کام کرتے تھے گرمعالجین کواس اصول کا کوئی علم نہیں تھا۔ وہ محض تجر بے کی بنا پر محدود دائر ہے میں بعض دواؤں کو ہومیو پیتھک طریق علاج کے مطابق شفادینے کے لئے استعال کرتے تھے۔مثلاً ابی کاک (Ipecac) اوراو پیم (Opium) کوخفیف مقدار میں ملکے ٹنچر کی صورتمیں ملا کرمتلی اور نے کے رجحان کورو کئے کے لئے استعال کیا جاتا تھا۔حالانکہ بیدونوں دوائیں ایسی ہیں کہانگی مقدار ذراسی بڑھا دی جائے تو ان میں متلی اور قے بیدا کرنے کار جحان بشدت یا یا جاتا ہے۔ مانیمن نے اسی قسم کی بہت ہی دوائیں ا بنی ایلوپیتھک پریکٹس کے دوران معلوم کیں اوراس بات پرغور کیا کہ آخر کیوں بیدوا کیں ایک بیاری پیدا بھی کرتی ہیں اور ہلکی مقدار میں اس کا انسداد بھی کرتی ہیں۔اسغور کے دوران اس نے انسانی نظام دفاع کا رازمعلوم کیا۔اطباءعموماً بیتو جانتے تھے کہانسانی جسم میں دفاع کی طاقت ہے مگریپہ نہیں جانتے تھے کہ دفاع کی طاقت کتنی وسیع ہے اور کن اصولوں کے مطابق کام کرتی ہے اور پیھی نہیں

جانتے تھے کہ اگر بیاریاں جس میں پھولتی پھلتی رہیں تو اس دفاع کی طاقت کو ان کے خلاف کس طرح استعال کیا جاسکتا ہے۔ یہ ہومیو بیتھی کا وہ مرکزی رازتھا جس کی دریافت کا سہرا ہانیمن کے سر پر ہے۔ اس نے انسانی طبعی نظام دفاع کو اتنی گہرائی سے سمجھا اور اس کی طاقتوں کا ایسے جیرت انگیز طریق پر مشاہدہ کیا کہ آج بھی یقین نہیں آتا کہ واقعتاً انسانی جسم کوخد اتعالی نے ایسی عظیم اور لطیف طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ مگر مشاہدہ مجبور کرتا ہے کہ انسان یقین کرے۔

اس اصول کے حق میں بہت سے مزید شواہد ہائیمن کے سامنے آئے کہ جہم ہر بیرونی حملے کے خلاف ایک طبعی روعمل دکھا تا ہے۔ ہروہ چیز جس سے جہم اجنبیت محسوس کرے، خواہ وہ غذا ہویا دوا ہویا کسی قتم کا زہر ہو، جہم کا دفاعی رعمل اس کے خلاف حرکت میں آجا تا ہے۔ یہ بیرونی حملہ جتنا کمزور ہوا تنابی آسانی سے جہم اس کے خلاف کا میاب دفاع کرتا ہے۔ ڈاکٹر ہائیمن نے اس طبعی نظام دفاع ہوا تنابی آسانی سے جہم اس کے خلاف کا میاب دفاع کرتا ہے۔ ڈاکٹر ہائیمن نے اس طبعی نظام دفاع سے استفادہ کرتے ہوئے بینظر بیپیش کیا کہ اگرانسانی جسم میں کوئی الیمی بیائی موجود ہوجس کوجسم نے کسی وجہ سے نظر انداز کر دیا ہواوراس کا مقابلہ نہ کر رہا ہوتو اگر بہت ہی لطیف مقدار میں کوئی الیماز ہر جس کی علامتیں اس بیماری سے ملتی ہوں جسم میں داخل کر دیا جائے مگر اسے بلکا کرتے کرتے باکل جس کی علامتیں اس بیماری سے ملتی ہوں جسم میں داخل کر دیا جائے مگر اسے بلکا کرتے کرتے باکل بیا اثر کر دیا گیا ہوتو جسم اس نہا ہیت کمزور بیرونی حملہ کے خلاف جور دیمل دکھائے گا اسی روعمل سے باثر کر دیا گیا ہوتو جسم اس نہا ہیت کمزور بیرونی حملہ کے خلاف جور دیم مشا بہت رکھتی ہے۔ اس اندرونی بیماری کوبھی ٹھیک کر دیے گا جواس زہر کی علامتوں سے قربی مشا بہت رکھتی ہے۔ لئے استعمال کیا کہیں وہ طریقہ علاج جس میں انہی زہر یکی اشیاء کود یہی بی بیماری دور کرنے کے لئے استعمال کیا

پی وہ طریقہ علاج جس میں انہی زہریلی اشیاء کوولیی ہی بیاری دورکرنے کے لئے استعال کیا جائے جیسی وہ خود بیدا کر سکتی ہیں، اسے ہومیو بیتھی یا بالمثل طریقۂ علاج کہا جاتا ہے۔ مگر لازم ہے کہ اس زہر کو جب ہومیو دوا کے طور پر استعال کیا جائے تو اسے اتنا ہلکا کر لیا جائے کہ وہ اپنا زہریلا اثر بیدا کرنے کی طاقت سے کلیتًا محروم ہو چکی ہو۔ باوجوداس کے جسم کی لطیف دفاعی صلاحیت کا شعوراس بیدا کرنے کی طاقت سے کلیتًا محروم ہو چکی ہو۔ باوجوداس کے جسم کی لطیف دفاعی صلاحیت کا شعوراس

موہوم ہملہ کو پیچان کراس کے خلاف روِ عمل دکھائے گا۔ بسااوقات بیز ہر ہلکا کرتے کرتے عملاً بالکل معدوم کر دیا جاتا ہے اورا کیف نقط پر پہنچ کراصل زہر کا کوئی نشان بھی اس دوا مین باتی نہیں رہتا جس سے دوابنا نے کا آغاز ہوا تھا۔ جوں جوں اس عمل کواور آ گے بڑھاتے چلے جائیں لیخی اس محلول کو جس میں ابتداء کسی زہر کا قطرہ ڈالا گیا تھا مزید محلول ڈال کریدامر لیخی بنادیا جائے کہ اصل زہر کی ایک لطیف میں ابن زہر کا کوئی ایٹم تک باتی نہیں رہا تو جتنی باراس عمل کو آ گے بڑھائیں گے یاد کے سوااس محلول میں اس زہر کا کوئی ایٹم تک باتی نہیں رہا تو جتنی باراس عمل کو آ گے بڑھائیں گے اتنا ہی اس محلول کی ہومیو پیتھک پڑینسی او نچی ہوتی چلی جائے گی۔ جیرت انگیز بات بیہ ہے کہ اس محلول میں گلی ہوئی موہوم یاد کے پیغام کوروح سمجھ جاتی ہے اور روح کی جیرت انگیز بات بیہ ہے کہ اس محلول میں گلی ہوئی موہوم یاد کے پیغام کوروح سمجھ جاتی ہے اور روح میں بیصلاحیت نہ ہوکہ زہر کی محض ایک یاد کے حملہ کو خلاف بیدار ہوجاتا ہے۔ اگر روح میں بیصلاحیت نہ ہوکہ زہر کی محض ایک یاد کے حملہ کوئی ہومیو پیتھی طاقت بھی کا منہیں کر سکے گی۔ لیکن مشاہدہ بتا تا ہے کہ ایک قانون کی طرح سے اوپر کوئی ہومیو پیتھی طاقت بھی کا منہیں کر سکے گی۔ لیکن مشاہدہ بتا تا ہے کہ ایک قانون کی طرح سے اوپر کوئی ہومیو پیتھی طاقت بھی کا منہیں کر سکے گی۔ لیکن مشاہدہ بتا تا ہے کہ ایک قانون کی طرح سے اوپر کوئی ہومیو پیتھی طاقت یک لا کھ طاقت میں بھی ہومیو دوا قطعی اثر دکھاتی ہے۔

یہ اتنا لطیف نظام ہے کہ کہ روح کے وجود کوتناہم کئے بغیر جپارہ نہیں رہتا۔ اصل زہر کا موجود ہونا تو کجا، ہومیو پیتھی دواکی اونچی طاقتوں میں اس کے واہمہ کا موجود ہونا بھی ممکن نہیں، پھر بھی وہ دوا بھر پور اثر کرتی ہے۔ ہومیو پیتھی کے منکرین توالرجی کے نظام کی بھی کوئی معقول توجیہ پیش نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ امریکہ میں ایک الیں خاتون پر جسے انڈے سے الرجی ہوجاتی تھی ڈاکٹروں نے تجربہ کیا اور اسے ایک الیں عمارت میں رکھا جس کی کسی منزل پر بھی انڈ ارکھنے کی اجازت نہیں تھی خواہ وہ کسی پرندے کا ایک الیں عمارت میں رکھا جس کی کسی منزل پر بھی انڈ ارکھنے کی اجازت نہیں تھی خواہ وہ کسی پرندے کا فوری طور پر تحقیق شروع ہوئی اور نیچے سے اوپر تک اس بلند و بالاعمارت کے ایک ایک کونے کی مکمل فوری طور پر تحقیق شروع ہوئی اور نیچے سے اوپر تک اس بلند و بالاعمارت کے ایک ایک کونے کی مکمل

تلاثی لی گئ۔بالآخر جب وہ سب سے بالائی منزل کی حجت تک پنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک گھونسلے میں ایک کبوتری نے ایک انڈا دیا ہوا تھا۔ یہ حجت بیار عورت کے فلیٹ سے پندرہ بیس منزل اوپرتھی۔ اس سے یہ حیران کن انکشاف ہوا کہ انسانی جسم اتنے دور دراز کے لطیف انژات کوبھی جوہواؤں میں گھل کر کا لعدم ہو چکے ہوں گے میوس کر لیتا ہے جب کہ سی انتہائی جدیدز و دحس برقی آلہ کے لئے بھی یمکن نہ تھا کہ اس انڈے کے وجود کومسوس کر سکے۔

الرجی کے خمن میں ہونے والی تحقیقات سے ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے کہ الرجی کے بعض مریض میں آئندہ ہونے والی تبدیلی کے اثرات بھی اسنے دن پہلے محصوں کر لیتے ہیں کہ جب ابھی انتہائی لطیف سائنسی آلات نے بھی انہیں محسوں نہ کیا ہو۔ مثلاً بعض مریض ایسے ہیں جنہیں بجل کے کڑ کنے اور موسم میں اضطراب پیدا ہونے سے الرجی ہوجاتی ہے۔ چنا نچے تحقیق سے جو جیرت انگیز بات سامنے آئی وہ بھی کہ موسم کی ظاہری تبدیلیاں ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تصیں اور ان کے کوئی آثار بھی بات سامنے آئی وہ بھی کہ موسم کی ظاہری تبدیلیاں ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تصیں اور ان کے کوئی آثار بھی کسی سائنسی آلہ کے ذریعہ مضبط نہیں ہوسکے تھے پھر بھی ایسے مریضوں میں اس الرجی کے آثار ظاہر ہونے شروع ہوگئے جس کا تعلق اس بگڑے ہوئے موسم سے تھا۔ اللہ تعالی نے پرندوں کو بھی یہ ملکہ عطا فرمایا ہے کہ وہ موسم کی تبدیلی سے پہلے ہی اسے محسوس کر لیتے ہیں اور شور مجانے لگتے ہیں۔

روح ضرورر دِعمل دکھاتی ہے۔ ہومیو پیتھی میں جسم در حقیقت روح کے تابع رقبمل دکھا تا ہے نہ کہ ازخود۔ ہومیو پیتھی میں جودوائی دی جاتی ہے وہ اتن لطیف ہوتی ہے کہ اس میں کوئی بھی جسمانی مادہ باقی منہیں رہتا۔ اس لئے ظاہر ہے کہ جسم اس کے خلاف کوئی رقبمل دکھا ہی نہیں سکتا۔ صرف روح ہی جوایک لطیف حقیقت ہے اور کوئی مادی وجوز نہیں رکھتی اس لطافت کومسوس کرسکتی ہے۔ حضرت بانی سلسلہ احمد سے لطیف حقیقت ہے اور کوئی مادی وجوز نہیں رکھتی اس لطافت کومسوس کرسکتی ہے۔ حضرت بانی سلسلہ احمد سے لئے بھی اس طرز کے علاج کے لئے روحانی علاج کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بیدوہ پیرول فقیروں والی

روحانیت نہیں ہے بلکہ بیروح کا ذکر ہے۔

پروونگ (PROVING)

ہومیو پیتھک ادوییہ کے اثرات معلوم کرنے کے عمل کوطریقیۃ آزمائش (Proving) کہا جاتا ہے۔ مختلف دواؤں کےخواص جاننے کاایک ذریعہ ہزاروں سال تک پھیلا ہواوسیج انسانی تج بہہے۔ انسان کومختلف زہروں سے بار ہاواسطہ پڑتار ہاہے جس سے ان زہروں کا مزاج کا اسے پیتہ چلا ہے۔ سقراط کوآج سے 2500 برس پہلے جوز ہر دیا گیااس کا نام کونیم (Conium) تھا۔اس وقت سے پہلے سے بھی انسان کواس زہر کے اثر ات بہت حد تک معلوم تھے مگر سقراط اپنے جسم کے اندراس زہر سے یڑنے والے باریک اثرات جب تک اس میں سکت رہی تفصیل سے بیان کرتا رہا۔ اس سے پہلے وہ دنیائے طب کومعلوم نہیں تھے جوں جوں زہر کی علامات بڑھتی گئیں وہ اپنے شاگر دوں کو بتا تار ہا کہ اس ز ہر کے کیا کیااٹرات جس کے کس کس حصہ پر کس تر تیب سے پڑ رہے ہیں۔ڈاکٹر ہانیمن بھی زہروں کونہایت خفیف مقدار میں خود اپنے اوپر استعال کرنے کے بعدان کے لطیف اثرات کو بڑی باریکی سے مرتب کرتار ہااوراس کے اس فعل نے سقراط کی یادکوزندہ کر دیا ڈاکٹر ہانیمن نے بیکھی معلوم کیا کہ جوز ہرتج بہ کی خاطر کسی صحت مندانسان کو بہت تھوڑی مقدار میں بار بار دیا جائے اس سے اس زہر کی بہت باریک علامتیں بھی نکھر کرسامنے آ جاتی ہیں اور اس کا بیا ترمستقل نہیں رہتا۔ زہر کے اثر ات تفصیل سے جانچنے کے اس طریق کو Proving کہا جاتا ہے۔ ہانیمن کے طریق پر ہی بعد میں گئ ہومیو پیتھکاطباءنے نئے نئے زہروں کواپنے اویر آ زمایا اوران کے تفصیلی اثر ات مرتب کئے اوراس طریق پر ہومیو Materia madica (میٹریا میڈیکا) میں نہایت مفیداضا فہ کرتے چلے گئے ۔مگر جہاں تک Proving کے اس طریق کا تعلق ہے ہانیمن کے اصولوں کے پیش نظر کسی ایک شخص کی

Proving پراعتا دنہیں کیا جاتا بلکہ مختلف وقتوں میں مختلف موسموں میں مختلف ملکوں میں کسی دوا کی Proving کرنے والے جب اپنے اپنے مشاہدہ کی روسے اس کے اثر ات بیان کرتے ہی تو ان میں سے صرف متفقہ اثرات کو قبول کیا جاتا ہے اور بیقیقی معنوں میں Proving کہلاتی ہے۔ان مختلف Proving کرنے والوں کی وہنی افتاد اور جسمانی ساخت کی مختلف تفاصیل بھی درج کی جاتی ہیں اور اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے الگ الگ الرّ ات کو بھی مرتب کرلیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک دوا ایک موٹے آ دمی پر زیادہ اثر دکھاتی ہے اور سوکھ پر کم۔ یا اس کے برعکس معاملہ ہوسکتا ہے۔ ایسی صورت میں پر کھا جائے گا کہ بیدواا کثر موٹے آ دمیوں براثر کرتی ہے اور شاذ کے طور پریلے آ دمیوں یر بھی وغیرہ وغیرہ ۔اینے اس تجربہ کے دودران وہ ایک دوسرے سے کوئی مشورہ نہیں کرتے ۔نہ ہی ان کو بیلم ہوتا ہے کہ س نباتاتی یا معدنی مادہ کامحلول بنا کران پرتجر بہ کیا جار ہا ہے نیز اس تجربہ کومختلف موسموں میں بھی دہرایا جاتا ہے۔اس طریق براس تجرباتی محلول کے جواثرات ذہن اورجسم بربڑتے ہیں، تجربہ کرنے والا احتیاط سے ان کومرتب کرتا ہے۔سب تجارب کا تجزیاتی مطالعہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہاس دوا کے کیااثرات ہیں۔ڈاکٹر ہانیمن نے ان تجارب کی روشنی میں سب سے زیادہ اہمیت دہنی علامتوں کودی ہے۔اگر کسی خاص دہنی افتاد کے مریض پر کوئی دوازیادہ اثر کرتی ہے تو ویسی ہی ذہنیا فقاد کے دوسر مے شخص پر بھی ویساہی اثر دکھائے گی لیکن جسمانی ساخت کے ایک جیسے ہونے کے باوجودیہ دستور بسااوقات صادق نہیں آتا۔

دوابنانے کا طریق

ہومیو پیتھی میں دوا بنانے کے دوطریق ہیں۔سب سے پہلے دوا کے اصل جز وکوالکھل میں ملاکر کچھ عرصہ کے لئے رکھاجا تا ہے پھراسے چھان لیاجا تا ہے۔اس پہلی حالت کو پیٹنسی نہیں کہتے۔ یہ محلول مدر ننگجر (Mother Tincture) کہلاتا ہے۔ کئی دواؤں کو مدر ٹنگجر میں ہی استعال کیا جاتا ہے۔ مثلًا جگر کی بیاری میں کارڈس میریانس (Cardaus Marianus) مدر نیکچر ہی استعال ہوتی ہے۔ اگراس کے آٹھ دس قطرے تھوڑ ہے سے یانی میں گھول کریلائی تو بیدوا جگر کی بہت ہی بیاریوں میں مفید ثابت ہوتی ہے۔آب جب بھی کسی ہومیودوا کے ساتھ Q لکھا ہوایا ئیں تووہ مدر ٹنگیر ہی کا نشان ہوگا۔ مدر نکچر سے ہومیو دوا بنانے کا عام طریق یہ ہے کہ الکحل یا مقطریانی (Distilled Water) کے 100 قطرے ایک شیشی میں ڈال لیں اس میں صرف ایک قطرہ کسی دوا کی مدر منگجر کا ڈال کراس کا ڈ ھکنا بند کر کے دوبارز ور دار جھڑکا دیں جس سے وہ قطرہ تمام محلول میں اچھی طرح گھل کرایک حان ہوجائے۔جودوااس سے تیار ہوگی اس کوایک پٹینسی یاایک طافت کہیں گے۔مثلاً اگرا یکونائٹ مدر ٹنگجر كاايك قطره تقريباً 100 قطرے محلول ميں ڈال كر دو جارزور دار جھڭكے دیں تواسے''ا يكونائث 1'' کہیں گے۔اس ایکونائٹ 1 کی طاقت بڑھانامقصود ہوتو پھراس کا صرف ایک قطرہ کسی محلول کے تقریباً 100 قطروں میں ملا دیں اور زور دار جھٹکے دیں تو جو دوا تیار ہوگی اسے ایکونائٹ 2 کہیں گے۔ا یکونائٹ2 کاایک قطرہ لے کروہی عمل دہرائیں کہ محلول کے سوقطروں میں اسے ملا کر جھٹکے دیں توا يكونائث 3 تيار ہوجائے گی۔اس طرح 30 باركريں توا يكونائث 30 طاقت تيار ہوگی۔ہم جوروز مرہ ہومیود وائیں استعال کرتے ہیں وہ اسی طرح بنائی جاتی ہیں اوران کی طاقت کے ساتھ لفظ''C'' کھاجاتا ہے۔'' کاصرف پیمطلب ہے کہ دوا کی ہریٹینسی میں اس کی ٹجلی طاقت سے ایک قطرہ لے کر 100 قطرے محلول میں ملایا گیا ہے۔اگر ہر بارمحلول کے 100 قطروں کی بجائے صرف دس قطرے لے کران میں مدر بچر کا قطرہ ڈالیں اوراس ممل کواسی طرح دہراتے رہیں توہر بارجودوا تیار ہو گی اس کی طاقت کے سامنے''D'' ککھا جائے گا۔''D'' دس کے عدد کو ظاہر کرتا ہے۔ مائیو کیمک

دوا ئیں اس طریق پرمحلول کی بجائے ایک قسم کے بلکے میٹھے سے تیار کی جاتی ہیں۔ مثلاً مدر نگجرا یک قطرہ لے کردس گنا Dextrose میں جو بھاوں سے تیار کردہ میٹھے کی بہت ہلکی قسم ہے خوب اچھی طرح پیس کراسے بجان کردیں ۔ بعض دوا ساز مدر ٹنگجر کی بجائے اصل زہر کا جس سے دوا تیار کرنا مقصود ہو ایک چھوٹا سا ذرہ دس گرام مصحفہ میں ملا دیتے ہیں اور اسے اچھی طرح گھوٹ کر ملا دینے کے بعد جو دوا بنتی ہے اسے 1X کہتے ہیں۔ جب اس میں سے ایک گرام لے کر اسے مزید دس گرام بعد جو دوا بنتی ہے اسے 2X کہتے ہیں۔ جب اس میں سے ایک گرام لے کر اسے مزید دس گرام کے کر اسے مزید دس گرام کے کر دس تو یہ 2X میں سے ایک گرام لے کر دس تو یہ 3X کی سے ایک گرام لے کردس گو یہ 3 کی کے بیان کردیں تو یہ 3 کی کہتے ہیں کر کے جان کردیں تو یہ 23 دوا بن جائے گی ۔ اس 2X میں سے ایک گرام لے کردس گرام لے کردس گرام کے کردس گرام کی کردس گرام کے کردس گرام کے کردس گرام کے گردس گرام کے کردس گرام کی کردس گرام کے کردس گرام کی کردس گرام کے کردس گرام کردس گرام کردس گرام کے کردس گرام کردس گرام کردس گرام کردس گرام کے کردس گرام کردس گرا

غرضیکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دواکی طاقت بڑھر ہی ہے تو ہر گزیم راذہیں ہوتی کہ اصل زہر کی طاقت بڑھر ہی ہے نہیں، بلکہ ہر دفعہ جب اصل زہر کی طاقت کم ہوکر سوواں حصہ رہ جاتی ہے تو جو دوا بنتی ہے اس کی ایک طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح بائیو کیمک دواکا حال ہے۔ ہر دفعہ اصل زہر دسواں حصہ کم ہوتو بائیو کیمک دواکا سے ہر دفعہ اصل زہر دسواں حصہ کم ہوتو بائیو کیمک دواکل کے ساتھ عام طور پر C ہوتو بائیو کیمک دواکل کے ساتھ عام طور پر کا کھنے کارواج نہیں رہا بلکہ 1-2-3 یا 30-200 وغیرہ کھا جاتا ہے۔ چونکہ دنیا میں میہ معروف ہو چکا ہے اس لئے C کھنے کی ضرور سے نہیں تجھی جاتی لیکن بائیو کیمک دواکل کے ساتھ کہ ہوگی دواکل کے ساتھ نہوئی دواکل کے ساتھ '' C'' گھنے کارواج ہر جگہ اس طرح قائم ہے۔ بائیو کیمک دواکل کے ساتھ '' X'' کھنے کا رواح ہر جگہ اس مواد کیمیں گے۔ اگرا کیکہ دواکل کے ساتھ آپ ہمیشہ کیمیں گے۔ اگرا کیکہ خرار طاقت ہوتو اگریز می میں وہ 1 کہلائے گی۔ 10 مل کھا جائے تو دس بزار طاقت ہوگی۔ اگرا کیک لاکھ طاقت بنائی گئی ہوتو اسے 10 کہلائے گی۔ 10 کھا جائے تو دس بزار طاقت ہوگی۔ اگرا کیک لاکھ طاقت بنائی گئی ہوتو اسے 2 کسے ہیں۔

هوميو يبيضك ادوبيركا استعال

روز مرہ علاج میں یہ بات یا در کھیں کہ وہ مریض جو گہری اور دیرینہ بیاریوں میں مبتلا ہیں مثلاً دمه،مرگی وغیره ـ انہیں سرسری نسخه دنیا درست نہیں بلکه وقت نکال کرایسے مریضوں کاتفصیلی انٹرویوں لینا جا ہے اور بیاری کے متعلق تمام باتیں یوچھ کران کی مزاجی دوا تلاش کرنی جا ہے۔ بہت سے مریض ایسے بھی ہیں جنہیں میں نے ان کی بیاری سے متعلق معرف دوائیں اور ٹکسالی کے نسخے دیئے مگرانہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔لیکن جب مریض کوسامنے بٹھا کراس کی تفصیلی علامتیں معلوم کیں اور یماری کو بھلا کرصرف علامتوں کو دیکھا تو تشخیص کردہ دوانے حیرت انگیز طور پر کام کیا۔مثلاً مرگی کے مریضوں میں بیاری کے حملہ کے آغازیر ہونے والا''اورا''(Aura)الگ الگ ہوتا ہے اوراس کی علامات مختلف ہوتی ہیں۔بعض دوائیں ایسی ہیں جن کا مرگی کے مرض میں ذکرنہیں ملتا۔ مثلاً ایک مریض کوسر میں شورمحسوس ہوتا تھاا ورشور سے چوٹ ہی گئی تھی جس سے اسے وحشت ہوتی تھی اور نبیند نہیں آتی تھی۔ سراور دل شکنجے میں جکڑا ہوامحسوں ہوتا تھا۔اسے میں نے کیکٹس (Cactus) دی تو اس کی کایا پلیٹ گئی اور وہ آ رام سے سونے لگا۔اوراسے مرگی کے مرض سے نجات مل گئی۔ جبکہ کیکشس کا مرگی کی دوا وَں میں کوئی ذکرنہیں۔ایسے مریضوں کوجن کا''اورا''سر میں، ہوانہیں چنددن زیرنظر رکھ کر ان کے لئے نسخہ تجویز کرنا چاہیے۔ سرتمتما اٹھے اور خون کا دباؤ بہت بڑھ جائے تو وہاں کیکٹس دینی جاہیے۔ اسی طرح بعض اور بیاریوں میں مثلاً ہتے کی تکلیف میں مریض کی ساری علامتیں دیکھنی چاہئیں۔اس سلسلہ میں بہت ہی دوائیں کام دے سکتی ہیں۔ایک دفعہ میں نے ایک مریض کو پیۃ کے درد کے لئے تمام معروف دوا کیں دیں لیکن اسے فرق نہیں پڑا۔ وقت نکال کر جب اس کی عمومی علامات کا جائز ه لیا توپیة چلا که کسی نفسیاتی اوراعصا بی دباؤ کی وجهے اس کا اعصابی نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ دراصل وہ سپیا (Sepia) کا مریض نکلا اور سپیا دینے پراس کی آئکھیں کھل گئیں۔ درد جا تار ہااور وہ بالکل ٹھیک ہوگیا۔ اس سے پہ چلتا ہے کہ ضدی بھاریوں میں لاز ماً مریض کوسا منے بٹھا کر اسکی تفصیلی چھان مین ہونی چا ہیے۔ ایک دفعہ ایسا ہی تجربہ مجھے گردے کے ایک مریض کے بارہ میں ہوا۔ میں اسے مرض کے حاد حملے کوفوراً روکنے کے لئے ایکونائٹ اور بیلا ڈونا کا مشہور نسخہ دیتا رہائین اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں اسے وہ دوائیں دے رہا ہوں جو تب کام آتی ہیں جب مریض کو گرم خسال اپنچائے اور ٹھنڈ سے فائدہ ہو۔ اس مریض کو گرم خسل لینے کام آتی ہیں جب مریض کو گرم فسان پہنچائے اور ٹھنڈ سے فائدہ ہو۔ اس مریض کو گرم خسل لینے سے شدید تکلیف پہنچی تھی۔ میں نے اس بات کو پیش نظر رکھ کر جب اس کومیگنیشیا فاس اور کو لوسنتھ ملاکر دیں تو وہ دیکھتے دیکھتے ہی ٹھیک ہوگیا۔

ہومیوبیتی میں کوئی بھی تکسالی کا نسخہ ہمیشہ نہیں چل سکتا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پچھ در کے بیاری کو بھول کر مریض کو دکھے کر اس کی ذاتی علامتوں کو بیش نظر رکھیں۔ گری اور سردی کی دوائیں ذہن میں الگ الگ رکھنی چاہئیں۔ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر مریض کی طبیعت گرم ہوتا ہے۔ مثلاً اگر مریض کی طبیعت گرم ہوتا ہے۔ مثلاً اگر مریض کی حزاج کے رخ اچھی ہوتا ہے۔ مریض کے مزاج کے رخ اچھی مطرح ذہن میں رکھنے چاہئیں کہ کون ساالیا مریض ہے جس کوگر می نقصان ہوتا ہے۔ مریض کے مزاج کے رخ اچھی طرح ذہن میں رکھنے چاہئیں کہ کون ساالیا مریض ہے جس کوگر می نقصان پہنچاتی ہے یا سردی سے تکلیف بڑھتی ہے۔ اگر مید چیزیں ذہن نئین ہوں تو مریض سے ہا کہ مریض کی طرف توجہ دی جاسکتی ہے۔ اگر موریض کی طرف توجہ دی جاسکتی ہے۔ اگر موریض سے بات کرتے ہوئے مرض سے ہا کہ مریض کی طرف توجہ دی جاتی ہیں۔ میں بھی روز مرہ کی مصروفیت کی وجہ سے وقت نہ ملے تو مرض کے حوالے سے دوائیں دی جاتی ہیں۔ میں بھی ہمیشہ وقت کی کمی کی وجہ سے ایسے ہی شخوں کی تلاش میں رہا جن سے جلد فائدہ ہوجائے۔ لمبے تج بے جین نظر احتیاط سے بنائے ہوئے یہ نسخے کام اکثر صورتوں میں آجاتے ہیں لیکن جومریض باتی وہ

جائیں ان کے بارہ میں مٰدکورہ بالاطریق اختیار کرنالازم ہے۔

عام طور پر ہومیو پیتھاس فلنے کو قبول کرتے ہیں کہ ہومیو پیتھی کی ایک دوائی کو دوسری میں نہ ملایا جائے۔ میں بھی شروع شروع میں ایسا ہی کرتا رہا۔ مگر پھر مجھے پیطریق بدلنا پڑا۔ اس کی وجہ میری بید مشکل تھی کہ ایک دوائی بیچان کے لئے جتناوت چاہیے۔ مجھےوہ وقت اکثر میسر نہیں آتا تھا۔ ربوہ کے قیام کے دوران میرااصل کام جو جماعت کی طرف سے سپر در ہایا وقف جدید کا کام تھایا انصاراللہ اور خدام الاحمد بید وغیرہ کا۔ اس طرح انجمن اور ترح یک جدید کمیٹیوں میں بیٹھنے کے لئے بھی وقت نکالنا پڑتا تھا اور ان سب مصروفیات کے علاوہ میں وقف جدید کیدفتر میں ہی شام کو ہومیو پیتھک ڈ سپنسری بھی کھولتا تھا جہاں بعض دفعہ سوسوم بیض آ جایا کرتے تھے بیڈ سپنسری ابتدا میں گھر پرچای تھی جس کے لئے کھولتا تھا جہاں بعض دفعہ سوسوم بیض آ جایا کرتے تھے بیڈ سپنسری ابتدا میں گھر پرچای تھی جس کے لئے زیادہ تر مغرب اور عشاء کے درمیان وقت میسر آتا تھا۔ یہ مصروفیات مجھے مجبور کرتی تھیں کہ اسپ علم اور تجربات کی روثنی میں ایسے مرکبات بنالوں جو اکثر مریضوں کیلئے کار آ مد ثابت ہوں۔ جن کو فائدہ نہ ہو کرتا تھا۔ پس مرکب بنا نے پر مجبور ہونے کی ایک وجہ تو ہہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ہومیو پیتھک طریقہ علاج تو دن بدن نئی دواؤں سے مزین ہور ہا ہے اورائیں دوائیں دریافت ہورہی ہیں جو سابقہ دواؤں سے بہتر اثر دکھاتی ہیں یا سابقہ دواؤں میں ان مریضوں کا علاج ہی نہیں ۔ اس لئے جب مرکبات بنائے جاتے ہیں تو دراصل ایک نئی دوداوجو دمیں آتی ہے۔ کیونکہ اکثر دوائیں جو پہلے استعال ہورہی ہیں وہ قدرتی مرکبات ہی تو ہیں۔ مثلاً نکس وامیکا کوایک دو کہنا اس لئے درست نہیں کئس وامیکا تو بہت ہی دواؤں کا قدرتی طور پر بننے والا ایک مرکب ہے۔ کہنا اس لئے درست نہیں کئس وامیکا تو بہت ہی دواؤں کا قدرتی طور پر بننے والا ایک مرکب ہے۔ کہنا اس کئے درست نہیں کہ ہوئے مرکبات پر اس پہلو سے غور کرتا ہوں کہ آخری نتیجہ کے طور پر ان کی کون ہی علامات قابل اعتبار ہیں اور ہرگز ضروری نہیں کہ ہر دواجواس مرکب میں شامل ہواس کی تمام

علامات مرکب میں بھی موجود رہیں کیونکہ دوائیں ایک دوسرے کے اثر کواندر ہی اندرزائل بھی کرتی رہتی ہیںاورآ خری صورت میں بعض دفعہ بالکل مختلف تا خیر بھی ظاہر ہوتی ہے۔

وائرس(Virus)

وائرس (Virus) اپنے ارتقاء میں سب سے تیز ہے۔ کوئی اور چیز اتنی تیزی سے تکلیں برلتی نظر نہیں آتی جتنی وائرس ہے۔ اگر ہومیو پیتھک طریق پر صحیح دوادے کراسے ختم نہ کیا جا سکے توا بنٹی بائیوٹک دوا دینے سے جو وائرس کی قتم مرے گی اس کے بدلے پہلے سے زیادہ خطرناک ایک نی قتم پیدا ہوجائے گی اور بیسلسلہ بڑھتے بڑھتے کینسر میں بھی تبدیل ہوسکتا ہے۔

ایک عام اصول

یہ عام اصول یا در گلیں کہ جہاں عوارض مزمنہو کچے ہوں یا اس نوعیت کے ہوں کہ بہت آ ہستہ آ ہستہ بڑھ کرانہوں نے نظاجسم پر قبضہ کیا ہوان کے علاج کے لئے ایسی دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے جس کے مزاج میں آ ہستگی پائی جاتی ہے اور وہ لمبے عرصہ تک استعال کرتے رہنے پر آ ہستہ آ ہستہ اپنااثر دکھاتی ہیں۔ دریہ بیاریوں میں جو دوائی تجویز کریں وہ چھ ماہ ،سال تک دیتے رہیں۔ پہلے پچھ عرصہ دکھاتی ہیں۔ دریہ بیاریوں میں جو دوائی تجویز کریں وہ چھ ماہ ،سال تک دیتے رہیں۔ پہلے پچھ عرصہ دکھاتی ہیں دیں ۔ پھر جب وہ اثر بند کر دیتو 200 میں شروع کر دیں۔ ہفتہ دس دن میں ایک دفعہ اور اس کے بعد پھر مہینے میں ایک دو بار 1000 میں دیتے رہیں۔ پھر آخری خوراک (Dose) ایک لاکھ میں دے کر چھ مہینے یا سال کے بعد اسے دہرا کر علاج بند کر دیں اور اس کے رفتہ رفتہ ظاہر ہونے والے اثر ات کا بغور مطالعہ کریں۔

طاقت (Potency)

پڑٹینسیوں کی بحث ایک الگ مضمون ہے۔اس میں بہت سائنٹیفک طور پر ریسرچ ہوئی ہے کہ

کس فتم کے مریضوں اور اور بیار یوں میں کون کون کی پوٹینسیاں استعال ہونی چاہئیں۔ معدے کی کالیف میں نسبتاً چھوٹی پوٹینسیاں زیادہ اثر کرتی ہیں۔ اعصابی کالیف ہوں تو 200 یا زیادہ اونچی طاقتوں کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔ گہری نفسیاتی بیار یوں میں ہڑی پوٹینسی میں فائدہ ہوتا ہے۔ کینسر کی بعض قسموں میں زیادہ اونچی طاقت دینی پڑتی ہے۔ لیکن بعض مریضوں کی حالت اتنی بگڑچی ہوتی ہے کہ ان کواونچی طاقت دینا ان کے لئے زہر ثابت ہوتا ہے۔ سلے رفتہ رفتہ ان کی جسمانی حالت کو اعتدال پرلانے کی کوشش کرنی چا ہیے اور مناسب غذا اور وٹا منز کے استعال سے بھی استفادہ کرنا چا ہیے۔ جب مریض میں ردعمل برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہوجائے تو پھرتمیں طاقت سے علاج شروع کرکے طاقتوں کو تدریجاً بڑھایا جاسکتا ہے۔ ایک دوسرے کی وٹمن دواؤں کو بھی اکھانہیں دینا جا ہے یہ تو تیزگرم چائے میں آئس کریم ملانے والی بات ہے۔

اگرچہ کینٹ نے بعض دواؤں کے استعمال میں لا کھ طاقت سے بہت ڈرایا ہوا ہے۔ان میں خصوصیت سے سلیشیا (Silicea) شامل ہے حالانکہ سلیشیا کوایڈزاوربعض قسم کے کینسرز میں میں نے لاکھ سے نیچے ہزارتک کی طاقتوں میں مفید ہی نہیں یایا۔

ہومیو پیتھی میں اگر دی گئی دوا کا اثر نمایاں نہ ہوتو دو ہی طریقے ہیں۔ یا تو دواد ہرا دی جائے اور جب دیکھیں کہ بار بار دہرانے سے بھی اثر نہیں ہوتا تو تجربتاً اونچی پڑینسی دے کر دکھے لینا چاہیے۔ دوسراطریق یہ ہے کہ پڑینسی وہی رہنے دی جائے اور پچ میں ایسی دوا دی جائے جور ڈمل کو بحال کر دے۔

سل کے مریضوں کوسلفراونچی طافت میں دینے سے لاز ماً احتر از کرنا چاہیے۔ان کا علاج ہمیشہ حچوٹی طاقتوں سے شروع کرنا چاہیے۔

ہومیو پینھک دوا کی خوراک (DOSE)

لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی ہومیو پیتھی دوا دن میں کتنی دفعہ اور کتنی مقدار میں کھانی چاہیے؟ اس مسلے

پر ہومیو پیتے آج تک متفق نہیں ہو سکے۔ ہرایک اپنے تج بے کے مطابق مختلف طریق استعال کرتا ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں ہر جگہ اپنے تج بہ کے مطابق ہی کار آمد طاقتیں تجویز کی ہیں اور مختلف ہومیو پیتھس کے تجارب کے بیش نظران کی کتابوں میں فدکور طاقتوں کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ اور یہ بات معالج پر کھلی چھوڑ دی ہے کہ وہ جو طریق چا ہے اختیار کرے۔ جن طاقتوں کے مؤثر ہونے پر میں خود شاہد ہوں ان کو استعال میں لانے والے شاذ کے طور پر ہی ان سے استفادہ کرنے سے محروم رہیں شاہد ہوں ان کو استعال میں لانے والے شاذ کے طور پر ہی ان سے استفادہ کرنے سے محروم رہیں علی سے موان مریضوں کے مناسب کے کہ وہ ان دواؤں کو اس طاقت میں استعال کریں جو ان مریضوں کے مناسب حال نہ ہو۔

ہومیو پیتھک ادویات کی مقداراتنی اہم نہیں ہوتی۔ مریض چند گولیاں کھائے یا زیادہ کھائے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ البتہ کوئی دوائی جتنی دفعہ کھائی جائے اس سے ضرور فرق پڑتا ہے۔ ہومیو پیتھی دواایک دفعہ کھانے کوایک سٹرائیک (Strike) کہا جاتا ہے۔ دوا کے منہ میں ڈالتے ہی جس میں اس کا ردِممل شروع ہوجا تا ہے۔ اور دن رات مین جتنی باریہ دوائی لی جائے گی ہر دفعہ تحریک کااعادہ کرے گی۔

بعض ہومیو پیتھک معالجین اصرار کرتے ہیں کہ دواہاتھ کی بجائے کاغذ پر ڈال کر کھانی چاہیے ورنداس کا اثر ضائع ہوجائے گا۔ حالانکہ عام طور پر ہاتھ منہ سے زیادہ صاف ہوتے ہیں اور منہ میں گئ فتم کی آلائشوں کی تہیں چڑھی ہوتی ہیں۔ اگر منہ دوا کے اثر کو قبول کرسکتا ہے تو پھر ہاتھ پر ڈال کر کھانے سے کیا فرق پڑسکتا ہے۔ اگر کاغذ پر ڈالی جائے تو کاغذ پر بھی تو آلودگی ہوتی ہے۔ عام خور دنی نمک کی ہومیو پیتھک ویشرم میور (Natrum Mur) کہا جاتا ہے۔ منہ میں پہلے ہی اتنی مقدار میں نمک موجود ہوتا ہے کہ اس کی ہومیو پیتھک خوراک کھائی جائے تو ایسا ہی ہے جسے نمک کی کان میں نمک موجود ہوتا ہے کہ اس کی ہومیو پیتھک خوراک کھائی جائے تو ایسا ہی ہے جسے نمک کی وجہ ہیں ہو کان میں نمکین یانی کا معمولی سا قطرہ ڈال دیا جائے لیکن اس کے باجود اثر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہیہ ہے

کہ اس اثر کا مادی ذرات سے تعلق نہیں ہوتا۔ دوا بناتے ہوئے جب محلول سے اصل مادہ بالکل غائب ہوجا تا ہے تو اس کے اندر محض اس کی ایک یا دسی باقی رہ جاتی ہے جومنہ یا خون میں شامل ہو کر اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے اور روح اس پیغام کو مجھ لیتی ہے۔ دراصل خدا تعالی نے یا دکا ایک ایسانظام بنار کھا ہے کہ وہ بھی نہیں مٹتا۔ یہ ایک روحانی نظام ہے جس کا مادے سے بھی ایک تعلق ہے۔

دوا کب کھائی جائے

دوا کھانے میں بیاحتیاط لازم ہے کہ کھانے معاً پہلے یعنی آ دھے گھنٹے تک اور آ دھے گھنٹے بعد تک نہ کھائی جائے تو بہتر ہے۔ اگر اس وقفہ سے کم میں بھی کھانی پڑے تو بچھ نہ بچھ اثر ضرور دکھائے گالیکن دوا کا بہترین وقت خالی پیٹ کا ہے۔ اگر فوری ضرورت پیش آئے تو پھر کسی بھی وقت ہومیو دوائی لی جاسکتی ہے۔ نہار منہ یارات کے کھانے کے دو دھار گھنٹے بعد دوا کھانا بہر حال بہتر ہے۔

مریض کی خوراک

ہومیو پلیتھی طریق علاج میں خوراک کے بارے میں کوئی خاص پابندی نہیں ہے کہ کیا کھایا جائے اور کیا نہ کھایا جائے۔ ہومیو پلیتھی دوائیں ہرشم کی خوراک کھانے کے باوجود مکمل اثر دکھاتی ہیں اور کسی فتم کاخلل واقع نہیں ہوتا۔ لیکن میر بھی حقیقت ہے کہ ہر مریض کوالی غذا کے استعال سے پر ہیز کرنا چاہیے جس سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوجا تا ہواور ہ اس کے مزاج سے موافقت نہ رکھتی ہو۔ اس کا فیصلہ طبیب سے بڑھ کر مریض خود کر سکتا ہے۔

ہومیو پیتھک دوا ؤں کومحفوظ رکھنے کا طریقہ

ہومیو پیتھک دوائیں لمبے عرصہ تک خراب نہیں ہوتیں ۔سوسال سے زائد مدت تک بھی بڑی

ر ہیں پھر بھی اثر دکھاتی ہیں۔ لیکن عموماً انہیں معتدل درجہ حرارت پر خشک جگہوں پر رکھنا چاہیے۔
شیشیوں کے ڈھکنے اچھی طرح سے بند ہوں۔ درجہ حرارت بڑھنے سے عموماً دواخراب نہیں ہوتی لیکن
اگر دوائنگجر کی صورت میں ہواورشیشی کے ڈھکنے کواحتیاط سے بند نہ کیا گیا ہوتو درجہ حرارت بڑھنے سے
دواسو کھ جاتی ہے۔ اگرشیشی بالکل خشک ہوجائے تو تازہ دوابنانی چاہیے لیکن ایک قطرہ بھی موجود ہوتو
اس میں دوبارہ محلول ڈال کراسے بھر سکتے ہیں۔ اس طرح دواکی پوٹینسی ایک درجہ زیادہ ہوجائے گ
لیمنیں دوبارہ محلول ڈال کراسے بھر سکتے ہیں۔ اس طرح دواکی پوٹینسی ایک درجہ زیادہ ہوجائے گ

ہومیو بیتی دواؤں کے بارے میں بیاحتیاط لازم ہے کہ انہیں براہ راست دھوپ میں نہرکھا جائے کیونکہ سورج کی شعاعوں سے ان دواؤں کا اثر زائل ہوسکتا ہے۔اگر دواکی خالی شیشیاں دوبارہ استعال میں لانی ہوں تو انہیں پانی میں ابال کر خشک کر کے دھوپ میں رکھ دیں تا پہلی دوا کے تمام اثرات مٹ جائیں۔

سب دواؤں کو الگ الگ شیشیوں میں رکھنا چاہیے۔ اگر چہ بعض دواؤں کے نسخے بنا کرر کھنے سے اثر کلیتاً زائل تو نہیں ہوتالیکن وہ دوائیں جوایک دوسرے کے اثر کو زائل کر دیں اور آپس میں ہم مزاج نہ ہول انہیں الگ الگ رکھنا ضروری ہے۔ ضرورت کے مطابق تازہ کمسچر بنایا جائے تو بہتر ہے بنسبت اس کے کہ سچر بنا کررکھا جائے۔

دوا کوحتی الامکان تیز خوشبو کے اثرات سے بچا کر رکھنا چاہیے خصوصاً کافور کی خوشبوتو اکثر ہومیو پیتھی ادو پید کے اثر کوزائل کردیتی ہے۔اگر کمرے میں خوشبویا تیز دوا کا سپرے کیا گیا ہوتو جب تک اس کا اثر زائل نہ ہوجائے مائع ہومیو پیتھک دواؤں کی شیشیاں نہ کھولی جائیں۔

الیکٹرولائٹ(Electrolyte)

خون کا وہ سیال مادہ جس میں سرخ اور سفید ذرے معلق رہتے ہیں اسے پلاز ما کہتے ہیں۔اس

میں بارہ نمکیات ہوتے ہیں جنہیں الیکٹر ولائٹ کہتے ہیں۔ایک نظریہ یہ ہے کہ ان نمکیات کے توازن کے گڑنے کا نام بیاری ہے۔ یہ نظریہ بائیوکیمک (Bio-Chemic) نظریہ کہلاتا ہے اوران کے نزدیک ان بارہ نمکیات کے سخچ استعال سے ہی ہرتسم کی بیاری قابومیں آسکتی ہے۔اس دعوے میں کچھ نہ کچھ صدافت ضرور ہے مگراس میں کچھ مبالغہ آمیزی سے کام لیا گیا ہے۔

ہومیو بیتھی اور بائیوٹیمی میں فرق

بائیویمی کادوسرانام Tissue Remedies ہے۔انسانی خون کے نظام میں بارہ کیمیائی مادے (Chemicals) ایک خاص توازن میں پائے جاتے ہیں۔اگریہ توازن بگڑ جائے توانسان ضرور بیار پڑجا تا ہے۔قانون قدرت کے مطابق بارہ کیمیائی مادوں کا باہم متوازن ہونا ضروری ہے۔ یعنی جس مقدار میں اور جس تناسب میں اللہ تعالی نے آئہیں خون میں معلق فرمایا ہے وہ تناسب بگڑتے ہی ضرور کسی بیاری پر منتج ہوگا۔

بعض دفعہ خطرناک بیاریاں ان نمکیات کا توازن بگڑنے سے نہیں پیدا ہوتیں بلکہ بیرونی وجو ہات مثلاً مہلک جراثیم وغیرہ کے حملہ سے پیدا ہوتی ہیں۔وہ بیاریاں ان نمکیات کا توازن بگاڑنے کا موجب بن جاتی ہیں جوایک دفعہ بگڑ جائے تو بیاریوں کومزید بڑھا دیتا ہے اور بسا اوقات مریض کے لئے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔

بائیو کیمک طریق علاج میں اس پر بہت تحقیق ہوئی ہے کہ ان کیمیائی مادوں سے بنائی ہوئی بائیو کیمک طریق علاج میں اس پر بہت تحقیق ہوئی ہے کہ ان کیمیائی مادوں سے بنائی ہوئی بائیو کیمک دوائیں کس کس بیماری اور کس کس قتم کی مضرعلا مات کو درست کرنے میں مفید ثابت ہوتی ہیں۔ مثلاً جہاں اکثر شخص بیماریوں میں کالی فاس مفید بتائی جاتی ہے۔ میگ فاس مفید بتائی جاتی ہے۔

بائیو(Bio) کامطلب ہے زندگی اور کیمک'' کیمیکل'' کامخفف ہے۔ وہ کیمیکل جوزندگی برقرار

رکھنے کے لئے ضروری ہیں، ان میں ایک دوا سلیٹیا ہے جو کسی کیمیائی مرکب سے نہیں بلکہ سلیکون (Silicon) سے بنتی ہے جوز مین کا ایک عالمگیر جزو ہے اور ہرمٹی میں پایا جاتا ہے انسانی جسم پر سلیٹیا کا زیادہ تر اثر اس طرح ہوتا ہے کہ بیہ ہر ہیرونی حملے کے خلاف جسم کو متحرک کردیتی ہے۔ اسی دواسے او نچی طاقت کی ہومیو پیتھک دوا کیں بھی بنائی جاتی ہیں۔ صرف سلیٹیا پر ہی بس نہیں تمام بائیو کیمک ادویہ کا طاقت کی ہومیو طاقت میں بھی بنائی جاتی ہیں۔ صرف سلیٹیا پر ہی بس نہیں تمام بائیو کیمک ادویہ کا طاقت کے علاوہ کا طاقت میں بھی بنائی جاتی ہوتی اور کا میانی سے استعال ہوتی ہیں۔

بعض معالج سیجھتے ہیں کہ بائیو کیمک دواؤں کی حدود کے اندرر ہتے ہوئے وہ ہر بیاری کا علاج کر سکتے ہیں اس لئے بیہ ہومیو پیتھی طریق علاج کی ایک الگ شاخ بن گئی ہے جب کہ ہومیو پیتھک معالج سینکڑوں ہومیو پیتھک دواؤں کے علاوہ ہائیو کیمک دوائیں بھی استعال کرتے ہیں۔

کسی بیاری کے پیدا ہونے کیلئے ہرگز ضروری نہیں کہ پہلے خون میں موجود بارہ نمکیات کا توازن سے گڑے تو اس کے نتیج میں کوئی بیاری گئے۔ ہزاروں بیاریاں ایسی ہیں جو نمکیات کے توازن سے بیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پرٹائیفائیڈ اور پولیو بیرونی جراثیم کے حملے سے ایسے تحس کوبھی لاحق ہوجاتے ہیں جس کا نمکیات کا نظام متوازن ہوتا ہے۔ اگر دوسری ہومیو دواؤں سے ٹائیفائیڈ اور پولیوکا حجے علاج کیا جائے اوراعصاب میں زندگی کی کچھرمتی باقی ہوتو زندگی ان کے خلاف دفاع شروع کردیتی ہے اور رفتہ رفتہ بیاری کے اثرات مٹنے لگتے ہیں۔

ایک تنبیه

ایک امر سے میں یہاں تمام معالجین کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ بائیو کیمک ادویات کامسلسل استعال خون کا وقاً فو قاً تجزیہ کرائے بغیرانتہائی خطرنا ک نتائج کا حامل بھی ہوسکتا ہے اوران کا اندھا دھنداستعال نمکیات کا توازن درست کرنے کی بجائے انہیں حدسے زیادہ بگاڑ بھی سکتا ہے۔ایسی

مثالیں موجود ہیں کہ بائیوکیمک کے ٹانک استعال کرنے سے بعض بچوں کو بلڈ کینسر ہوگیا اور وہ سنجالے ہیں سنجھے۔ بہخطرات بڑے گہرے ہیں۔

ایک غلطی کاازاله

ہومیو پیچک دواؤں کے بارے میں بیہ خیال کہ یہ بالکل بے ضرر ہیں یعنی ان کے غلط استعمال سے بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا، درست نہیں ہے۔اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی اناڑی اور بیوتو ف کے ہاتھ میں بہت تیزرفتار کارآ جائے تو باوجوداس کے کہوہ کار حفاظتی نقطہ نگاہ سے بہت ماہرانہ طریق بر بنائی گئی ہوا کیک اناڑی کے ہاتھ میں نہایت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔

ایلو پیتھک معالج کتنے بھی سمجھدار کیوں نہ ہوں ،ان کی بیر مجبوری ہے کہان کی دوائیں ایک مرض کوتو دورکر دیتی ہیں مگر دوسرا پیدا کر دیتی ہیں۔

مرزا طاہر احمہ

اس نے ایڈیشن کے متعلق کچھ ضروری ہاتیں

جب انگلستان میں پہلی بار ہومیو پیتھی کلاس کا آغاز کیا گیا تو بنیادی مقصد پیتھا کہ سلم ٹیلی ویژن احمد بیہ (MTA) کے ذریعیہ جوں جوں اس ٹیلی ویژن کا دائرہ کار دنیا میں پھیلتا چلا جائے، دنیا بھر میں ہومیو پیتھی کی تر و تنج ہو سکے۔

شروع میں اس کلاس کیلئے جوشا گردسٹوڈیو میں اعظمے کئے گئے ان میں چندایک ایلوپیتھک ڈاکٹر اور ہومیوڈاکٹر بھی شامل تھے گریہ معدودے چند تھے۔ بھاری اکثریت ایسے طلماءاور طالبات کی تھی جن کو ہومیو پلیتھی تو در کنار دنیا کے کسی علم طب کی الف بھی نہیں آتی تھی اورا کثر کوسائنس کی بھی کوئی سدھ بدھنہیں تھی۔ میرے لئے یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ میں ہومیوپیتھی کو اس طریق پر یڑھاؤں کہ رفتہ رفتہ ہومیو پیتھک فلسفہ کے علاوہ ہومیو پیتھک دواؤں کے متفرق اثرات اور مریضوں اورمرضوں کی شناخت کے طریق وغیرہ سے ان سب کواچھی طرح آگاہ کرسکوں۔ اس چیلنج کوقبول کرتے ہوئے مجھے یہی تر کیب بھھائی دی کہ شروع سے لے کرآ خرتک ہر دوا کے ذکر میں بار بارتفصیل کے ساتھ نہ صرف اس دوا کا ذکر کروں بلکہ ملتی جلتی تمام دواؤں کا ذکر بھی اسی باب کے تحت کر دوں ۔اسی طرح مریضوں کی نوعیت کے متعلق بھی تفصیل سے روشنی ڈالوں اور مختلف امراض کے لئے بض نسخے ڈپکلوں کےطور پرتجویز کروں جنہیں ہومیو پیتھی کا ایک ابتدائی طالبعلم اپنے روز مرہ کے استعال میں لا کران سے استفادہ کر سکے۔اس کا ایک ضمنی فائدہ یہ بھی ہونا تھا کہ میرے طلباء کا ہومیو پیتھی پریفین بڑھتا چلا جاتا۔اس طریق تعلیم کواختیار کرتے ہوئے میں نے ہر دوا کے ذکر میں نہایت تفصیل کے ساتھ ملتی جلتی دواؤں کا بھی ذکر کیا۔ان امراض کی قسموں کا بھی بیان کیا جوان

دواؤں کے زیراثر ٹھیک ہوسکتی ہیں اورسب دواؤں کے مزاج پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی۔غرضیکہ ہر دوا کے ذکر میں اس کثر ت سے متفرق امراض اور دیگر دواؤں کا ذکر کرتار ہا کہان ابتدائی طالبعلموں کو گویا گھوٹ گھوٹ کر ہومیو پیتھی بلانی پڑی لیکچرز کےطور پرتو پیطریق بہت ہی مفیداور کامیاب رہا۔ لیکن ایک متقل کتاب کے اندران سب امور کا دہرانا مناسب نہیں تھا۔اس کتاب کے پہلے ایڈیشن کی لفظی مرمت تو میں نے کر دی تھی۔ ہاں!اس میں بھی کتابت کی بہت سی غلطیاں رہ گئی تھیں۔ مگراس پہلو سے میں سابقہ ایڈیشن کا مطالعہ نہیں کر سکا تھا کہ کتاب کے بڑھنے والے ر مذکورہ بالا تکرار کا کیا اثر پڑے گا۔ جب میں نے اس پہلوسے کتاب کا مطالعہ کیا تواسے شخت اعصاب شکن پایا۔ ایک بالکل نیا قاری کتاب کےمصنف کے متعلق یہی رائے قائم کرسکتا ہے کہمصنف کی یا دداشت سخت کمزور ہے اور وہ ان با توں کوسلسل ہر باب میں دہرا تا چلا جار ہاہے جو پہلے باب میں بیان ہو چکی تھیں۔ چونکہ اب میراارادہ پیہ ہے کہاس کتاب کوانگریزی اور دنیا کی دیگراہم زبانوں میں ترجمہ کر کے بکثرت شائع کیا جائے اس لئے یہ نیاایڈیشن بہت احتیاط سے تیار کیا جار ہاہے اور حتی المقدور کوشش کی گئی ہے کہ مضمون کی تکرارصرف اتنی رکھی جائے جتنی طبیعت برگران نہیں گزرتی بلکہ یا دداشت کوتازہ کردیتی ہے۔علاوہ ازیں بیجھی کوشش کی گئی ہے کہ ملتی جلتی دواؤں کا صرف ان امراض کے تعلق میں ذکر کر دیا جائے جن سےان کا تعلق ہے۔ صرف ان کے نام درج ہیں اور بعض جگہ پیکھا ہوا ہے کہ جس نے تفصیل دیکھنی ہو وہ ان کے باب میں مطالعہ کرلے۔اس طرح کتاب کا حجم تو بہت کم ہو گیا ہے لیکن افادیت کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی ہے۔

اس ایڈیشن کا انڈیکس بھی از سرنو تیار کرنا پڑا ہے اور اس میں دوسری جلد کی دواؤں کو بھی حروف ہجی کے لحاظ سے ترتیب دے کر بچے میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اس بنا پر بھی نیاا نڈیکس تیار ہونا ضروری تھا۔ بہت خوشکن بات بیہ ہے کہ جلد دوم کی دواؤں کو جلداول میں شامل کرنے کے باوجود کتاب کا حجم بڑھنے

کی بجائے کم ہوگیا ہے۔

کتاب کے اس ایڈیشن میں چندرنگین تصاویر کا اضافہ بھی کیا گیا ہے جوان جڑی ہو ٹیوں یا عناصر کی ہیں جن سے بیادویات تیار کی جاتی ہیں۔

آخر پر قارئین سے گزارش ہے کہ میری بشری کمزوری کی بناپر لاز ما کچھ غلطیاں اس نے ایڈیشن میں بھی رہ گئی ہوں گی جوعمو ما مصنف سے بھی میں بھی رہ گئی ہوں گی جوعمو ما مصنف سے بھی منسوب ہوجاتی ہیں ۔اس قتم کی سب غلطیوں سے متعلق میں قارئین سے دلی معذرت چا ہتا ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی درگز رفر مائے اور یہ کوشش بنی نوع انسان کیلئے ان چند غلطیوں کے باوجود غیر معمولی فائدہ کا موجب ہے۔

والسلام

خا کسار

مرزا طاہر احمد

ابرائينم 1

1

ابراثينم

ABROTANUM

ابراٹینم ایک ایسی دوا ہے جس کا نام سنتے ہی انتقال مرض کا مضمون ذہن میں ابھرتا ہے۔ انتقالِ مرض کوائکریزی میں میٹاسٹیسز (Metastasis) کہتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مرض ایک عضو کوچھوڑ کرکسی دوسر عضو کی طرف منتقل ہوجائے جبیبا کہ عموماً کن پیڑوں کی بیماری میں یہ عادت پائی جاتی ہے کہ گلے پراور کان کے پیچھے جوا بھار پیدا ہوتا ہے وہ وہاں سے دب جاتا ہے اور اعضائے تناسل کی طرف منتقل ہوجا تا ہے۔ اس کے دبنے کی وجوہات مختلف ہیں مثلاً جراثیم کش دواؤں کے استعال سے یا مقامی طور پرلیپ وغیرہ کرنے کے نتیجہ میں بھی ایسا ہوسکتا ہے اور بعض اوقات بخار کی حالت میں سردی لگ جانا و جہ بن جاتا ہے۔ وہ سب دوائیں جوانقال مرض میں کام آتی ہیں اور اسے واپس اپنی پہلی جگہ کی طرف لوٹا دیتی ہیں ان میں ابراٹینم کوئمایاں مقام حاصل ہے۔

بعض اوقات اسہال کے دب جانے کے نتیجہ میں اچا نک جوڑوں کے در دشروع ہو جاتے ہیں اور بھی دل پرشدید حملہ ہو جاتا ہے۔اسی طرح بعض دفعہ عورتوں کا ایا م جیض کا خون اچانک بند ہو جانے پران کو ذہنی یا دوسرے عوارض لاحق ہو جاتے ہیں۔

انقالِ مرض کوہم مختلف دواؤں کے تعلق میں بار بار بیان کریں گے تا کہ بیا چھی طرح ذہن نشین ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ کون کون سی دوائیں کس کس انتقالِ مرض کو درست کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔

اگرکسی مریض کو جوڑوں میں درد کی بیاری ہومثلاً گاؤٹ (Gout) یا وجع المفاصل اور ساتھ ہی دل میں کچھ بے چینی کا احساس پایا جائے جیسے خون دل کو چھیلتا ہوا گزرتا ہو، نیز ایسے مریض کو اگر نکسیر اور پیشاب میں خون آنے کی تکلیف بھی ہوتو اس بات کا بھاری امکان ہے کہ بیمریض ابراٹینم سے شفایائے گا۔

ابراٹینم کے بنیادی مزاج میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کا مریض اسہال کے دوران آ رام پاتا ہے کیونکہ وہ فاسد مادے جو جوڑوں کی تکلیف پیدا کرتے ہیں اسہال کے ذریعہ بی السمال ہے کہ اس پیا تا ہے کیونکہ وہ فاسد مادے جو جوڑوں کے اسہال کا اگر ابراٹینم کے ذریعہ بی علاج کیا جائے تو رفتہ رفتہ اسہال بھی دور ہوجا ئیں گے اور جوڑوں میں دردکی شکایت بھی ختم ہوجائے گی ۔اگر جوڑوں کے دردکسی دوایا مقامی علاج مثلاً عکوروغیرہ سے ٹھیک ہوجائیں اور اسہال لگنے کی ۔اگر جوڑوں کے دردکسی دوایا مقامی علاج مثلاً عکوروغیرہ سے ٹھیک ہوجائے جوملتی جاتی بیا کہ بجائے بلوریسی (Pleurisy) یعنی ذات الجنب کی تکلیف شروع ہوجائے جوملتی جاتی شروع کیسے ہوئی تھی نہ ہوتو ہومیو بیتھ کا فرض ہے کہ وہ یہ تھیتی کرے کہ ذات الجنب کی تکلیف شروع کیسے ہوئی تھی ۔اگر اس سے پہلے جوڑوں کے درد پائے جاتے تھے جن کے ٹھیک ہونے شروع کیسے ہوئی تو لازماً ابراٹینم ہی اس مریض کی دوا ہوگی ۔ اس کا پہلا اثر تو یہ ہوگا کہ بلوریسی کے بعد بلوریسی نہ تھی جوڑوں نے ۔اللہ تعالی نے چاہا تو اسی دوا سے جوڑوں کے درد بھی ٹھک ہوجائے گی ۔ اس کا دروجی ٹھک ہوجائی ہی جاری رکھنا چا ہے ۔اللہ تعالی نے چاہا تو اسی دوا سے جوڑوں کے دروجی ٹھک ہوجائیں گے۔

ید دوا بچوں کے سوکھے بن کی بیاری میں بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے کیکن محض اس صورت میں جب اس کی مخصوص علامت بچوں میں پائی جائے۔ سو کھے کے مریض بچوں کے علاج میں ایتھوزا (Aethusa)، نیٹر م میور (Natrum Mur)، اور کلکیر یا کارب علاج میں ایتھوزا (Calc. Carb)، نیٹر م میور (Calc. Carb) کو بھی بہت شہرت حاصل ہے۔ کلکیر یا کارب کا سوکھا بین صرف ٹا نگوں سے تعلق رکھتا ہے جبکہ ابراٹینم کا سوکھا بین بھی گوٹا نگوں سے شروع ہوتا ہے مگر ٹا نگوں تک محدود نہیں رہتا اوراو پر کے بدن کی طرف منتقل ہونے لگتا ہے۔ صرف اسی ایک علامت کا پایا جانا ہی ابراٹینم کی شخیص کرنے کے لئے کا فی ہے۔ اگر 30 طاقت میں دن میں تین باردوا شروع کروائی جائے تو خدا کے فضل سے مکمل شفا کا موجب ہوسکتی ہے۔

اگر <u>جوڑوں کے در دوں</u> کےعوارض بظاہرٹھیک ہوجا ئیں لیکن مریض کا دل بیار پڑ جائے تو متعلقہ دواؤں کی تلاش میں ابراٹینم کونظرا ندا زنہیں کرنا چاہئے ۔

اسہال اچا نک بند ہونے کے نتیجہ میں بعض اوقات جوڑوں کے دردوں کے علاوہ خونی بواسیر کی شکایت بھی ہوجاتی ہے۔ اس کا بھی ابراٹینم سے ہی علاج کیا جائے۔ ایسے مریض کا عمومی مزاج سردی بہت محسوس کرتا ہے اور تکلیفیں ٹھنڈے اور بھیگے موسم میں بڑھ جاتی جاتی ہیں۔ ایسے مریض کو اکثر کمر درد کی بھی شکایت رہتی ہے جو ہمیشہ رات کو بڑھ جاتی ہے۔ کمر کا ایسا در دجورات کے پچھلے پہر یعنی تین چار بجے کے قریب بڑھے وہ ابراٹینم کی نہیں بلکہ کالی کارب (Kali Carb) کی نشان دہی کرتا ہے۔ ابراٹینم کا در درات کے کسی معین جھے سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اکثر رات بڑنے پر کمر در دمیں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اگر ایسے مریض میں ابراٹینم کی مرکزی علامت بھی پائی جائے یعنی اس کا ہر مرض اسہال لگ جانے سے ٹھیک ہوجائے تو ایسا کمر در دبھی ابراٹینم سے شفا پا جائے گا۔ اسہال سے بہتری جانے سے ٹھیک ہوجائے تو ایسا کمر در دبھی ابراٹینم سے شفا پا جائے گا۔ اسہال سے بہتری مصوس کرنے کی علامت کسی حد تک نیٹر مسلف (Natrum Sulph) اور خصوس کرنے کی علامت کسی حد تک نیٹر مسلف (Natrum کی دوسری امتیازی علامتیں بغیر دفت کے فیا خت کی جائے تھیں بائی جاتی ہوئی ہیں ہو کیا تھی بیش میں بغیر دفت کے شاخت کی جائے تھی بیں۔

ابراٹینم کے دردبعض اوقات تیز اور کاٹنے والے ہوتے ہیں جو جوڑوں کے علاوہ خوا تین کی بیضہ دانیوں (Ovaries) پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ الیی مریضہ جس کی بیضہ دانی میں اس قتم کے کاٹنے والے در دہوں اور وہ عموماً جوڑوں کے در دکی بھی شاکی رہے یا رات کو بڑھنے والا کمر در دابراٹینم کے مشابہ ہواور اسے اسہال سے آرام ملتا ہوتو اس کے بانجھ بین کا بھی ابراٹینم ہی بہترین علاج ثابت ہوگا۔

طاقت: 30

بستتهم

2 ایسنتھیم

5

ABSINTHIUM

(Common Worm Wood)

ابسنتھم کا سب سے نمایاں اثر دماغ پر ہوتا ہے اور یہ مرگی کے مرض میں بہت کارآ مد ثابت ہوئی ہے۔ اگر مرگی میں کیو پرم (Cuprum) کی طرح جسم نیلا ہو جا تا ہواور ہاتھ پاؤں مڑنے لگیں تو ان علامات میں کیو پرم کے علاوہ ابسنتھم بھی دوا ہوسکتی ہے۔ مرگی کے تملہ سے قبل مریض اعصا بی بے چینی محسوس کرتا ہے، اچا تک متلی ہوتی ہے۔ مرگی کے تملہ سے قبل مریض اعصا بی بے چینی محسوس کرتا ہے، اچا تک متلی ہوتی ہے، وہمی نظار سے اور خیالی چیز بین نظر آنے گئتی ہیں، جسم کا نیتا ہے اور زبان دانتوں میں آ جاتی ہے۔ منہ سے جھاگ نکلتی ہے اور مریض بے ہوش ہوجا تا ہے۔ اعصا بی بیجان میں آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ عمومی بے خوابی بھی پائی جاتی ہے اور ہسٹریائی بیاریاں لاحق ہوجاتی ہیں۔ اس دوا سے تعلق رکھنے والی مرگی زہریلی تھمبیاں (Mushroom) کھانے سے پیدا ہونے والے زہر کے اثر سے ملتی ہے۔ کھمبیاں کھانے میں ہمیشہ احتیاط سے کام لینا چا ہئیں کیونکہ ان کی بعض قسمیں بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ چن کی بیچان ماہرین ہی کر سکتے ہیں۔

ابسنتھیم کا مریض کھلی فضااوراونچی جگہوں سے گھبرا تا ہے، چکر آتے ہیں جن میں پیچھے کی طرف کرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مریض کی یا دواشت کمزور ہوجاتی ہے اور وہ تو ہمات کا شکار رہتا ہے، ہر چیز سے بے پرواہ ہوجاتا ہے، خیالات پریشان ہوتے ہیں، آئکھوں کی پتلیاں غیر متوازن ہو کر مختلف سمتوں میں گھومتی ہیں، نظر دھندلا جاتی ہے اور گدی میں درد حلسیمیم سے مشابہ ہوتا ہے۔

ابسنتھے میں معدے کی علامتیں بھی نمایاں ہیں۔ بھوک نہیں لگتی اور غذا ہضم نہیں ہوتی۔ ڈکار، متلی، قے ، معدے میں اپھارہ اور ہوا کا سخت زور، ایسے مریض کوعمو ما قبض رہتی ہے، پیشاب بہت آتا ہے، جن کا رنگ گہرا اور بوسخت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ مریض کی زبان موٹی ہوکر باہر نکل آتی ہے اور کا نبتی ہے، بولنے میں دفت ہوتی ہے اور فالجی اثر ات نمایاں ہوتے ہیں۔

عورتوں میں سن یاس سے قبل ہی حیض بند ہو جائے اور ایسنتھیم کی دیگر بنیا دی علامتیں موجود ہوں تو ایسنتھیم حیض کو دوبارہ جاری کر دیتی ہے۔

سینہ میں دل کے مقام پر بو جھ محسوں ہوتا ہے اور دل کی دھڑ کن بے قاعدہ اور بہت میں دل کے مقام پر بو جھ محسوں ہوتا ہے اور دل کی دھڑ کن بے وال میں دخم اور حلق متورم، گولا بھیننے کا احساس ہوتا ہے۔ پاؤں بہت ٹھنڈ ہے، کمر اور کندھوں میں در د، اعضاء کا نیتے ہیں اور تشنجی علامات نمایاں ہوتی بہت ٹھنڈ ہے، کمر اور کندھوں میں در د، اعضاء کا نیتے ہیں اور تشنجی علامات نمایاں ہوتی بہت ٹھنڈ ہے۔ ہمر اور کندھوں میں در د، اعضاء کا بہت ہیں اور تشنجی علامات نمایاں ہوتی بہت ٹھنڈ ہے۔ ہمر اور کندھوں میں در د، اعضاء کا بیتے ہیں اور تشنجی علامات نمایاں ہوتی ہیں۔

طاقت: 30 ياحسب تجربه چھوٹی يااونچی طاقت

3

ايسيطك السير

ACETIC ACIDUM

(سركه-ايك تيزانې محلول)

ایسیٹک ایسٹر معدے کے کینسر میں مفید دواسمجھی جاتی ہے۔ پیٹ میں شدید کاٹنے والا در دہوتا ہے۔شدید پیاس، قے کار جحان اور جلن پائی جاتی ہے۔عمو ماً سب تیز ابوں میں جلن کی علامت ملتی ہے اور جسم میں سوجن ہوتی ہے۔

آپیش کے بعد مریض کی حالت بہت خراب ہوجائے اور وہ سخت نڈھال ہوتو بعض دفعہ ایسیٹک ایسٹر دینے سے اس کی حالت سنجل جاتی ہے۔ اس ضمن میں سٹر وشیم کا رب اور کار بوو بچ بھی بہت مفید دوائیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کپڑے کوایسیٹک ایسٹر کا میں بھگو کر معدے کے مقام پر رکھنے سے معدے کے کینسر کی گلٹی گھلنے گئی ہے۔ کیونکہ 1x میں گلٹی کو گھو لنے اور اس میں پیپ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اونز گلٹی کو گھو لنے اور اس میں پیپ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اونز اسے اندرونی اور خارجی دونوں طرح استعال کرنا چا ہئے۔ معدے اور سینے میں شدیداور اسے اندرونی اور خارجی دونوں طرح استعال کرنا چا ہئے۔ معدے اور سینے میں شدیداور علامت ہے۔

ایسیل ایسٹی اسہال آتے ہیں جو بہت کمزورکر دیتے ہیں۔ ذیا بیطس کے لئے بھی مفید دوا ہے۔ اگرجسم میں خون کی کمی کے نتیجہ میں سخت کمزوری ہو، بار بار بے ہوشی طاری ہو، سانس میں گھٹن کا احساس ہوتو ایسٹیک ایسٹر مفید دوا ہے۔ اس کی خاص علامت میں بہت پسینہ آتا ہے، بائیں گال پر سرخ داغ پڑ جاتے ہیں اور یہاں نہیں گئی۔

اس کی ایک خاص علامت کمر کا ایسا در دہے جسے صرف پیٹے کے بل لیٹنے سے ہی

ایسیک ایسڈ -آرام آتا ہے۔

طافت: 3 سے 30 - اس کی خورا ک جلد جلد نہیں دہرانی چاہئے۔

ا يكونائث

4

ا يكونائك نيبلس

ACONITUM NAPELLUS

(Monks Hood)

ہومیو پینتی کو اگر آپ اچھی طرح سمجھ لیں اور اس پر عبور حاصل کر لیں تو روز مرہ کی بیاریاں اکثر آغاز ہی میں قابو آجائیں گی اور مزید پیچیدگی بیدا نہیں ہوگی۔ بیاریوں کے آغاز میں ایکونائٹ کا نمبر پہلا ہے جس کا پورانا م Aconitum Napellus ہے۔ار، دومیں اسے ''میٹھا تیلیا'' کہا جاتا ہے مگر عام طور پر بیا کیونائٹ کے نام سے ہی مشہور ہے۔

یہ ایک زہرہے جس کا انسانی جسم کے مختلف حصوں پر اثر پڑتا ہے۔ پچھ تو طب کی کتابوں میں روایتی طور پر دوسرے زہروں کی طرح اس کا ذکر بھی ماتا ہے لیکن زیادہ تر تفصیلی اور باریک اثرات کاعلم ڈاکٹر ہانیمن اور ہومیو پیتھی کا تجربہ کرنے والے دوسرے ڈاکٹر وں نے اپنی اپنی ذات پر آزمائش (Proving) کے ذریعے حاصل کیا۔

آ زمائش کا طریقہ یہ بہیں کہ ایکونائٹ یا کسی اور زہر کوخالص حالت میں استعال کر لیا جائے بلکہ جو بنیا دی اصول ہانیمن نے پیش کیا اور ایکونائٹ کے حوالے سے اسے ثابت کیا وہ یہ تھا کہ اگر کسی زہر کو ہاکا کر کے کا لعدم کر دیں کہ وہ بالکل خفیف اور زہر یلے اثر کے لحاظ سے غیرمؤٹر ہو چکا ہو۔ یہ اگر کسی صحت مندانسان کو بار بار دیا جائے تو جسم اس کی مسلسل چوٹ سے مغلوب ہو جاتا ہے اور اس کے خلاف ردممل دکھانے کی بجائے ایسی علامتیں ظاہر کرتا ہے جو اصل زہر میں تھیں لیکن یہ علامتیں اتنی خطرنا کنہیں ہوتیں کہ مستقل نقصان پہنچا ئیں یا زندگی کے لئے خطرہ بن جائیں بلکہ خفیف اور عارضی ہوتی ہیں اور ان کے ذریعہ اصل زہر کا مزاج نہایت بار کی اور تفصیل سے سمجھا جا سکتا ہے۔ زہروں یا دواؤں کی گہری بہچان کے لئے یہ طریق جسے پر دونگ (Proving) کہا جاتا ہے ،

نہایت مؤثر ہے۔اس طریق آ زمائش سے ایکونائٹ کی جوخصوصیات سامنے آئیں ان میں ان میں ان میں ان میں ان میں ان ہیں ان انہائی خوف، بیاری کی شدت اور اچا تک پن نمایاں ہیں۔ بیاری اچا تک حملہ کرتی ہے اور مریض خیال کرتا ہے کہ وہ اس بیاری سے نے نہ سکے گا۔

ا یکونائٹ عموماً خشک اور شنڈ ہے موسم کی دوا کہلاتی ہے کیونکہ اس کی بیاریاں زیادہ تر خشک سردموسم میں گئی ہیں۔ مگر ضروری نہیں کہا یکونائٹ صرف سردخشک موسم کی بیاریوں میں ہی استعال ہو۔ ہرفسم کی بیاریاں ہر موسم میں اگر اچانک اور تیزی سے شروع ہوں اور شدید خوف دامن گیرہو تو بلاتر ددا یکونائٹ کا استعال کرنا جائے۔

ایکونائے کواگر رسٹاکس سے ملاکر دیا جائے تو بہ نسخہ بیار یوں کے آغاز میں اور بھی زیادہ موثر اور وسیح الاثر ثابت ہوتا ہے۔ میر نزدیک بیاسپرین (Asprin) کا بہترین بدل ہے۔ ہرائی بیاری کے آغاز میں جس میں بے چینی اور بخار کی کیفیت ہواور محسوں ہوتا ہو کہ پچھ ہونے والا ہے ایکونائٹ اور رسٹاکس کی 200 طاقت میں دو تین خوراکیس بیاری کو آغاز ہی میں ختم کر دیتی ہیں۔ ایک دفعہ میر موجودہ سیکورٹی آفیسر (ریٹائرڈ میجر محمود احمد صاحب) ہمارے ساتھ سائیکلنگ پر گئے۔ شخت بارش ہورہی تھی اور سردی بھی بہت تھی۔ ہم سب بھیگ گئے۔ شبخ ساتھ سائیکلنگ پر گئے۔ شخت بارش ہورہی تھی اور سردی بھی بہت تھی۔ ہم سب بھیگ گئے۔ شبخ ساتھ سائیکلنگ پر گئے۔ شخت بارش ہورہی تھی اور سردی بھی بہت تھی۔ ہم سب بھیگ گئے۔ شبخ نیس بخار ہو گیا اور جسم میں شدید درد تھا۔ انہیں ایکونائٹ (Rhustox) 400 میں بیاری کا نصف نصف گھنٹے کے وقفہ سے باری باری کھانے کی ہدایت دی گئی تو چند گھنٹوں میں بیاری کا نام ونشان باقی ندر ہا اور وہ پوری صحت کے ساتھ ڈیوٹی پر حاضر ہو گئے۔ سردی اور بھیگنے کے نتیجہ میں نام ونشان باقی ندر ہا اور وہ پوری صحت کے ساتھ ڈیوٹی پر حاضر ہو گئے۔ سردی اور بھیگنے کے نتیجہ میں نام ونشان باقی ندر ہا اور وہ پوری صحت کے ساتھ ڈیوٹی پر حاضر ہو گئے۔ سردی اور بھیگنے کے نتیجہ میں دینا چا ہے۔

یہ نسخہ میں نے لیے تجربہ کے بعد اخذ کیا ہے۔ اس کا انتر یوں، پھیپھڑ وں اور میعادی بخار سے بھی تعلق ہے اس کے علاوہ ملیریا اور پیچیش پر بھی فوری اثر کرتا ہے۔ میعادی بخار سے بھی تعلق ہے اس کے علاوہ ملیریا اور پیچیش پر بھی فوری اثر کرتا ہے۔ بسااوقات بہاری کی نوعیت الیم ہوتی ہے کہ وہ ان دواؤں کے بس میں نہیں ہوتی اور بالمثل صحیح دوا کے استعال کے بغیر پیچھانہیں چھوڑتی ۔ بعض دفعہ انفلؤئنز اکے آغاز میں یہ نسخہ ناکام ہو جاتا ہے سوائے اس کے کہ بالکل شروع میں دیا جائے۔ اگر ذرا دریہ ہو جائے تو پھر انفلؤئنز اکی دوسری بالمثل دوائیں دینی پڑیں گی۔

عرصے کے لحاظ سے بیاریاں دوقتم کی ہوتی ہیں۔ایک حاد (Acute) بعنی آناً فاناً شدت سے حملہ آور ہونے والی جوٹھیک بھی جلد ہوجاتی ہیں۔دوسری مزمن (Chronic) بیاریاں جو آ ہستہ آ ہستہ جسم میں نفوذ کرتی ہیں۔لبی بیاریوں کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ تھوڑا عرصہ رہنے والی ہیں جیسے ٹائیفا ئیڈ وغیرہ اور کچھ لمباعرصہ جسم سے چمٹ جانے والی ہیں۔مثلاً تپ دق، دمہ یا پھر غدودوں کا آ ہستہ آ ہستہ پھول کر کینسر میں تبدیل ہوجانا۔ا یکونا ئٹ کو حاد بیاریوں کے علاج میں استعال ہونے والی دواؤں میں سرفہرست رکھا جاتا ہے۔

گردے کے درد شروع ہونے پر ایکونائٹ (Aconite) کو بیلا ڈونا 1000 (Relladonna) منٹ کے دوقعہ سے دوخوراکیں دی جائیں تو متعدد مریضوں کوفوری فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر گردے کے شنجی دردکوگرمی سے آرام آتا ہوتو بہتنے کوئی فائدہ نہیں دےگا۔ بیصرف ان مریضوں میں کام کرےگا جن کوگرم گورنقصان پہنچاتی ہے۔ جہاں گردے کی تکلیف میں گرمی سے افاقہ ہوتا ہو وہاں بعض دفعہ کولوسنتھ CM کی ایک ہی خوراک فوری فائدہ پہنچائے گی یا پھر میگ فاس 6x کوگرم پانی میں گھول کر گھونٹ گھونٹ بلایا خوراک فوری فائدہ پہنچائے گی یا پھر میگ فاس 6x کوگرم پانی میں گھول کر گھونٹ گھونٹ بلایا حوراک تو تشنج دور ہو جائے گا اور جہاں سردی سے آرام محسوس ہو وہاں ایکونائٹ اور بیلا ڈونا کام کرےگی۔

اگر اجا نک بیچش کے ساتھ خوف کا عضر نمایاں ہوتو ایکونائٹ اس پیچش میں بھی فوری فائدہ دیتی ہے۔ خشک گرمی کی بیچش میں تو بدلا جواب ہے۔ دل کی بیماریوں میں بھی ایکونائٹ بہت کام آتی ہے۔ میرے والدمر حوم جوخود بھی ایک بہت اچھے ہومیو پیتھ تھے وہ اکثر دل کی تکلیف میں ایکونائٹ اور کریٹیگس Q (Crataegus) ملاکر دیا کرتے تھے۔ ایکونائٹ کو مدر بیچر کی صورت میں ہی کریٹیگس مدر نیچر سے ملاکرٹائک بنایا جاتا

ہے۔ آٹھ دس قطرے کڑیگس Q کے اور صرف ایک دو قطرے ایکونائٹ Q کے پانی میں ملاکر دی تو اللہ کے فضل سے بہت مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ ایکونائٹ کی زیادہ مقدار خطرناک ثابت ہوئتی ہے اس لئے احتیاط کرنی چاہئے۔

اییا مریض جس کے دل کے دھڑ کئے کی رفتار معمول سے زیادہ ہواس کے لئے ایکونائٹ بہت مفید ہے۔ بعض دفعہ معدے میں ہوا پیدا ہونے سے یااعصا بی کمزوری کی وجہ سے دل بہت تیزی سے دھڑ کئے لگتا ہے۔ نیند بھی نہیں آتی۔ اگر کسی چیز کا خوف ہو، کوئی بری خبرسی ہویا امتحان دینے کے لئے جانا ہویا کوئی ابتلاء درپیش ہوتو ہیجان سے دل کی دھڑ کن تیز ہوجاتی ہے۔ امتحان دینے کے لئے جانا ہویا کوئی ابتلاء درپیش موتو ہیجان سے دل کی دھڑ کن تیز ہوجاتی ہے۔ ایکونائٹ 200 میں دینے سے دھڑ کن معمول پر آجاتی ہے اور طبیعت پرسکون ہوجاتی ہے۔ ایکونائٹ ایکونائٹ بعض ذہنی امراض میں بھی مفید ہے۔ صدمے یا مایوس سے دماغ پراچا تک اثر ہوجائے اور ہر چیز سے بے جاخوف آنے لگے تو بیاری کی ابتداء میں ہی ایکونائٹ استعال کروانا کر نے سے نمایاں فرق پڑتا ہے لیکن اگر بیاری لمبی ہوجائے تو پھر دوسری دوائیں استعال کروانا کرنے ہیں جن میں سلفر نمایاں ہے۔ سلفر کوا یکونائٹ کی مزمن دوا کہا جاتا ہے۔ سلفر کی جوعلامات حیات بیں وہ عارضی طور پرا یکونائٹ میں یائی جاتی ہیں۔

روزمرہ کی زندگی میں الیمی بیاری جو جراثیم کے حملہ کی وجہ سے ہو مثلاً باسی غذا کھا لی جائے جس میں تعفن پیدا ہو چکا ہواوراس سے اسہال شروع ہو جائیں یا اچا نک پیچیش لگ جائے ، اسی طرح برسات کے موسم میں خونی پیچیش جس سے مریض ڈر جائے۔ ان سب بیاریوں میں ایکونائٹ مفید ثابت ہوسکتا ہے۔

بعض بیاریوں میں مریض خوف سے چینیں مارتا ہے اور چکر بھی آنے لگتے ہیں۔ مثلاً اگر راستہ چلتے ہوئے اچانک کتا جھیٹے تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے اور اس کا سر گھو منے لگتا ہے۔ ایسی حالت میں ایکونائٹ فوری فائدہ دیتا ہے۔

اگر آنکھوں میں احیا نک سوزش ہو جائے تو بھی ایکونائٹ اور بیلاڈونا بیک وقت

ذہن میں آتے ہیں۔ مزیدعلامات ظاہر ہونے کا انتظار کئے بغیر دونوں کو اکھا استعال کرنا چاہئے کیونکہ بیا کیدوں رے کی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ہاں اگر کسی ایک دوا کی علامتیں بہت واضح ہوں تو دوسری دیئے کی ضرورت نہیں۔ مثلاً اگر بیلا ڈونا کی علامات بالکل واضح ہوں تو ایکونائٹ ساتھ ملانے کی کوئی ضرورت نہیں، بیا کیلی ہی بیماری پر غلبہ پالیتی ہے اور لمبے عرصہ تک کام کرتی ہے۔ مردی لگنے کی وجہ سے اچانک کان میں شدید درد شروع ہوجائے تو بھی بیدوا فوری اثر دکھاتی ہے۔ ایکونائٹ میں ہردرد کے مقام پر دھڑ کن کا حساس ہوتا ہے، مریض شوراور موسیقی وغیرہ مالکل برداشت نہیں کرسکتا۔

ا یکونائٹ کی ایک خاصیت پلسٹیلا سے بھی مشابہ ہے۔ بخاریا تکلیف کا اثر چہرے کے ایک طرف زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ ایک گال سرخ ہوجاتا ہے اور ایک زرد ۔ عام طور پر بچوں میں یہ علامت نمایاں ہوتی ہے۔ شروع میں ہی ایکونائٹ دے دی جائے تو بیاری فوراً ختم ہوجائے گ۔ اگر در یہ وجائے تو پلسٹیلا ، لائیکو بوڈ یم یا نیٹرم میور میں سے شاید کوئی کام آئے۔

دانتوں میں سردی کی وجہ سے در دہویا گلے میں تکلیف ہوتو بھی ایکونائٹ کی ضرورت ہوگی۔اگرجسم کے کسی حصہ میں خون کا دباؤزیا دہ ہوجائے تواندرونی یا بیرونی جریان خون شروع ہو جاتا ہے مثلًا انٹریول سے خون بہنے گگے گا۔کوئی بھی وجہ ہوا گرابیاا چپا نک ہوا ہوا ورخوف بھی ساتھ ہوتو بلاخوف ایکونائٹ استعال کریں۔

اگرکسی صدمہ کے نتیجہ میں بیشاب بند ہو جائے تو فوری طور پر پہلے ایکونائٹ دیں۔کسی عزیز کی اچانک وفات سے یا اچانک کوئی مالی صدمہ پہنچا ہوتوا یکونائٹ کا فوری استعال جسم کواس کے بدا ٹرسے بچالیتا ہے۔

بعض ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ ایکونائٹ عورتوں کی بیاریوں میں مردوں کی نسبت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔اگرعورتوں کی اندرونی تکالیف اور رحم کی سوزش وغیرہ کے آغاز میں ایکونائٹ دے دیں تواللہ کے فضل سے بیاریاں آگے ہیں بڑھیں گی۔ ا يكونائث

ا یکونائٹ کی تکلیفیں کھلی ہوا میں کم ہوجاتی ہیں۔رات کو گرم کمرے میں یا خشک اور ٹھنڈی ہواسے بڑھ جاتی ہیں۔

> مددگاردوائیں: سلفر-کافیا-آرنیکا-پیلا ڈونا-برائیونا-فاسفورس-سپانجیا دافع اثر دوائیں: نکس وامیکا-سلفر طافت: مدرٹنگچریا بالعموم 200،200،200 یا CMیا حسب حالات معالج کوخود فیصله کرنا ہوگا

ا يكثيا 15

5

ا بیٹیا ریسی موسا

ACTAEA RACEMOSA

(Black Snake-Root)

اس دواکو' سی می سی فیوجا'' (Cimicifuga) بھی کہتے ہیں۔ عورتوں کی بیار یوں میں یہ غیر معمولی اثر رکھنے والی دوا ہے خصوصاً حمل کے دوران پیدا ہونے والی بعض تکلیفوں میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اگر ماہانہ ایا م میں عموماً کھل کرخون جاری ہوجائے تو عورتوں کی اکثر تکلیفیں خود بخو دٹھیک ہوجاتی ہیں لیکن ایکٹیاریسی موسامیں بیالٹی بات ہے کہ خون کی مقدار میں جتنا اضافہ ہو در داور دوسری تکلیفیں اسی نسبت سے بڑھتی چلی جاتی ہیں اور بسا اوقات خون بند ہونے کے بعد بھی کسی حد تک حاری رہتی ہیں۔

ایکٹیا جوڑوں کے درد میں بھی بہت مفید ہے۔ عضلات میں پھوڑے کی طرح درد ہوتا ہے۔ گردن اور کمر کے عضلات میں درد بجلی کے کوندوں کی طرح ہرطرف بھیل جاتا ہے۔ آ رام کرنے سے تکلیف میں کمی ہوتی ہے اور حرکت سے بڑھ جاتی ہے۔ شنڈک اور نمی سے آ رام آ تا ہے۔ ایکٹیا رہی موسا میں بھی ابراٹینم کی طرح انتقال مرض پایاجا تا ہے۔ عموماً جسمانی بیاریاں ذہنی بیاریوں میں تبدیل ہوجاتی ہیں۔ بچوں کی جسمانی بیاریاں کسی علاج سے بظاہر ختم ہو جائیں تو زہنی علامات ظاہر ہو کر بہشیر یائی کیفیات بیدا ہوجاتی ہے۔ کوئی بچی بہت نا زک مزاج اور حساس ہوتو بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ زور دے کر بلائیں تو رو دے گی۔ سب دنیا سے بے نیاز، اپنی فاموش ہو جاتی ہے۔ زور دے کر بلائیں تو رو دے گی۔ سب دنیا سے بے نیاز، اپنی ذات میں گم سے بہت گہراتعلق ہے۔ غم کے بدا ثرات جسمانی بیاریوں کی شکل اس دوا کاغم سے بہت گہراتعلق ہے۔ غم کے بدا ثرات جسمانی بیاریوں کی شکل

اختیار کر لیتے ہیں۔ نازک مزاج عور توں کوصد مدکی وجہ سے ماہانہ نظام میں بے قاعدگی، جوڑوں کا درد اور دوسر ہے جسمانی عوارض لاحق ہوجاتے ہیں۔اگر فرہمن پرصد مد کا اثر ہوتو خوف اور وہم میں مبتلا ہوجاتی ہیں، دوابھی استعال نہیں کرتیں کہ اس میں زہروغیرہ نہ ملا دیا ہو۔اگر دیگر علامتوں کے ساتھ وہم بھی پایا جائے تو ایکٹیار لیی موسا کی ایک دوخوراکیں ہی سب وہموں کو دورکر دیتی ہیں اور مریضہ صحت یاب ہونے گئی ہے۔

ایکٹیا میں دومتقابل دواؤں کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ بعض پہلوؤں سے یہ ہرائیونیا اور بعض پہلوؤں سے رسٹاکس میں آرام سے تکلیف ہو بھتی ہے۔ ایکٹیا میں جس پہلو پر لیٹیں اس پہلو میں تکلیف ہو ہے گی اور اعصاب کھڑ پھڑا نے لگیں گے۔ ہر درو عموماً آگھ کے ڈیلوں اور سرکے پیچھے ہوتا ہے جسے دبانے سے آرام آتا ہے لیکن حرکت سے بڑھ جاتا ہے۔ چکر آتے ہیں، سرمیں بھاری بن نمایاں ہوتا ہے، نظر دھندلا جاتی ہے۔ پڑھائی، فکر اور مثانے کی تکلیفوں سے سردروشر وع ہوجاتا ہے۔ ہنظر دھندلا جاتی ہے۔ پڑھائی، فکر اور مثانے کی تکلیفوں سے سردروشر وع ہوجاتا ہے۔ ہنظر دھندلا جاتی ہے۔ بڑھائی، فکر اور مثانے کی تکلیفوں سے سردروشر وع ہوجاتا ہے۔ ہنلی ہوتا ہے۔ متلی اور شخص اور اسہال آپس میں اور لتے بدلتے رہنج ہیں، معدہ میں شدید دردہ ہوتا ہے جس میں آگے کی طرف جھنے سے آرام آتا ہے۔ ریڑھی ہڈی اور خو میں شدید میں شدید میں شدید دورہ ہوتا ہے۔ ہی آرام نہیں آتا۔ اس تکلیف میں گہر غور وفکر، مزاج شناسی اور دیکھوں کو بہلے مل میں شدید متلی ہوتی ہے اور کسی دوائی سے بھی آرام نہیں آتا۔ اس تکلیف میں گہر غور وفکر، مزاج شناسی اور دیگر علامات کا بار کیک بنی سے جائزہ کے کر دوا تجویز کرنی چا ہئے۔ اگر مریضہ میں ایکٹیار کیک موسائی دیگر علامات کا بار کیک بنی سے جائزہ کے کئے اسی سے فائدہ ہوگا۔

بعض کمزوراعصاب کی عورتوں میں وضع حمل کے وقت جب دردیں اٹھتی ہیں تو جنین کو باہر دھکیلنے کی بجائے دائیں ، بائیس پھیل جاتی ہیں۔ کولہوں میں تشنجی علامات پیدا ہوتی ہیں جو وضع حمل کی تکلیفوں میں ایکٹیا ریسی موسا کی خاص پہچان بن جاتی ہیں۔اگر بروقت صحیح دوا دی جائے تو دردیں نامل ہوکر صحیح رخ میں اٹھتی ہیں اور بیج کی ولادت آسانی سے ہوجاتی ہے۔ کولوفائیلم بھی وضع حمل کے موقع پر استعال ہونے والی اہم دوا ہے لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ دردیں جنین کو بیجے دھکیلنے والے اعصاب میں جانے کی بجائے ران کے اندر سے بینچ اثر کر دائیں بائیں بھیل جاتی ہیں اور رحم کا منہ نہیں کھلتا۔ بعض اوقات معالجین اور دائیاں وضع حمل کو آسان کرنے کے لئے عورتوں کوار گٹ دے دیتی ہیں لیکن اس سے رحم کا منہ اور بھی تحق سے بند ہو جاتا ہے اور شدید تکلیف ہوتی ہے۔ گئ عورتوں کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ لاڑ کا نہ انور آباد سندھ میں ایک دفعہ جلسہ کے مورتوں کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ لاڑ کا نہ انور آباد سندھ میں ایک دفعہ جلسہ کے مبتلا ہے، رحم کا منہ ہیں کھل رہا اور خطرہ ہے کہ اس تکلیف سے موت واقع ہو جائے گی۔ میں مبتلا ہے، رحم کا منہ ہیں کھل رہا اور خطرہ ہے کہ اس تکلیف سے موت واقع ہو جائے گی۔ میں نے اپنے سفری بیگ میں سے اسے کولوفائیلم دی کہ فوراً اپنی بیوی کوکھلا دو۔ دس پندرہ منٹ کے بعد ہی اللہ کے فضل سے سب بیچید گیاں دور ہو گئیں اور نار مل طریق سے صحت مند موٹا تازہ بچ پیدا ہوا۔ ہو میو پیشک دواؤں کو معمولی نہیں سمجھنا چا ہے۔ بروقت اس کی چند گولیاں دینے سے ہی بعض دفعہ زندگی کولاحق مہیب خطرے ٹل جاتے ہیں۔

الیں عورتیں جن کاحمل رحم کے عضلات اور متعلقہ اعضاء میں کمزوری کی وجہ سے شروع دنوں میں ہی ضائع ہوجاتا ہو یا حمل بہت مشکل سے شہر ہے الیں عورتوں کی کولو فائیلم بھی دوا ہوسکتی ہے۔ وضع حمل کے وقت ایکٹیارلیں موسا اور کولو فائیلم کے ساتھ جلسیمیم کوبھی یا در کھنا چاہئے۔ اگر وضع حمل کے وقت در دول کا زور کمر میں ہواور در دیں نیچ جاکروا پس کمر میں آتی ہوں تو جلسیمیم بہت مفید ہے۔ کالی کارب میں در دیں اندررحم کی طرف جانے کی بجائے دونوں رانوں کی بیرونی سمت میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ پلسٹیلا میں اعصا بی کمزوری اورخوف کی وجہ سے در دیں بہت کمزور اور کم ہوتی ہیں۔

ا یکٹیا رکسی موسا میں حیض بے قاعدہ یا دبر سے آتے ہیں۔رحم کے مقام پر اور کمر میں شدید در د ہوتا ہے۔اعضاء بوجھل محسوس ہوتے ہیں۔ایکٹیا رکسی موسا کی مریضہ بہت ست، غم میں ڈوبی ہوئی، پریثان حال دکھائی دیتی ہے۔ دماغ پر گہرے بادل سے چھائے ہوئے محسوں ہوتے ہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، مسلسل بولتی ہیں، کسی خاص چیز پر توجہ مبذول نہیں کرسکتی، خوفز دہ ہوجاتی ہے،خصوصاً موت کا خوف اسے گھیرے رکھتا ہے جوا یکونا ئے کی یا ددلا تا ہے۔

ا یکٹیار کیں موسامیں گلے میں خراش ہوتی ہے۔ خشک کھانسی رات کے وقت اور باتیں کرنے سے بڑھ جاتی ہے۔ دل کی دھڑکن زیادہ اور نبض کمزور اور بے قاعدہ ہوتی ہے۔ انجائنا کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ بائیں بازو کا سن ہونا ایکٹیار کیں موسا کی خاص علامت ہے۔ کمراور ریڑھ کی ہڑی میں بھی شد بددرد ہوتا ہے اور گردن اور کمر کا اوپر والا حصداکڑ جاتا ہے۔ بازوؤں اور ٹائگوں میں بے چینی اور بے آرامی کا احساس ہوتا ہے، فارش ہوتی ہے۔ اعصاب کو جھٹکے بھی لگتے ہیں۔ نیند نہیں آتی ، دماغ بے چین ہوتا ہے، فارش ہوتی ہے۔ اعصاب کو جھٹکے بھی لگتے ہیں۔ نیند نہیں آتی ، دماغ ہے۔ کان شور سے زود حس ہوجاتے ہیں۔ ورحس ہوجاتے ہیں۔

ا یکٹیا کی تکالیف صبح کے وقت اور سردی سے بڑھ جاتی ہیں۔سوائے سردرد کے جسے گرمی سے اور کھانا کھانے سے آرام آتا ہے۔

طانت: 30 سے اوپر سی ایم (CM) تک

6

ایڈریناین

ADRENALIN

(Epinephrin)

ایڈرینالین گردول کے اوپر واقع غدودول (Suprarenal Glands) سے نکلنے والی رطوبت ہے جو بہت سے غدودول کا توازن درست رکھتی ہے۔اسے ہومیو پیتھی میں بطوردوا استعال کیا جاتا ہے۔غصہ، ڈراورخوف کے نتیجہ میں جو بداثرات پیدا ہوتے ہیں وہ سب اس کے مریض میں موجود ہوتے ہیں۔دل کی دھڑکن تیز ہوجاتی ہے۔خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔گھٹن اور نگی کا احساس ہوتا ہے۔انٹڑ یول کے فعل کی رفتارست ہوجاتی ہے، منہ خشک رہتا ہے۔اس کے کمول میں شریا نول کے اردگرد کے عضلات کو سکیڑنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ہومیو پیتھی طریق علاج میں یہ دوا ہر قتم کے سیلان خون کو روکنے میں مدد دیتی ہے۔پھیپوروں،ناک،انٹڑ یول،رقم یا کہیں اور سے خون جاری ہوجائے اوراسے روکنے کے لئے کسی دوا کی واضح علامتیں نہ ہوں تو ایڈرینالین کو بھی فوری ضرورت کے لئے استعال کیا جاسکتا ہے۔ خصوصاً نکسیر میں اسے بہت مفید پایا گیا ہے۔ کئی سرجن آ پریشن سے پہلے اس کا استعال کیا جاسکا کرتے ہیں تا کہ خون ضا کع نہ ہو۔

ایک معالج نے انجائنا اور اس سے ملتی جلتی علامات میں بھی ایڈرینالین کومفید بتایا ہے۔ دل کے اردگر داور سینے کی مڈی میں کھانا کھانے کے بعد اور چلنے سے درد ہوتو اس ڈاکٹر کے مطابق یہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ سینے کی گھٹن اور تنگی کے لئے بھی مفید ہے۔ رگوں کے سکڑ نے کے نتیجہ میں خون کا دبا وُ ہڑھ جا تا ہے اس لئے یہ ہومیو پیتھی پوٹینسی میں بلڈ پریشر کے لئے بھی مفید ہوسکتی ہے۔ چونکہ اس بارے میں میرا ذاتی تجربہ نہیں ہے اس لئے مخض دوسرے اطباء کی رائے پیش کر رہا ہوں۔ بہت احتیاط سے مریض

كاجائزه كرايُّر ينالين كِمُل يَسْمِهِ عَالَي سِجْد

البتہ میں نے ایڈرینالین کو چند بیاریوں میں بہت مفید پایا ہے۔ پیشاب کے ساتھ جب خون آنے گئے تو بیدوا فائدہ دیتی ہے۔ پیشاب سے پہلے اور بعد میں جلن ہوتی ہے۔ نیٹرم میور میں بھی بیعلامت پائی جاتی ہے۔

اگر یا وُل کی انگلیول پر گئے پڑ گئے ہول جنہیں Corn کہتے ہیں تو ان کے لئے کھی بیدوامفید ہے۔ اس کے مریض کی ٹانگیس عموماً تھی تھی رہتی ہے۔ پیڈلیوں میں درداور شنج ہوتا

طاقت: 30سے 200 تک

ايسكولس

7

ايسكولس بيبو كاسطينم

AESCULUS HIPPOCASTANUM

(Horse Chestnut)

ایسکولس کا سب سے نمایاں پہلو ذبنی انتشار ہے۔ تھکاوٹ اور کمزوری کی وجہ سے دماغ میں اضطراب پیدا ہونا طبعی عمل ہے گر ایسکولس ایسی دوا ہے جس میں سونے سے ذبنی انتشار میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ جب مریض سوکراٹھتا ہے تواس کے دماغ میں الجھاؤ ہوتا ہے اور وہ مجھ نہیں سکتا کہ وہ کہاں ہے، اس کے گر دونواح میں کیا ہے اور کون لوگ ہیں۔ اگر کسی نئی جگہ میں سوکراٹھیں توصحت مندانسان کا ذہن بھی بعض دفعہ الجھ جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ یہ انتشار کا عارضی اور وقتی ہوتا ہے جو سفر کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر مریض مستقل طور پر اس انتشار کا شکار ہوجائے، یا دواشت میں کمی آجائے، طبیعت میں غم یا غصہ پایا جائے اور ہر کام سے نفرت ہونے گے تو ایسکولس دوا ہے۔

ایسکولس کی علامات رکھنے والے بچوں کی بادداشت کمزور ہوتی ہے۔طبیعت میں غصہ پایا جاتا ہے، نیند میں ڈرکر چونک اٹھتے ہیں، بہت حساس اور زودرنج ہوجاتے ہیں۔اگر ایسے بچے پرنا راضگی کا اظہار کیا جائے تو صدمہ سے مغلوب ہو کربعض دفعہ وہ ہے ہوش ہو جاتا ہے۔اورکی دفعہ یہ ہوتی مرگی میں بھی تبدیل ہوجاتی ہے۔ایسکولس کوصرف بچوں کی دوانہیں ہے۔اورکی دفعہ یہ ہر عمر میں کام آنے والی دوا ہے۔

آ تکھول کی سرخی ایسکولس کی نمایاں علامت ہے۔ آ نکھ کے وہ ریشے جن میں خون گردش کرتا ہے کمزور ہوجاتے ہیں اور ذرا بھی دباؤ محسوس ہوتو آ نکھیں سرخ ہوجاتی ہیں۔ بعض ہومیو پیتھ ڈاکٹروں نے اس سرخی کو آنکھول کی بواسیر قرار دیا ہے۔ آنکھول میں بھاری بن محسوس ہوتا ہے۔ یانی بہتا ہے، آنکھ کے بیوٹوں اور بائیں آنکھ کے نچلے میں بھاری بن محسوس ہوتا ہے۔ یانی بہتا ہے، آنکھ کے بیوٹوں اور بائیں آنکھ کے نجلے

عضلات میں پھڑکن پائی جاتی ہے، آنکھوں کی پتلیوں میں در دہوتا ہے۔

ایسکولس کا مریض عموماً سردی محسوس کرتا ہے اور اسے دردوں کو گرمی پہنچانے سے آرام آتا ہے۔ پلسٹیلا کی طرح دردسارے جسم میں دوڑ ہے پھرتے ہیں۔ لیکن ان دونوں دواؤں میں ایک فرق پایا جاتا ہے کہ پلسٹیلا میں درد ہمیشہ گرمی سے بڑھتے ہیں اور سردی سے آرام آتا ہے۔ پلسٹیلا میں غم کار جمان اور مزاج میں نرمی ہوتی ہے۔ ایسکولس میں بھی غم کی طرف میلان ہوتا ہے لیکن مزاج میں نرمی نہیں ہوتی اور تکلیفوں کو گرمی سے آرام آتا ہے۔

ایسکولس کے مریض کی مرمیں مستقلاً تھی تھی ہی درد کا حساس رہتا ہے۔ ریڑھ کی مڈی میں میں جواب دے جاتی ہیں۔ چلنے سے پاؤں لڑکھڑاتے ہیں، بیٹھ کر اٹھنا مشکل ہوجا تا ہے۔ کندھوں کے درمیان درد، گردن کی بیثت میں تھکاوٹ کا حساس، دائیں کندھے اور سینہ میں درد، جس میں سانس اندر کھینچنے سے اضافہ ہو، ہاتھ پاؤں میں سوزش، دھونے سے ہاتھ سرخ ہوجا ئیں، جوڑوں میں اکڑن اور درد، جوایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوں، بجلی کے جھکے کی طرح چیرنے والے درد، درد کو گورسے آرام۔ بیسب ایسکولس کے دائر وعمل میں ہیں۔

ایسکولس میں ایک خاص قتم کی بواسیر ہے جس میں انگور کے خوشوں کی طرح نیگوں رنگ کے دوجار مسے اکٹھے ہوتے ہیں جن میں شدید جلن کا احساس ہوتا ہے۔ کھڑے ہونے اور چلن کے دوجار مسے اختیار کر جاتا ہے۔ مقعد میں جلن، خشکی اور یہ احساس جیسے چھوٹی چھوٹی کر چیاں بھری ہوئی ہیں، اجابت سخت، خشک اور مشکل سے ہوتی ہے۔ اور اجابت کے بعد سخت دردوہوتا ہے۔

ایسکولس میں <u>گردول کا درد</u> بھی نمایاں ہے۔خصوصاً بائیں گردے میں درد۔ باربار پییثاب کی حاجت گرمقدار میں کم ،سیاہی مائل جاتا ہوا پییثاب آتا ہے۔

عورتوں میں دوران حیض شدید کمر درد اور کمزوری کا احساس، رحم کا اندر کی طرف گرنا ایسکولس کی خاص علامت ہے۔ کیکوریا گہرے زرد رنگ کا ، گاڑھا اور کیس دار

ہوتا ہے۔

ایسکولس میں دل کی علامات بھی نمایاں ہیں۔دل کے مقام پرجلن اور در د، دل کی دھڑکن میں اضافہ جس کی وجہ سے رگوں میں ہر جگہ دھڑکن نمایاں ہوتی ہے۔ سینے میں گرمی محسوس ہوتی ہے۔

ایسکولس میں کھانا کھانے کے بعد مسلسل بے چینی، جلن اور ایساا حساس رہتا ہے جیسے ابھی قے آنے والی ہو۔ نظام ہضم میں کمزوری واقع ہوجاتی ہے۔ معدے میں پھر کا سابوجھ، کھانا کھٹاس میں تبدیل ہوجاتا ہے اور کھٹی ڈکاریں آنے گئی ہیں۔ منہ کا ذا گقہ دھات کی طرح کسیلا، لعاب لیس دار، زبان پر سفیدیا زردموٹی تہہ اور منہ میں تھوک کی زیادتی ایسکولس کی نمایاں علامتیں ہیں۔ گلے میں گرمی ، خشکی اور زخمی ہونے کا احساس ہوتا ہے، نگلتے ہوئے در دجو کا نوں کی طرف جاتا ہے۔ ایسکولس میں سردی سے، چلنے پھرنے سے، کھانے کے بعد اور نیندسے جاگئے کے بعد تکلیفیں بڑھتی ہیں۔ بواسیر کی تکلیف بھی عموماً سردی میں بڑھ جاتی ہے۔ تازہ کھلی ہوا میں اور لیٹنے اور آرام کرنے سے تکلیفیں کم ہوجاتی ہیں۔

ایسکولس وریی کوزوینز (Varicose Veins) یعنی وریدول کے کچھے کھول جانے کی بھی بہترین دواہے۔ عموماً عورتول میں حمل کے دوران ٹائگول پر جالا سابن جاتا ہے ، ہرطرف نیلے رنگ کی وریدیں بھینے گئی ہیں جو بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں، اس بیاری میں ایسکولس بہت مفید دوا ثابت ہوئی ہے۔

دافع انژ دوا: نکس وامیکا طاقت: 30سے 200 تک 8

ايتقوز اسائی نپيم

AETHUSA CYNAPIUM

(Fools Parsley)

ایتھوزا اگر بالمثل ہوتو ہے مثل کام کرتی ہے۔ایلوپیتھک طریقہ علاج میں اس کا نغم البدل میرے علم میں نہیں آیا۔ یہ بچول کے سو کھے بین کی بہترین دواہے۔ایسے بچے دودھ بالکل ہضم نہیں کر سکتے ۔ دودھ پیتے ہی تے کردیتے ہیں۔ تے کے بعد کمزوری کا شدید غلبہ ہوتا ہے۔ فوراً بھوک لگ جاتی ہے لیکن دوبارہ دودھ پلانے برحالت پھروہی ہوجاتی ہے۔ عموماً شدید قبض ہوتی ہے۔اگر اسہال شروع ہوجائیں تو وہ بہت معمولی مقدار میں آتے ہیں۔ پہلے زردی مائل پھرسبزرنگ کےصفراوی مادے کا اخراج ہوتا ہے۔ پیٹے میں شدید مروڑ اٹھتے ہیں،اسہال کے علاوہ بار باریھٹے ہوئے دودھ کی قے کار جحان بھی ملتا ہے مگراس میں اسہال شاذ کے طور پریائے جاتے ہیں۔ بچوں کی بھاری اکثریت شدید قبض کا شکار ہوتی ہے۔ ا یسے بچوں برعمو ماً غنود گی طاری رہتی ہےاور وہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ایک دفعہایک سو کھے کا مریض بچہ میرے یاس لایا گیا۔اس کی شکل بیاری کی وجہ سے انتہائی خوفناک ہو چکی تھی ۔ بڑا سا سر، بچکا ہوا چہرہ اورجسم مڈیوں کا پنجربن چکا تھا۔اس کے ماں با پ نے بتایا کہ کوئی دوا کا منہیں کر رہی ۔ایک ماہ سے شدید قبض ہے۔ دودھ پیتے ہی قے کر دیتا ہے۔ میں نے اسے ایتھوزا دی۔ بہت جلد قبض ختم ہو گئی اور طبیعت بہتری کی طرف مائل ہونے گی ، دود ھ ہضم ہونے لگا اور ایک ہفتہ میں ہی بچے کی کایا بلیٹ گئی اور وہ اللہ کے فضل سے مکمل طور پرصحت مند ہو گیا۔

ابراٹینم میں بھی سوکھا بن پایا جاتا ہے۔لیکن سب سے پہلے ٹانگیں سوکھتی ہیں پھر

چھاتی اور گردن۔ لیکن ایتھوزا میں ساراجسم بیک وقت سوکھتا ہے۔ ایتھوزا کی ایک اورانهم علامت یہ ہے کہ گرمی سے بچے کی بیاری سرکی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ ایسا بچہ جس کے دماغ میں کچھفلل ہواور گرم موسم میں دودھ بیتے ہی قے کردینے کی علامت نمایاں ہو اس کی دواا بیتھوزا ہی ہے۔ یہ پیٹ کی بیاری اور دماغی خلل دونوں بیاریوں کوٹھیک کرے گ۔ اگر روائتی طریقہ علاج سے ایسے بچہ کی معدہ کی علامتیں اور دودھ الٹنے کار جمان ٹھیک کیا جائے تو وہ بچہ ذہنی تو ازن کھودیتا ہے۔ ایسی صورت میں ایتھوزا کو نہ بھولیں ورنہ ایسا بچہ مستقل دیوا نہ ہو جائے گا۔ ایتھوزا کی علامتیں رکھنے والے بچکو میں نے بھی ایتھوزا کی علامتیں رکھنے والے بچکو میں نے بھی ایتھوزا ہی دی جائے۔

ایتھوزامیں بہاریاں بہت شدت سے حملہ کرتی ہیں اور ہر تکلیف میں شدت نمایاں ہوتی ہے جس کے بعد ذہنی اور جسمانی کمزوری اور نیندکا غلبہ ہونا شروع ہوجاتا ہے ، غشی طاری ہوجاتی ہے ، مریض مختلف قسم کے تو ہمات کا شکار رہتا ہے ، بلیاں ، کتے اور چو ہے نظر آنے گئے ہیں ، ذہنی کیسوئی نہیں رہتی ، بہت ممکین اور بے چین ہوتا ہے ، سرشکنجہ میں کسا ہوامحسوں کرتا ہے ، سرکے بچھلے حصہ میں درد جوگردن ، کندھوں اور کمر میں پھیل جاتا ہے ۔ دبانے اور لیٹنے سے آرام محسوں ہوتا ہے ۔ نیز اجابت اور ہوا کے اخراج کے بعد سرکی علامات کوآرام ملتا ہے ۔ بال کھنچ ہوئے محسوں ہوتے ہیں ، غنودگی کے ساتھ چکر آتے ہیں اور دھڑکن محسوں ہوتی ہے ۔ جب چکرٹھیک ہوجا کیں تو سرگرم ہونے لگتا ہے ۔

روشنی سے زود حسی پائی جاتی ہے، پوٹوں کے کنار سے سوج جاتے ہیں۔
سوتے ہوئے آئھ کی پتلیاں ادھرادھر حرکت کرتی ہیں۔ آئکھیں نیچے کی طرف تھنچ جاتی
ہیں اور چیزیں اصل جم سے بڑی دکھائی دینے گئی ہیں۔ کا نوں میں درد ہوتا ہے اور گرم
پانی نکلنے کا احساس ہوتا ہے، پھنکار نے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ناک گاڑھی رطوبت
کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے، ناک کی نوک پر حصیلنے کا احساس اور چھینکنے کی بے سود کوشش

ایتھوزا کی علامات میں سے ہے۔ چہرے پرسرخ نشان ظاہر ہو جاتے ہیں، جبڑے کی ہڈیوں میں در داور تھیا و محسوس ہوتا ہے۔منہ خشک اور زبان کمبی محسوس ہوتی ہے۔ گلے میں جلن اور آبلےنمودار ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے نگلنے میں دفت ہو تی ہے ۔ بھی سانس میں ۔ اتنی تنگی اور گھٹن ہوتی ہے کہ مریض بول نہیں سکتا ۔ سینہ میں بھی جکڑ اوُ کا احساس ہوتا ہے ۔ ایتھوزا عورتوں کی تکلیفوں کے لئے بھی اچھی دواہے، حیض کے دوران یانی کی طرح پتلاخون جاری ہوتا ہے، سینے کے غدود پھول جاتے ہیں اوران میں شدید در دہوتا ہے۔ الیی عورتیں جن میں ایتھوزا کی کچھ علامات یائی جائیں، رحم کی تکلیفیں اور انتڑیوں کی طبعی حرکت میں کمزوری ہو، بغیرمتلی کے کھانا اللنے کار جحان ہو ایتھوزادینے سے آرام یاتی ہیں۔ ایتھوزا کی علامات صبح تین جار بجے بڑھتی ہیں،ٹھنڈے یانی اوربستر کی گرمی سے بھی بیاریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ د ماغی علامات کے سواکھلی ہوامیں دیگر تکلیفوں میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ دوابچوں کے دانت نکلنے کے زمانے میں اسہال لگ جانے کی بہترین دواؤں میں سے ہے۔ایتھوزا میں ہاتھ یاؤں کے سونے اور تشنجی دوروں کی علامت بھی ملتی ہے۔کہنی کے جوڑوں میں تشنج ہوتا ہے۔ با زوؤں میں سن ہونے کا احساس ،ا نگلیاں اور انگو ٹھے اندر کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ مرگی میں بھی بید دوا مفید ہے۔اعضاء سر دہوتے ہیں اورجسم میں اینٹھن ہوتی ہےاور منہ سے جھا گ نگلتی ہے۔ بچہ سرنہیں سنجال سکتا۔ دودھ پیتے ہی قے کردیتا ہےاور قے کے فوراً بعد دودھ طلب کرتا ہے۔

ایتھوزائے بارے میں بعض ہومیو پیتھک معالجین کا کہناہے کہ وہ طلباء جو کمر وُامتحان میں گھبراجا ئیں اور پر چہل نہ کرسکیں ان کے لئے بہت مفید ہے۔200 طاقت میں ایک خوراک صبح امتحان کے لئے جانے سے پہلے استعال کی جائے تو غیر معمولی فائد ہ پہنچاتی ہے۔ سیکسیار سے کلک سال

مددگاردوا: کلکیریا کارب طاقت: 30سے 200 تک ایگیریکس

9

ا يگير کيس مسکيريس

AGARICUS MUSCARIUS

(Fly Fungus)

ایگیریکس ایک الیی دوا ہے جس کی سب سے نمایاں علامت جسم کا کانینا ہے۔ عضلات کی کمزوری اور نفسیاتی تناؤ سے اعصاب اور عضلات لرزتے ہیں۔ ہاتھ کا نیتے ہیں۔ اعصاب میں جھٹکے لگتے اور سارے جسم میں کیکی محسوس ہوتی ہے۔

ایکٹیار کی موسا (سی می سی فیوجا) کی نمایاں علامت بھی جھکے لگنا ہے لیکن بنیادی فرق یہ ہے کہ ایکٹیا میں مریض جس کروٹ لیٹے اسی کروٹ جھٹکے لگتے ہیں جبکہ ایگیر میس میں ساراجسم کا نیپتا ہے۔ رعشہ اورشنج دونوں ملتے ہیں۔ آئکھیں بھی لرزتی اور ڈولتی رہتی ہیں اور نظر ایک جگہ گئی نہیں۔ ایک دفعہ ایک نوجوان اس تکلیف میں مبتلا تھا میں نے اسے ایگیر میس دی تو اتنا نمایاں فائدہ ہوا کہ عام روز مرہ کے سب کام عمر گی سے کرنے لگا ور نہ یہ تکلیف عمر کے ساتھ ساتھ ہو جو رہی تھی۔

ایگیریس میں آئکھوں کی علامتیں بہت نمایاں ہوتی ہیں۔ایک کی بجائے دودو نظر آتے ہیں۔ آئکھوں کے سامنے کالے دھبے ناچتے ہیں، بھینگا بین، آئکھوں میں جلن ، خارش اور تھکاوٹ عمومی علامتیں ہیں۔ایک جگہ نظر کو جمانا مشکل ہوتا ہے اور مریض بڑھنے میں دفت محسوس کرتا ہے۔آئکھوں کی بتلیاں گھڑی کے بینڈولم کی طرح حرکت کرتی رہتی ہیں۔زردلیس دار رطوبت نکلتی ہے جس کی وجہ سے آئکھیں چپک جاتی ہیں۔مریض کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ دماغی محنت اور لکھنے پڑھنے سے تھکا وٹ محسوس کرتا ہے۔ایسے بچے عموماً ضدی، چڑچڑے اور بہت حساس ہوتے ہیں۔اگر انہیں معمولی سی ڈانٹ ڈپٹ بھی کی جائے تو صدمہ سے بے ہوش ہوجاتے ہیں۔اگر انہیں معمولی سی ڈانٹ ڈپٹ بھی

اگر کسی بچے میں بیسب علامتیں موجود ہوں لیکن آئکھیں دائیں بائیں متحرک رہنے کی خاص علامت نہ بھی ہوتوا گیر کیس ضرور دینی چاہئے۔ بعض بچوں میں شروع سے ہی ذہنی کمزوری پائی جاتی ہے۔ جب صبح کے وقت اس کیفیت میں اضافہ ہوجاتا ہے اور انہیں کوئی نئی بات بتائی جائے تو سبجھتے نہیں۔ ست اور بے شعور سے لگتے ہیں، بے مس ہوجاتے ہیں اور تھکن محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جول جول دن گزرتا ہے تکلیف کم ہونے گئی ہے۔ شام کے وقت یا رات کے پہلے حصہ میں بالکل ٹھیک ہوجاتے ہیں۔ ہر بات سمجھنے لگتے ہیں اور ہشاش بشاش نظر آتے ہیں، ایسے بچول کو ایسکولس دیں۔ یہ بیاریاں اگر چہا گیر کیس میں بھی ملتی ہیں لیکن بیاری کے گھٹے بڑھنے کے ایسکولس دیں۔ یہ بیاریاں اگر چہا گیر کیس میں بھی ملتی ہیں لیکن بیاری کے گھٹے بڑھنے کے مخصوص اوقات ایسکولس سے ایکیر کیس کومتاز کر دیتے ہیں۔

اوراس کانفسیاتی علاج بھی ضروری ہے۔ عموماً سرامونیم کو گہرے اعصابی خوف سے پیدا ہونے والی بیاریوں میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن لکنت یا ہملانے کے مرض میں اس کا نمایاں فائدہ مشاہدہ میں نہیں آیا ہے۔ اس لئے بیاری کی اصل وجہ کو پیش نظر رکھ کر دوااستعمال کرنی چاہئے۔ ایکیر میس بھی لکنت میں مفید ثابت ہو سکتی ہے۔

ایگیریکس میں انتقال مرض کار جمان بھی پایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ تورتوں میں بچوں کو دودھ پلانے کے زمانے میں کسی حادثے ،صدمہ یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے دودھ خشک ہوجاتا ہے اوراس کا د ماغ پر گہرااثر پڑتا ہے۔ ایسے موقع پرا مگیر کیس فائدہ مند ہے۔ اگر عورت کا دودھ کم اُترے یا خشک ہوجائے اوراس دوران د ماغ پر حملہ ہوتو اس کی دواا مگیر کیس ہوسکتی ہے۔ عام طور پر دودھ سو کھنے کی صورت میں پلسٹیلا زیادہ مفید ہے لیکن میصرف ایسی عورتوں کے کام آتی ہے۔ جن کی علامات پلسٹیلا کی ہوں۔ ور نہ دودھ جاری کرنے کی اور بھی دوائیں ہیں۔ مثلاً

Agnus Castus اليكناس كاسلس كاسلس Aconite اليكونائث Aconite الييا فوشيرًا Asafoetida برائيونيا

Causticum کابیریا کارپ Calcarea Carbonica کابیریا کارپ

Lac-Defloratum ليك و يفلورينم Chamomilla

فاسفورك ايسلر Phosphoric Acid فانكيو لاكا Phytolacca

Silicea سلیٹیا Secale سلیٹیا

ار ٹیکا Urtica

ایگیر کیس میں ایسکولس کی طرح در دوں کا رجحان اور دباؤینچے کی طرف ہوتا ہے لیکن دردیں کلم ہوتا ہے لیکن دردیں کلم ہیں ایسکولس کی طرح دردوں کا رجحان اور دباؤینچے کی طرف پائی جاتی ہوتیں کیونکہ اعصاب میں الیسی حرکت پائی جاتی ہے جس کے نتیجہ میں درد بھی ایک طرف اور بھی دوسری طرف لیکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔الیسی صورت میں ایگیریکس زیادہ مفید ہے۔

ایگیریکس کے مریض کے پیٹ میں بہت ہوا بنتی ہے۔انتر یوں کی طبعی حرکت میں

کمزوری واقع ہوجائے اور پیٹ غیر معمولی طور پر ہوا سے بھر جائے تو ایگیر کیس مفید ہے۔

مکس وامیکا بھی انتر یوں کی حرکت کو بحال کرنے کے لئے بہت زوداثر ہے اوراس کے لئے

بہت زیادہ علامتیں ڈھونڈ نے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ پیٹ کی عارضی اور مستقل

دونوں بہاریوں میں نکس وامیکا اچھا اثر دکھاتی ہے۔ نہ سلفر کی طرح بہت گہری اور نہ

ایکونا سے کی طرح عارضی بلکہ درمیانی کیفیت کی دواہے۔

ایگیریکس کا مریض عموماً گم سم ہوتا ہے اور اس کی خاص علامت یہ ہے کہ چہرے کے اعصاب اور عضلات پھڑ کتے ہیں۔ یہی علامت انتر یوں میں بھی پائی جاتی ہے۔اگر انتر یوں میں بار بار پھڑ کن کا احساس ہولیکن نیچے کی طرف حرکت نہ ہوتو ایگیر کیس دوا ہوگی۔

ا یگیریس میں وہمی نظار ہے بھی ملتے ہیں۔ عورتوں کے رحم میں زہر یلے ماد ہے پیدا ہونے لگیں تو ان کے نتیجہ میں بالعموم وہمی نظار ہے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد رحم کی پوری طرح صفائی نہ ہوتواس سے بھی ذہن پر برااثر پڑتا ہے۔ الیسی صورت میں پلسٹیلا رحم کی صفائی کے لئے انجھی عمومی دوا ثابت ہوتی ہے۔ رحم میں انفیکشن ہوجائے اور بخار ہوتو سلفراور پائیر وجینم 200 طاقت میں ملا کراستعال کرنی چاہئیں۔ اگر الیسی مریضہ کو وہمی نظار نے نظر آنے لگیں اوراس کا دودھ بھی خشک ہوجائے توا یگیر کیس کام آئے گی۔ انفیکشن میں سلفراور پائیر وجینم کے ساتھ سلیشیا، کالی میور، فیرم فاس اور کالی فاس سب کو حکی کی طاقت میں ملا کردینا جھانسخہ ہے۔

ایگیریکس میں ایگزیما بھی ماتا ہے۔ اس ایگزیما کی پیچان زردرنگ کے موادوالے چھالے ہیں جواعصابی ریشوں کے ساتھ ساتھ جلد پر نگلتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اعصابی کمزوریاں ایگزیما میں بدل جاتی ہیں۔ بعض اور بیاریوں میں بھی اعصاب کی رگوں کے ساتھ ساتھ چھالے نکلتے ہیں جوعموماً ہر بیز (Herpes) کی پیچان ہے جس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں لیکن ایگیر کیس ہر بیز کی دوانہیں ہے اور اس کے ایگزیما اور چھالوں کا تعلق ہر بیز سے نہیں ہے۔

ہر پیز (Herpes) بہت تکلیف دہ بیاری ہے۔ اس کو اعصاب کی دوسری بیار یوں سے اسمیازی طور پر سمجھنا چاہئے اوراس کا بروقت سمجھے علاج کرنا چاہئے ورنہ بعض دوسری خطرناک پیچید گیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ ہیں پہلے سلیشیا ، کالی فاس اور کالی میور دیا کرتا تھا جن سے کسی حد تک فاکدہ بھی پہنچا تھالیکن بعد میں تجربہ سے ثابت ہوا کہ ہر پیز کا بہترین علاج وہ نسخہ ہے جو میں عموماً سانپ بچھو کے کاٹے کے علاج میں دیتا ہوں۔ مکرم آفتاب احمد خان صاحب مرحوم کو ایک بار ہر پیز کا بہت شدید حملہ ہوا تھا۔ میں نے انہیں آر نیکا 200 ایڈم 200 اور آرسنک میں دیں۔ غیر معمولی تیزی سے شفا ہوئی۔ لیکن کوئی الیام عین نسخہ میر علم میں نہیں ہے جو ہر فعد کام آئے کے والے بیا عضا پر قابنہیں رہتا ، ہاتھوں سے چیزیں گرتی رہتی ہیں۔ اکثر عورتوں اور بچیوں کے ہاتھ سے برتن گر کر ٹوٹ جاتے ہیں ، کوئی چیز کیٹر نی ہوتو ہیں۔ اکثر عورتوں اور بچیوں کے ہاتھ سے برتن گر کر ٹوٹ جاتے ہیں ، کوئی چیز کیٹر نی ہوتو ہیں۔ اکثر عورتوں اور بچیوں کے ہاتھ سے برتن گر کر ٹوٹ جاتے ہیں ، کوئی چیز کیٹر نی ہوتو بیں۔ اکثر عورتوں اور بچیوں کے ہاتھ سے برتن گر کر ٹوٹ جاتے ہیں ، کوئی چیز کیٹر نی ہوتو جاتا ہے ، ہاتھ یاؤں میں اینٹھن ہوتی ہوتی ہیں۔ شدید عضلاتی دردیں اور شنج بھی پایا ہے ، ہاتھ یاؤں میں اینٹھن ہوتی ہوتی ہے۔

ا یگیر نیس میں کھانا کھانے کے بعد، کھلی ٹھنڈی ہوااورسر دموسم میں تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ نیند سے طبیعت بحال نہیں ہوتی۔ دن بھر غنو دگی چھائی رہتی ہے۔ خارش ہوتی ہے جس میں جلن نمایاں ہے۔

ابسنتهیم - کا فیا - کیمفر	ترياق: طافت:
30 سے 200 تک عموماً	طاقت:

10

ایگنس کاسٹس

AGNUS CASTUS

(The Chaste Tree)

ایگنس کاسٹس کا زیادہ تر تعلق عورتوں کی بیاریوں سے ہے۔ عموماً بچوں کی ولادت کے بعد ان کے اعصاب کمزور ہوجاتے ہیں اور کچک ختم ہوجاتی ہے، عضلات ڈھیلے ہوکر لگنے ہیں اورسکڑ کرواپس اپنی اصل حالت میں جانے کی طاقت نہیں رکھتے جیسے بعض دفعہ ربڑ ڈھیلا ہوکرلئک ساجاتا ہے۔ رقم کے نیچ گرنے کا احساس ہوتا ہے۔ حیض میں کی آ جاتی ہے۔ با نجھ بین بیدا ہوجاتا ہے اور از دواجی تعلقات سے نفر سے ہونے گئی ہے۔ زردی مائل لیکوریا کا اخراج ہوتا ہے۔ مریضہ میں بے چینی، خوف اور مایوی کے آٹار ظاہر ہونے گئی ہیں۔ رقم میں لیکوریا کا اخراج ہوتا ہے۔ مریضہ میں بے چینی، خوف اور مایوی کے آٹار ظاہر ہونے گئی میں سورش ہوتی ہے۔ ایکنس کاسٹس اوقات ہسٹیریائی علامات بیدا ہوجاتی ہیں۔ رقم میں سوزش ہوتی ہے۔ ناک سے خون بہتا ہے۔ ایکنس کاسٹس ان سب علامات میں مفید ہے۔ ایکنس کاسٹس کے مریض کو بیاری کے متیجہ میں خود شی کا خیال آئے لگتا ہے۔ و نیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہوجاتا ہے اور آنے والی موت کے بارے میں سوچتار ہتا ہے۔ سب سے نمایاں دواجس میں خود شی کار بحان اور گہراغم پایا جاتا ہے وہ آرم میور (Aurum Mur) میں بنا جیسا کہ آرم میور میں ہوتا ہے۔

مریض کی یا دواشت کمزور ہو جاتی ہے، دماغ غیر حاضر رہتا ہے۔ اعصابی کمزوریاں روزمرہ کی بات ہے، بہتی اور ناطاقتی کا احساس ہوتا ہے۔ ایگنس کاسٹس میں کنپٹیوں اور بیشانی میں شدید در دہوتا ہے جوحرکت سے بڑھتا ہے۔

ایگنس کاسٹس روشنی سے زود حسی میں بھی کام آتی ہے۔ گئی دوسری دواؤں میں بھی یہ ہے گئی دوسری دواؤں میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے لیکن ایگنس کاسٹس میں روشنی سے زود حسی کے نتیجہ میں سرمیں در دشروع ہوجا تا ہے۔ اگر سرمیں پہلے ہی در دہوتو روشنی نا قابل برداشت ہوجاتی ہے اور آئیس نہیں کاسٹس کی خصوصی علامتیں نہ ہوں اور روشنی میں آئکھ کھو لنے سے تکلیف ہوتی ہوتو ایسے در دکی بہتر دواگر یفائٹس ہے۔

ایگنس کاسٹس میں ناک کی ہڑی میں درد ہوتا ہے جسے دبانے سے آرام آتا ہے۔بعض قتم کی خوشبوؤں سے زودحسی ہوتی ہے،رخساروں پرخارش اور چیونٹیاں رینگنے کا احساس بھی ایگنس کاسٹس کی خاص علامت ہے۔

ایگنس کاسٹس میں بیٹ میں ہوا بھی پائی جاتی ہے۔معدہ سے گر گر اہٹ کی آوازیں آتی ہیں۔ آنتیں نیچے گرنے کا احساس ہوتا ہے اور مریض پیٹ کو ہاتھوں سے کیڑتا ہے۔

ایگنس کاسٹس مردانہ کمزوریوں میں بھی مفید دوا ہے۔خصوصاً اوائل عمر میں کی جانے والی غلطیوں کے نتیجہ میں کمزوری اور ناطاقتی کا شکار ہونے والے مریضوں کی کمزوریاں دورکرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عام اعصا فی کمزوریاں دورکرنے میں بھی کالی فاس کی طرح اچھا اثر رکھتی ہے۔

مددگار دوائیں: کلیڈیم ۔ سیلینیم دافع انژ دوائیں: کیمفر نکس وامیکا طاقت: 30 سے اونچی پوٹینسیاں سی ۔ایم (CM) تک ايليم سيپا

11

ايليم سيبيا

ALLIUM CEPA

(Red Onion)

الیہم سیپاسرخ پیاز سے تیار کی جانے والی دوا ہے جوسردی کے موسم میں ہونے والے نزلدز کام میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ پیاز حصلنے سے جوعلامات ظاہر ہوتی ہیں وہی اس کے نزلہ میں بھی پائی جاتی ہیں۔ گلا بیٹھ جاتا ہے، ناک سے پٹی رطوبت بہتی ہے۔ جس میں تیز ابیت ہوتی ہے، آ کھوں سے بکثر ت پانی بہتا ہے لیکن اس میں تیزی نہیں ہوتی اور وہ آ تھوں میں سرخی نہیں پیدا کرتا۔ یہ الیہم سیپا کی امتیازی علامت ہے جو اسے یوفریزیا میں سرخی نہیں پیدا کرتا۔ یہ الیہم سیپا کی امتیازی علامت ہے جو اسے یوفریزیا میں آ کھوں سے بہنے والے پانی میں جلن اور غارش ہوتی ہے اور آ تکھیں سرخ ہوجاتی ہیں۔ ایک اور نمایاں فرق یہ ہو کہ الیہم سیپا کی غارش ہوتی ہے اور آ تکھیں سرخ ہوجاتی ہیں۔ ایک اور نمایاں فرق یہ جو کھانی پیدا کرتی ہے۔ یوفریزیا میں کھانی کودن میں آ رام رہتا ہے کیونکہ نزلہ کا پانی آ تکھوں کے راستے باہر نکاتا ہے۔ یوفریزیا میں کھانی کودن میں آ رام رہتا ہے کیونکہ نزلہ کا پانی آ تکھوں کے راستے باہر نکاتا رہتا ہے۔ رات کوسونے کے بعد یہمواد گلے میں گرنے لگایا چھپچر وں میں چلا جاتا ہے جس سے کھانی ہونے گئی دوبارہ ہوجاتا ہے اور مریض الٹھ جاتا ہے۔ بعض اوقات کھانی کے بہت شدید دور سے بانی دوبارہ جو جاتا ہے۔ اور مریض الٹھ جاتا ہے۔ بعض اوقات کھانی کے بہت شدید دور سے بانی دوبارہ ہوجاتا ہے اور سرخی پیدا کرتا ہے۔

اہلیم سیپا آئھوں میں سرخی پیدانہیں کرتی اس کی بجائے کا نوں پراس کا زورٹوٹنا ہے۔ در دہوتا ہے، رطوبت بہتی ہے اور شنوائی پر اثر پڑتا ہے۔ اگر نزلے کے نتیجہ میں بیہ ہوا ہوتو اہلیم سیپا کان میں تکلیفوں کی بھی بہترین دوا ثابت ہوگی۔ ورنہ کان میں تکلیف کی دوسری دوائیں پلسٹیلا ، کیمومیلا یا امونیم کارب اپنی مخصوص علامات کی وجہ سے پہنچائی جاتی ہیں ۔

ایلیم سیپامیں تکلیفیں دائیں سے بائیں منتقل ہونے کا رجحان ہے۔لیکیسس میں بھی یہ بات نمایاں ہے، بائیں طرف بھاری کا آغاز ہوتا ہے جبجسم کا دفاعی نظام اس کے خلاف بیدار ہوتا ہے تو بھاری دائیں طرف بناہ لے لیتی ہے۔ اکثر سانپوں کے زہر کا اثر بائیں طرف نمایاں ہوتا ہے۔ بجیب بات ہے کہ سانپوں میں بیاز کے خلاف منافرت پائی جاتی ہے۔ سندھ میں سانپوں سے بیخ کے لئے بیتر کیب استعال کی جاتی ہے کہ بستر کے اردگرد بیاز ڈال کرسوجاتے ہیں۔ سانپ قریب بھی نہیں آتا کیونکہ وہ بیاز سے دور بھا گتا ہے۔

اللیم سیپا میں آ رام سے تکلیف بڑھتی ہے اور حرکت سے کم ہو جاتی ہے۔ رات کو لیٹنے سے بھی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مرطوب اور سر دموسم میں نزلہ شروع ہو جاتا ہے لیٹنے سے بھی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مرطوب اور سر میں در در ہوتا ہے جو خصوصاً داہنی کنیٹی لیکن کھلی ہوا سے افاقہ ہوتا ہے۔ زکام کے ساتھ سر میں در در ہوتا ہے جو خصوصاً داہنی کنیٹی میں شدت سے محسوس ہوتا ہے اور بیشانی تک پھیل جاتا ہے۔ ایلیم سیپا میں زکام بائیں میں شدت سے محسوس ہوتا ہے اور بیشانی تک پھیل جاتا ہے۔ ایلیم سیپا میں زکام بائیں نتھنے سے شروع ہوکر دائیں طرف منتقل ہونے کار جمان رکھتا ہے۔

اہلیم سیپا کالی کھانسی میں بھی مفید ہے اور خسرہ میں بھی۔ اگر بچے کو الٹیاں بھی آئیں، بدہضمی ہو، بد بودار ہوائیں خارج ہوں اور خسرہ کی علامات ظاہر ہونی شروع ہوجائیں تواہلیم سیپا بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ نیز بچوں کے پیٹے درد کے لئے بھی بیاحچی دواہے۔

ایلیم سیپا میں پیٹ میں ایسا در داٹھتا ہے جس کے ساتھ بیشا ب کی حاجت ہوتی ہے۔ مثانے میں جلن اور بیشا ب کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ مثانہ کے مقام پر در دہوتا ہے۔ مثانہ کے مقام پر در دہوتا ہے۔ نزلہ زکام میں بیشا ب بار بار آتا ہے۔ زکام کی وجہ سے آواز میں بوجھل بن ، حلق میں خراش اور سانس کی نالی میں در دنمایاں ہوتے ہیں اور شدید کھانسی اٹھتی ہے، بہت

حچینکیں آتی ہیں۔ گردن کے پچھلے حصہ میں شدید درد، رات کوسر دی کی شدیدلہر کمرسے نیچے اتر تی ہوئی محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے بار بار بیشاب آتا ہے۔

بعض دفعہ نزلہ زکام کے ساتھ جلد پر سرخ جھوٹے جھوٹے دانے نمودار ہو جاتے ہیں۔سوئیاں چھنے کا احساس ہوتا ہے اورجسم کے بعض حصوں میں حدت اور جلن محسوس ہوتی ہے۔

ایلیم سیپ<u>ا اعصا فی در دول</u> میں بھی مفید ہے۔اگر ز کام کے ساتھ جسم میں خصوصاً چہرہ، دانت ،سراورگر دن میں در دہوں تواہلیم سیپاان سب کے لئے بہترین دواہے۔

> مددگاردوائیں: فاسفورس تھوجا۔ پلسٹیلا دافع اثر دوائیں: آرنیکا۔ کیمومیلا۔ وریٹرم اہلم طاقت: 30سے 200 تک

ايلو 41

12

ابلو

ALOE

(Socotrine - Aloes)

ایلو ایک ایسے بودے سے تیار کی جانے والی دوا ہے جسے اردو میں کنوار گندل کہتے ہیں۔ پیپٹے میں ہوا، اسہال اوراکٹی کا رجحان اس دوا کی نمایاں علامتیں ہیں اور بھی ایسی سینکڑ وں دوائیں ہیں جواسہال،الٹی اور بیٹ کی ہوا کے لئے استعال ہوسکتی ہیں کیکن سب دواؤں کی اپنی اپنی علامتیں ہیں جوایک کودوسرے سے متاز کرتی ہیں۔ایلو کی ایک خاص علامت الیں ہے جو لائیکو پوڈیم میں بھی یائی جاتی ہے یعنی سمندری جانور خصوصاً آؤسٹر (Oyster) کھانے سے اسہال لگ جاتے ہیں۔ جس مریض میں بھی سمندری جانور کھانے سے اسہال کا رجحان ہو وہاں لائیکو بوڈیم کے علاوہ ایلو کی طرف بھی دھیان جانا چاہئے۔ایلو کے مریض کے پیٹ کی ہواسارے پیٹ میں تناؤ پیدائہیں کرتی بلکہ لائیکو بوڈیم کی طرح دائیں طرف نیچے کی طرف اس کا دباؤ ہوتا ہے۔عام طوریر ہومیو پیتھک ڈاکٹر پبیٹ کی ہوا کے لئے تین دواؤں پر زیادہ زور دیتے ہیں۔کار بوویج جس میں ہوا کا دیا وُ اوپر کی طرف ہوتا ہے، لائیکو بوڈیم جس میں دباؤنیجے کی طرف ہوتا ہے اور جا ئنا جس میں دباؤ سارے پیٹ میں ہر طرف ہوتا ہے۔ پیٹ کی ہوا کی علامتیں صرف ان تین دواؤں تک محدود نہیں بلکہ بکثرت دوسری دواؤں میں بھی یائی جاتی ہیں اور محض ان تین دواؤں کو مدنظر رکھ کرعلاج کرنا کافی نہیں۔ اس قسم کے چککے کتابوں میں اس لئے درج ہوتے ہیں کہ فوری ضرورت کے طور پر بعض دفعہ بیہ کام آ جاتے ہیں۔معدےاورانٹریوں میں ہوا زیادہ دیرر کنے سے در دِقو کنج (Colic) بھی ہو سکتا ہے۔وقت کی کمی اور مریض کی تیزی سے بگر تی ہوئی حالت ڈاکٹر کواکٹر ٹکسالی کی دواؤں کا

سہارا لینے پر مجبور کر دیتی ہیں۔لیکن پیٹ کی ہوا کا اصل اور مستقل علاج تو مزاجی دوا کا استعال ہے ورنہ کچھ عارضی افاقہ کے لئے بھی ایک دوا کا سہارالینا پڑے گا بھی دوسری کا۔

انترابیت کی وجہ سے شکنجہ سا آجائے اور کھانا متعفن ہونے کی وجہ سے انترابی کی معدہ کے منہ پر معدہ کے منہ پر تیزابیت کی وجہ سے شکنجہ سا آجائے اور کھانا متعفن ہونے کی وجہ سے شخت بد بو بیدا ہواور ہوا معدہ میں اکٹھی ہوتی رہے تی ہوتی ہیں۔

عیا نا بیب کی ہوا میں اس صورت میں مفید ہے جبکہ چائنا کی دوسری علامتیں بھی موجود ہول یعنی مریض کے مزاج میں خشکی اور ملیریا کے بدا ثرات کی عمومی علامتیں ملتی ہوں۔ بعض دفعہ لعابوں کی کمی کی وجہ سے انتر یوں میں جگہ جگہ ہوارک جاتی ہے۔ چائنا ایسے مریضوں سے تعلق رکھتی ہے جن کے لعاب خشک ہور ہے ہوں اور انتر یوں کے گلینڈ زا پناپورا کام نہ کریں۔

اس طویل ضمنی بحث کے بعد اب ہم واپس اصل دوا کی طرف لوٹ یوں۔

سمندری غذا خصوصاً آؤسٹر کھانے کا رڈمل ایلو کے مریض پر فوری اسہال کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ متلی اور قے کے ساتھ سرمیں در دہوتا ہے عموماً اس کا سر در دوما سے معنی سرکے اگلے حصہ سے شروع ہوتا ہے۔ آئکھیں سرخ اور بوجل ہوجاتی ہیں اور کھولنی مشکل ہوتی ہیں، ہونٹ خشک ہوجاتے ہیں، کھانا چباتے ہوئے کا نول میں شورمحسوس ہوتا ہے۔

بعض اوقات صبح اٹھتے ہی ایلو کے مریض کے ناک سے خون جاری ہوجا تا ہے۔ مریض کا منہ کڑوا ہوجا تا ہے۔ دائیں طرف پسلیوں کے نیچے در دبھی ایلو کی خاص علامت ہے۔ اسہال کے ساتھ پیٹ میں مروڑ بھی اٹھتے ہیں۔ بواسیر کے مسے پچھوں کی صورت میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں شدید جلن اور در دہوتا ہے۔ ٹھنڈ ایانی لگانے سے سکون محسوس ہوتا ہے۔ اگر اسہال کی بجائے قبض ہوتو پیٹ کے نیلے حصہ میں شدید دبا وُمحسوس ہوتا ہے۔ ایلو کا مزاج رکھنے والا مریض عموماً گوشت کھانا پیند نہیں کرتا حالا نکہ گوشت کھانے سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔

عورتوں کے ماہانہ ایام میں ایلو کی تکلیفوں میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ چلنا اور کھڑا ہونا دشوار معلوم ہوتا ہے۔ رحم بوجھل اور کمر کے نچلے حصہ میں درد ہوتا ہے اور وقت سے بہت پہلے کثرت سے خون آنے لگتا ہے۔

ایلو کی ایک علامت گلے کی خراش اور کھانسی بھی ہے، جوڑوں میں بھی درد ہوتا ہے۔ اس کی بیاریاں مجھ کے وقت بڑھ جاتی ہیں۔خشک اور گرم موسم میں بیاریاں شدت اختیار کر لیتی ہیں۔سردی اور تازہ ہوا میں آ رام ملتا ہے۔عموماً کھانا کھانے کے بعداس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں یاشدت پکڑ جاتی ہیں۔

سلفر	مد د گار د وائيں :
سلفر_او پیم	دافع اثر دوائيں:
30	طاقت:

اليومن

13

اليومن (مچنگري)

ALUMEN

(Common Potash Alum)

الیومن پھٹکری کو کہتے ہیں جوکسی بھی زخم سے جریان خون کوفوری رو کئے کے لئے استعال کی جاتی ہے بیکولائیڈل (Colloidal) کی صورت میں معلق ذرات براثر اندازی کے لحاظ سے بہت شہرت رکھتی ہے۔اگر کسی محلول ما گیس میں چھوٹے چھوٹے ذرات معلق ہوجائیں تو ایسے ذرات کو کولائیڈل (Colloidal) کہا جاتا ہے۔ پیٹکری ہوایا کسی گیس میں موجود کولا ئیڈل ذرات پراٹر اندازنہیں ہوتی لیکن ہرمحلول کےکولا ئیڈل ذرات کواکٹھا کر کے چیوٹی چھوٹی پھٹکیوں کی صورت میں منجمد کر دیتی ہے۔ بالکل ایساہی اثر متعدد سانیوں کے زہر کا خون یر بڑتا ہے۔عموماً خون سے بننے والی ایسی چھٹکیاں دل کے حملوں کا محرک ہو جاتی ہیں۔ سے مگری کواگر براہ راست انسانی خون میں داخل کیا جائے تو خون کے سرخ اور سفید ذرات کوتو پھٹکیوں کی صورت میں منجمد کر دیتی ہے مگر الیکٹر ولائٹ کا وہ مرکب جس میں بارہ نمک خاص تواز ن سے کھلے ہوئے ہوتے ہیں ان پر کوئی اثر نہیں کرتی ۔ پچھکری کو ا یسے مٹی ملے یا نی کوصاف کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے جس میں مٹی کے ذرات کولا ئیڈ ل شکل میں معلق ہوں ۔سندھ کےان علاقوں میں جہاں زبریز مین یا نی سخت کھاری ہے پینے کے لئے نہر کا یا نی ہی استعال ہوتا ہے۔اس میں معلق مٹی اور ریت کے ذرات کو پھٹکیاں بنا کرنچے بٹھا کریانی کونتھارنے کے لئے بکثرت پھٹکری استعال ہوتی ہے۔ چونکہ مچھکری کا کچھ نہ کچھ حصہ نقرے ہوئے یانی میں باقی رہ جاتا ہے اس لئے ایسے علاقوں میں مچھکری کے زہر سے پیدا ہونے والی بہاریوں کا زیادہ پایا جانا تعجب انگیزنہیں۔ پھٹکری کے

زہر کے بدائرات کے نتیجہ میں عموماً گہرے السر بنتے ہیں اور اگر پھوڑے بنیں تو ان پھوڑ وں کے رفتہ رفتہ بگڑ کر کینسر بننے کار جحان بھی پایا جاتا ہے۔ اسی طرح گلے اور زبان میں خصوصیت کے ساتھ بیز ہر حملہ کرتا ہے اور وہاں بھی السریا کینسر پیدا کر دیتا ہے نیز اس کے نتیجہ میں گلینڈ زسوج کرسخت ہونے لگتے ہیں۔ ٹانسلز سوج کر رفتہ رفتہ بڑے اور سخت ہوجاتے ہیں۔ عور توں میں رخم اور سینے کے غدوداسی طرح موٹی موٹی سخت گھلیوں میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔

سلفری طرح سری چوٹی پر گرمی اور دباؤ کا احساس ہوتا ہے کین سلفر کا مریض ہاتھ کا دباؤ یا کپڑ الینا پیندنہیں کرتا جبکہ الیومن میں دباؤ کا احساس ہونے کے باوجود مریض کو ہیرونی طور پر دبانے سے آرام محسوں ہوتا ہے۔

الیون میں عضلاتی کمزوریاں بھی بہت نمایاں ہیں۔اس پہلوسے یہ پلمبم (Plumbum) سے بہت مثابہ ہے۔خصوصاً دونوں کی فالجی علامتیں ایک دوسر ہے سے کافی حدتک مثابہت رکھتی ہیں۔ پس جزوی طور پرالیومن پلمبم کی فالجی علامتوں کے مثابا الرات پیدا کرتی ہے۔
الیومن کے بیتمام زہر ملے الرات جن کا اوپر ذکر گرز رچکا ہے ایلومینیم کی ہومیو پیتھک دوا سے شفایا ہوسکتے ہیں۔قطع نظر اس کے کہ یہ بیاریاں کیوں پیدا ہوئیں۔اگران کی شکل الیومن سے ملتی ہواور مریض کا عمومی مزاج بھی الیومن کی یا دولاتا ہوتو یہ ساری بیاریاں اللہ کے فضل سے ایلومینیم کے مناسب استعمال سے دور ہوسکتی ہیں۔ پھونسوانی بیاریوں کا ذکر اوپر گرز رچکا ہے۔ ان ایلومینیم کے مناسب استعمال سے دور ہوسکتی ہیں۔ پھونسوانی بیاریوں کا ذکر اوپر گرز رچکا ہے۔ ان ایلومینیم کے مناسب استعمال سے دور ہوسکتی ہیں۔ پھونسوانی بیاریوں کا ذکر اوپر گرز رچکا ہے۔ ان اگر آ واز مستقال طور پر بیٹھ جائے تو یہ بھی الیومن کی ایک نمایاں علامت اگر آ واز بیٹھنے کے لئے بور یکس یا کو کا یا آ رسنگ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن ہوں محض آ واز بیٹھنے کی علامت پر انحصار نہیں کرنا جب سک مریض کی دیگر علامتیں نہاتی ہوں محض آ واز بیٹھنے کی علامت پر انحصار نہیں کرنا جائے۔ گلے کی بیاریوں میں جی وہی دوا مفید ٹابت ہوگی جو مریض کی عمومی مزاجی دوا جائے ہوں محن کی بیاریوں میں جی وہی دوا مفید ٹابت ہوگی جو مریض کی عمومی مزاجی دوا جائے۔ گلے کی بیاریوں میں جی وہی دوا مفید ٹابت ہوگی جو مریض کی عمومی مزاجی دوا جائے۔ گلے کی بیاریوں میں جی وہی دوا مفید ٹابت ہوگی جو مریض کی عمومی مزاجی دوا

ہو۔الیومن کے مزاج میں بیبات داخل ہے کہ اس کے مریض کا گلابعض دفعہ مستقل طور پر بیٹے جاتا ہے۔ بیدا یک ایس دوا ہے جو بہت گہرا اور لمبااثر کرنے والی بھی ہے اور عارضی بیاریوں میں بھی شفادینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔الیومن انترا یوں کی بیماریوں میں بھی بہت کارآ مدہ۔شدید قبض اور ضدی جریان خون کے لئے مفید ہے۔ بوڑ ھے لوگوں کی سانس کی تکلیفوں میں بھی بہت کارآ مدہے۔اگر سانس کی نالیوں میں بھی بہت کارآ مدہے۔اگر سانس کی نالیوں میں بھی اور کھپاؤ کا احساس ہو، غذا نگلنے میں خصوصاً مائع نگلنے میں دقت پیش آئے اور زبان کے غدود سخت ہوجا کیں تو بیدوا بہت مفید ثابت ہے۔الیومن میں شدید میر درد کے علامت بھی ملتی ہے جس کے ساتھ سر پر ہو جھ کا احساس ہوتا ہے۔ دبانے سے آرام آتا میں سردرد کے جسے ٹھنڈک پہنچانے سے آرام ماتا ہے۔

دافع اثر دوائيں: کيموميلا پئس واميکا پسلفر اپي کاک طاقت: 30 سے 200 تک اليومينا 49

14

اليومينا

ALUMINA

(Oxide of Aluminum-Argilla)

الیومینا جس سے الیومن کا کیمیاوی مرکب بنتا ہے ایک الیمی دھات ہے جس سے بکثرت برتن بنائے جاتے ہیں۔ اکثر باور چی خانوں میں اور کسی حد تک خسل خانوں میں بھی الیومینا کے بنے ہوئے برتن استعال ہوتے ہیں۔ ایک زمانے میں جب بیددھات یورپ میں نئی دریافت ہوئی تو بہت مہنگی ہوتی تھی اور امراء اور رؤساہی اس کے برتن استعال کرتے تھے اور بیان کی امارت کی علامت تھی۔ اب صنعتی انقلاب کے نتیجہ میں ایلومینم بہت ہی سسی دھات کے بیان کی امارت کی علامت تھی۔ اب سنعتی انقلاب کے نتیجہ میں ایلومینم بہت ہی سسی دھات کے برتن استعال کرتے ہیں۔ استعال کرتے ہیں۔ استعال کرتے ہیں۔

جہاں تک کھانے پکانے یا دیگر استعال کے برتنوں کا تعلق ہے جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ الیومینا کا مستقل استعال انسانی صحت پر بہت گہرے منفی اثر ات ڈالتا ہے۔ بیز ہر بہت آ ہستگی سے اثر انداز ہوتا ہے گرمستقلاً انسانی وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ بیخون کی نالیوں کوسکیڑتا ہے نیزان نالیوں میں رفتہ رفتہ ایسے مادوں کی تہ جمنے گئی ہے۔ جن کی وجہ سے تنگ ہوتے ہوتے تقریباً بند ہوجاتی ہے اور دل کے حملے کا موجب بنتی ہے۔ دماغ کوخون پہنچانے والی نالیوں پر بھی اس سے ملتا جاتا اثر ہوتا ہے اور انسان آ رٹیر ہوسکر وسس (Arteriosclerosis) کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجہ میں بڑھا ہے کے اثر ات تیزی سے ظاہر ہوتے ہیں ، یا دداشت کمز ور ہوتی جاتی جاتی ہو کہ بیا جاتی ہو کہ بیا ہوتے ہیں ، یا دداشت کمز ور ہوتی جاتی ہے بی جاتی ہو کہ بیا رہونے گئے ہیں ، بلڈ پریشر کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوجا تا ہے۔ مریض تیزی سے ذبنی اور عضلاتی کی لظ سے معذور ہونے لگتا ہے۔ اگر اسے الیومینا دیں تو مریض تیزی سے دبنی اور عضلاتی کی لظ سے معذور ہونے لگتا ہے۔ اگر اسے الیومینا دیں تو

جلدفائدہ کی امیدنہ رکھیں کیونکہ یہ بہت آ ہستہ اثر کرنے والی دوا ہے۔ جوز ہرآ ہستہ آ ہستہ جسم پراثر دکھاتا ہے وہ جب دوا بنتا ہے تو وہ دوا بھی آ ہستہ آ ہستہ اثر دکھاتی ہے۔ بعض اوقات اس کا اثر سالوں پرمجیط ہوتا ہے۔ اس لئے اگر مستقل اور دائی علاج کے لئے الیو بینا کو استعال کریں تو او نجی طاقت میں لمبے وقفوں کے بعد دیں مثلاً ایک مہینے کے بعد ایک ہزار طاقت میں یا دس ہزار کی طاقت میں۔ اگر 200 کی طاقت میں استعال کریں تو ہر دس دن کے بعد ایک خوراک دیں۔ اگر اس دوانے کام کیا تو مہینوں یا سالوں مسلسل استعال کریے تو بے جان ہو چکے ہیں ان میں رفتہ رفتہ بہتری کے کوئی آ فار ظاہر نہیں ہوتے لیکن پھر وہ ریشے جو بے جان ہو چکے ہیں ان میں رفتہ رفتہ جان پڑنے گئی ہے اور پھر کو صداستعال کے بعد پھونہ چھ بہتری کی طرف مائل تبدیلیاں دکھائی جان پڑنے گئی ہیں۔ اس لئے الیو مینا ایسے مریض کو دینی چا ہئے جو جلد باز نہ ہواور بیجان لے کہ بیاری گہری اور کہی ہے اور دوا کے مسلسل ایک دوسال استعال سے بالآخر بیاری کارخ پلٹے گا اور زندگی کے کھواور دن اچھے گزر دوائیں گے۔

الیومینا کی ایک علامت ہے ہے کہ اس کی خارش میں جلد پر کوئی ابھار نہیں بنتے۔بالکل صاف شفاف جلد پر پہلے خارش ہوتی ہے۔ پھر خارش سے جلد میں سوزش پیدا ہوجائے تو تخی سے صاف شفاف جلد پر پہلے خارش ہوتی ہے۔ پھر خارش سے جلد میں سوزش پیدا ہوجائے تو تخی سے کھی کرنے سے دانے یا آ بلے بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات حصلنے سے خون بھی رسنے لگتا ہے۔ متاثرہ حصہ بالکل ماؤف ہوجاتا ہے اور انفیکشن کی وجہ سے کئی اور پیچید گیاں پیدا ہوتی ہیں۔ خارش کی عام دواؤں میں عموماً جلد پر ابھار پہلے پیدا ہوتے ہیں اور خارش بعد میں شروع ہوتی ہے۔ الیومین اس کے برعکس ہے۔

الیو مینا میں آئکھول کے چھپر (Lids) سوجنے کی علامت بھی نمایاں ہے۔ پپوٹے موٹے اور بوجسل ہوجاتے ہیں، بلکیں جھڑ جاتی ہیں، بینائی دھندلا جاتی ہے، جہ کے وقت اٹھنے پر روشنی سے زود حسی ہوتی ہے اور آئکھول کے چھپر چیکے ہوئے ہوتے ہیں، سب اشیاءزر در کھائی دیتی ہیں۔

اليومينا ميں معدہ جواب دے جاتا ہے، بھوک بالكل ختم ہو جاتى ہے، گوشت سے

نفرت ہوجاتی ہے نا قابل ہضم چیزیں مثلاً مٹی ، کوئلہ وغیرہ کھانے کی خواہش کے ساتھ معدہ میں سوزش اور تشنج ،کسی چیز کا ذا نقہ ٹھیک نہیں رہتا ، کھٹے ڈکار آتے ہیں۔الیو مینا ان سب علامات میں مفید ثابت ہوسکتی ہے۔آرٹیریوسکلروسس سے ملتا جلتا اثر معدے پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔معدے کی رگیس اور خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے معدہ بہت تیزی سے بڑھا ہے کے آثار ظاہر کرتا ہے۔

یہ معدہ کی عارضی بیاریوں مثلاً تیز ابیت وغیرہ اور مزمن بیاریوں میں بھی کام
آتی ہے۔ بواسیر کے پرانے مسول کوٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کی سب سے
نمایاں علامت تیز ابیت ہے۔ مردوں اور عورتوں دونوں کی بیاریوں میں تیز ابیت کے
آثار بہت نمایاں ہوتے ہیں۔ عورتوں کے لیکوریا میں اتن تیز ابیت ہوتی ہے کہ اس کے نتیجہ
میں گی دوسری بیاریاں بیدا ہو جاتی ہیں۔ عورتوں کے تعلق میں اس کی ایک خصوصیت یہ ہے
کہمل کے دوران شدید قبض ہو جاتی ہے جبکہ عام حالات میں قبض نہیں ہوتی۔ اگر قبض کا
حمل کے ساتھ تعلق ہوتو الیو مینا آپ کے ذہن میں انجرنی چاہئے۔ یہ وہ تکلیف ہے جس
میں الیو مینا عارضی طور یر بھی کام دکھاتی ہے اور دیرینہ بیاری میں بھی۔

یہ دائمی کھانسی میں بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ عام طور پروہ کھانسی جودائمی ہواور گلے کی بجائے پھیچھڑے کی خرابی سے تعلق رکھتی ہواس میں بیسلینیم ، فاسفورس ، آ رسنک آئیوڈ ائیڈ اور کالی کارب عموماً مفید ثابت ہوتی ہیں لیکن اگر مزاجی علامتیں الیومینا کی ہوں تو صرف الیومینا سے ہی مستقل فائدہ ہوسکتا ہے۔

اليوميناكى ذہنى علامات ميں ايك نماياں علامت بيماتى ہے كه آہسته آہسته انسان كى قوت فيصله ماؤف ہونے لگتی ہے اور مریض كرنه كر، كى غير معین حالت میں معلق رہتا ہے۔ رفتہ رفتہ ذہن دھند لا جاتا ہے اور ابہا مات كاشكار ہوجاتا ہے۔ مریض جو پچھ سنتا ہے اور جو پچھ د يكھا ہے اسے يوں لگتا ہے كہ وہ نہيں بلكہ كوئى اور سن اور د مكھ رہا ہے۔ بعض دفعہ اسے يوں لگتا ہے كہ وہ نہيں ميں منتقل ہوتو اس كى آئكھوں سے بعض دفعہ اسے يوں لگتا ہے كہ اگر وہ كى اور كے ذہن ميں منتقل ہوتو اس كى آئكھوں سے د مكھ سكے گا۔ رفتہ رفتہ ہڑھے چلے جانے والا بير جمان آخر ایسے مریض كو پاگل كر دیتا

ہے مگر وہ دوسروں کے لئے خطرنا ک نہیں ہوتا بلکہ فکر ونظر کی صلاحیتوں سے عاری ہوکر اپنی ذات میں کھوجا تا ہے۔

اس کی ذبنی بیاری بعض اوقات بے صبری کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وقت گزرہی نہیں رہااور دل چا ہتا ہے کہ جلد گزرے۔ تیز دھارآ لات اور ہتھیا روں کود کھے کر ایسے مریضوں کے دل میں ایک زور دار لہراٹھتی ہے کہ میں ان ہتھیا روں سے خودا پنے آپ کو زخمی نہ کرلوں ۔ ایسے مریض خود گئی نہیں کرتے بلکہ محض ڈراتے ہیں کہ وہ خود تشی کرلیں گے۔ جیسے بعض لوگ اونچی جگہ سے بنچے دیکھیں تو ڈرلگتا ہے کہ کہیں چھلانگ ہی نہ لگاویں۔

الیومینا کا مریض بہت عمگین رہتا ہے اور اپنے ماحول سے تنہا کہیں دور چلے جانے کی خواہش رکھتا ہے ۔ بھی خوف کھا تا ہے کہ کہیں میں پاگل ہی نہ ہو جاؤں۔ صبح اٹھنے پرنفسیاتی علامات زیادہ ہوتی ہیں۔

بیم الیومینا کا اثر کھانا اور پانی نگنے والے عضلات پر پڑتا ہے اور چیز نگلنے میں رفتہ رفتہ دقت ہونے گئی ہے۔ بھی ان عضلات کی کمزوری سے کھانا سانس کی نالی میں یااوپرناک کی نالی میں چلاجا تا ہے۔

فالجی اثر بعض او قات مثانے پر پڑتا ہے اور مقعد پر بھی۔ پیشاب پوری طرح خارج کرنے کے لئے بھی اور فضلہ نکا لئے کے لئے بھی مسلسل زور لگا نا پڑتا ہے، فضلہ نرم بھی ہوتو زور لگا نا پڑتا ہے، فضلہ نرم بھی ہوتو زور لگائے بغیر نہیں نکلتا۔ پیشاب کی علامتیں پر اسٹیٹ گلینڈ بڑھ جانے کی علامات سے ملتی جلتی ہیں۔ بسااو قات اجابت کی شکل میں بکری کی مینگنیوں یا اونٹ اور گھوڑے کی لید سے ملتی ہے بعنی چھوٹی چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی گھلیوں کے ایک دوسرے کے ساتھ چیکنے سے جو فضلہ بنتا ہے بھی پتلا اور بھی موٹا ہوتا ہے اور خارج ہوتے وقت تکلیف دیتا ہے۔

گریفائٹس اور پلمبم کے مریضوں میں بھی فضلہ کی ایسی ہی علامات پائی جاتی ہیں۔ کبھی فالج کی بناپر بغیر محسوس ہوئے بیشاب قطرہ قطرہ نکلتا رہتا ہے اور عضلات میں سکت نہیں ہوتی کہ اسے بند کر سکیں۔ یہی علامت فضلے کے بے اختیار تھوڑ اتھوڑ انکلتے رہنے کی

صورت میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔

الیومینا کے مریض کو چگر بہت آتے ہیں اور چلتے پھرتے سرگھومتا اور تو ازن بگڑتا رہتا ہے۔ پاؤں سن ہوجانے کار جحان بھی ملتا ہے اور در دایک مقام سے سائکل کے پہنے کے تاروں کی طرح چاروں طرف پھیلتے ہیں۔ بیسب علامات کسی مریض میں اکٹھی ہوجائیں تو الیومینا اس کی نقینی دوابن جائے گی۔

ٹانگوںاور باز دوئں کی متوازن حرکت پرارادہ کواختیار نہر ہےاور چلنے میں پاؤںادھر ادھریڑیں توالیو مینا کالمبااستعال ضرور فائدہ دیتا ہے۔

نزلاتی اور جلدی علامات بیشرت ملتی نبیں۔ نزلہ ناک میں مستقل اڈہ بنا بیٹھتا ہے ناک ہر وقت خشک مواد سے بھرار ہتا ہے جو بسااوقات لمبے خشک ہوئے ہوئے''چوہوں''کی شکل میں ناک کو بھر دیتے ہیں۔ آئکھوں پر نزلہ گرے تو نظر دھندلا دیتا ہے۔ اندرونی جھلیوں لینی معدے انترایوں اور گردے کی جھلیوں پر لمبے عرصہ تک سوار رہتا ہے۔ جب بھی نزلہ ہویا سردی لگ جائے سردرد شروع ہوجا تا ہے۔

نزلاتی جھلیوں کی طرح جلد بھی ہرتہم کی بیاریوں کا شکار رہتی ہے۔ تھجلا کر جگہ جگہ سے موٹی کھال کی طرح ہوجاتی ہے۔ زخم بھی بنتے ہیں اور ناسور بھی۔ سلفر کی طرح بستر کی گرمی سے خارش بہت بڑھ جاتی ہے۔ چہرے پریوں لگتا ہے جیسے جالا ساتنا گیا ہویا انڈے کی سفیدی لگانے کے بعد خشک ہوگئ ہو۔ ناک کی چونچ میں کٹاؤ بڑجاتا ہے۔ آئکھوں پرسوزش اور بعض دفعہ کمرے بن جاتے ہیں۔

الیومینا کا فالجی اثر فلیکسرز (Flexors) پر بھی پڑتا ہے اور ایکسٹینسر ز (Extensors) پر بھی فلیکسرزان عضلات (Muscles) کو کہتے ہیں جو ہاتھ پاؤں کواندر کی طرف کھیجتے ہیں اورایکسٹینسرزان عضلات کو کہتے ہیں جوان کو باہر کی طرف کھولتے ہیں۔ عموماً جن غذاؤں سے الیومینا کے مریض کی تکلیفیں بڑھتی ہیں ان میں نمک، شراب، سرکہ، مرچیں، آلواور کیس والے مشروبات شامل ہیں۔ بواسیراور مقعد کا کناروں سے بھٹ جانا ہیاس کی خاص علامت ہے۔

تمام مردانہ علامتوں میں بے طاقتی اور رات کو احتلام ہو جانا شامل ہیں۔ پر اسٹیٹ بڑھ جاتا ہے۔ پراسٹیٹ گلینڈ کے مقام پر اور اردگر د بھرا و اور تنا و کا احساس رہتا ہے۔ جنسی اعضاء میں نیم فالجی علامتیں ملتی ہیں جس کی وجہ سے عمومی صحت کے باوجود انسان نا کارہ ہوجاتا ہے۔

عورتوں کے جنسی اعضاء میں عموماً لمجنز لے کے بداثرات پائے جاتے ہیں اوراس کے نتیجہ میں ہرتسم کا لیکور یا جاری ہوجاتا ہے اور مستقل بہتار ہتا ہے۔ اسی طرح رقم کے پنیج گرنے کا احساس بھی نمایاں ہے۔ کھڑے ہونے اور چلنے سے تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ اگر سوزاک کو دوسری دواؤں سے دبا دیا گیا ہولیکن اس کے دریا باثر باقی رہ جائیں اور عورتوں کے اعضاء میں خصوصاً بے چینی اور گرمی کا احساس ایک مستقل بیاری بن جائے تو اس میں ایلیو مینا بھی دوا ہوسکتی ہے۔

کھانی کے ساتھ بعض دفعہ چینکیں بھی آتی ہیں اور گلے میں ایساا حساس ہوتا ہے جیسے پرندے کے پرسے گدگدی کی جارہی ہے۔ ایلیو مینا کی کمر در دمیں جلن بعض دفعہ اتی شدید ہوتی ہے جیسے ماؤف مقام پرگرم استری رکھ دی گئی ہو۔ پاؤں کے تلوے کمز وراور نرم پڑجاتے ہیں اور کچھ سوج بھی جاتے ہیں۔ جس پہلوپر انسان لیٹے یا بیٹھے وہ بہت جلد سوجا تا ہے اور ٹاگوں میں سونے کا رجحان زیادہ پایا جا تا ہے۔ سردی گرمی کے احساس میں ایک تضاد یہ ماتا ہے کہ مریض محضنڈ ا ہوتا ہے اور خوب اچھی طرح اپنے آپ کو لیسٹ کررکھنا چا ہتا ہے مگر اس کے باوجود چہرے پرخارش کا دورہ شروع ہوجا تا ہے۔ بسترکی گرمی شروع میں تو بہت پیند آتی ہے مگر گرم ہونے پرخارش کا دورہ شروع ہوجا تا ہے۔ ہاتھ بہت ٹھنڈے درہتے ہیں اور سوتے وقت بہت آ ہستہ پرخارش کا دورہ شروع ہوجا تا ہے۔ ہاتھ بہت ٹھنڈے درہتے ہیں اور سوتے وقت بہت آ ہستہ گرم ہوتے ہیں۔ جلدعو ما خشک رہتی ہے اور پسینہ بہت کم آتا ہے یابالکل نہیں آتا۔

مددگاردوائیں: برائیونیا دافع اثر دوائیں: اپی کاک کیمومیلا طاقت: 30 سے ہی ۔ایم (CM) تک

15

ایمبرا گریپیا

AMBRA GRISEA

(Ambergis-A morbid Secretion of the Whale)

ایمبرا گریبا دبلے پتلے، زودرنج، چڑچڑے اور جلد غصہ میں آجانے والے بچوں اور بروں کی دوا ہے۔ زود حسی اس کی نمایاں علامت ہے۔ کم عمری میں ہی توازن کھو دینے اور چکرانے کا رجحان ملتا ہے جیسے بہت بوڑھے لوگوں میں طبعی طور پر بیا عارضہ پایا جاتا ہے۔ لہذا یہی دوامعمر مریضوں کی عمومی بیاریوں میں مفید ثابت ہوتی ہے۔

ایمبراگریسا کامریض عموماً غم میں ڈوبار ہتاہے خواہ کوئی معین غم اس کے ذہن میں نہ بھی ہو۔ یہا یسے مریضوں کی دوا ہے جو طبعاً اور فطر تاخمگین ہوں، ان کار جحان اندھرے میں بیٹھار ہنے کی طرف ہو، بات بات پر دل ڈوبتا ہوا محسوں ہواور زندگی کی کوئی خواہش باقی نہ رہے۔ ہر چیز سے بیزار اور بے پر واہ ہو جائے۔ اگر ان علامتوں کے ساتھ وقت سے پہلے بڑھا ہے کی جسمانی علامتیں بھی ظاہر ہوں تو ان کا علاج ایمبرا گریسا ہے۔ ایسے مریضوں کو چکر بہت آتے ہیں۔ سراور معدہ میں کمزوری کا حساس ہوتا ہے، بیشانی پر بوجھ، دماغ میں شدید در د کی لہریں اٹھتی ہیں، غنودگی طاری ہوجاتی ہے۔ حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ سرکی بیرونی علامتوں میں بالوں کا تیزی سے جھڑنا شامل ہے۔ ایسے مریض کی نکسیر پھوٹے تو بہت زیادہ پھوٹی ہے اور دانتوں سے جریان خون ہوتو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ معدے میں ہوا بہت بیدا ہوتی ہے اور ڈکار دانتوں سے جریان خون ہوتو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ معدے میں ہوا بہت بیدا ہوتی ہے اور ڈکار ایسے آتے ہیں جیسے کھٹاس بہت ہولیکن اس کے ساتھ معدے میں جانن کی بجائے ٹھنڈک کا احساس یا یا جاتا ہے۔

فہنی انتشار اس کی ایک طبعی علامت ہے۔ سرس ہونے کا احساس جو تمام جسم میں پھیاتا ہوامحسوس ہوتا ہے۔

ایمبرا گریسا میں بیاریاں عموماً ایک طرف ہی تھہری رہتی ہیں۔ یہ رجحان برائیونیا،
بیلا ڈونا اور سپائی جیلیا میں بھی پایا جاتا ہے۔ ایمبر اگریسا میں دائیں اور بائیں کا فرق نہیں ہے۔
اگر دائیں طرف ہی بیاری ہوتو دائیں طرف ہی رہے گی اور اگر بائیں طرف ہوتو بائیں طرف ہی رہے گی۔
ہی رہے گی۔

ایمبرا گریبا کی ایک علامت جو بظاہر اچنبھی معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مریض موسیقی کو برداشت نہیں کرسکتا اوراس کے سر درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔اعصابی تناؤ اور جسمانی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ گویا موسیقی اس کوسکون بخشنے کی بجائے اس کے اعصاب میں اضطراب بیدا کردیتی ہے۔

ایمبرا گریبا میں بڑھا ہے کی طبعی علامتیں مثلاً ہاتھ پاؤں کا سونا، دل کا دھڑ کنا اور اعصاب کا ڈھیلا بن سرعت سے بڑھنے گتا ہے۔ بید دوا فوری صدمہ کی شدت کو کم کرنے میں بھی کام آتی ہے۔ میں نے کئی باراسے ایسی مریض خواتین میں استعال کیا ہے جو جذباتی صدمہ کام آتی ہے۔ میں گرے کئی باراسے ایسی مریض خواتین میں استعال کیا ہے جو جذباتی صدمہ کہ بہنچ کے نتیجہ میں گہرے غم کا شکار ہوگئی تھیں۔ عارضی طور پڑم کے صدمہ کے لئے اگیشیا سے بہتر کوئی اور دوانہیں۔

دافع اثر دوائيں: کیمفر کافیائیس وامیکا پلسٹیلا سٹفی سگریا طافت: 30سے 200 تک

16

امونيم كارب

AMMONIUM CARB

(Carbonate of Ammonia)

امونیم کارب بہت گہری اورخون کے نظام پر اثر انداز ہونے والی دواہے۔اس کا ا ثر سانپ کے زہروں سے ملتا ہے۔سندھ میں بعض قابل ہومیو پیتھک ڈاکٹر امونیم کارب کو سانب کاٹنے کے تریاق کے طور پر بہت کا میابی سے استعمال کرتے رہے ہیں۔ کالے رنگ کا یتلا خون بہتا ہے جو پیرظا ہر کرتا ہے کہ اندرونی حملیاں جواب دے گئی ہیں۔اگر حملیاں جواب دے جائیں تو بداکثر بیاری کے آخری خطرناک مرحلے کی علامت ہوتی ہے۔ ناک، منہ، گلے،معدےاورانتر یوں وغیرہ سےخون رسنےلگتا ہے۔اگر بدسیاہ رنگ کا ہواور کچھ بتلا ہوتو امونیم کا رب اس کی بہترین دواہے کیونکہ سانپ کے کاٹے سے بھی یتلے یا گاڑھے سیاہ خون کا جریان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امونیم کارب ہومیو پیتھی میں اس کے توڑ کے طور پر استعال ہوتی ہے۔بعض بیاریوں میں اندرونی حجلیاں سرخ خون کے خلیوں کورو کئے کے قابل نہیں رہتیں ۔اس مرض کے لئے دوسری دوائیں استعال کی جاتی ہیں جن کا کتاب میں ا بنی اینی جگہ ذکرموجود ہے ۔ سیاہ خون کااخراج اکثر ایسی بیاریوں میں ہوتا ہے جوموت پر منتج ہوتی ہیں اورا گرفوری علاج نہ کیا جائے تو مریض کی زندگی کوشد پدخطرہ لاحق رہتا ہے۔بعض اور دواؤں میں بھی سیاہ خون کے بہاؤ کا ذکر ملتا ہے لیکن ان کے باہم فرق کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے ورنہ محض اس علامت کا کسی دوا میں پایا جانا کا منہیں دے گا۔ بواسیر میں سیاہی مائل نیلے خون کا جریان ہوتو یہ اندرونی جھلیوں کے نظام کی خرابی نہیں بلکہ پورٹل سٹم (Portal System) کا درہم برہم ہونا ہے۔ ہومیو پیتھک اصطلاح میں پورٹل سٹم جگر اوراس کے ساتھ تعلق رکھنے والی وریدوں کے نظام کو کہا جاتا ہے جن میں گندہ خون ہوتا ہے۔اگر اس نظام میں خرابی ہواور سیاہ خون کا جریان ہوتو سلفر، ہیمامیلس (Hamamelis) اوراس شم کی اور دوائیں بھی حسب علامت کا م آسکتی ہیں۔لیکن اگر انتر یوں اور گرد سے وغیرہ جواب دے جائیں اور جہاں جہاں اندرونی جھلیاں ہیں وہاں سے سیاہ رنگ کا زہر یلاخون جاری ہوجائے تو بیمناف چیز ہے۔ یہاں امونیم کارب کویا در کھنا ضروری ہے۔ایسے نازک اور تشویش ناک مرحلہ میں بیسب سے اچھی دوا ثابت ہوتی ہے۔

سانیوں کے کاٹے میں پی عجیب بات یائی جاتی ہے کہ اس میں خون جمنے اور بہنے دونوں با توں کار جحان ہوتا ہے۔ Orifices سےخون بہتا ہے یعنی ہراس جگہ سے جہاں جلداوراندرونی جھلیوں کا جوڑ ہے مثلاً ناخن اور جلد کا جوڑ، ہونٹوں کے باہر کی جلد کے ساتھ اندر کی جلد کا جوڑ وغیرہ۔جلداور جھلیوں کے جوڑ ایک طرح سے سلائی والی کیبر کے مشابہ ہوتے ہیں جہاں دو کنارے آپیں میں ملتے ہیں۔پس جہال کہیں بھی جلداور جھلیوں کا جوڑ ہووہاں سےخون رسنے کار جحان سانپوں کے زہروں میں نمایا ں طور پر ملتا ہے اور یہی رجحان امونیم کارب میں بھی ہے۔ امونیا کارب کی مریض عورتوں میں ہسٹیر یائی علامت نمایاں ہوتی ہے اور لیکیسس کی طرح سونے سےان کی بیاریوں میںاضا فیہوجا تا ہے۔ پرسوتی بخاراوربعض ایسے بخار جوز ہریلے مادے پیدا کر کے د ماغ پراثر انداز ہوجاتے ہیں اوراس کے نتیجہ میں مریض کو عجیب وغریب ڈرواؤنے خواب نظرآنے لگتے ہیں،ان خوابوں سے بھی مرض کی پیچان ممکن ہے۔اگر خواب میں سانپ زیادہ نظر آئیں تو بیاری کا نیٹرم میور سے تعلق ہوتا ہے۔سانپ کا زہرتولیکیسس ہوتا ہے نہ کہ نیٹرم میور۔سلیشیا میں بے چین کر دینے والے جو خواب آتے ہیں ان کی خاص علامت یہ ہے کہ مریض نیند کی حالت میں چلنے لگتا ہے اور بعض د فعہ لمباعرصہ چلنے کے بعد واپس اپنے بستر پر پہنچ کرسو جاتا ہے۔ ایک دفعہ سلیشیا کی ایک مریضہ سوتے میں اپنا بستر لپیٹ کر اٹھائے ہوئے دوسرے گھر پہنچی اور دروازہ بند

پا کربستر و ہیں بھینکا اور واپس اپنے گھر پہنچ کرخالی جاریائی پر دراز ہوگئی اورا گلے دن اسے پچھ بھی یا نہیں تھا۔

نیندگی حالت میں بے چینی اور نیندگی کی کا احساس سونے سے دور نہ ہوتو اس کی وجو ہات معلوم کرنی چاہئیں کہ نیند کیوں بے چین کرتی ہے اور تکلیف کو کیوں بڑھادیتی ہے۔اگر معین وجہ معلوم ہوجائے تو اس سے تعلق رکھنے والی دوا اس کی ساری بیاری پراٹر انداز ہوگی بشر طیکہ اس میں دیگر اہم علامتیں بھی یائی جاتی ہوں۔

کانوں سے بدبودار مواد رسنے گئے تو امونیم کارب ضرور ذہن میں آنی چاہئے۔
کانوں کی مزمن بیار بول میں یہ بہت مفید دوا ہے۔اس کی بومیں مردہ چیز کی عفونت پائی جاتی ہے
کیونکہ اس کی بیار بول میں نظام حیات درہم برہم ہوجا تا ہے اور اعضا کے ماؤف ھے تیزی سے
مرنے لگتے ہیں۔کان کے اندر بھی اسی وجہ سے بدبودار پیپ بن کر جھلیوں کو کھانے گئی ہے۔
موت کے ساتھ عفونت وابستہ ہے۔ یہ ایک خاص قتم کی بوہوتی ہے جو دوسری عام بدبوؤں سے
بہت ہی مختلف ہوتی ہے۔کان کے ایسے مریضوں میں مستقل علاج کے لئے امونیم کارب کام
آئے گی۔

اگراچا نک شدید در دشروع ہوجائے اور مریض سخت بے چین ہوتو پلسٹیلا اللہ کے فضل سے فوری فائدہ پہنچاتی ہے بشرطیکہ اس کے مزاح میں نرمی پائی جاتی ہواور رونے کی طرف رجحان ہو۔اگر کان کے درد کے ساتھ مزاج سخت برہم ہوجائے تو کیمومیلا کواولیت حاصل ہے اوراگر نزلہ کان کی طرف منتقل ہونے سے درد کا تعلق ہوتو ایلیم سیباچوٹی کی دوا ہے۔خون کا دباؤزیادہ نمایاں ہواور درد کے ساتھ سرخی اور تمتما ہے بھی ہوتو پلسٹیلا کے ساتھ بیلاڈ ونا 30 بھی ملالینی جا ہے۔

اموینیم کارب غدودوں اور سلی امراض میں بھی بہت مفید ہے۔ بعض اوقات گردن کے غدودسوج کر سخت ہوجاتے ہیں اور گلٹیاں بن جاتی ہیں۔ دائی سوزش اموینیم کارب کی خاص علامت ہے۔ اس لئے یہ کینسر کی گلٹیوں میں بھی مفید ہے۔ اگر جلدی بیاریاں علاج سے دبادی جائیں اوروہ غدودوں میں پناہ لے لیں اور لمبے عرصہ تک ان کی

طرف توجہ نہ دی جائے تواس کے نتیجہ میں غدودوں میں کینسر پیدا ہونے کا خطرہ لاحق ہوجائے گا۔ امویٹیم کارب بھی گھلیوں کے کینسر میں کام آنے والی دواہے۔اس میں گلینڈ زاس وقت پھولتے میں جب بیاریاں بیرونی سطحوں سے اندر کی طرف منتقل ہو کر غدودوں کی جھلیوں میں گھر بنا لیں۔

> دافع اثر دوائیں: آرنیکا کیمفر طافت: 30 یا حسب ضرورت او نچی

انقراسينم

17

انقراسينم

ANTHRACINUM

بددوا بیار بھیڑوں کی تلی کے متعفن مواد سے تیار کی جاتی ہے۔ السر اور سیلان خون کے لئے یہ بہت اعلیٰ دوا ہے۔اکثر ڈاکٹر اسے بہت کم استعال کرتے ہیں لیکن میں نے اسے بہت مفید دوایا یا ہے۔الیمی پھنسیاں جوغدودوں کی سوزش کے نتیجہ میں پیدا ہوں وہ بہت سخت اور گانٹھ دار ہوتی ہیں۔ان میں ایسی نیلا ہٹ یائی جاتی ہے جو بہت بدزیب دکھائی دیتی ہےاور در د بھی ہوتا ہے لیکن ان میں پیپنہیں بنتی ۔ ایسی پھنسیوں میں انتقراسینم تیر بہدف ثابت ہوتی ہے۔ایک دوماہ کے سلسل استعال سے یہ پھنسیاں آ ہستہ آ ہستہ تم ہوجاتی ہیں۔ جسم کے اندرونی حصہ میں یائے جانے والے زخم جن سے خون رستا ہواور ایسے تمام السرجن کے کینسر بننے کا خدشہ ہوان میں انتھراسینم مؤثر ثابت ہوسکتی ہے۔جلد کے بعض جھے جو بماری کے نتیجہ میں ادھڑ جائیں اور ننگی خون آلود جلد نظر آئے تو اس میں بھی انقراسینم بہت مفید ہے۔اس علامت کے پیش نظر میرا خیال ہے کہ السریٹو کلائٹس (Ulcerative Colitis) لینی بڑی آنت کے نچلے حصہ کے زخموں میں اسے مفید ہونا جا ہئے۔اس بماری میں انتری کی جھلی کے نرم اور ملائم حصے گل کر جھڑ جاتے ہیں اوراندر سے انتڑی ننگی ہو جاتی ہے۔جس سے خون نکلتا رہتا ہے۔ایلو پیتھی میں ابھی تک اس بیماری کا کوئی مستقل علاج دریا فت نہیں ہوا۔ وقتی تکلیف کو رو کنے کے لئے جو دوائیں دی جاتی ہیں ان کے خمنی بداثر ات بھی ہوتے ہیں۔البتہ آپریشن کے ذریعہ اس انتر کی کو کاٹ دیا جائے تو علاج ہوجاتا ہے اور پیریجاری آ گے نہیں بڑھتی ۔ کسی بیاری کوغلط دواؤں کے نتیجہ میں دیا دینے سے السریٹو کلائیٹس ہونے کا امکان ہوتا ہے۔اس میں

انقراسینم کواٹر کرنا جا ہے کیونکہ میں نے اس قتم کی ملتی جلتی بیاریوں میں اسے استعال کیا ہے اور بہت مفیدیا یا ہے۔

انتھراسینم زخموں اور پھوڑوں کو مندمل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور جسم میں مزید پھوڑے کے سخت کے سی حصہ سے مزید پھوڑے پھنسیاں بننے کے رجحان کا بھی قلع قمع کر دیتی ہے۔ اگر جسم کے کسی حصہ سے بھی سیاہی مائل خون کا اخراج ہوتو اس میں انتھراسینم مفید ہوسکتی ہے۔

دا فع اثر دوائیں: ایپ کیمفر کاربووج کے کرئیوزوٹ سلیثیا ۔رسٹاکس طاقت: 30 سے 200 تک انتقرا کوکلی

18 انتخرا کوکی

ANTHRAKOKALI

یددواجلد کی بیماریوں اور خارش وغیرہ میں مفید ہے۔ جلد خشک اور جگہ جگہ سے بچٹ جائے اور آ بلے بنیں تو اسے استعال کرنا جا ہئے۔ ناک کے نقنوں اور نا خنوں کے کنارے بچٹنے گیں اور زخم بن جا کیں تو انظرا کو کی مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس میں منہ خشک رہتا ہے۔ حلق میں بھی خشکی محسوس ہوتی ہے۔ خشک صفراء کی زیادتی کی وجہ سے قے آتی ہے۔ بیٹ میں ہوا بنتی ہے۔ مریض شدید بیاس محسوس کرتا ہے، بیشا بہت آتا ہے۔

طاقت: 30

19 اینٹی مونیم کروڈ

ANTIMONIUM CRUDUM

(سرمه)

اینٹی مونیم کروڈ کی سب سے نمایاں علامت معدے کے نظام کا درہم برہم ہو جانا ہے۔ زبان پرسفیدمیل کی موٹی سی تہہ جم جاتی ہے۔ ڈاکٹر وں نے عموماً زبان کے سفیدرنگ پر بہت زور دیا ہے۔ حالا نکہ بسااوقات چاکلیٹ کھانے یا چائے پینے سے زبان کارنگ نسواری ہو جاتا ہے اس لئے اینٹی مونیم کروڈ کی سفیدی نسواری رنگ میں بھی بدل سمق ہے۔ بنیا دی علامت بہی ہے کہ زبان پر جو بھی تہہ جے وہ بہت موٹی ہوتی ہے اورا گرخوراک کے اثر سے رنگ تبدیل نہ ہوتو وہ ہمیشہ سفید ہوگی۔ اینٹی مونیم کروڈ اپنی عمومی علامتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ وہ مریض جو بہت کا شانا کھاتے ہیں اور ہر وقت کھاتے چلے جاتے ہیں۔ بیاریوں کے حملہ سے پہلے نا قابل برداشت بھوک کا دورہ پڑتا ہے۔ پھراچا تک جب معدہ جواب دے جائے تو اس وقت نبان پر فہ کورہ علامت یوری طرح ظاہر ہوتی ہے۔

اینٹی مونیم کروڈ کافی گہری اوروسیج الاثر دواہے۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے قے کا رجیان ہو تواس کے استعال سے قے رک جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پاؤل کے موہکوں میں یہ اچھا اثر دکھاتی ہے۔ پاؤل کے نیچ سخت کیل کی طرح مو بکے ہو جاتے ہیں۔ ناخن بگڑ جانا یا ناخون پر لکیریں پڑنا بسااوقات کسی اندرونی بیاری کی علامت ہوتی ہے۔ اینٹی مونیم کروڈ کے مریض کے ناخنوں اور انگلیوں کے قریب مسے بنتے ہیں۔ ناخن اکھڑنے لگتے ہیں یا پیک جاتے ہیں اور ان میں لکیریں سی پڑ جاتی ہیں۔ موٹے موٹے ابھارین جاتے ہیں۔ پاؤل میں بھی موجے اور مسے بنتے ہیں۔ مسوڑھے پھول جاتے ہیں اور دانتوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔

دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔اگر بیعلامتیں نمایاں ہوں تو اینٹی مونیم کروڈ کی پہچان بن جاتی ہیں۔اینٹی مونیم کروڈ اوراینٹی مونیم ٹارٹ کا دانت کا در داعصا بی بھی ہوتا ہے۔

خونی پیچیش میں عام طور پر مریض کے نضلے کے اندرخون ملا ہوا ہوتا ہے لیکن اپنی مونیم کروڈ میں جواجنبی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں صحت مندانسان کے فضلے کی طرح فضلہ بندھا ہوا اورخون کی آمیزش سے پاک ہوتا ہے لیکن اس کے اردگر دخون کی ایک تہر ہی لیٹی ہوئی ہوتی ہے۔

اینٹی مونیم کروڈ کے مریض کی ایرٹیوں میں درد ہوتا ہے۔معدہ کی خرابی کے ساتھ جلدی امراض الجرآتے ہیں۔اس کی تکلیفوں میں کھلی ہوا سے اور مرطوب گرم موسم سے کمی آجاتی ہے لیکن مریض گرمی بر داشت ہوتی ہے۔ ہے لیکن مریض گرمی بر داشت ہوتی ہے۔ اس کی علامات میں معدے کی خرابی ، تلی ، چھپچر وں پراثر ، نا خنوں اور ناک کے کناروں پراثر ، ناک کے کنارے اور ہونٹ کے کنارے چیل جانا اور خشک ایگزیما شامل ہیں۔

مددگاردوا: سلفر دافع انژ دوا: همیپرسلف طاقت: 30 ايىپى 67

20

اييس ميليفيكا

APIS MELLIFICA (The Honey Bee)

طبی نقطہ نظر سے شہد کی مکھی کے ڈنک میں موجود زہر کو کئی بیاریوں کے علاج میں استعال کیا جاتا ہے۔ قدیم طب میں بھی زہر ملے کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کا علاج اس سے کرتے تھے۔ شہد کی کھی کے کاٹنے سے جو بیاریاں پیدا ہوتی ہیں ان سے متی جلتی بیاریوں میں ایپس بہت مفید ہے۔

اییس کے مریض کے درد میں جلن اور چین کا احساس ہوتا ہے جو ہمیشہ ٹھنڈک سے
آ رام پا تا ہے اور گرمی سے بڑھ جاتا ہے۔اس کی علامات عموماً دائیں طرف سے شروع ہوتی ہیں
اور بائیں طرف منتقل ہونے گئی ہیں۔ جلد پر سخت دکھن کا احساس ہوتا ہے اور مریض کوئی دباؤ
حتیٰ کہ کیڑے کالمس بھی برداشت نہیں کرسکتا۔خون میں حدت اور تمازت پائی جاتی ہے اور
مریض کھلی ہوامیں آ رام پا تا ہے۔حرارت سے بیاری کی شدت میں اضافہ ہوجاتا ہے۔

ہوسم کی سوزش اور ورم میں ایپس اس صورت میں بہت مفید ہے جب گوریا گری سے تکلیف بڑھتی ہو۔ ان علامتوں کی موجودگی میں ایپس گردن توڑ بخار (Meningitis) کا بھی بہترین علاج ثابت ہوتی ہے۔ اگرایپس مینجائٹس میں بروقت استعال کروائی جائے تو مرض بگڑ کر مرگی میں تبدیل نہیں ہوتا جبکہ روایتی طبی علاج سے مینجائٹس ٹھیک بھی ہو جائے تو اس کے دیریا منفی اثرات باقی رہ جاتے ہیں جن میں سے ایک مرگی بھی ہے۔ اگر گرمی کی بجائے سردی سے تکلیف بڑھتی ہوتو ایپس جیسی علامات کے مریض کو ایپوسائینم گرمی کی بجائے سردی سے تکلیف بڑھتی ہوتو ایپس جیسی علامات کے مریض کو ایپوسائینم کی بجائے سردی ہے تکلیف بڑھتی ہوتو ایپس جیسی علامات کے مریض کو ایپوسائینم کی بجائے سردی ہوتے کی ۔

حمل کے دوران خصوصاً آخری دنوں میں بعض عورتوں کو کشنج ہوجاتا ہے۔ عمومی تاثر سیہ ہے کہ ایسی حالت میں گرم پانی سے نہا نے سے سکون ملتا ہے لیکن اگر مریضہ کا مزاج ایمیں سے ملتا ہوتو گرم پانی کے خسل سے سخت قسم کے نشنج ہونے لگتے ہیں یہاں تک کہ رحم کا منہ سکڑنے کی وجہ سے بچہ رحم کے اندر مرجاتا ہے اور ایسی مریضہ فوری طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے مرجھی سکتی ہے۔ اسی طرح چھوٹی عمر کے بچے جو اپنی تکلیف بیان نہیں کر سکتے اگر وہ مزاجاً ایمیں سے مثابہت رکھتے ہوں تو گرم خسل دینے سے ان کی تکلیف بیان نہیں کر سکتے اگر وہ مزاجاً ایمیں سے مثابہت رکھتے ہوں تو گرم خسل دینے سے ان کی تکلیف یہ بیٹ ہونے مثابہت رکھتے ہوں تو گرم خسل دینے سے ان کی تکلیف سے بڑھیں گی اور جگہ جگہ نشنج ہونے لیسی گی دومیو پیتھک ڈاکٹر زکا مشاہدہ ہے کہ بیشنج جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لئے معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ مریض کی تکلیف شخٹہ سے بڑھتی ہے بیا گرمی سے داگر گرمی سے تکلیف بڑھتو ایمیں کے علاوہ بیلا ڈونا اور ایکونا سے ایک بڑار طاقت میں ملاکر دو تین خور اکیں دس پندرہ منٹ کے وقفہ سے دینے سے بیاری کے آغاز میں ہی بہت نمایاں افاقہ محسوس ہوتا دس پندرہ منٹ کے وقفہ سے دینے سے بیاری کے آغاز میں ہی بہت نمایاں افاقہ محسوس ہوتا ہے۔ اگر شخٹہ سے تکلیف بڑھو میگ فاس دینی جا ہے۔

ایپوسائینم (Apocynum) اوراییس میں بیفرق ہے کہ ایپوسائینم ٹھنڈے مزاج کی دواہےاوراییس گرم مزاج کی ۔چھوٹا بچہا گر کپڑ الینا پسند نہ کرےاورٹائکیس مار کرجلد کپڑ اا تار دےتواس کا مطلب ہے کہ وہ گرمی پسندنہیں کرتا۔

امیس کے مریض کی ایک نمایاں علامت ہے ہے کہ اس کی ورموں میں ٹیسوں کا احساس ضرور ہوتا ہے جیسے کھی نے ڈنک مارا ہو۔ ایپوسائینم میں ٹیسوں کا احساس نہیں ہوتا۔ ایپس کے مریض کی ورم بعض دفعہ دماغ کی ہیرونی جھلی میں بھی ظاہر ہوتی ہے اور اس کی بھی یہی خاص بہچان ہے کہ گرمی سے تکلیف میں اضافہ اور بہت تیز ٹیسیں پڑنے کا احساس۔ بچہ جواس تکلیف کو بیان نہیں کرسکتا وہ اچا تک بڑے زور سے جیخ مارتا ہے اس لئے ڈاکٹر کا کام ہے کہ فوراً اس علامت کی طرف توجہ کرے اور امیس دینے میں دیر نہ کرے۔

ا میں دل کے بردوں پر بھی ایسا ہی اثر کرتی ہے۔ پھیپھڑوں کے غلاف پر بھی اور حگر کے غلاف پر بھی۔ گویا اس کا زیادہ تعلق عضلات سے بڑھ کران غلافوں سے ہے جن غلافوں میں عضلات لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایپوسائینم (Apocynum) کا بھی یہی حال ہے کہ بیزیادہ تر غلافوں کی دوا ہے۔ بید دونوں دوائیں پیٹ کی لعاب نکا لنے والی جھلیوں پراثر انداز ہوتی ہیں جیسا کہ انترایوں کی جھلیوں پریا گر دے کی جھلیوں پر جوخون سے پیشاب کو نظارتی ہیں۔ دونوں میں عموماً ورم پھلیھلی ہوتی ہے مگرا بیوسائینم کی ورم بعض دفعہ بخت بھی ہو جاتی ہے۔ اگر جلد کو دبایا جائے تو جیسا کہ ورم والی جگہ میں عموماً ہوتا ہے دبانے کا نشان کچھ دریر تک اس طرح رہتا ہے اور آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ اٹھ کر باقی جگہ سے مل جاتا ہے۔

اگرایپس کے مریض کے گردے خراب ہوں تو آئھ کے نیچے پھلپھلی ورم ان کی نشاندہی کرتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ گردوں میں ٹیسیس پڑنے یا گرمی سے تکلیف کے بڑھنے کی علامت موجود ہوتو قطعی طور پر بیمرض ایپس کے دائر ہا اثر میں ہوگا۔ اگر آئھ کے اندر تکلیف ہوتو آئھ کا اندرونی حصہ اور پپوٹوں کے نیچے کی جھلیاں سوج کر بھیا نک منظر پیش کرتی ہیں۔ ان میں شوخ سرخی کے علاوہ چھن داردرد بھی ہوتا ہے اورایپس کی بنیادی علامت یعنی گرمی سے تکلیف کا بڑھنااس کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایسام یض دھوپ میں آئھ نہیں کھول سکتا۔

اپیں کی بعض تکیفیں دائیں طرف ہوتی ہیں۔ بری خبر سننے سے یا حسد اور جلن سے دائیں طرف فالجے ہو جاتا ہے۔ البتہ آئکھ کی تکلیف اکثر بائیں آئکھ سے شروع ہوتی ہے۔ گلے کی خرابی میں بھی اسی طرح پہلے بائیں طرف سوزش ہوگی پھر دائیں طرف منتقل ہوگی۔ جو لیکنسسس کی بھی ایک نمایاں علامت ہے لیکن ایپس میں گرم یا نی کے خراروں کی بجائے ٹھنڈ بے یانی کے غراروں سے آرام آتا ہے۔

اییں کے مریض کا پیٹ اکثر ہوا سے تن جاتا ہے جس کے نتیجہ میں دائیں طرف پہلی کے پنچ میں دائیں طرف پہلی کے پنچ تشنج ہونے لگتا ہے اور مریض ماؤف جگہ کود باکرر کھنے سے آرام پاتا ہے اور جب تناؤاور ہڑھ جائے توبائیں طرف بھی دل کے پنچ شنج ہونے لگتا ہے جیسے شنجہ پڑ گیا ہو۔ اگر مریض گرمی سے بے چینی محسوں کرے تو ایس تیر بہدف ثابت ہوتی ہے اور ایک دو

ايىپى 70

خوراکوں میں ہی آ رام آ جا تا ہے۔ امیس عرصہ اثر کے کھاظ سے در میا نہ درجہ کی دوا ہے اور اس میں فاکدہ کچھ دیر استعال کے بعد شروع ہوتا ہے لیکن بہت لمیے انتظار کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے موماً دس پندرہ دن یا ہفتے کے اندر ہی اثر شروع ہوجا تا ہے۔ ہاں انتر یوں میں شکنجہ پڑنے کی صورت میں فوری اثر دکھاتی ہے۔ گھنٹہ دو گھنٹہ میں نمایاں فرق پڑجا تا ہے۔ دماغ کے ورم میں بھی فوری اثر دکھاتی ہے لیکن اگر بچے کو ہائیڈروکیفیلس (Hydro Cephalus) ہو یعنی سر بڑا ہوتے چلے جانے کی بھاری ہوتو اگر چہا میس کا فوری فاکدہ دکھائی دیتا ہے لیکن بیاس مرض کی مستقل دوانہیں ہے۔ اس لئے فوری طور پر اس مرض کی مستقل دوانہیں ہے۔ اس لئے فوری طور پر اس مرض کی مستقل دوانہیں ہے۔ اس لئے فوری طاقتوں سے شروع کر کے بعض دفعہ بہت اونجی طاقتوں میں بھی دینی پڑتی ہے۔

پیٹ کی تکلیفوں میں ہوا کے تناؤ میں ایپس فوری فائدہ دیتی ہے کیکن انتڑیوں کی بعض مزمن تکلیفوں میں لمبے عرصہ تک اسے استعمال کرانا پڑتا ہے۔

ایک عمومی اصول یا در کھنے کے لائق ہے کہ جہاں علامتیں آ ہستہ آ ہستہ پیدا ہوں وہاں دوا بھی فوری اثر دکھاتی دوا بھی آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ اثر دکھائے گی۔ جہاں علامتیں فوری پیدا ہوں وہاں دوا بھی فوری اثر دکھاتی ہے۔ گردے کی تکلیف میں جب ایپس کو کمباعرصہ استعال کرنا پڑتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ فائدے کے آ ٹار بھی بہت دیر بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر گردے کی بیاری میں ایپس کام کررہی ہوتو مستقل بیاری ٹھیک ہونے میں تو وقت گے گالیکن ہفتہ دس دن کے اندر گردے پیشاب زیادہ بنانے گئیں گے جو اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ ایپس نے کام کرنا شروع کر دیا بیشاب زیادہ بنانے گئیں گے جو اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ ایپس نے کام کرنا شروع کر دیا جے۔ اس صورت میں دوا کی طاقت آ ہستہ آ ہستہ بڑھاد بنی چا ہے اور خوراکوں کا وقفہ لمبا کردینا چا ہے۔ اس کا طریق کار تفصیل سے ٹیوبر کیولینم یا ہیسیلینم میں بیان ہوا ہے اسے Rising کہاجا تا ہے۔

مددگاردوا: نیٹرم میور دافع انژ دوائیں: کینتھرس۔اپی کاک لیکیسس لیڈم نیٹرم میور طاقت: 30سے 200 تک

21

ارجنع مثيليكم

ARGENTUM METALLICUM

(Metallic Silver)

ارجہ ٹم میٹیلیکم چاندی کو کہتے ہیں۔ چاندی وہ دھات ہے جوعموماً خالص حالت میں جسم میں جذب ہوسکتے ہیں۔ میں جذب نہیں ہوتی لیکن کچھا ورعنا صرسے مل کراس کے مرکبات جسم میں جذب ہوسکتے ہیں۔ طب یونانی میں چاندی کے ورق طاقت کے لئے استعال کئے جاتے ہیں لیکن اصل چاندی جسم کا جزونہیں بنتی ۔ آج کل تو سکہ کوٹ کر چاندی کے نام پر ورق بنائے جاتے ہیں جوصحت کے لئے سخت مضر ہوتے ہیں۔

جہاں تک ہومیو پیتھک اثرات کا تعلق ہے ہر دھات جوجلد یا انترا یوں کومس کر رہی ہو نہایت لطیف ذرات کی صورت میں کچھ نہ کچھ مقدار جسم میں جذب ہوتی رہتی ہے جوجد بدترین آلات سے بھی معلوم نہیں کی جاسکتی۔

ارجنٹم میٹیلیکم کاسب سے زیادہ اثر کرکری ہڈیوں پر ہوتا ہے یعنی وہ ہڈیاں جن میں کیک پائی جاتی ہے اور وہ بآسانی مڑ جاتی ہیں۔ یہ ہڈیاں موٹی اور سخت ہونے گئی ہیں، ناک کی ہڈی موٹی ہوجانے کے باعث سانس لینے میں دفت ہوتی ہے۔ اسی طرح کان کی ہڈیوں میں چھوٹی چھوٹی گخصیں سی پڑ جاتی ہیں اور وہ سوج کرموٹی ہونے گئی ہیں۔ یہی علامتیں بڑھ کران ہڑیوں کے کینسر میں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں۔

ارجہ میٹیلیکم دماغ پر بہت گہرا اثر کرنے والی دوا ہے۔ دماغ کے خلیے آ ہستہ آ ہستہ گلنے لگتے ہیں اور بڑھا پے کی علامتیں وقت سے بہت پہلے ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ قوت فکریہ کمزور ہونے لگتی ہے۔ یہ کمزوری دماغ کے مرکزی حصہ سے شروع ہوکررفتہ رفتہ جسم کے دوسرے اعضاء پر قبضہ کرلیتی ہے۔ ہاتھ پاؤں مڑنے لگتے ہیں۔ زہنی صلاحیتیں

متاثر ہوتی ہیں اور یا دواشت اتنی کمزور ہوجاتی ہے کہ بعض دفعہ مریض بالکل نیم پاگل سا ہو جاتا ہے اور اول فول بکتا ہے۔ سوچنے کی طاقت میں کمی آنے گئی ہے۔ کوئی بات سوچاتو چکر آنے لگتے ہیں۔ سی خطرے کا الارم ہے کہ د ماغ کے خلیے سکڑنے گئے ہیں۔ اس وقت فوراً ارجنٹم سٹیلیکم اونچی طاقت میں دینی چاہئے جسے پندرہ ہیں دن یا مہینے کے بعد د ہراتے رہنا چاہئے۔ دمہ کے مریض سانس کی تنگی دور کرنے کے لئے جو Inhaler استعال کرتے ہیں اس کے زہر کا اثر بھی ارجنٹم کے اثر سے ملتا جاتا ہے اوروہ بھی د ماغ کے خلیوں کوسکیڑتا ہے یہاں تک کہ وہ بالکل ماؤف ہوجاتے ہیں۔

ارجنٹم سٹیلیکم کی کیکیسس سے اس پہلو سے مشابہت ہے کہ لکیفیں سونے کے بعد بڑھ جاتی ہیں خصوصاً اعصاب میں بہت کمزوری واقع ہوجاتی ہے۔سارے بدن کے اعصاب کمزوری محسوس کرتے ہیں۔

ارجہ ہمیٹیلیکم کا ٹائوں کے عضلات سے بھی گہراتعلق ہے۔ اعصابی دردیں زیادہ تر دونوں ٹائلوں اور پاؤں میں پائی جاتی ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ریشے بھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہوجا کیں گئرے ہوجا کیں گئر ہے ہوجا کیں گئر ہے ہوجا کیں گئر ہے ہوجا کیں ہیں ہوھ جاتے ہیں۔ بائی کی دردیں بھی ہمیشہ طوفانی اور بھیگے ہوئے موسم میں زیادہ ہوجاتی ہیں۔ برسات کے موسم میں بارش سے پہلے اور بعد میں تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ ان دردوں کے ساتھ سوزش نہیں ہوتی مگر مریض شخت ہے آ رام ہوتا ہے۔ عام طور پر ہلکی حرکت موافق آتی ہے۔ تیز حرکت سے جوڑوں میں درد شروع ہوجاتا ہے۔ آ ہت حرکت سے دردوں کونسبٹا سکون ملتا ہے۔ تکلیف نیند سے مہریش بلکہ آ رام کرنے سے بڑھتی ہے۔ ساری رات رسٹاکس کی طرح جسم میں دردیں اکٹھی ہوتی رہتی ہیں۔ فرق یہ جس سے مریض کروٹیں بدتار ہتا ہے۔

ارجنٹم ٹیلیکم جلد کے کینسراور اندرونی جھلیوں کے کینسر میں بہت مفید ہے۔ رحم کے منہ کے کینسر کوعموماً ہرفتم کے معالج نا قابل علاج مرض تصور کرتے ہیں لیکن ارجنٹم یٹیلیکم اس میں بہت کامیابی سے استعال ہوتی ہے اور مکمل شفا کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اگر پوری شفانہ بھی ہوتو لیے عرصہ تک مریض کوسکون مل جاتا ہے ٹیرنٹولا ہسپانید (Terentula Hisp.) ہوری شفانہ بھی ہوتو لیے عرصہ تک مریض کوسکون مل جاتا ہے ٹیرنٹولا ہسپانید (Carbo Animalis) بھی رحم کے منہ کے کینسر ہیں۔ مفید ہیں۔

ار خٹم ٹیلیکم میں جگہ جگہ السریائے جاتے ہیں لیکن کرکری ہڈیوں کے السرمیں پیر بالخصوص زیادہ اثر دکھاتی ہے۔وریدوں کےخلیوں سے بھی اس کاتعلق ہے۔اس میں ایک عجیب اورغیرمعمولی علامت یا کی جاتی ہے جوعام طور پر دوسری دواؤں میں نہیں ملتی ، وہ یہ کہ عورتوں کے اندرونی اعضاء میں بیہ ہائیں طرف اور مردوں کے اندرونی اعضامیں دائیں طرف اثر دکھاتی ہے۔عموماً دائیں بائیں یا اوپرینچے کے دھڑکا فرق کرنے والی دوائیں تو بہت ہیں لیکن عورتوں اورمردوں کی تکالیف میں دائیں اور بائیں کا فرق کرنا اسی دوا کا خاصہ ہے۔اس میںعورتوں کی Ovary یعنی انڈ ابنانے والی تھیلی بیار ہوکر پھول جاتی ہے اور مختلف قسم کے مادے جم جم کراسے سخت اورموٹا کر دیتے ہیں۔رحم بھی پھیل جاتا ہے اور اس میں لیک نہیں رہتی۔ایک دفعہ پھیل جائے تو دوبارہ اپنی اصل حالت کی طرف نہیں لوٹا۔ ہر بیجے کی پیدائش کے بعدیہ تکلیف بڑھ جاتی ہےاوربعض دفعہ رحم نیچے گر جاتا ہے۔ارجنٹم ٹیلیکیم ایسی مریض خواتین کی بہترین دوست ٹا بت ہوتی ہےاور شفا کا موجب بن جاتی ہے۔ رحم میں سختی اور رحم کے منہ پر ایکٹھن اور اکڑاؤ کی علامت ظاہر ہو، نیز ایبالیکوریا ہوجس میں غیرمعمولی بد بواورتعفن پایا جائے تو یہ باتیں نشاندہی کرتی ہیں کہ بیمام لیکوریا نہیں ہے بلکہ سی گہری مرض کے نتیجہ میں پیدا ہوا ہے۔اس وقت ارجنٹم یٹیلیکم استعال کی جائے تو بیاری کی شروع میں ہی روک تھام ہوجاتی ہے۔ اگر ٹانگوں میں درد ہےاوراصل وجہ معلوم نہ ہو سکے توار جنٹم میٹیلیکم ضروراستعال کرنی چاہئے۔ سن یاس کے زمانہ میں لینی حیض بند ہونے کے بعد بھی خون جاری ہوجائے تو ارجنٹم ٹیلیکم اچھا اثر دکھا سکتی ہے۔ یہ عموماً دبلی تیلی اور لمبے ہاتھوں والی عورتوں کے

کام آنے والی دوا ہے لیکن بیضر وری نہیں۔نسبتاً موٹی خواتین کی بیاریوں میں بھی مفید ثابت ہوسکتی ہے۔

بعض لوگوں کو نیند آتے وقت یا نیند کے دوران جھکے لگتے ہیں۔ یہ بہت تکلیف دہ عارضہ ہے۔ اس میں گرائینڈ بلیا (Grindelia) چوٹی کی دوا ہے۔ آرسنگ بھی اچھاا اثر دکھاتی ہے۔ ارجنٹم میٹیلیکم بھی مفید ہے بشرطیکہ اس تکلیف کا تھکا وٹ سے تعلق ہو سخت محنت ومشقت سے تھکے ہوئے بدن کوسونے سے قبل جھکے لگیں تو ارجنٹم میٹیلیکم سے خدا تعالی کے فضل سے فوری شفا ہو جاتی ہے۔ ویسے اس بیاری میں اکثر گرائینڈ بلیا ہی کام آتی ہے۔ جس کی ایک ہی خوراک ہفتوں تک اثر دکھاتی ہے، بار بارضرورت پیش نہیں آتی۔

ارجہ ہم میٹیلیکم کی تکلیفیں عین بارہ ہجے، جب سورج نصف النہار پر ہو، ہڑھ جاتی ہیں، چکر آتے ہیں۔ سرکا درد ماتھا در بیشانی تک محدودر ہتا ہے یا پھر سرکے سی ایک طرف مقام بنا لیتا ہے جوزیا دہ تر دائیں طرف ہوتا ہے۔ آہتہ ہڑھتا ہے کیکن میدم ختم ہوجا تا ہے۔ اس درد کا چہرے کی اعصابی دردوں سے بھی تعلق ہے کیونکہ یہ بنیا دی طور پر اعصابی دوا ہے اور سردرد کا بھی اعصاب سے تعلق ہے۔

اگر خارش صرف ایک کان تک محدود ہوا ور مریض اسے تھجلا کر زخمی کرد ہے اور کان موٹا ہوجانا کوڑھ کان موٹا ہوجانا کوڑھ کان موٹا ہوجانا کوڑھ کان موٹا ہوجانا کوڑھ کی ابتدائی علامت ہوتی ہے۔ بیمرض بہت آ ہتہ بڑھنے والا ہے۔ اس علامت کے ظاہر ہوتے ہی ہائیڈروکوٹائل (Hydrocotyle) دینی چاہئے۔ یہ کوڑھ کی روک تھام کے لئے بہترین دوا ہے۔

ذیا بنطس اور پیشاب میں البیومن آنے کی بیاری میں ارجنٹم میٹیلیکم بہترین دوا ہے۔ اگر دوسری علامتیں ملتی ہوں تو مکمل شفا ہوجاتی ہے۔ گر دوں کی اندرونی جھلیوں میں خرابیاں پیدا ہوجا کیں تو بھی ارجنٹم میٹیلیکم مفید ہے۔

ار جنٹم میٹیلیکم میں پٰیشاب کی دوطرح کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔اگر سیاہی مائل

پیثاب ہوتو اس کا مطلب ہے کہ اس میں البیومن آ رہی ہے۔ اگر شوگر آئے تو اکثر ایسے مریضوں کولسی کی طرح بیثاب آتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے بچے جو بچپن سے ہی فریا بیطس کا شکار ہوجا ئیں ان میں بیعلامت ملتی ہے۔ اس میں ارجنٹم یٹیلیکم تب مفید ثابت ہوگی جب وہ مریض کی عمومی مزاجی دوا ہو۔ ایسے مریض جنہیں ذیا بیطس ہواور گر دے جواب دے رہے ہوں اور ان کا رات کو بستر میں پیشاب نکل جاتا ہوتو ان سب عوارض کے لئے ارجنٹم مٹیلیکم مفید ہے۔

ارجنٹم سٹیلیکم میں غیر معمولی کمزوری کا احساس پایا جاتا ہے۔ سارابدن اندرونی طور پر بے مد
کمزور محسوس ہوتا ہے۔ بدن بے جان ساہو جاتا ہے۔ اس گہری تھکا وٹ کا علاج ارجنٹم سٹیلیکم ہے۔
ارجنٹم سٹیلیکم زیادہ بولنے اور گانے والوں کے لئے بھی مفید دوا ہے۔ آ واز کے بیٹھ جانے
میں یہ دوا بہت شہرت رکھتی ہے۔ اس میں آ واز بعض دفعہ بالکل بند ہو جاتی ہے۔ جوں جوں کوئی
بولے آ واز غائب ہوتی جائے گی۔ بعض اور دواؤں میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے گین ان میں
تفریق کرنا مشکل امر نہیں ہے۔ مثلاً رسٹا کس کے مریض بولنا شروع کریں تو آ واز شروع میں بیٹھی
ہوئی معلوم ہوتی ہے لیکن بولئے رہنے سے رفتہ رفتہ آ واز صاف اور بہتر ہوتی جائے گی۔ اگر بولئے
ہوئی معلوم ہوتی ہے لیکن بولئے رہنے سے رفتہ رفتہ آ واز صاف اور بہتر ہوتی جائے گی۔ اگر بولئے
سے نکلیف کم ہونے کی بجائے بڑھتی جائے تو عموماً بوریکس سے بہت زیادہ مؤثر "فابت ہوگی۔
مریض مزاجی طور پر ارجنٹم میں حنجرہ میں شد ید در دا ورسوزش نمایاں ہوتے ہیں۔ بیننے سے
ارجنٹم میں حنجرہ میں شد ید در دا ورسوزش نمایاں ہوتے ہیں۔ بیننے سے

ارہ م سیم یں جرہ ہی صدر درداور موری میں ہوئے ہیں۔ ہستے سے کھانسی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ علامت فاسفورس میں بھی بہت نمایاں ہے۔ اگر فاسفورس سے فائدہ نہ ہوتوار جنٹم میٹیلیکم دینی چا ہئے۔ارجنٹم میٹیلیکم کے مریضوں کوسردی کی وجہ سے نزلہ زکام ہوجاتا ہے اور گلے پراثر پڑتا ہے، سینہ کے بالائی حصہ میں دکھن کا احساس ہوتا ہے، دو پہر کے وقت بخار ہو جاتا ہے، سینہ میں شدید کمزوری اور بائیں جانب پسلیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ارجنٹم میٹیلیکم پھیچھڑوں کی تکلیف میں جانب پسلیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ارجنٹم میٹیلیکم پھیچھڑوں کی تکلیف میں

بھی مفید ہے۔ ویسے چھاتی کی تکیفوں میں جوعموماً کمزوری اور بلغمی مزاح کی وجہ سے بیدا ہوتی بیں ارجنٹم سے زیادہ شینم (Stanum) مفید ہے لین اگر کوئی ارجنٹم سینیکیم کا مزاجی مریض ہوتو سٹینم کے مقابل پر یہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ ارجنٹم سینیکیم میں وقت سے بہت پہلے برخھا پے کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ بیس بچیس سال کی عمر میں ہی منہ جھریوں سے بھر جاتا ہے۔ وقت سے پہلے ظاہر ہونے والے بڑھا پے میں سارساپر یلا چوٹی کی دوا ہے۔ چینینم آرس کا جوقت سے پہلے آنے والا بڑھا پانمایاں ہوتا ہے مگرچینینم آرس کا بے وقت کا بڑھا پا لمبی اور گہری بیاریوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جگراور تلی جواب دے جاتے ہیں۔ سارساپر یلا میں جلد سکڑ کر بالکل چرمر ہوجاتی ہے۔

ارجہ ہمیٹیلیکم میں پیٹھ کے بل لیٹنے سے دھڑکن زیادہ محسوں ہوتی ہے۔ اس کا تعلق بھیپھڑوں میں پانی کھرا ہوتو پیٹھ کے بل بھیپھڑوں میں بلغم یا پانی کھرا ہوتو پیٹھ کے بل لیٹنے سے وہ ان تمام خلاؤں میں بھر جاتا ہے جن میں سانس کی ہوا بھرنی چاہئے۔ بیٹھنے یا کھڑا ہونے پریہ پانی پھیپھڑے کے اوپر کے حصہ سے نجلے حصہ کی طرف اتر جاتا ہے جس سے مریض سانس لینے میں کچھآ سانی محسوس کرتا ہے۔

عورتوں میں حمل کے دوران دل کی دھڑ کن زیادہ ہوجاتی ہے۔ بھی بھی اچا تک دل بہت شدت سے دھڑ کنے لگتا ہے۔ ایسی صورت میں ارجنٹم میٹیلیکم خدا کے فضل سے بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔

ثابت ہوتی ہے۔ ارجنظ میٹیلیکم کی تکلیفوں میں چھونے سے اور دن کے بارہ بجے اضافہ ہوجا تا ہے۔ کھلی ہوا میں اور رات کو لیٹنے سے کھانسی میں کمی واقع ہوجاتی ہے لیکن دیگر جسمانی عوارض میں لیٹنے سے تکلیفیں بڑھتی ہیں۔

> دافع اثر دوائیں: مرک سال پلسٹیلا طاقت: 30 سے تی ایم (CM) تک

22

ارجنثم نائيٹريم

ARGENTUM NITRICUM

(Nitrate of Silver)

ارجنٹم نائیٹر کیم ایک ایسی دوا ہے جسے زمانہ قدیم میں مرگی کے مرض میں استعال کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے استعال سے اگر مرگی کو آرام آئے تو جلد پر خارش ہونے گئی تھی۔اسی طرح روایتی طریقہ علاج میں اسے آئکھوں کی بیاریوں کے لئے بھی استعال کیا جاتا تھا۔

ارجنٹم نا ئیٹر کیم چاندی کا زیور پہننے والے لوگوں میں پیدا ہونے والی علامات پر اونچی طاقت میں اثر انداز ہوسکتی ہے۔ لمجابلو پیتھک استعال کے نتیجہ میں بیدونتہ رفتہ وقت وہ کئیں تو منفی اثر ڈالتی ہے۔ اگر و لیے ہی د ماغ کمزور ہوجائے اور تخلیقی صلاحیتیں متاثر ہونے لگیں تو ارجنٹم نا ئیٹر کیم ضرور پیشِ نظر رکھنی چاہئے۔ اس میں یا دواشت کمزور ہوجاتی ہے اور ایسا مریض غیر معقول استدلال کرنے لگتا ہے۔ تو ہمات کا شکار ہوجاتا ہے اور خیالی ہو لنظر آنے لگتے ہیں۔ اگر ہیو لنظر نہ آئیں تو بھی سمجھتا ہے کہ کوئی چیز گردو پیش میں موجود ہے۔ وہ بعض خاص مقامات میں جانے سے ڈرتا ہے۔ ایسے خوفزدہ بچول کو اپنے ساتھ لے کرالی جگہ جانا چاہئے جہاں سے وہ خوف محس کرتے ہیں اور انہیں بتانا چاہئے کہ یہاں کچھ بھی نہیں۔ ارجنٹم نا ئیٹر کیم الی علامتوں کو خوف محس کرتے ہیں اور انہیں بتانا چاہئے کہ یہاں کچھ بھی دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دور کرنے کے علاوہ بعض دوسری گہری بیاریوں کو بھی دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ارجنٹم نا ئیٹر کیم امریض اونچی جگہ سے نیچ د کیھے تو ڈرے گا کہ کہیں میں چھلانگ نہ لگا دوں ، اس ارجنٹم نا ئیٹر کیم کا مریض اونچی جگہ سے نیچ د کیھے تو ڈرے گا کہ کہیں میں چھلانگ نہ لگا دوں ، اس لیے اونچائی پر جانے سے حتی المقدور احتر از کرتا ہے۔ لیکن ارجنٹم نا ئیٹر کیم کے مریض میں بی

علامت بھی ملتی ہے کہ نیچے سے اویرکسی بلند عمارت کود کھنے سے بھی سخت خوفز دہ ہوجا تا ہے۔اسی طرح مریض اونچی حیبت والے ہال میں جانے سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں حیبت اس پر نہ گر جائے۔اکثر ہومیو پیتے ڈاکٹر وں نے اپنی کتب میں اس علامت کوزیادہ واضح نہیں کیا صرف یہی لکھا ہے کہ اونچی عمارتوں کود کھنے سے خوف آتا ہے اور مرگی کے حملہ کا خطرہ ہوتا ہے کین میں نے جن مریضوں کو قریب سے دیکھا اور ان کی علامات کا تجزیہ کیا تو واضح طوریر وہ علامات سامنے آئیں جنہیں میں بیان کر چکا ہوں۔ایسے مریض کو بل پر سے گزرتے ہوئے بھی خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں دریا میں چھلانگ نہ لگا دوں۔ جب مرض بہت بڑھ جائے تو بل سے گزرتے ہوئے چھلانگ لگانے کا جوش دل میں اٹھتا ہے۔اپیامریض خوف سے کا نیتا ہےاور کمزوری بھی محسوں کرتا ہے۔ ارجنٹم نائیٹر کم میں کسی امتحان پاکسی اہم ملاقات سے پہلے خوف سے اسہال شروع ہوجاتے ہیں۔بعض لوگ ایسی کیفیت میں مضطرب ہوجاتے ہیں اور انہیں سخت غصر آتا ہے۔ ارجنتم نائيركم ميس غيرمعمولى ذہنى تھكان اورمعده كى تيزابيت كى وجهسے يا دداشت متاثر ہوتی ہے۔ایک بیاری جوآ رٹیر یوسکار وسس (Arterio-Sclerosis) کہلاتی ہے یعنی د ماغ کی طرف خون لے جانے والی شریانوں کا تنگ ہوجانا،اس میں ماضی قریب کے گزرے ہوئے واقعات بھول جاتے ہیں۔بعض دفعہ د ماغ کی طرف خون لے جانے والی شریانوں میں وقی تشنج بھی پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے مریض سب کچھ بھول جاتا ہے۔اگر تشنج کار جحان زیادہ ہو جائے تو مریض مستقل طور پریا د داشت کھو بیٹھتا ہے۔اس کا معدے کی عارضی خرابی اور ذہنی تھکان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ارجنٹم نا ئیٹر کیم میں بیعلامتیں بھی ملتی ہیں مگراس میں یا د داشت کا کھودیناا کثرمستقل علامت کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔اس بیاری میں الیومینا بھی مفید دوا ہے۔ اسے لمبے عرصہ تک استعال کیا جائے تو فائدہ ہوگا۔

ار جنٹم نا ئیٹر کیم میں <u>دل کمزور</u> ہو جاتا ہے اور اس میں کیو پرم اور کار بوائیمیلس کی

طرح نیلا ہٹ کا رجحان ہوتا ہے۔ کیو پرم میں تشنج کی وجہ سے جسم نیلا ہو جاتا ہے۔

کار بوائیمیلس میں آ کسیجن کی کی اور خون کی خرابی کی وجہ سے نیلا ہٹ ہوتی ہے۔

ارجہتم نا کیٹر کیم میں نیلا ہٹ کا رجحان کار بوائیمیلس سے مثابہ ہے۔ ان دونوں دواؤں کی نیلا ہٹ سارے جسم پر ظاہر ہوتی ہے جیسے کسی کا دم گھٹ جائے تو جسم نیلا ہو جاتا ہے۔ کیو پرم میں وقی تشنج سے ہاتھ یا وں بھی مڑ جاتے ہیں اور مریض کا چیرہ اور ہونٹ نیلے ہوجاتے ہیں۔

میں وقی تشنج سے ہاتھ یا وں بھی مڑ جاتے ہیں اور مریض کا چیرہ اور ہونٹ میں پہلے آ کھی ہر ارجائم نا کیٹر کیم میں رخموں کا رجحان بھی ہوتا ہے۔ ایلو پیشک میں موری ہے۔ خصوصاً آ کھے کے بیاری میں سلورنا کیٹر میں ارجنٹم نا کیٹر کیم مفید دوا ہے۔ اس میں روشنی سے بہت زود حسی بھی ملتی ہے۔

آ تکھوں میں در داور تھکن کا احساس ہوتا ہے۔ مستقل آ شوب چیٹم جس میں ہیو ٹے سوج جاتے ہیں۔ مواد جاری رہتا ہواس میں بھی ارجنٹم نا کیٹر کیم اچھا اثر دکھاتی ہے۔ اس میں ہوٹے ہیں۔ یہ بیاری برصغیر میں ۔ پیوٹوں کے اندرونی حصہ میں سوزش اور سرخی کے دائر سے بن جاتے ہیں۔ یہ بیاری برصغیر میں۔ پیوٹوں کے اندرونی حصہ میں سونش اور سرخی کے دائر سے بن جاتے ہیں۔ یہ بیاری برصغیر میں۔ پیوٹوں کے اندرونی حصہ میں بہت عام ہوتی ہے۔

ارجنٹم نائیٹر کیم عورتوں کی تکلیفوں میں بھی مفید ہے۔ حیض کے آغاز میں معدہ میں در دہوتا ہے، رحم کی گردن پرزخم بن جاتے ہیں جن سےخون رستا ہے۔ حیض ختم ہونے کے ایک دو ہفتہ بعد ہی دوبارہ خون جاری ہو جائے جو مقدار میں کم ہوتو یہ ارجنٹم نائیٹر کیم کی خاص علامت ہے۔ اس کے علاوہ اگر مزاج ارجنٹم نائیٹر کیم سے مشابہ ہوتو بیر حم کی دوسری تکلیفوں میں بھی مفید ہے۔

زخموں سے خون بہنے اور قے کے ساتھ خون آنے کار جمان ہوتا ہے۔ معدے کے ایسے السر جو پرانے ہو چکے ہوں اور جن میں کوئی دوا کام نہ کرے ان میں ارجنٹم نا ئیٹر کیم بھی استعال کروا کے دیکھنی چاہئے۔اس کے علاوہ السر کے مریضوں کولٹھی

کوٹ کر کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کچے کیلے کوسکھا کر پیس کراس کے سفوف کو دن میں دو تین بار کھلا یا جائے تو یہ کچھ عرصہ کے بعد زخموں پر تہہ ہی بنا دیتا ہے جو نہ صرف السر کو ڈھانپ لیتی ہے بلکہ اس سفوف میں شفا کا مادہ بھی پایا جاتا ہے۔ میں نے ایک سائنسی معلومات کے رسالہ میں پڑھا ہے کہ کچے کیلے کے پاؤڈر پر جو تحقیق کی گئی ہے اس سے قطعی طور پر ثابت ہوا ہے کہ یہ معدے کے السر کا بہترین علاج ہے۔خود میں نے گئی مریضوں کو یہ استعال کروایا ہے اور ہمیشہ فائدہ ہوا ہے۔

ارجنٹم نائیٹر کیم کے مریض کومعدے میں پرانے السر ہوں تو جسم میں خون کی کی ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی میٹھا کھانے کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ میٹھے کی خواہش اور بھی بہت دواؤں میں پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ بہت میٹھا کھانے ہیں لیکن انہیں کچھنیں ہوتا جبکہ ارجنٹم نائیٹر کیم کے مریض کو میٹھا موافق نہیں آتا۔ اس کے کھانے سے معدے کا نظام بگڑ جاتا ہے اور دوسری تکلیفوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اگر میٹھے کی خواہش کے ساتھ پیٹے میں ہوا اور تناؤ بھی ہو تو یہ علامت اگر چہلوگوں میں عام طور پر پائی جاتی ہے گئی ارجنٹم نائیٹر کیم کے مریض میں بہت نمایاں ہوتی ہے۔ ارجنٹم نائیٹر کیم کا مریض دائیں کروٹ نہیں سوسکتا۔ یہ علامت ناجا (Naja) میں بہت میں بھی ملتی ہے۔ دائیش کروٹ لیٹنے سے بض تیز ہو جاتی ہے۔ کا لمیا، سپونجیا، کالی نائیٹر بیٹ میں بھی ملتی ہے۔ دائیش کروٹ لیٹنے سے بض تیز ہو جاتی ہے۔ ان دواؤں کی ایک دوسرے الیومن، پلاٹینا، لیئم نگر کیم وغیرہ سب میں یہ علامت مشترک ہے۔ ان دواؤں کی ایک دوسرے سے تھر بی ان کی دوسری امتیازی علامتوں سے کی جاسکتی ہے۔

ارجنٹم نائیٹر کیم کی تکلیفیں گرم کمرے میں یا آگ کے پاس بیٹھنے سے بڑھ جاتی ہیں۔اس میں چہرے کا پسینہ بہت نمایاں ہوتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے پانی سے اندر سے پھوٹ رہا ہے۔ ارجنٹم نائیٹر کیم میں چہرہ پژمردہ اور نیلگوں ہو جاتا ہے، آئکھیں اندر دھنسی ہوئیں اور بےرونق ہوتی ہیں۔تھوجا کی طرح مریض میں مسے بننے کا رجحان بھی ہوتا ہے۔ گلے میں بھیرسلف کی طرح کیانس اسلنے کا حساس بہت نمایاں ہوتا ہے۔اسے نکا لنے کی کوشش میں تکلیف اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ احساس بہت نمایاں ہوتا ہے۔اسے نکا لنے کی کوشش میں تکلیف اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ صرف احساس ہوتا ہے،حقیقت میں کچھنہیں ہوتا۔ نائیٹرک ایسٹر میں بھی بیعلامت ملتی ہے۔

صرف گلے میں ہی نہیں بلکہ جسم کے مختلف حصوں میں کوئی چیز چھنے کا احساس ہوتا ہے جہاں ذرابھی ہاتھ لگ جائے تو بہت در دہوتا ہے۔

ارجنٹم نائیٹر کیم میں دودھ پلانے والی ماؤں کی علامات ان کے بچوں میں ظاہر ہو جاتی ہے اگر ماں بہت زیادہ میٹھا کھائے تو بچے کواسہال لگ جاتے ہیں۔ ارجنٹم نائیٹر کیم میں قے اوراسہال بیک وقت شروع ہوجاتے ہیں۔ سبزی مائل دست آتے ہیں، بچہ جو بچھ پیتا ہے فوراً نکل جاتا ہے۔ ایسے بچے عموماً سو کھے بن کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ شیرخوار بچوں میں ماں کے دودھ کی وجہ سے سوکھا بن بیدا ہو۔ بچے بذات خود بھی ارجنٹم نائیٹر کیم کے مریض ہوسکتے ہیں۔ ان کے سوکھے بن میں بیعلامت ملتی ہے کہ سبز رنگ کے اسہال ہوتے ہیں۔ ق اوراسہال اکٹھے یاباری باری ہوتے رہتے ہیں۔ اسہال کے ساتھ آؤں بھی آتی ہے۔

ارجئٹم نا ئیٹر کیم میں جسم کے اندرونی اعضاء میں درد ہوتا ہے۔ مثلاً جگریا تلی میں دکھن ہوتی ہے، معدے میں درد ہوتا ہے،ضروری نہیں کہ دکھن کا بیا حساس سارے پیٹ میں بھیلا ہوامحسوس ہو۔

ارجنٹم نا ئیٹر کیم میں پیشاب غیرارادی طور پرخود بخو دنکل جاتا ہے۔ بچوں میں رات کو بستر گیلا کرنے کی علامت بھی ملتی ہے۔ایک اور علامت بیہ ہے کہ بیشاب کی خواہش ہوتی ہے کین پیشاب کی نالی میں درد، ورم اور خارش کا رجحان ہوتا ہے۔ سوزاک کی بھی یہ بہترین دواہے۔

رجنٹم نائیٹر کیم حمل کے دوران پیدا ہونے والی اکثر تکالیف میں مفید ہے۔
اس کے مریض میں دل کی کمزوری پائی جاتی ہے جس میں حمل کے دوران بوجھ پڑنے سے
اضا فہ ہوجا تا ہے اور یہ تکلیف سارے حمل کے زمانہ میں رہتی ہے۔ یہ تکلیف جسمانی حرکت
اور جذباتی ہونے سے بڑھ جاتی ہے۔ ارجنٹم نائیٹر کیم میں ڈراؤنی خوابیں آتی ہیں۔

صبح اٹھنے کے بعد ٹائگوں میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے چوٹیں گئی ہوں۔ چلنے سے دکھن ہوتی ہے، پیڈلیوں میں کمزوری کا احساس ہوتا ہے، باز و بےحس ہو جاتے ہیں، کمر میں در دہوتا ہے اور ریڑھ کی ہڑی بہت زودحس ہو جاتی ہے، رات کو بہت در دہوتا ہے۔ ارجنٹم نا ئیٹر کیم میں نچلے دھڑکا فالج بھی ملتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی کے اردگر د کے ریشوں میں شختی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر قسم کی گرمی اور حرارت میں ، کھانا کھانے کے بعد تکلیفوں میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ تازہ ہوااور سردی سے تکلیف کم ہوجاتی ہے۔

مددگار دوائیں: آرسنگ مرکسال فاسفورس پلسٹیلا

دافع اثر دوا: نیشرم میور

طاقت: 30 سے 200 تک

مرگی، بلندی کےخوف اور ڈراؤنی خوابوں کے رجحان کو ختم کرنے کی خاطر بہت اونچی طاقت میں دی جائے۔ آرنيكا 83

23

آرنكا

ARNICA MOUNTINA

ہومیوبیتھی میں آرنیکا کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ بیددوا پہاڑی تمباکو کے بودے سے تیار کی جاتی ہے۔ یہاڑی تمبا کو دوا کے طور پر لمبے عرصہ سے استعال ہور ہاہے۔عرصہ دراز تک اسے چوٹوں کےعلاج کے لئے استعمال کیا جاتار ہا۔ پیاڑی علاقوں میں چوٹیں کھانا اورگر جانامعمول کی بات ہے۔خداتعالیٰ نے وہاں ہی اس کا علاج بھی پیدا کر دیا ہے۔ ہومیو بیتھی میں اس کا استعال اکثرنئ یا پرانی چوٹوں کو دور کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ آرنیکا کی سب سے اہم علامت خون کو منجمد کرنا ہے۔ بدا تر پھٹکری کے اثر سے ملتا جاتا ہے اس لئے دل کی تکلیفوں میں یہ ایک لازم دوا بن جاتی ہے۔ آرنیکا جمے ہوئے خون کو پکھلا دیتی ہے لیکن اس کے باوجود ایلوپیتھک دواؤں کی طرح خون کوزیادہ پتلانہیں کرتی اور بوقت ضرورت خون کی جمنے کی صلاحیت کوبھی زائل نہیں کرتی۔ ول کے حملہ میں عموماً آرنکا کو کیسس سے ملاکر دیاجا تاہے کیونکہ لیکیسس اس سانب کے کاٹے کی دواہے جس کاز ہرخون کو جما کر پھٹکیاں بنادیتا ہےاورخون منجمد ہونے کی وجہ سے دل پر حملہ ہوجاتا ہے۔ بعض سانیوں کے زہر دل کے اعصاب یر بھی اثر انداز ہوتے ہیں لیکن خون پر بدائر نہیں ڈالتے۔ایسے سانیوں میں'' ناجا''سب سےاول نمبریر ہے۔اس کا زہر دل کےاعصاب برحملہ کرتا ہے جبکہ لیکیسس خون خراب کرکے دل کو نقصان پہنچا تا ہے۔آ رنیکا اور کیکیسس دونوں کا خون کے جمنے سے تعلق ہے۔اس لئے ایسی ملتی جلتی دواؤں کوایک دوسرے کے بعد استعال نہیں کرنا جائے کیونکہ بعض دفعہ ان دواؤں کے اثرات ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں اور ایبا مریض ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ دو تین

دواؤں کوایک دوسرے کے بعد دینایا ملا کرایک نسخہ کی صورت میں دیناایک ایسافن ہے جو دواؤں کے مزاج کے گہرے مطالعہ اورتجربہ سے نصیب ہوتا ہے۔اسی خطرہ کے پیش نظر میں آرنیکا کو لیکی^ے س سےملا کر دیتا ہوں یا پھر دونوں میں سےصرف ایک دوااستعال کراتا ہوں۔

اگر دل كاحمله خون جمنے كى وجه سے ہوا ہوتو آر نيكا خون كومناسب حد تك يتلا كرتى

حادثات اور چوٹول کے لئے آرنیکا بہترین دواہے۔ چوٹ کھائی ہوئی جگہ نیلی یا کالی ہو جائے اورخون جم گیا ہوتو آرنیکا بلاخوف وخطراستعال کریں۔ایک دفعہ میرے پاس ایک ایسا مریض لایا گیا جس کا ساراجسم سر سے یا وُں تک لاٹھیوں کی ضربوں سے کالا اور نیلا ہور ہاتھا۔ حالت اتنی خطرناک تھی کہ لگتا تھا کہ جلد مرجائے گا۔ میں نے اسے آرنیکا کی بہت سی خوراکیں دے کر گھر بھجوا دیا۔ دوسرے دن شام تک جب اس کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی تو تشویش لاحق ہوئی۔ پیتہ کروایا تو جواب ملا کہ وہ تو رات ہی کو ہالکلٹھیک ہوگیا تھااوراب بھا گا دوڑا پھرر ہا ہے۔الحمدللد

آرنيكا 200 كواكرا يكونائث 200سے ملاكر ديا جائے تواكيلي آرنيكا كے مقابل يربيدونوں دوائیں مل کرزیادہ اچھااور فوری اثر دکھاتی ہیں۔ ماؤف حصہ پرسرخی زیادہ نمایاں ہوتو آرنیکا کے ساتھ بیلا ڈونا ملاکر دینازیا دہ مفیدہ کیونکہ بیسرخی بتاتی ہے کہ چوٹ والی جگہ کی طرف خون کا غیر معمولی رجحان ہے۔عموماً جس جگہ چوٹ لگے وہاں ابھار بن جاتا ہے جو چوٹ والے حصہ کو چھپالیتا ہے۔ بیا بھار دوران خون زیادہ ہونے کی وجہ پیدا ہوتا ہے جوجسم کے بعی ردمل کے طور پرصدمہ کی اطلاع ملتے ہی تیزی سے اس طرف دوڑ تا ہے چونکہ آرنیکا میں متاثرہ حصہ کی طرف خون کار جحان بڑھانے کا مزاج نہیں پایا جاتا اس لئے آرنیکا اکیلی کافی نہیں ہوتی۔اسے بیلاڈونا کے ساتھ ملاکر دینا چاہئے۔ ایکونائٹ بھی اس صورت حال میں عمومی طور پر مفید ہے۔ اس کئے روز مرہ کے طور پر بين خد بلاتر دد استعال كيا جائے تو كوئى نقصان نہيں۔ بال بعض صورتوں ميں زيادہ فائدہ كى

امید ہوسکتی ہے۔

آرنیکا چھوٹی طاقت سے لے کر بڑی طاقت تک یکساں کام کرتی ہے کین تکلیف زیادہ گہری ہوتو اونچی طاقت میں دینی بہتر ہے۔ ایک دفعہ ایک فوجی افسر میجر ممتاز ایکسرسائز کے دوران ہمالہ کی ایک برفانی چوٹی سے پچھتر فٹ گہرائی میں جاگرے تھے۔ ان کی چوٹیں اس قدر شدید تھیں کہ ڈاکٹروں نے مایوی کا اظہار کردیا تھا۔ میں نے انہیں آرنیکا ایک ہزار اور نیٹر مسلف ایک ہزار پوٹینسی میں پہلے دن دو دفعہ، پھر روزانہ ایک دفعہ استعال کروائی۔ اللہ کے فضل سے جیرے انگیز طور پر شفایا ہوگئے۔

85

میرےا بیک سابقہ مریض جواسی طرح کی سخت چوٹ کا شکار ہوئے تھے۔ایک دفعہ لنڈن ملنے آئے تو میں انہیں پہچان نہیں سکا۔ کیونکہ جب میں ان کا علاج شروع کیا تھا تو ریڑھ کی ہڈی چوٹ کےصدمے سے ٹوٹ چکی تھی اور ڈاکٹروں نے فیصلہ دیا تھا کہ ساری عمر چلنے کے قابل نہیں ہوسکو گے اگر بیرمریض ہے بھی گیا تو عمر بھربستریر لیٹنا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ شفا کی صورت میں وہیل چیئر (Wheel Chair) کے بغیرانیک جگہ سے دوسری جگہ حرکت ممکن نہیں ہوگی ۔ میں انہیں اس لئے نہیں بہیان سکا کہ گوشکل کی عمومی مشابہت تو تھی مگریہ میرے دفتر میں اپنے قدموں پر چل کے داخل ہوئے اورکسی سوٹی کے سہارے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ تب مسکراتے ہوئے انہوں نے مجھے یا د کرایا کہ میں وہی مریض ہوں جسے ڈاکٹروں نے تو لا علاج قرار دیا تھا مگر آپ نے ہمت بند ہائی تھی اور دعا کے ساتھ جود وائیں تجویز کی تھیں میں مسلسل وہی دوائیں استعال کرر ہا ہوں اور کسی دوسری دوا کی ضرورت نہیں پڑی۔اب خدا کے فضل سے میں سہولت سے چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہوں۔ مجھے یاد آ گیا کہان کی خطرناک حالت کے پیش نظر میں نے بہت غور کے بعد ایک نسخہ سوچا تھا جس میں آر نیکا، روٹا، ہائی پیریکم، کلکیریا فاس اور سمفائٹم شامل تھیں۔ان سب دواؤں کو ملا کر 30 طاقت میں مسلسل دن میں تین جار د فعہ کھانے کی ہدایت دی تھی اور یہ بھی سمجھایا تھا کہ کچھ عرصہ بعد چند دن کا نا غہ کر دیا کریں۔ چنانچہانہوں نےمسلسل یہی نسخہ جاری رکھا اور اللہ کے فضل سے شفا کا بیہ

اعجازی نشان ظاہر ہوا۔ اگر چوٹوں کے بدائر ات مثلاً سوزش، درد، اینٹھن اورا بھاروغیرہ دریتک باقی رہیں تو ان کومٹانے کے لئے یہ بہترین نسخہ ہے۔ پہلے مریض کی دوا میں میں نے نیٹر مسلف 1000 اس لئے داخل کیا تھا کہ گدی کی خطرناک چوٹ میں نیٹر مسلف سے بہتر کوئی دوا مجھے معلوم نہیں۔ عام طور پرٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑنے کے لئے نہایت مؤثر نسخہ حسب ذیل تین دواؤں پر مشتمل ہے۔ سمفائٹم، روٹا اور کلکیریا فاس۔ سالہاسال کے تجربے کی بناپر میں یقین سے کہہسکتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ہڈی جڑنے کی رفتار توقع سے دگئی تیز ہوجاتی ہے اور اس سے ایسی ٹوٹی ہوئی ہڑیاں بھی جڑجاتی ہیں جن کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو چکا ہو۔ رفتہ رفتہ دونوں طرف سے یہ ہڑیاں بڑھنا شروع ہوجاتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں۔

چوٹ کے علاوہ جسمانی محنت سے حکن اور درد کا احساس ہوتو اس میں بھی آرنیکا بہت مفید ہے۔ اگر زیادہ جسمانی مشقت سخت کھیلوں کے نتیجہ میں جسم درد سے ٹوٹ رہا ہوتو اس کے لئے تیر بہدف نسخد آر نیکا 200 اور برائیونیا 2000 ملا کر دینا چاہئے ۔ عورتوں کے متفر ق عوارض میں آرنیکا ایک بہت کارآ مددوا ہے۔ وضع حمل کے وقت غیر معمولی زور لگنے اورخون کے مستقل درد یں ٹیم برجاتی ہیں۔ اگر ولادت سے چنددن قبل آرنیکا 1000 طاقت میں دی جائے تو وضع حمل کے وقت غیر معمولی نہ ور لگنے اورخون کے مستقل درد یں ٹیم برجاتی ہیں۔ اگر ولادت سے چنددن قبل آرنیکا 1000 طاقت میں دی جائے تو وضع حمل کے وقت اور بعد میں پیدا ہونے والی پیچید گیوں اور کئی تئم کے نقصانات سے بچالے گی۔ سلفر اور پائیر وجینم ملا کر دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے لیکن اگر پہلے آرنیکا دی جائے تو غالبًا ان دواؤں کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی ۔ ان دونوں دواؤں کے ساتھ ملا کر بھی غالبًا ان دواؤں کی صاحت واضح طور پر غالبًا ان دواؤں کی میں جومرض سے دوسے بیت فائدہ ہوتا ہے لیکن اگر بڑھاتی فروس ہوتا ہو مرض سے داختے ہیں لیکن جنتی دوائیں جومرض سے دے مراس ہے نہ رکھتی ہوں بے ضرورت ملا دی جائیں تو وہ اپنا اثر بڑھاتی نہیں بلکہ ضرورت مشابہت نہ رکھتی ہوں بے ضرورت ملا دی جائیں تو وہ اپنا اثر بڑھاتی نہیں بلکہ ضرورت

کی دواکو جواس نسخہ میں شامل ہو کمزور کردیتی ہیں۔ میں بعض اوقات محض وقت کی کمی کی وجہ سے بعض دوائیں ملا کر استعال کرتا ہوں۔ بہت لہے تجربے کے بعد چند دواؤں کوآپس میں ملا کر دینے سے جو فائدہ سامنے آتا ہے وہ اکثر اسی طرح سب مریضوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جہاں روز مرہ کی فوری ضرورت میں ایسے نسخے ہمیشہ مفید ثابت ہوں وہاں بعض متعصب ہومیو پیتے ڈاکٹروں کا بیاعتراض جڑدینا کہ اصولاً ایک ہی دوااستعال ہونی چاہئے درست نہیں۔ احتیاط کے ساتھ بعض روز مرہ بیاریوں کو، علامتوں کے چکر میں پڑے بغیرا گرآزمودہ مجرب نسخوں کے ساتھ بعض روز مرہ بیاریوں کو، علامتوں کے چکر میں پڑے بغیرا گرآزمودہ مجرب نسخوں سے ٹھیک کیا جاسکتا ہوتو ٹھیک نہ کرنا مریض پر احسان نہیں ظلم ہے۔ضروری نہیں کہ نسخہ میں موجود سب دوائیں کام کریں کیکن کوئی ایک دوابالمثل ثابت ہوکرا نیا کام دکھاتی ہے۔

آرنیکا کے مریض کے مزاج میں خوف نہیں ہوتا لیکن رات کوسوتے وقت ڈراؤنے اور وحشت ناک خواب آتے ہیں مگر دن جمر جا گئے میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ عورتوں کے حمل کے دوران جنین کی حرکت کی وجہ سے رحم میں درد محسوس ہوتا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہڑھ جاتا ہے۔ یہ در درات کوخوف میں تبدیل ہوکر ذہن پراٹر انداز ہوتا ہے اور ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ نیند کے غلبہ کی وجہ سے تکلیف شعوری طور پر محسوس نہیں ہوتی بلکہ ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ نیند کے غلبہ کی وجہ سے تکلیف شعوری طور پر محسوس نہیں ہوتی بلکہ ڈراؤنے خوابوں کا روپ دھار لیتی ہے۔ اگر کوئی بھاری گہری ہوا ور شدت اختیار کر بوتو بعض دفعہ آرنیکا کا مریض بھی موت کے خوف میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ او پیم میں بھی ایبا خوف پایا جاتا ہے جو رات ہویا دن وہ خوف کیساں رہے گا۔ گرسوائے اس کے کہ کوئی بھاری بہت زیادہ عمین ہوجائے آرنیکا کے مریض کوروز مرہ کی عام بھاریاں خوفزدہ نہیں کرتیں۔ آرنیکا کے خون کے ہوجائے آرنیکا کے مریض کو بڑا ہے۔ آرنیکا کا مریض میریا اور ٹائیفا ئیڈ کے آ غاز کے مریض سے بھی تکلیف محسوس کرتی ہے۔ آرنیکا کا مریض میریا اور ڈھن کا احساس ہوتا ہے۔ جسم ٹو ٹا ہے، جلد میں کچا پن آ جاتا ہے اورد کھن کا احساس ہوتا ہے۔ جسم ٹو ٹا ہے، جلد میں کچا پن آ جاتا ہے اورد کھن کا احساس ہوتا ہے۔ جسم ٹو ٹا ہے، جلد میں کچا پن آ جاتا ہے اورد کھن کا احساس ہوتا ہے۔ جسم ٹو ٹا ہے، جلد میں کچا پن آ جاتا ہے اورد کھن کا احساس ہوتا ہے۔ جسم ٹو ٹا ہے، جلد میں کچا پن آ جاتا ہے اورد کون کا مریض کے تاز میں بدن جلد معمولی کمس سے بھی تکلیف محسوس کرتی ہے۔ عام طور پر ملیریا بخار کے آغاز میں بدن

کی دکھن اسی طرح ہوتی ہے۔ ٹائیفائیڈ کا بھی اسی قشم کا مزاج ہے جیسے کسی کو مار پڑے اور اندرونی چوٹیس لگیس لیکن خون جاری نہ ہو۔ آرنیکا کے مریض کے وجع المفاصل میں بھی یہی علامتیں ملتی ہیں۔

88

اگر پاؤل میں موچ آ جائے یا پھے تھنے جائے اس وقت آ رنیکا تھے کو پینسی میں دی جائے تو بہت جلد اثر دکھاتی ہے۔ اگر چھوٹی پوٹینسی میں استعال کریں تو بار بار دینے سے اتنا فائد ہٰہیں ہوتا جتنااونجی طاقت میں ایک دفعہ دینے سے ہی غیر معمولی اثر ظاہر ہوتا ہے۔

آ رنیکا کے مریض کواپنا بستر سخت محسوں ہوتا ہے خواہ وہ کتنا ہی نرم کیوں نہ ہو۔ بار بار کروٹیں بدلتا ہے۔جسم کو بار بارحرکت دینا اور جگہ بدلنا آ رسنک اور رسٹاکس میں بھی بہت نمایاں ہے۔لیکن آ رنیکا میں بیرکروٹیں بدلنا بے چینی کی بناپڑ ہیں ہوتا بلکہ مریض جس کروٹ بھی لیٹے جسم دکھتا ہے۔

آرنیکا کی بعض اور دواؤں سے بھی مشابہت ہے۔ مثلاً بیلا ڈونا کی طرح سرگرم ہوتا ہے اور باقی جسم ٹھنڈار ہتا ہے۔ بخارجسم کے اندر چلے جا ئیں تو خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ آرنیکا کی ایک خوراک اونچی طاقت میں دیں تو ساراجسم دوبارہ گرم ہونا شروع ہوجا تا ہے اور جو علامتیں دب گئی تیں وہ دوبارہ جسم پر ظاہر ہونے گئی ہیں اور علاج کے لئے وقت مل جاتا ہے۔ لیکن اگر پہلے ہی واضح طور پر بیاری کا علم ہوتو پھر علامتوں کو دوبارہ ابھارنے کے لئے آرنیکا ضروری نہیں۔ وہی بالمثل وہ کام کرے گی جس کا مرض تقاضا کرتا ہے۔

ایک دفعه ایک خاتون موچ آ جانے کے باعث مسلسل تکلیف میں تھیں اور چندقدم چنا بھی دو بھر تھا۔ ہومیو پیتھک دواتو کھاتی تھیں مگر ساتھ ہی ماؤف جھے کی مالش بھی بہت کرتی تھیں۔ میں نے انہیں آرنیکا، برائیونیا اور کاسٹیکم دی اور مالش سے پر ہیز کرنے کو کہا کیونکہ اس سے عضلات بھرزخمی ہوجاتے تھے۔ایک ہفتہ کے اندر ہی ان کی طرف سے اطلاع ملی کہ بالکل ٹھیک ہیں۔ آرنیکا کے ساتھ دوسری دوائیں اس لئے ملائی تھیں

کہ بعض دفعہ صرف چوٹ کا ہی اثر نہیں ہوتا بلکہ بعض عضلات کمزور ہو جاتے ہیں اور برائیونیا عضلات کے اندر کی تکلیفیں جو چوٹ سے علاوہ ہوں ان کی بھی اچھی دوا ہے اور عضلات میں طاقت پیدا کرتی ہے۔ کاسٹیکم میں عضلات ڈھیلے ہو کرمفلوج سے ہو جاتے ہیں یا ہرنیا کی علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔

اگر تکلیف دائیں طرف ہوتو آرنیکا، بیلا ڈونا اور برائیونیا کا نسخہ مفید ہوگا۔ ہا ئیں طرف تکلیف کے لئے آر نیکا کیکیسس اورلیڈم بہت بہتر نتائج پیدا کرتی ہیں۔اگر چوٹ یا حادثے کی وجہ سے پیٹھہ اپنی جگہ سے ہل جائے اور موچ کی کیفیت ہوتو عموماً آرنیکا کی اونچی طافت سے بہتر کوئی اور دوا کا منہیں کرتی ۔ چند گھنٹوں میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر كمر ميں كسى جھٹكے كے نتيجہ ميں' چيك' بڑجائے لعنی عارضی طور برعضلات اپنی جگه سے ٹل جائیں تو پیر کیفیت خود بخو دیچھ عرصہ کے بعد ٹھیک ہوجاتی ہےاورکسی مستقل بیاری کا حصہ نہیں بنتی لیکن بعض دفعہ یہی مستقل بیاری بن جاتی ہے اور کمر کو جھٹکا لگناعمر بھر کا روگ لگا دیتا ہے۔ پہلے سے کمزورعضلات اور بھی سکڑ جاتے ہیں یا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔اس صورت میں آ رنیکا مددگار ہوتی ہے مگریہ براہ راست عضلات کی اندرونی کمزوریوں کی دوانہیں ہے۔اس تکلیف کور فع کرنے کے لئے ایک امکانی دوا''سی می سی فیوجا'' بھی ہوسکتی ہے جوعضلات کی گہری تکلیفوں میں کام آتی ہے۔اگر سمر میں درد تھہر جائے تو آغاز میں آرنیکا اور برایؤنیا استعمال کرنی چاہئے کیکن اگر آ فاقہ عارضی ہوتو آ رنیکا کے ساتھ برائی اونیا کی بجائے رسٹائس ملا کر دیکھیں کیونکہ رسٹاکس عضلات کی گہری کمزوریوں کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔اس لئے فالح کی بھی بہت مؤثر دوا ہے،عضلات کوتقویت پہنچاتی ہےاوران میں جان ڈال دیتی ____ ہے۔ پھیلے ہوئے دل کی بھی دوا ہے۔ لمبے برانے فالجوں میں بھی سلفر کے ساتھ ملا کر دینا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔اس کے بعد کلکیریا کارب کی ضرورت بھی پیش آسکتی ہے کیونکہ بیسلفراور رسٹاکس دونوں کی مزمن (Chronic) دواہے یعنی ان کے اچھے اثر ات کوآ گے بڑھاتی ہے۔

آرنیکا ہر پیز (Herpes) میں بھی بہت مفید دوا ہے۔ اس بیاری کی ایک قسم عام ہے جو اعصابی کمزوری یا نفیکشن سے تعلق رکھتی ہے دوسری قسم جنسی بے راہ روی سے پیدا ہونے والی ہر پیز ہے۔ اعصابی کمزوری کی وجہ سے ہونے والی ہر پیز میں آرنیکا بہت مفید ہے۔ اس کے ساتھ آرسنک اورلیڈم ملاکر دینا زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ ان تینوں دواؤں کا نسخہ ہر قسم کے زہر یلے جانوروں کے کالے کا بھی علاج ہے۔

آرنیکا میں جس طرح جلد پر کمزوری اور بے چینی پیدا کرنے والی دکھن ہوتی ہے اسی طرح اندرونی جھلیوں اور انتر ایوں کا حال ہوتا ہے۔خصوصاً ملیریا اور ٹائیفائیڈ کے بخاروں میں اندرونی نزلاتی جھلیوں میں بہت در دہوتا ہے۔آرنیکا میں سیلان خون کا بھی رجحان پایا جاتا ہے۔اس کئے خون کی باریک رگوں کے بھٹ جانے میں یہ بہت مفید دوا ہے۔اگر قے ، دست اور بلغم میں خون آنے گے تو اگر کسی دوسری معین بالمثل دوا کاعلم نہ ہوتو آرنیکا کو موقع دینا چاہئے۔ بعض دفعہ بھاری بہت بڑھ جائے تو سب اندرونی حجلیاں جواب دے جاتی ہیں اور سخت بدیودار خون کے دست آتے ہیں۔اس صورت میں اکیلے آرنیکا کے بس کی بات ہمیں۔ مین بالمثل دوا کی تلاش ضروری ہے۔آرنیکا کے مریض کے سانس اور پسینہ میں بعض نفعہ بیٹیشیا کے مریض کے سانس اور پسینہ میں بعض دفعہ بیٹیشیا کے مریض کے سانس اور پسینہ میں بعض

جب بیاری زیادہ بڑھ جائے تو آرنیکا کا مریض بھی آرسنگ کے مریض کی طرح موت کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آرنیکا کے مریض کا سرگرم ہوتا ہے لیکن اسے ٹھنڈا کرنے کا مطالبہ نہیں کرتا ، صرف جسم کوگرم کرنا چا ہتا ہے۔ آرسنگ کا مریض اس سے متضا و ہے۔ وہ بیک وقت سرکو ٹھنڈا اور جسم کوگرم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ دائی طور پر ٹھنڈا ہونے کے لحاظ سے وہ سورائینم کے مریض سے ملتا ہے لیکن سورائینم میں مریض سرسے پاؤں تک ٹھنڈا ہوتا ہے۔ لیکیسس بھی سخت سردی کی دوا ہے خصوصاً اگر یا وَں ٹھنڈ ب ہوں۔ سونے کے بعد پاؤں ٹھنڈ ہے ہونا اس کی خاص علامت ہے لیکن کیکیسس میں میں مریض ہونا اس کی خاص علامت ہے لیکن کیکیسس میں کھنڈ دائی نہیں ہے، آتی ہے اور چلی جاتی ہے اور اخراجات میں دائی لعفن کی

علامت نہیں ملتی لیکن سورائینم کا مریض بد بودار مریض ہے۔ سخت سردی محسوس کرتا ہے، بعض دفعہ مجھلی کی طرح جسم پر پہلے چیلے سے نکل آتے ہیں جو بہت بھیا نک ہوتے ہیں۔ آرسنک میں بھی میں علامت ہے۔ اگران میں بد بوبھی ہوتو آرسنک اور سورائینم دونوں اس کی بہترین دوائیں ثابت ہوسکتی ہیں۔

آرنیکا کے مریض کواگر بخارلمبا ہوجائے تو نیند میں پیشاب کے علاوہ اجابت بھی ہوجاتی ہے۔ پیشاب گہرے رنگ کا ہوتا ہے، پیشاب میں خون آتا ہے، مثانہ میں اپنتھن ہوتی ہے۔ مثانے میں بوجھاور گردوں میں در دمحسوس ہوتا ہے۔ سردی گئی ہے اور متلی اور قے کا رجحان ہوتا ہے۔ اجابت کا رنگ سیاہی مائل، حاجت بار بار ہوتی ہے۔ اجابت کا رنگ سیاہی مائل، حاجت بار بار ہوتی ہے۔ اسہال کے ساتھ انتر یوں میں شدید در دہوتا ہے اور ہر اسہال کے بعد مریض بہت کمزوری محسوس کرتا ہے اور لیٹ جانے کو جی جا ہتا ہے۔

آرنیکا کالی کھائسی کی بھی بہت مفید دوا ہے۔ اس کی خاص علامت یہ ہے کہ بچہ کھائسی سے پہلے یا بعد میں تکلیف کی شدت سے روتا اور چنجتا ہے۔ زور لگنے سے رگیں اور باریک خلیے بھٹنے لگتے ہیں۔ اگر آرنیکا نہ دی جائے تو بھی ایسے مریض اندھے بھی ہوجاتے ہیں۔ اندرونی دباؤکی وجہ سے ایسی کیفیت ہوجاتی ہے جیسے جسم کو بہت کوٹا بیٹا گیا ہے۔ آرنیکا ایسی کھائسی کو فی ذاتہ ٹھیک نہیں کرتی بلکہ قدر سے سکون بخش دیتی ہے اور مریض کی حالت نا قابل برداشت نہیں رہتی ۔ کھائسی کے لمبے بدا ترت بھی باقی نہیں رہتے۔ ڈروسرا حالت نا قابل برداشت نہیں رہتی ۔ کھائسی اور اس سے مشابہ کھائسیوں میں بہت مفید ہے۔ دات کوایک دفعہ میں طاقت میں دینے سے غیر معمولی فائدہ ہوتا ہے۔

آ رنیکا کا مریض چڑ چڑا، عمگین ، پریشان اور مایوس رہتا ہے لیکن بیہ مزاج صرف بیاری کے دوران ہوتا ہے ورنہاس کے مستقل مزاج میں مایوسی اور چڑ چڑا پن نہیں ہوتا۔ بیہ دوا بیاریوں سے متاثر ہوکرا پناایک خاص مزاج بنالیتی ہے۔

جب بیاری زیادہ بڑھ جائے تو درد کا احساس کم اور غنودگی کا غلبہ زیادہ ہوجا تا ہے۔ ذہنی لحاظ سے آخرتک تندرست رہتا ہے۔کوئی بات پوچھنے پر بالکلٹھیک جواب دے گا۔ دل کی بیاری میں ایسا در دہوتا ہے جیسے دل کو شکنجہ میں کس دیا گیا ہے اور مریض گھبرا کر دل پر ہاتھ مارتا ہے۔ نبض بے قاعدہ ہوتی ہے، محنت اور مشقت کے بعد دل کی دھڑ کن بہت بڑھ جاتی ہے جو آرام کرنے سے ٹھیک ہوجاتی ہے۔ مریض نئی جگھ جانے کی خواہش کرتا ہے اور وہ سو چتا ہے کہ ایک جگھ سے دوسری جگھ جانے سے آرام آجائے گا۔

آرنیکا کو ایپندگس کی تکلیف میں برائیونیا اور آئرس ٹینیکس (Iris Tenax) کے ساتھ ملاکر دینا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔

وضع حمل کی طرح ہر آپریش سے پہلے آرنیکا 1000 طاقت میں دینا کی قتم کی پیچید گیوں سے بچالیتا ہے۔

> مددگاردوائیں: ایکونائٹ۔اپی کاک دافع انژ دوا: کیمفر طافت: 30سے یہ۔ایم (CM

آ رسینک

24

آ رسينک البم

ARENICUM ALBUM (Arsenious Acid)

آ رسینک ایک بہت مہلک زہر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دفعہ جسم میں سرایت کر جائے تو اس کو بھی نہیں چھوڑتا۔ دس ہزار سال کے بعد بھی اس شخص کی لاش میں اس کے آثار موجود ہوں گے کیونکہ بیہ ہڈیوں اور بالوں کا جزوین جاتا ہے۔

آرسینک جوعلامات پیدا کرتا ہے ان میں بے چینی سب سے نمایاں ہے۔ ایسی بے چینی اگر جسمانی ہوتو رسٹا کس اور زہنی ہوتو آرسینک دوا ہے۔ اس میں ایکونائٹ کی طرح موت کا خوف بھی پایا جاتا ہے مگر و لیی شدت نہیں ہوتی بلکہ بے قراری، بے چینی اور وہم ہوتے ہیں اور مریض سجھتا ہے کہ اسے پھے ہونے والا ہے۔ بعض عورتوں میں صدموں اور پرسوتی بخاروں (Septic Fevers) کی وجہ سے آرسینک کی علامات پیدا ہوجاتی ہیں اور وہ ہر وقت بخاروں (جینی میں مبتلار ہتی ہیں۔ اس کا مریض بے حدنازک اورنفیس مزاج ہوتا ہے جو کپڑے کی ذرا بے چینی میں مبتلار ہتی ہیں۔ اس کا مریض بے حدنازک اورنفیس مزاج ہوتا ہے جو کپڑے کی ذرا کوئی ذرا بھی چھیڑو ہے تو غصہ سے بھڑک اٹھتا ہے۔ آرسینک کے مریض کے اخراجات سخت کوئی ذرا بھی چھیڑو ہے تو غصہ سے بھڑک اٹھتا ہے۔ آرسینک کے مریض کے اخراجات سخت بدیودار اور متعفن ہوتے ہیں۔ بیچین اور اسہال کی رنگت سیاہی ماکل ہوتی ہے اور تھوڑی تھوڑی اجادر سیاتی ماکل ہوتی ہے اور تھوڑی ہوتی ہے اور برنکل جانے چا ہمیں وہ جسم میں جذب ہونے گئے ہیں بہت سے زہر کیے ماد سے جو قدرتی طور پرنکل جانے چا ہمیں وہ جسم میں جذب ہونے گئے ہیں جن کی وجہ سے اجھن میں مینہ جذب ہونے گئے ہیں جن کی وجہ سے اجھن میں مینہ جذب ہونے گئے ہیں جن کی وجہ سے بھن میں مینہ جذب ہونے گئے ہیں کی وجہ سے اجھن میں مینہ جذب ہونے گئے ہیں جن کی وجہ سے بھن میں مینہ جذب ہونے گئے ہیں کی وجہ سے بھن میں مینہ بی مین مینہ بہت ہونے گئے ہیں کا دورہ میں کی وجہ سے بے چینی میں اضافہ ہوجاتا ہے اور وقفہ وقفہ سے بعض مریضوں کوشنج کا دورہ جن کی وجہ سے بے چینی میں اضافہ ہوجاتا ہے اور وقفہ وقفہ سے بعض مریضوں کوشنج کا دورہ

بھی پڑتا ہے۔اگروفت پر آرسینک دے دی جائے توانتر ایوں کی حرکت معمول پر آجاتی ہے اور مریض کی طبیعت بحال ہوجاتی ہے۔

آ رسینک کا گردوں کی بیار یوں سے بھی گہراتعلق ہے۔ گردوں کی جھلیوں کو بعض تیزانی مادے نقصان پہنچاتے ہیں اور بیشاب میں البیومن آنے لگتی ہے۔ بے حدد ماغی بوجھاور مسلسل ذہنی کام دونوں مل کراندرونی اعصاب میں بے چینی پیدا کر دیتے ہیں جس سے گردے کی جھلیاں زودحس اور ضرورت سے زیادہ فعال ہو جاتی ہیں۔ آرسینک کے مریض کی پیاس بھی بے چینی کا مظہر ہوتی ہے۔ گھونٹ گھونٹ یانی بیتا ہے لیکن بیاس بجھتی نہیں۔اصل میں یہ پیاس ہے ہی نہیں محض بے چینی ہے جس سے بار بار منہ خشک ہوتا ہے جسے تر کرنے کے لئے مریض گھونٹ گھونٹ یانی پیتا ہے۔اگر بیاری کمبی ہوجائے تو پیاس کلیتاً غائب ہوجاتی ہے کیکن بے چینی قائم رہتی ہے۔اس صورت میں ساراجسم بقراری سے حرکت کرتا ہے۔اگرجسم میں طاقت نہ ہوتو مریض دائیں بائیں سرپٹاتا ہے۔منہ خشک ہونے کے باوجودیانی پینے کودل نہیں جا ہتا۔ مریض جسیمیم کے مریض کے مشابہ ہوجا تا ہے لیکن ایک فرق نمایاں ہے کہ جلسیمیم کا مریض بے چین نہیں ہوتا۔ آرسینک کا مریض مسلسل کروٹیں بدلتا ہے۔تھوڑ اتھوڑ اپیشاب آتا ہے۔اگر گلے اور مثانے کی تکلیفوں میں آرسینک کی طرح بے چینی پائی جائے تو ہوسکتا ہے یہ بیاری کینسرہو۔اسے آرسینک پوری طرح شفانہ دیتواس کا استعال پھربھی جاری رکھنا جا ہے کیونکہ بیمرض میں کمی ضرور پیدا کر دیتا ہے۔لیکن اس کے ساتھ متعلقہ کینسر کی بالمثل دوا فوری تلاش کرنی حاہئے۔

اگر کینسریاکسی اور بیاری کا مریض اپنانجام کے قریب پہنچ چکا ہواوراسے انتہائی تکلیف اور بے چینی ہوتو ایسی صورت میں اونچی طاقت یعنی ایک لاکھ میں آرسینک دینے سے مریض کو فوری سکون ملتا ہے۔ لیکن اس عرصے میں اگر کوئی اور مؤثر دوا جس کا براہ راست اس کینسر سے تعلق ہو معلوم نہ ہو سکے تو آرسینک کے بعد مریض آرام تو پاتا ہے گراس کا بچنا محال ہوتا ہے۔ پس اگر وقت آ چکا ہے تو وہ تکلیف کی بجائے آسانی سے مگراس کا بچنا محال ہوتا ہے۔ پس اگر وقت آ چکا ہے تو وہ تکلیف کی بجائے آسانی سے

جان دےگا۔خدا تعالی نے بے چینی اور تکلیف کا حساس بھی جسم کے دفا کی نظام کو تحرک کرنے کے لئے پیدا فرمایا ہے۔ بیا پی ذات میں بیاری بھی ہے اور شفا کا محرک بھی۔ اگر بید دونوں با تیں نہ ہوں توجسم کی توجہ مقابلہ کے لئے بیدار ہی نہیں ہوتی۔ میں نے ایک مریضہ کو آرسینک ایک لاکھاس حالت میں دی کہ ڈاکٹر بالکل مایوس ہو چیا تھا اور در دکم کرنے والی دوا کیں بھی بند کر دی تھیں کیونکہ ان سے بے چینی میں اضافہ ہوجا تا تھا۔ اس کے بعد وہ جتنی در بھی زندہ رہیں بہت اطمینان اور سکون سے وقت کا ٹا۔ گویا آرسینک موت کا موجب نہیں بنتی ۔ البت اگر موت آگئ ہوتو آخری کھوں کوآسان کر دیتی ہے۔

آ رسینک کے مریض کا ساراجسم ٹھنڈا ہوتا ہےاور گرمی پہنچانے سے آ رام محسوں ہوتا ہے لیکن معدے اور سر کی تکلیفوں میں سردی آ رام دیتی ہے۔ بیاری ایک حالت سے دوسری حالت میں برتی ہے۔ بیاری ایک حالت سے دوسری حالت میں برلتی رہتی ہے۔ سرمیں درد ہوتو د ہاؤ سے آ رام محسوس ہوتا ہے۔ شدید متلی اور قے کار جحان بھی پایا جا تا ہے۔

معین وقفہ سے بیماری کا لوٹ آ نا بھی آ رسینک کی ایک خصوصیت ہے۔اگر کوئی در دشقیقہ میں مبتلا ہو، تکلیف میں سردی سے آ رام آئے، سات یا چودہ دن کے معین وقفہ سے دردکا دورہ ہوتو غالب امکان ہے کہ وہ آ رسینک کا مریض ہے۔اگرایسے دردکوکسی اور دواسے دبا دیا جائے اور ہر وقت صحیح شخص نہ ہو سکے تو بسااوقات بیدرد یا مستقل گھہر جا تا ہے یا جوڑوں کے درد میں تبدیل ہوجا تا ہے۔اگر جوڑوں کا صحیح علاج کیا جائے تو در داز سرنوسر کی طرف منتقل ہو جائے گا۔اس صورت میں آ رسینک سے وہ درد ٹھیک ہوجائے گا اور دوبارہ جوڑوں کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔

بسااوقات عورتوں کے رحم کی بیماریاں زہنی بیماریوں میں تبدیل ہوجاتی ہیں۔اگر کسی دواسے ماہانہ نظام ٹھیک ہوجائے لیکن بے چینی ،تو ہمات ،موت کا خوف اور پاگل پن کی علامات فطاہر ہونے لگیس توبیا چھاسودانہیں۔اگر آرسینک کی علامات ہوں تو آرسینک دینے سے بیسب بیاریاں یک دفعہ دور ہوجائیں گی۔

خشک کھانسی اور خشک دمہ میں بھی آرسینک کو بہت شہرت حاصل ہے۔ ناک میں سوزش ہو جائے ، خارش محسوس ہو، چھینگیں آنے کا رجحان ہو، ناک سے پانی کی طرح بہلی رطوبت بہداور گلے کے گلینڈ زسوج جائیں تو ان علامتوں سے بھی آرسینک کی نشاندہی ہوتی ہے۔

آرسینک دل کے لئے بھی اچھی دواہے۔اس کے مریض کی نبض باریک ہوتی ہے گر باوجود کمزوری محسوں کرنے کے نبض میں تیزی اور تناؤ پائے جاتے ہیں۔ایونائٹ اور بیلا ڈونا کے مریض کی نبض کا نبور اور کار بووت کے مریض کی نبض بالکل کمزور اور نرم ہوتی ہے۔

بیلا ڈونا کے مریض کی نبض بھر پور اور کار بووت کے مریض کی نبض بالکل کمزور اور نرم ہوتی ہے۔

ذراسازور سے دبانے سے غائب ہوجاتی ہے۔ یہ بنیادی فرق یا در کھیں تو نبض کے ذریعہ مریض کی شناخت آسان ہوجائے گی اور آپھی دوا تک بآسانی پہنچ جائیں گے۔

گینگرین اعضاء گئے سڑے نے کہ جہاں ڈاکٹروں (Gangrene) کے تکایف دہ مرض میں جس میں اعضاء گئے سڑنے کہ جہاں ڈاکٹروں نے ہیں۔ آرسینک بہت اہمیت رکھتی ہے۔ میرے تجربے میں یہ بات ہے کہ جہاں ڈاکٹروں نے میرے کہنے پر آرسینک 200 یا اونجی طاقت میں استعال کی اور خدا تعالیٰ کے فضل سے گینگرین کی جو علامتیں ظاہر ہو چکی تھیں وہ سرے سے غائب ہو گئیں۔ ایک نوجوان کا ہاتھ مثین میں آکر کچلا کیا، اس کے زخم مندل نہیں ہوئے اور بگڑ کر گینگرین میں تبدیل ہوگئے۔ ڈاکٹر نے مایوں ہوکر کیا اور ہفتہ دی دن کے بعد دہرانے کو کہا۔ چند ہفتوں کے بعد اس نے لکھا کہ در دتو ہے لیکن کی اور ہفتہ دی دن کے بعد دہرانے کو کہا۔ چند ہفتوں کے بعد اس نے لکھا کہ در دتو ہے لیکن سیابی رفتہ رفتہ سرخی میں تبدیل ہورہی ہے۔ پچھ ہی عرصہ میں اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوگیا اور بازوکٹوانا تو کیا، ہاتھ کی افکان کو ایت بھی نہ آئی۔ لیکن ایک بات یا در کھیں کہا گر سینک سے نمایاں فائدہ سامنے نہ آئے تو بہتر ہے کہ کوئی اور دوا مثلاً سلیشیا یا سلفراونجی طاقت میں دے کر مرض کو قابو میں لائیں ور نہ بہتر ہے کہ کوئی اور دوا مثلاً سلیشیا یا سلفراونجی طاقت میں دے کر مرض کو قابو میں لائیں ور نہ بہتر ہے کہ سرجن کا مشورہ قبول کرلیا جائے۔ آغاز میں دے کر مرض کو قابو میں لائیں ور نہ بہتر ہے کہ سرجن کا مشورہ قبول کرلیا جائے۔ آغاز میں دے کر مرض کو قابو میں لائیں ور نہ بہتر ہے کہ سرجن کا مشورہ قبول کرلیا جائے۔ آغاز

میں اگر ہاتھ کٹوانے سے جان پی سکتی ہے تو دیر ہوجانے پر بعض دفعہ باز وبھی کٹوانا پڑتا ہے اور پھر بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ گینگرین جسم اور د ماغ کو متاثر نہ کرے گی۔ عام نا سوروں میں جو گہرے ہوں اور ہڈی کو بھی کھارہے ہوں تو آرسینک سے زیادہ کالی آیوڈ ائیڈ (Kali Iodide) یا آرسینک آیوڈ ائیڈ بہتر کام کرتی ہیں۔

آرسینک کی بیاریاں دن یارات کوبارہ بجے کے بعد شدید ہوجاتی ہیں۔رات کومرض میں اضافہ ہوجا تا ہے اور مریض خوف محسوس کرتا ہے اور اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا۔ تکلیف بہت بڑھ جائے تو کسی کی موجودگی بھی فائدہ نہیں دیتی۔ آرسینک کے مریض کے جسم میں جگہ جگہ سوزش کی علامات ملتی ہیں خواہ وہ ہیرونی ہوں یا اندرونی۔ آنکھ میں بھی آرسینک کے مریض کی سوزش کی علامات ملتی ہیں خواہ وہ ہیرونی ہوں یا اندرونی۔ آنکھ میں بھی آرسینک کے مریض کی سوزش بہت نمایاں ہوتی ہے جوساری آنکھ پراٹر انداز ہوتی ہے کیکن کالی کارب میں بیسوزش اوپر کے چھپرتک محدود رہتی ہے۔ایپس میں سوزش کے ساتھ آنکھ کے بنچ بھیلیھلی ورم پیدا ہو جاتی ہے۔

آ رسینک کے مریض کے چہرے پر بھی بعض دفعہ وقت سے پہلے بڑھا پے کے آثار ظاہر ہوجاتے ہیں۔ بیعلامت سارساپر یلا (Sarsaparilla) اور چینینم آرس (Chininum Ars) میں آرسینک کے مقابل پر بہت زیادہ یائی جاتی ہے۔

اگر پراسٹیٹ گلینڈز،گرد نے اور مثانے کی بیاریوں میں آرسینک کی علامات موجود ہول کین آرسینک اکیلی کافی نہ ہوتو فاسفورس اس کی مددگاردوا ثابت ہوتی ہے۔ دونوں کو یکے بعد دیگرے دینا بھی میرے تج بے مطابق بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ یہی نسخہ کینسر میں بھی بہت افاقہ کا موجب بنتا ہے۔ یہ نسخہ ایک ایسے مریض پر بھی استعمال کیا گیا جس کے متعلق ڈاکٹروں کا فیصلہ تھا کہ ایک ہفتے سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا۔ لیکن اسے ان دواؤں سے نمایاں فائدہ ہوا اور خدا تعالی کے فضل سے بعد ازاں وہ ایک سال کی مدت تک بغیر تکلیف کے زندہ رہا۔

آرسینک کی بے چینی بعض دفعہ پاگل بن میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ <u>خود کئی</u> کار جمان پیدا ہو جاتا ہے اور مریض اس وہم میں مبتلا ہوجاتا ہے کہ میری بخشش کے دن گزر چکے ہیں۔اگرمروجہطب کے ذریعہ ایسی مریضہ کی ماہواری کاعلاج کیا جائے جسے زیادہ خون آتا ہوتو اس کی بیاری بظاہر دب جاتی ہے مگر رحم کے اندرسٹر اند کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں اور مستقل بد بودار، لیس دار مادہ یا خون کے لوتھڑے نکلنے لگتے ہیں۔اسی طرح دیگر اخراجات کوبھی علاج کے ذریعہ بند کیا جائے تو بہت خطرنا ک اثر ات ظاہر ہوتے ہیں جوبعض اوقات ذہنی بیاریوں پر منتج ہو سکتے ہیں ۔سار ہےجسم میں دردیں اور بے چینی ہوتی ہے اورجسم میں زہر پلے مادے جمع ہونے لگتے ہیں۔جن کے اخراج کی کوئی صورت نہیں ہوتی اور گردوں پر بہت برااثر پڑنے لگتا ہے۔الیں صورت میں ضروری ہے کہ اخراجات کو دوبارہ جاری کیا جائے۔اس میں آرسینک ایک اہم دوا ہے۔ کالی آیوڈ ائیڈ اور آرسینک آیوڈ ائیڈ کو باری باری یا انتظے ملا کر دینا بھی مفید ہے۔علاوہ ازیں سلفراور پائروجینم 200 کوملا کردینارخم کے اکثر تعقینات اوران کے نتیج میں بخار یا ذہنی انتشار کو دور کرنے میں بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ آرسینک اور سکیل کار (Secale Car) (ارگٹ) بہت سی علامتوں میں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔سیکیل کار خون کے گہرے امراض میں استعال ہوتا ہے۔جس بیاری میں بھی کالے رنگ کا متعفّن خون خارج ہونے گلے اور سکیل کی نمایاں علامت یعنی شدید گرمی کا احساس موجود ہوتو یہ دوا بسااوقات تیر بہدف ثابت ہوتی ہے۔آ رسینک سے جوعلامات ملتی ہیںان میں بے چینی اور خون کے تعقبات شامل ہیں۔لیکن ایک امتیازی فرق بیہے کہ سکیل کار کا مریض شدیدگری محسوس کرتا ہے اور آ رسینک کا مریض سخت سردی کے احساس سے اپنے جسم کو ہروفت ڈھانیتا رہتا ہے اورآ گ کے یاس بیٹھنا پیند کرتا ہے۔ سیکیل کا مریض گرمی محسوس تو کرتا ہے مگراس کی اندرونی گرمی کوافاقہ بھی بیرونی گرمی پہنچانے سے ہوتا ہے۔اگر دباؤمحسوں ہوتو دباؤہی سے آ رام آتا ہے۔ سخت بد بوداراخراجات ،موت کا خوف اور گھونٹ گھونٹ یانی بینا۔ بیتصوریز ہن کو فوری طوریرآ رسینک کی طرف منتقل کرتی ہے۔

آ رسینک کی بیار یوں میں تکرار پائی جاتی ہے۔خاص معین مدت کے بعد مرض عود کر آتا ہے۔ چار، سات یا چودہ دن کے بعد خاص وقفوں میں مرض دہرایا جاتا ہے کیکن ان کے علاوہ بعض ایسے امراض جو بارباریلٹ آئیں مثلاً ملیریا وغیرہ ان میں بھی آرسینک بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ ملیریا کی روک تھام کے لئے بھی یہ بہترین دوا ہے کیکن اسے اونچی طاقت میں مثلاً ایک ہزاریا ایک لاکھ طاقت میں بخار کی علامتیں ظاہر ہونے سے پہلے ہی روک تھام کی خاطر دینا جا ہے۔ بخار کے دوران نہیں دینی جا ہے۔ ہاں اگر بخار کی علامتیں آرسینک کا مطالبہ کریں تو بخار کے حملوں کے درمیان جب پہلے بخار کا زورٹوٹ چکا ہویا ٹوٹ رہا ہوتو اس وقت آ رسینک بے دھڑک دی جاسکتی ہے۔ نیٹرم میور کا بھی ملیریا سے گہراتعلق ہے مگراس میں بھی یہی احتیاط لازم ہے جوآ رسینک کے متعلق بیان کی گئی ہے۔ ملیریا سے ستقل نجات اونچی طاقت میں آرنیکا کوبھی بڑی شہرت حاصل ہے اور خود میرے تجربے میں آرنیکا کی بیصلاحیت باربارہ ئی ہے۔ملیریا کے تعلق میں عام طور پر ہومیو پیتھک کتب میں جا ٹناپرزور دیا گیا ہے کیکن میرے تج بے میں بیاتنی کارآ مد ثابت نہیں ہوئی۔آ رسینک اورآ رنیکا دونوں اس سے بہت بہتر دوا ئیں ہیں اوراسی طرح ہرفتم کے بخار کی ابتدائی اعضاء شکنی کے وقت برائیونیا اور رسٹاکس 200 كوبارى بارى دينابهت مفيد ثابت ہواہے۔ بياصول بهرحال ہميشه پيش نظرر كھنا حاجة كه ملیریا کے چڑھتے بخار میں دوانہیں دینی۔ ہومیو پیتھی دواا گرمؤثر ہوگی تو پھر دوبارہ بخار ہوگا ہی نہیں یا اس کے دوسر رحملہ کی شدت پہلے سے کم ہوگی ۔اسی طرح اگر بخار کا وقت بدل جائے یعنی بعد میں آنے کی بجائے جلدی آجائے یا تاخیر سے ہوتو بشرطیکہ دونوں صورتوں میں بخار کا حملہ مدہم ہوتو یہ بھی دوا کے مؤثر ہونے کی علامت ہے۔اگر علاج کے دوران ان صورتوں میں ہے کوئی انژنمودار نہ ہوتو پھر یا علاج بدلیں یا مریض کوکسی اورمعالج کے سپر دکریں بعض دفعہ ایسے مریض کوایلوپیتھک ڈاکٹر سے علاج کا مشورہ بھی دینایٹے ہے تو حرج نہیں کیونکہ جان بچانا اولین فریضہ ہے۔

خشک دمیر میں جیسا کہ پہلے ذکر گزر چکا ہے آرسینک اچھا کا م کرتی ہے اوراس دمیر بھی جس کا تعلق دل کی کمزوری سے ہو۔ دل کی بیاریوں سے آرسینک کا ایک گہرا تعلق ہے۔ مریض کے لئے چلنا خصوصاً بلندی پر چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، چڑھتے وقت

آرسینک 100

بہت تکایف ہوتی ہے اور جلد جلد سانس پھو لنے لگتا ہے۔ اسی طرح ہوائی جہاز کا سفر بھی ایسے مریض کے لئے خطرنا کنہیں تو مشکل ضرور ہوتا ہے۔ اگر مریض کوسفر سے پہلے آرسینک باربار کھلا یا جائے اور سفر کے دوران بھی استعمال کے لئے دیا جائے تو جیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے۔ وضع حمل کے بعد بعض اوقات پیشاب بند ہوجاتا ہے۔ اس میں اگرچہ کاسٹیکم اولین دوا ہے۔ لیکن اس کی ناکامی کی صورت میں آرسینک کو موقع دینا چاہئے۔ گلا بیٹھنے میں بھی آرسینک بہت مفید ہے۔ کا نول کے اندرجلن اوردکھن کا احساس ہو، بد بودار مواد خارج ہو جس سے خراش پیدا ہوتی ہو، ناک میں بھی جلن ہو، آئھوں سے بھی جلن اور خراش پیدا کرنے والا یا نی بہت و آرسینک سے فائدہ ہوسکتا ہے۔

آ رسینک کی علامتوں میں مرطوب موسم میں، آدھی رات کے بعد، سردغذا کے استعمال اور سمندر کے کنارے جانے سے اضافہ ہوجا تا ہے۔ گرمی اور گرم مشروبات سے تکلیف میں کمی ہوتی ہے۔

> مددگاردوائیں: رسٹائس کاربوو بجے فاسفورس تھوجا دافع اثر دوائیں: او پیم کاربوو بجے چپائنا پہیپر سلف نکس وامیکا طاقت: 30 سے سی ۔ایم (CM) تک

25

آرسینک آئیوڈائیڈ یا (آرسینیکم آئیوڈیٹم)

ARESNICUM IODATUM

(Iodide of Arsenic)

آ رسینک آئیوڈ ائیڈ کا آ رسینک البم سے بہت گہراتعلق ہے۔آ رسینک آئیوڈ ائیڈ زخموں کے ناسور بننے اور گینگرین میں تبدیل ہونے کی بہترین روک تھام ہے۔ پھیپھڑوں کے نیسور بننے اور ہواکی نالی میں سوزش ہوتو یہ بہت موشر ہے۔آ رسینک آئیوڈ ائیڈ میں ہوتت ہے حصہ میں زخم اور ہواکی نالی میں سوزش ہوتو یہ بہت موشر ہے۔آ رسینک آئیوڈ ائیڈ میں ہوتتم کی بیاریاں پائی جاتی ہیں اور اس کی علامات کا عام آرسینک سے امتیاز بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے۔

آرسینک کا مرض بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔لین آئیوڈیٹم کا مریض بہت گرمی محسوں کرتا ہے۔اور تیز چلنے اور تیزی سے حرکت کرنے سے اس کی بے چینی کا اظہار ہوتا ہے۔ایسا بچہ جو بہت شرارتی اور پھر تیلا ہو قابو میں نہ آئے خوب کھائے چیئے لیکن دبلا پیلا ہو آئیوڈین کا مزاج رکھتا ہے۔ بہی مزاج آرسینک آئیوڈائیڈ میں بھی کسی حد تک دکھائی دیتا ہے۔اس دوا کے مریضوں میں تضادات ملتے ہیں۔ بھی مریض کی علامات آرسینک سے ملتی ہیں اور بھی آئیوڈین سے جو دومتضاد علامتوں والی دوائیں ہیں۔ بہت می دیگر علامتوں کو پیش نظر رکھ کراس دوا کی نشاند ہی کرنی پڑتی علامتوں کو پیش نظر رکھ کراس دوا کی نشاند ہی کرنی پڑتی سے۔

آ رسینک آئیوڈائیڈ بہت وسیع الاثر دوا ہے۔ اس کے تمام اخراجات کا ٹے اور حصلے والے ہوتے ہیں۔ جس مخرج سے بھی گزریں وہاں سرخی 'جلن اور سوزش پیدا کردیتے

ہیں۔ناک کی اندرونی سطح متورم اور سخت ہوجاتی ہے ٔ حلق اور کان کے درمیان سوزش کی وجہ سے بہرہ پن پیدا ہوجا تا ہے۔

آرسینک آئیوڈ ائیڈ چھیپھر وں کی ہرفتم کی تکلیفوں اور زخموں کے لئے مؤثر ثابت ہے اسی لئے اسے تپ دق میں بھی استعال کیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ مقدار میں بلغم کا اخراج ہوتا ہواور یہ بغم چھیپھر وں کے نچلے حصہ میں بنتا ہوسانس کی تکلیف اور کھانسی مزمن ہو جائے تو آرسینک آئیوڈ ائیڈ کوئییں بھولنا جائے۔

یہ لیوپس (Lupus) اور جلد کے کینسر میں بھی بہت مؤثر دوا ہے۔ اسی طرح رحم اور خصیۃ الرحم لیعنی اووری (Ovary) جس میں افزائش نسل کے لئے انڈے بنتے ہیں اس کے کینسر کواگر ٹھیک نہ بھی کر سکے تو فوری طور پر بڑھنے سے روکتی ہے۔ ڈاکٹر کینٹ کے نزدیک تو ہر کینسر کی بڑھوتی کی رفتار فوری طور پر روکنے کے لئے آرسینک آئیوڈ ائیڈ بہت مفید ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ ایسی صورت میں آرسینک آئیوڈ ائیڈ کے ساتھ بھی بوٹی کو استعال کروانا زیادہ مفید فابت ہوتا ہے۔

آ رسینک آ رئیوڈائیڈ مختلف قتم کے <u>ایگزیموں پر بھی</u> اچھا اثر رکھتی ہے۔ مثلاً ایسے ایگزیمے جن میں جلد بہت خشک ہواور بڑے بڑے چھلکے اتر تے ہوں جن کے پنچے سے زخمی اور چھلی ہوئی جلد ظاہر ہواور رطوبت نکلتی ہو۔

آرسینک آئیوڈ ائیڈ چنبل (Psorisis) کے علاج میں بھی کام آتی ہے۔ اس مرض میں دوائیں عموماً قتی آرام پہنچاتی ہیں بھی اس موتی ۔ اگر غدودوں سے بیاری باہر نکا لئے کے لئے دوائی دوادیں قو بہت سخت رقمل ہوتا ہے اور ساراجسم چنبل سے بھر جاتا ہے۔ جلدکوٹھیک کرنے کے لئے دوائی کے استعال سے بیاری دب کرکسی اور رنگ میں ظاہر ہوتی ہے۔ ابھی تک کوئی الیی دواسا منے ہیں آئی جودونوں شم کے اثر ات کوسنجال لے۔ ہاں سلفر اور سورائینم ایک ہزار طاقت میں باری باری دینے سے کسی حد تک فائدہ ہوتا ہے۔ ہائیڈروکوٹائل (Hydrocotyle) بھی اثر کرتی ہے۔ یہ بہت طاقتور دوا ہے جو کوڑھ میں بھی مفید ہے۔ آرسینک بھی سورک (Psoric) دواؤں میں طاقتور دوا ہے جو کوڑھ میں بھی مفید ہے۔ آرسینک بھی سورک (Psoric) دواؤں میں

شار ہوتی ہے جو اندرونی جھلیوں اور جلد کے درمیان اثر دکھاتی ہے۔ بعض دواؤں کا انتراپوں اور جلد سے تعلق رکھنے انتراپوں اور جلد سے تعلق رکھنے والی دواؤں میں سلفراور مرکری بہت نمایاں ہیں۔ آرسینک آئیوڈ ائیڈ کی سفلس کے مختلف مراحل میں بھی ضرورت پڑسکتی ہے۔

آ رسینک آئیوڈ ائیڈ میں سر کے پیچھے گدی میں درد اور کمر میں جلن کی علامات پائی جاتی ہیں۔ بائیں ٹانگ میں سردی کی لہر دوڑتی ہے اور سنسنا ہٹ ہوتی ہے۔ کلائی کی ہڑی میں کھتے ہوئے درد ہوتا ہے۔ آرسینک آئیوڈ ائیڈ کا مریض سردی محسوس کرتا ہے۔ اس کے باوجوداسے پسینہ بھی آتا ہے۔

اس کی تکالیف بڑھ جائیں تو متلی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ سخت پیاں گئی ہے مگر فاسفورس کی طرح پانی پیتے ہی تھوڑی در میں قے ہو جاتی ہے۔ معدے میں شدید در د ہوتا ہے جس میں کولوسنتھ کی طرح آگے جھکنے سے آرام آتا ہے، سخت سوزش پیدا کرنے والے اسہال جوسج کے وقت شروع ہوتے ہیں ،معدہ ہوا سے بھرار ہتا ہے ، بھوک بہت گئی ہے مگر کھانا جسم کونہیں لگتا۔

طاقت: 30 سے 200 تک

26

ا رسينيكم سلفيوريثم فليوم

ARSENICUM SULFURATUM FLAVUM

آرسینک سلف فلیوم عمو ماً برص میں کام آنے والی دوا ہے۔ یہ ہرتنم کی خارش، برص اور جلد پرآتشک کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے دانوں کے لئے بھی بہت مؤثر ہے۔ سینہ کے اندر سے چھن دار درد کے کوند ہے باہر کی طرف کیس نیز پیشانی میں دائیں طرف کان کے پیچھے چھن ہوتو آرسینک سلف فلیوم کی بینمایاں علامات ہیں۔ اس میں اکثر دردسوئی کی طرح چھن پیدا کرتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ تمام جسم میں چیونٹیال رینگنے کا پیدا کرتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ماتھی پایا جاتا ہے۔ گرمی کے احساس کے ساتھ ساتھ اخساس ہوتا ہے۔ دردیں بہت نبض تیز اور بے قاعدہ ہوجاتی ہے۔ چلنے یا دوڑ نے سے درد میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ دردیں بہت شدیداورنا قابل برداشت ہوتی ہیں۔

آ رسینک سلف فلیوم کا مریض بہت جلد غصہ میں آ جا تا ہے۔ صبح کے وقت اعظمے پر بے حد چڑ چڑا ہوتا ہے۔ سر میں چکر آتے ہیں جن میں دائیں طرف کرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ سر طفنڈا محسوس ہوتا ہے، سر علی ہوئی، سرخی مائل زر در طوبت نکلتی ہے، کا نول سے بھی بد بودار رطوبت بہتی ہے۔ نزلہ زکام ہوتو ناک سے بے حدمواد نکلتا ہے۔ نقابہت اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔

آ رسینک سلف فلیوم کی اصل شہرت جلدی امراض میں ہے۔ برص کے سفید داغوں میں بہت کثرت سے استعال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ چنبل اور کیل مہاسوں میں بہت کثرت سے استعال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں جلن اور سخت تکلیف ہو بھی مفید ثابت ہوئی ہے۔ ایسے زخم جومندمل نہ ہوں اوران میں جلن اور شخت تکلیف ہو تو آ رسینک سلف فلیوم بھی استعال کرنی جا ہے۔ اس کی علامات ضبح اور شام کو بڑھتی ہیں۔

آ رسینک سلف فلیوم مریض کھلی ہوا پیندنہیں کر تا اور اس کی تکلیفوں میں کھلی ہوا سے اضا فیہ ہو جاتا ہے۔

30 سے 200 تک

طاقت:

27 آ رم ٹرائی فلم

ARUM TRIPHYLLUM

(Indian Turnip)

آ رمٹرائی فلم ایک سبزی ہے تیار کی جانے والی دوا ہے جو کدواور شلجم کے مشابہ ہوتی ہےاور جنگلوں میں کثرت ہے اگتی ہے۔اس میں شدیدخراش اور سنسناہٹ پیدا کرنے والا زہر یا یا جا تا ہے۔جسم کےکسی حصہ سے یہذرانجھی حجھو جائے تو وہاں بے انتہا سنسناہٹ ہونے لگتی ہے۔اکثر بہ بات تجربہ میں آئی ہے کہ ناک کے اندریا ناک کی نوک پر شدید سنسنا ہے کا یہ مؤثر علاج ہے۔ ناک کی اندرونی خارش بسااوقات نزلے پر منتج ہوجاتی ہے۔ایسے بچے جو ہروقت ناک کریدیں اوراندرونی جھلیوں کوزخی کرلیں ان کے لئے بھی اس دوا کویا در کھنا جا ہئے۔ نزلاتی تکلیفوں کے دوران اگر آئکھوں میں خارش ہواور یانی بہے، اوپر کے پیوٹوں میں لرزہ ہوتو آ رمٹرائی فلم سے فائدہ ہوسکتا ہے۔اس کا نزلہ بہت شدید ہوتا ہےاورمسلسل بہہ بہہ کر د ماغ کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ناک سے بے حدیانی بہتا ہے اور سخت خارش ہوتی ہے۔ گلے میں بیہ خارش اورسنسناہٹ لمیے صرحہ تک رہے تو فالجی اثر ات ظاہر ہونے لگتے ہیں اور سنسناہٹ کی بجائے بے حسی پیدا ہوجاتی ہے۔اس کی فالجی علامات بعض دفعہ گلے کے نگلنے والے یا گھونٹ بھرنے والے عضلات میں ظاہر ہوتی ہیں اور خطرہ رہتا ہے کہ ایبا مریض جب لقمہ لے تو لقمہ غلط نالی میں نہ داخل ہوجائے یا گلے کے اندر ہی اٹکانہ رہ جائے۔اسی طرح وہ لوگ جویانی پینے میں جلدی کرتے ہیں اگر آ رمٹرائی فلم کے مریض ہوں تو خطرہ ہے کہ یانی معدے میں جانے کی بجائے اوپر ناک کی نالی میں چڑھ جائے۔ گلے کے غدود متورم ہو جاتے ہیں۔منہ اور حلق میں گھٹن، کیاین، دکھن اور

جلن کا احساس ہوتا ہے، زبان پرسرخی اور دکھن کے علاوہ جلن دار سنسنا ہے بھی پائی جاتی ہے۔ اس تکلیف کوعموماً Tongue کہا جاتا ہے۔ منہ میں زخمول اور چھالول کی وجہ سے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ پانی بینا بھی دو بھر ہو جاتی ہے۔ اس تکلیف میں آ رم ٹرائی فلم غیر معمولی اثر دکھانے والی دوا ہے۔ اس میں آ واز کا زیر و بم بدلتا رہتا ہے، زیادہ بولنے اور سردی کی وجہ سے آ واز بیٹھ جاتی ہے اور بھی بھی اچا نک اونچی بھی ہوجاتی ہے۔

مریض کو بھوک نہیں لگتی مگر بعض دفعہ سر در دکی وجہ سے کھانا پڑتا ہے جسے کھانے سے آرام ملتا ہے۔ اسہال ٹائیفائیڈ کے اسہال سے مشابہ ہوتے ہیں۔

پیپوٹ کے دکھتے ہیں۔اندرونی جھلیوں میں سنسناہ ٹی کی وجہ سے یا تھجلی ہوگی یاوہ دکھتے گئیں گی۔اگراس کا بروقت علاج نہ ہوتو اندرونی اعضا میں فالجی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں مثلاً انٹڑیوں کی حرکت اگر بالکل بندنہ ہوتو کمزور ضرور پڑجاتی ہے۔ یہ دوا عام طور پر چہرے،سراورناک کے بائیں حصہ پر زیا دہ اثر انداز ہوتی ہے۔ چھاتی کی تکلیفوں کے دوران پیشا ب کم مقدار میں آتا ہے۔اگراس دوا کے استعال سے افاقہ ہوتو پیشا ب بہت کھل کر آنے لگتا ہے۔ حکسیمیم میں مریض کا پیشا ب عموماً کھلا اور بے رنگ ہوتا ہے۔ آرم ٹرائی فلم میں پیشاب عموماً تھوڑ ااور رنگ دار ہوگا۔ جب بیاثر دکھائے تب پیشا ب بہت کھل جاتا ہے اور بے رنگ ہوجاتا ہے۔ جلد پر خسرے کی طرح دانے نکلتے ہیں۔ جلد پر خسرے کی طرح دانے تکلتے ہیں۔ جلد پر خسرے گئی ہوجاتی ہے۔ اور تھوڑی سی خراش سے ہی خون رسنے لگتا ہے۔ مریض کا سر در دگرم مشروب پینے یا گرم کیڑ الیسٹنے سے بڑھ جاتا ہے۔

دافع اثر دوائيں: ایسیئک ایسٹر پلسٹیلا طاقت: 30 28

ابيافيثيرا

ASAFOETIDA

(ہنگ)

مینگ کوعموماً گرم مسالے کے طور پر یا قوت ِ ہاضمہ کو بڑھانے کے لئے استعال کیا جاتا ہے۔ اس سے تیار کردہ ہومیو پیتھک دوا معدہ اور خوراک کی نالی کے نشخ میں مفید ہے۔ اس کی سب سے نمایاں علامت سرکاس ہونا ہے۔ سن ہونے کا حساس بسااوقات سرکی بیرونی جلد تک ہی محدودر ہتا ہے لیکن بھی سرکے اندرد ماغ میں بھی محسوس ہوتا ہے اور دونوں صورتوں میں کچھ درد کا احساس بھی پایا جاتا ہے۔ ہائیڈروسائینک ایسڈ، ٹیرینٹولا ہسپانیہ اور کوئیم میں بھی سن جونے کا احساس عام ہے۔ ایسافیٹیڈا میں مریض بہت زود حس ہوتا ہے۔ رات کو تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ کا احساس عام ہے۔ ایسافیٹیڈ امیں مریض بہت زود حس ہوتا ہے۔ رات کو تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ کا احساس عام ہے۔ ایسافیٹیڈ امیں مریض بہت زود حس ہوتا ہے۔ رات کو تکلیف بڑھ

مڈیوں کے بھر بھراہونے کی خطرناک بیاری بھی اس کے دائرہ میں شامل ہے۔ چنانچی^{سفلس} کے مریضوں کی طرح ناک کی اندرونی مڈیوں کے گلنے سڑنے کے نتیجہ میں دائمی خطرناک بد بودارنز لہ ملتاہے۔

> دافع انژ دوائیں: چاپئا،مرکری طاقت: 30

آ رم میث

29 آرم میٹیلیکم آرم

AURUM METALLICUM

آ رم میٹیلیکم کاسب سے زیاد ہ تعلق مریض کے ذہنی رجحانات سے ہے۔اس کی اکثر یماریاں بھی ذہنی تکالیف کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہیں۔ ذہن پر پڑنے والے بداثرات جسمانی بیاریوں میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔اس دوامیں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ ایسام یض اپنی ذات کا اعتماد کھونے لگتا ہے۔ ہروقت اپنے آپ کوملامت کرتا ہے۔خود کو بے کاراور نا کارہ وجود سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو زمین پر بوجھ تصور کرتا ہے۔ جب ایسے خیالات بڑھ جاتے ہیں تو آخر کار خود کشی کے رجحان پر منتج ہوتے ہیں اور مریض واقعتاً خود کشی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ آ رم میٹیلیکم کامریض بظاہرا بنی ذات میں گم ، مایوس اوریژ مردہ دکھائی دیتا ہے کین جب اسے کسی بات پر غصہ دلا دیا جائے تو اس کی اپنی جان لینے کی خواہش دوسروں کی طرف منتقل ہو جاتی ہےاوروہ قتل تک کرنے پر آ مادہ ہوجا تا ہے۔ جب اپنی ذات اور ماحول سے بریگا نگی اور دنیا کی بدسلو کی كااحساس دبكراندروني وبني ناسوربن جاتا ہے تو دبا ہوانفرت كاجذبه اجا تك الجرآتا ہے۔عام طور یراس بے چینی اور تکلیف کا رخ اس کی اپنی ذات کی طرف ہی رہتا ہے کیکن اگراسے کوئی بہت تنگ کرے تواس کا انتقامی جذبہ بھڑک اٹھتا ہے اور پھراییا مریض انتہائی تشدد براتر آتا ہے۔اس کئے آرم میٹیلیکم کے مریضوں سے چھیڑ خانی کرنے سے گریز کرنا جائے۔اسی طرح بلاوجہ انہیں بحثوں میں الجھانانہیں جا ہئے۔آرم میٹ میں پاگل بن کارخ جذبات سے ذہن کی طرف ہے۔ اگر مریض کی انا کچلی جائے، زندگی کی نا کامیاں اس پر چھا جائیں اور وہ اپنے آپ کو جذباتی طور نا کام ونا مراد محسوس کرے تو یہ جذباتی اذبت اور عذاب کی کیفیت رفتہ رفتہ مستقل پاگل پن میں تبدیل ہوسکتی ہے ورنہ شروع شروع میں وہ ان تمام کیفیات کے باوجود سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری نہیں ہوتا اور حقائق کا موازنہ کرسکتا ہے۔

آرم میٹیلیکم میں جسمانی لحاظ سے سب سے زیادہ جگر متاثر ہوتا ہے اور جگر کی خرابی ہمیشہ دل کی تکلیف کے ساتھ منسلک ہوجاتی ہے۔ دل کے عضلات کمزور پڑجاتے ہیں اور جگر جواب دے جاتا ہے۔ ایسے مریض میں بیدونوں بہاریاں اکٹھی ملتی ہیں۔ دل کی اندرونی جھلی میں سوزش کے نتیجہ میں دل میں دردمحسوں ہوتا ہے۔ دل پھیلنے لگتا ہے اور پھیپھڑوں میں پانی بھر حاتا ہے۔

آ رم میٹ میں بائی کی دردیں بھی یائی جاتی ہیں۔جوڑوں میںسوزش ہوجاتی ہے۔ مڈیوں کے اردگر دیائی جانے والی باریک جھلی میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے مڈیاں متاثر ہوتی ہیںاوربعض اوقات بھر بھری ہوجاتی ہیں۔کرکری ہڈیوں یعنی کیک دار ہڈیوں میں بھی کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ مڈیوں کے ریشوں میں شختی پیدا ہو جاتی ہے۔اس لحاظ سے یہ ارجنٹم نائٹر کم سے مشابہ ہے۔ ہڑیوں میں چاقو لگنے کی طرح کا درد ہوتا ہے۔ بعض اوقات جوڑوں کو حرکت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے کندھے کا جوڑ ملتا ہی نہیں۔ اسے عموماً Frozen-Shoulder کہتے ہیں۔ بسااوقات چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی جوڑ ہلانا جلانا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر بائی کی دردوں کی وجہ سے جوڑ حرکت نہ کرے تو آ رم میٹ بہترین دواہے۔ آ رم میٹیلیم میں خون کی وریدیں موٹی ہونے گئی ہیں۔ان میں خون کے لوتھڑے بن جاتے ہیں اور خون کی رگوں میں دھڑ کن اور تپکن پیدا ہوتی ہے۔خون کے سرخ ذرات جوڑوں میں جمع ہوجاتے ہیں جس سے جوڑوں کی تکلیفیں پیدا ہوجاتی ہیں۔دل اور جگر کی خرابی کی وجہ سے جسم کے کچھ حصے اور جسم کی ہر جگہ کی غدودیں پھول جاتی ہیں۔ عورتوں میں ٹانگوں اور ٹخنوں کے گر دسوجن نمایاں ہوتی ہے کیونکہ حمل کے دوران انہیں بہت بوجھ اٹھانا پڑتا ہے اور کمزوری کا احساس باقی رہ جاتا ہے۔ اس لئے ٹائلوں اور

ٹخنوں پرسب سے پہلے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔الیں حالت میں اور بھی کئی دوائیں کام آ سکتی ہیں مگران کی معین علامتیں آرم میٹیلیکم سے الگ موجود ہونا ضروری ہے۔

آ رم میٹ میں شدیدسر درد ہوتا ہے جس کے ساتھ بیاحساس ہوتا ہے کہ گویا ہوا چل رہی ہے۔سر در د کے دوران چہرہ سوج جاتا ہے اور کھیاؤ کی وجہ سے چہرے پر چکسی آ جاتی ہے۔ آ رم کے مریض میں سرکے بال جھڑنے کار جحان بھی ملتا ہے جو گنجے بین پر منتج ہو جا تا ہے۔ بال جھڑنے میں ایسڈ فاس کو بھی بہت شہرت حاصل ہے۔ اگر کسی معین دوا کاعلم نہ ہو سكے تو عمومی طوریرایلوپیشیا (Alopecia) كانسخه [بیسی کینیم 200 + نیٹرم میور 30+ ٹیوكریم (Teucrium Marum) 30 + پکرک ایسڈ 30] بہت مفید ہے مگر یا درہے کہ ایلو پیشیا چھوٹے چھوٹے گول دائروں میں بال جھڑنے کی بیاری کو کہتے ہیں کین اس نسخے کو میں نے عام گنجے بین پر بھی کامیا بی سے استعال کر کے دیکھا ہے، شرط پیہے کہ چبرے پر بھی اس بیاری سے دھدری جیسے نشان ظاہر ہوں۔اس وقت پیانسخہ بہترین ثابت ہوتا ہے۔ دیگر مزاجی علامتیں موجود ہوں تو گریفائٹس اور فاسفورس بھی گنجے بن میں بہت احیمااثر دکھاتے ہیں۔ایک عمومی نسخہ نیٹرم میوراور بیسی کینیم دوسوطافت میں بھی آ زمودہ ہے۔اس کے گنجے بن کا تعلق زیادہ تر سفلسی مادوں سے ہوتا ہے۔ کتابوں میں زیر نظر دوا آرم میٹیلیکم کوبھی سنجے بن کے بہترین علاج کے طور پر بتلایا گیا ہے لیکن اگر مریض آرم میٹیلیکم کا ہوتو پیا تر دکھائے گاور نہیں۔اس کے گنچے بین کاتعلق زیادہ تر دیے ہوئے شفلسی مادوں سے ہوتا ہے۔

آ رم میٹ کے اثر کومزید بڑھانے کے لئے سیفیلینم ایک لا کھ طاقت میں دین جاہے اور دومہینے کے بعد دہرانی جا ہے۔اگر فرق نہ پڑے تو آ رم یٹیلیکم دیں اوراس کے بعد نیٹرم میور اور بیسی لینیم ملاکر دیں۔

آ رم میٹ میں روشنی سے بہت زود حسی پائی جاتی ہے۔ گیس لائٹ میں خصوصیت سے آ نکھ کو تکلیف ہوتی ہے۔ آ رم میٹ میں

ایک علامت میکھی ہوئی ہے کہاس میں چاند کی روشنی سے سکون ملتا ہے۔ میر نے زدیک بیعام سی بات ہے کوئی راہنماعلامت نہیں۔

آ رم میٹ میں آئکھوں کے سامنے ستارے ٹوٹے دکھائی دیتے ہیں۔کلکیریا میں چیکدارستارے نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں جبکہ آرم میٹ میں اوپر سے پنچے کی طرف یہ یہاں میں مدددیتی ہے۔

بعض دفعہ آ تکھیں پھول کر باہر آ جاتی ہیں۔ ایلو پیتھی میں اس کا علاج عموماً آپریشن سے کیا جاتا ہے۔ اس بیاری کی گئی وجو ہات ہوسکتی ہیں۔ غدودوں کی خرابیاں، گھلیاں یا سلی مادوں کی موجودگی سے آ نکھ کے ڈھیلے بھول جاتے ہیں۔ آ رم میٹ میں کوئی معین وجہ تو نہیں بنائی گئی لیکن اسے ایسی بھولی ہوئی آ نکھ کے علاج میں مفید بتایا گیا ہے۔ میں نے نیٹر م میور اور بیسی لینیم کوبھی اس میں بہت مفید پایا ہے۔ اگر آ نکھ میں خون کا دباؤ زیادہ ہوتو بیلا ڈونا اور آ ر زیکا بیسی لینیم کوبھی اس میں بہت مفید پایا ہے۔ اگر آ نکھ میں خون کا دباؤ زیادہ ہوتو بیلا ڈونا اور آ ر زیکا بھی ساتھ ملا کرد ینا چاہئے۔ سب سے اہم بات یہ پیش نظر رکھنی چاہئے کہ مریض کے مزاج کو تبجھ کردو آشخیص کی جائے۔ ہر مریض کا کوئی نہ کوئی خاص نسخہ ہے جو اس کے مزاج اور روز مرہ کے رجی نات سے تعلق رکھتا ہے، وہ معلوم کرنا چاہئے لیکن آگر بہت سی علامتیں گڈ مڈنظر آ نمیں اور تشخیص نہ ہوسکت تو اسے بہت مفید پایا ہے۔

آرم میٹ کان کے زخموں میں بھی مفید ہے۔ کان کی بیرونی ہڈیوں سے تکلیف شروع ہوکر کان کے اندر منتقل ہو جاتی ہے اور باریک ہڈیوں کے جال کو متاثر کرتی ہے، جس سے کان کے اندر تعفن پیدا ہوکر بد بودار مواد خارج ہونے لگتا ہے۔

آرم میٹ میں ناک کے نزلے مزمن ہوتے ہیں اوران کا بلغمی جھلیوں جسے تعلق نہیں ہوتا بلکہ ہڈیوں جسے تعلق نہیں ہوتا ہے۔ نیٹرم میور کا تعلق ناک کی جھلیوں سے ہوتا ہے، ہڈیوں سے نہیں۔ اگر نزلہ میں نیٹرم میور دیا جائے تو ابتدا میں علامات شدت اختیار کر جاتی ہے اور ناک سے بہت یانی بہتا ہے کیکن جب ٹھیک ہوجائے تو کوئی علامت بھی باقی نہیں رہتی۔

ہومیو پیتھک طریقہ علاج میں آ رم میٹ کا پرانے دیے ہوئے سفلس سے جوتعلق بتایا جاتا ہے اس کی تصدیق میں ایلو پیتھک محققین کے سامنے نئے شواہد آئے ہیں۔ امریکہ میں جب بعض ایڈز کے مریض زیادہ خطرناک صورت اختیار کر گئے توان میں سفلس کی علامتیں بھی خلام ہوگئیں جو پہلے قطعاً موجود نہیں تھیں۔ مزید چھان بین پریہانکشاف ہوا کہ ایسے مریضوں کے آباء واجداد میں سے بعض کو بینی طور پر سفلس ہوا تھا جواس وقت کے علاج سے بظاہر ٹھیک ہو گیا تھا۔

آ رم میٹ کی ایک علامت ہے کہ ناک کے اوپر نیلے رنگ کی وریدوں کا جال بن جا تا ہے اوران میں خون جمنے کار جحان بھی ہوتا ہے جیسے ویر کی کوزوریدوں (Vericose Veins) کا مرض ہو۔ آ رم میٹ میں ناک کے علاوہ ہونٹ بھی نیلے ہوجاتے ہیں۔

آرم میٹ کی جگر کی تکلیفوں میں جگر پھر کی طرح سخت ہوجا تا ہے۔ گھلیاں ہی بن جاتی ہیں۔ (Inguinal Hernia) ہرنیا میں بھی یہ مفید دوا ہے۔ رحم کی سختی اور سوزش میں مفید ہے۔ چیف کا خون دہر سے آتا ہے اور مقدار میں کم ہوتا ہے۔ یہ علامت نیٹر م میور میں بھی پائی جاتی سے لیکن فرق یہ ہے کہ نیٹر م میور میں حیف کے دنوں میں کمر میں شدید در دہوتا ہے اور شادی شدہ عور توں کی بجائے اکثر کنواری بچیوں میں یہ تکلیف زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایسی علامات میں بسااوقات نیٹر م میور کی صرف ایک ہی خوراک اثر دکھاتی ہے۔ آرم میٹ میں کسی مخصوص در دکی علامت نہیں ملتی لیکن ادھر ادھر پھر نے والی در دیں رہتی ہیں جو کسی خاص مقام کی نشاند ہی نہیں کرتیں۔

آ رم میٹ کی اکثر علامتیں ارجنٹم میٹیلیکم سے ملتی ہیں لیکن بعض فرق کرنے والی علامتیں بھی ہیں۔ ارجنٹم میٹ میں جسم کی نکلیفوں کے دوران نرم اور آ ہستہ حرکت سے آ رام آتا ہے جبکہ آرم میٹ میں ایسی حرکت سے نکلیف ہوتی ہے خصوصاً تیز چلنے سے دل پرخون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور دل میں جکڑن اور گھٹن کا احساس ہوتا ہے لیکن ارجنٹم میں اس سے بالکل برعکس کیفیت ہوتی ہے۔

آ رم میث

مددگار دوائیں: آرم میور۔اییافیٹیڈا۔کالی آئیوڈائیڈ۔فاسفورس دافع اثر دوائیں: بیلاڈونا۔کیوپرم۔ چائنا طافت: 30سے 1000 تک آ رم ميور 117

30

آ رم میور AURUM MURIATICUM

آرم میورسونے کے نمک سے تیار کی جانے والی دواہے۔اس کی اکثر تکلیفیں دل کے گرد گھومتی ہیں اور آرمیٹیلیکم کی طرح اس میں جگراور دل کی بیاریاں اکٹھا حملہ کرتی ہیں۔ پیشاب میں بوریا بھی آتا ہے۔ یہ دوا غدودوں کی بیاریوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ چنانچہ اسے غدودوں کے کینسر میں بھی مفید بتایا گیا ہے۔اگر اس کی علامتیں موجود ہوں تو یہ دوا خطرناک کینسر میں بھی شفا بخش ثابت ہوتی ہے۔

آ رم میور کی خاص علامت جلن دار در دیں ہیں۔جسم میں جہاں کہیں بھی در دہوگا وہاں جلن پائی جائے گی۔اس کی تکلیفیں مختد ہے بھیگے ہوئے موسم میں آ رام پاتی ہیں جبکہ بھیگا ہوا گرم موسم آ رم میور کی تکلیفوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آ رم میسیلیکم کی طرح اس میں بھی خود ششی کا رجحان پایا جاتا ہے۔ لیکن مریض اپنی ذات کی تنہائی میں قید ہونے کی بجائے بدمزاج ، چڑ چڑا اور جھگڑا لوہوجا تا ہے۔

آرم میور کی تکلیفوں میں دھڑکن پائی جاتی ہے۔ اگر آنکھوں میں آتشک (Syphilis)
سے مشابہ علامتیں پائی جائیں لیعنی ہڑیاں گلنے اور کھو کھلی ہونے کار جمان ہوتواس میں مفید ہے۔
آرم میور کے مریضوں کی نظر مصنوعی روشنی میں کمزور ہوجاتی ہے۔ اگر ویسے نظر بالکل ٹھیک ہولیکن
رات کے وقت روشنیوں میں نمایاں کمزوری ہوتو آرم میوراسے دور کرنے کے لئے اچھی دوا ہے۔
آرم میور میں موسیقی سننے سے تکلیفوں کو آرام ملتا ہے۔ اس علامت کا تعلق کا نوں
سے ہے۔ کان کی تکلیفوں کو موسیقی سے آرام آئے تو پھر یہ دوا مفید ہوگی۔ رات کو

کان کے پیچھے جلن اور خارش ہوتی ہے۔ نیزییناک کی تکلیفوں اور پرانے نزلوں میں بھی مفید دواہے۔

آ رم میور میں ناک کے جمے ہوئے مواد کوا کھیڑنے کی کوشش کریں تو خون نکلنے لگتا ہے۔ زردی مائل سبز مواد خارج ہوتا ہے۔ نتھنوں کے کناروں پرلیوپس (Lupus) ہوجائے تواس میں آ رم میور کومفید بتایا گیا ہے۔

آرم میور میں اجابت سبزی مائل یا مٹیا لے رنگ کی ہوتی ہے۔ بیعلامت جگر کی خرابی کی نشاندہی کرتی ہے۔ اسہال رات کو نشاندہی کرتی ہے۔ اسہال رات کو برختے ہیں۔ پیٹاب بھی رات کو زیادہ آتا ہے۔ بعض اوقات رات کو بستر میں پیٹاب نکل جاتا ہے۔منہ سے رالیں بہتی رہتی ہیں۔

آرم میور رحم کے بڑھ جانے اوراس کی تخی میں خصوصاً رحم کی گردن کی تخی میں بہت مفید دوا ہے۔ رحم کی گردن کی تکلیفوں میں کار بوانینیمیلس، ٹیرنٹولا ہسپانیہ اور لیبس البس (Lapis Albus) بھی بہت مفید ہیں۔ اگر ذہنی بیجان کی وجہ سے نینداڑ جائے تو اور دواو ک کے علاوہ آرم میور بھی کام آسکتی ہے بشرطیکہ جسم میں جگہ جگہ دھڑ کنیں پائی جا کیں۔ ایسے مریض کوتشد د آمیز یاغم ناک خواب نظر آئے ہیں۔ مریض عموماً پنی بیاری کی کیفیت کے مطابق خواب دکھر آئے ہیں۔ مریض عموماً پنی بیاری کی کیفیت کے مطابق خواب کوشد د کھتا ہے۔ اگر تشد دوالے خواب نظر آئی میں تو اس کا مطلب ہے کہ بیاری خطر ناک حد تک پہنچ کی ہے۔ اگر تم کی خوابیں آتی ہیں تو مرض ابھی ابتدائی حالت میں ہے اور نسبتاً جلدا فاقہ ہونے کا امکان ہے۔ اگر تم می خوابیں آتی ہیں تو مرض ابھی ابتدائی حالت میں ہو میو بیتے آرم میور کو پلسٹیلا اور کالی سلف کے مشابہ دوا سیجھتے ہیں لیکن در حقیقت ان میں بہت فرق ہے۔

حمل کے بالکل ابتدائی ایام میں بلکہ پہلے دن شک پڑتے ہی آ رم میور CM ایک خوراک دینے سے خدا کے فضل سے اکثر بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اگر زیادہ دن اوپر چڑھ جائیں تو پھریہ دوا بے اثر ہو جاتی ہیں۔ بیٹا ہونے کے معاملہ کو قاعدہ کلیہ ہرگز نہیں بنایا جاسکتا۔میرے علم میں ایسی عورتیں بھی ہیں جنہوں نے دن چڑھتے ہی آ رم میور CM کی خوراک کھائی تھی مگراس حمل میں بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ ہاں دوسر ہے حمل میں بیٹا پیدا ہوا۔ پس بیٹی اور بیٹے کے معاملہ میں کوئی قاعدہ کلیے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس دوا کے اثر کا میں نے بہت سے مریضوں میں بغور مطالعہ کیا ہے اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ بیدوا کھانے سے بعض دفعہ کھہرتا ہی نہیں لیکن اگر حمل گھہر جائے تو غالبًا 80 فیصد یا اس سے زائد حاملہ عور توں کے بیٹا پیدا ہوگا۔ میرا بیہ مشاہدہ صرف ان مریضوں کے تعلق میں نہیں جن کو میں براہ راست خود دوا دیتا ہوں بلکہ اب تو اس دوا کی شہرت عام ہو چکی ہے اور ہرسال مجھے بیسیوں ایسے خط ملتے ہیں جن میں اس کے غیر معمولی اثر کا ذکر ہوتا ہے۔ مثلًا لا ہور سے ایک خط میں ایک خاتون نے بیکھا کہ میری دیورانی ، جھائی اور خود میرے دوائی بیٹا ہیں تھا۔ ہم تیوں نے کتاب میں مندرج ہدایت کے مطابق بینسخا ستعال کیا اور خدا کے فضل سے نتیوں کے بیٹے ہی پیدا ہوئے۔

طاقت: 30 سے CM تک

پپڻييا 121

31

بيلشيا

BAPTISIA

پیٹشیاروزمرہ کی تکلیفوں میں کام آنے والی بہت معروف اور مجرب دوا ہے۔اس کا تعلق تعفّنات سے ہے۔اگرانتر یوں میں بہت زیادہ تعفن پایا جائے خصوصاً ٹائیفا ئیڈ کی بھاری میں انتہائی خطرناک بدیو ہوتو بیٹشیا سے بہتر اور کوئی دوا میں انتہائی خطرناک بدیو ہوتو بیٹشیا سے بہتر اور کوئی دوا نہیں ہوتے ،معمولی یا نہیں ہوتے ،معمولی یا درجے کے لئی کی طرح کے اسہال ہوتے ہیں جن میں شدید بدیوہوتی ہے۔

بیپشیا گلے کی خرابیوں میں بھی بہت مفید ہے۔ گلامتعفن بیاریوں کی وجہ سے سخت متاثر ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ اس کے ساتھ در ذہیں ہوتا جس کی وجہ سے مریض کو گلے کی بیاری کی خطرناک صورت کا احساس نہیں ہوتا لیکن گلے کے غدود لینی ٹانسلز (Tonsils) کے اندر درد کی علامات ملتی ہیں۔ ہاں اس کے اردگر دکے ریشوں میں در ذہیں ہوتا جو گلے کی عام خرابیوں میں ضرور پایا جاتا ہے۔ اگر گلے کی تکلیف میں درد نہ بھی ہولیکن گلامتعفن ہوتو اس میں پیشیا بہت مؤثر دوا ہے۔

خون میں زہر پھیل جائے اور رحم یا جسم کے کسی دوسرے عضو میں زخم متعفن (Septic) ہوں تو ان میں بھی بیٹیشیا بہت اچھی ہے لیکن سلفر 200 اور پائیر وجینم 200 ملا کر دی جائے تو بیسب سے اچھا علاج ہے۔ ہاں بیٹیشیا کی علامتیں ہوں تو ان دونوں دواؤں کی مددگار کے طور پراسے 30 طاقت میں ساتھ دیا جائے تو سونے پر سہا گے کا کام کرے گی۔

ٹائیفائیڈ کی صورت میں جب پیٹشیا کی علامتیں ہوں تو پیٹشیالاز می دوابن جاتی ہے لیکن اس کی مددگار کے طور پرٹائیفائیڈ پنم 200 اور پائیر وجینم 200 ملا کر اس کے اثر کو اور بھی تیز کر دیتی ہیں۔ ٹائیفائیڈ میں پیٹ کا تناؤ بخار کی نسبت سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ساراجہم کھل کرختم ہور ہا ہوتا ہے جبکہ پیٹ پیٹشیا کی علامات موجود ہوں تا ہے جبکہ پیٹ پیٹشیا کی علامات موجود ہوں تو اس کے ساتھ ٹائیفائیڈ پنم اور پائیروجینم حسب ذیل طریق پر استعمال کرانی چا ہے:۔ جب تک بخار ٹوٹ کر درجہ حرارت ناریل نہ ہوجائے یعنی نہ شنج بخار ہو نہ رات کو بخار ہواس وقت تک ٹائیفائیڈ پنم اور پائیروجینم دن میں تین دفعہ اور بیٹشیا 30 ، پانچ چھود فعہ با قاعد گی سے دیں۔ جب درجہ حرارت بالکل ناریل ہو چکا ہوتو پھر کم سے کم مزید ایک ہفتہ تک پائیروجینم اور ٹائیفائیڈ پنم روزانہ ایک دفعہ اور بیٹشیا دن میں تین دفعہ سے تیسرے ہفتہ پائیروجینم اور ٹائیفائیڈ پنم ہفتہ میں دود فعہ اور بیٹشیا حسب سابق دن میں تین دفعہ دیتے چلے جائیں۔اگر پورے ایس دن بیا حقیاط برتی جائے تو اللہ کے فضل سے ٹائیفائیڈ کے اعادے کا کوئی اخمال خبیس دن یہ احتیاط برتی جائے تو اللہ کے فضل سے ٹائیفائیڈ کے اعادے کا کوئی اخمال خبیس رہے گا اور اس کے کوئی باتی ماندہ براثر ات بھی نہیں ہوں گے۔

اگر بپیشیا کی علامتیں نہ ہوں اور مریض مائل بقبض ہوتو بپیشیا کی بجائے اسی طریق پر کالی فاس اور فیرم فاس 6x میں ملا کر دیں اور ٹائیفا ئیڈینم اور پائیروجینم والانسخہ مٰدکورہ بالا ہدایت کےمطابق ساتھ دیتے رہے۔

کسی ڈاکٹر نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آ دمی ٹائیفائیڈ بخار کے بعد نابینا ہوگیالیکن جب وہ کسی دوا کے نتیجہ میں دوبارہ بخار میں مبتلا ہوگیا تواس کی بصارت واپس آ گئی۔ ہومیو پیتھی میں ایسے محیرالعقول واقعات شاذ کے طور پر ہی سہی مگر مشاہدہ میں ضرور آتے رہتے ہیں۔ حالا نکہ ایلو پیتھک ماہرین اعصاب کا دعویٰ ہے کہ اعصاب ایک دفعہ مردہ ہو جا ئیں تو ان کو از سرنو زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہر حال یہ بات مسلم ہے کہ ٹائیفا ئید بہت خطرناک بیاری ہے۔ ٹائیفائیڈ کے بدائر ات د ماغ پر ظاہر ہوں تو پاگل کردیتے ہیں اور ایسا یا گل پن عموماً عمر کھر کا روگ بن جاتا ہے۔ ایسے مریض میں سٹرامونیم اور

ہائیوس کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ بیدونوں دوائیں ٹائیفائیڈ میں بھی مفید ہیں۔ان سے کمل شفا تونہیں ہوتی لیکن علامات قدر بےزم ہوجاتی ہیں۔

بیپیشیا دانتوں کے لئے بھی مفید دواہے۔ دانت اور مسوڑ ھے خراب ہوں، بد بودار پیپ بننے لگے اور مسوڑ ھے دانت جھوڑ دیں تو بیپشیا بھی دوا ہوسکتی ہے۔

بیشتیا کی ایک علامت ہے ہے کہ مریض غنودگی اور نیم بے ہوشی کی کیفیت میں رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اعضاء الگ الگ ہوگئے ہیں۔ اس کی شخصیت اعضاء میں بھر جاتی ہے۔ اس کی غنودگی الگ الگ اعضاء پر قبضہ کئے رکھتی ہے۔ جب اسے مجبور کر کے اٹھایا جائے تو پھر وہ غنودگی کے عالم میں ہی اٹھتا ہے اور بھر ہے ہوئے اعضاء کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض دفعہ ان سے مخاطب بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ سے کہ اس کی ایک ٹا نگ اس کی دوسری ٹانگ سے با تیں کر رہی ہے۔ اسے جبنجھوڑ کر کوئی سوال کیا جائے تو سوال کا جواب دیتے دیتے گھرسو جاتا ہے۔ بیٹیشیا ایسے ذبنی الجھاؤ کا بہترین علاج ہے بشرطیکہ اس کی کچھ دوسری علامتیں بھی یائی جاتی ہوں۔

پیٹیشیا میں عموماً مٹمیالے یا ملکے زردرنگ کے لئی کی طرح کے اسہال ہوتے ہیں اور بعض دفعہ اسہال کارنگ سلیٹی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ماتھے پر پسینہ آتا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ مریض کی تمام طاقتیں جواب دے رہی ہیں۔ جب بیصورت حال ہوتو زبان چمڑے کی طرح اکر کر خشک ہو جاتی ہے اور دانتوں کے اردگر دزخم بننے لگتے ہیں اور بد بو آتی ہے۔ اگر اس کیفیت میں بروقت پیٹیشیا مل جائے تو مریض اکثر موت کے کناروں سے لوٹ آتے ہیں۔

پیٹیٹیا میں منہ میں زخم ہوتے ہیں جو گینگرین کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔اکثر زخموں میں در دنہیں ہوتا البتہ منہ کا مزہ خراب ہوجا تا ہے۔ بیٹیٹیا کے زخم کے اردگر دفالجی علامتیں پیدا ہوجاتی ہیں اور اردگر دکے ماحول سے زخم کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بہت خطرناک علامت ہے۔ جس زخم کے اردگر دکا حصہ ماؤف ہوجائے تو اسی نسبت سے وہاں ہومیو پیتھک دواکا پیغام پہنچنے میں دفت ہوسکتی ہے۔اس لئے مرض کو ہروقت پہچان وہاں ہومیو پیتھک دواکا پیغام پہنچنے میں دفت ہوسکتی ہے۔اس لئے مرض کو ہروقت پہچان

بِيْئِشِيا 124

كردواديني جاہئے تا كەمعاملە آگے نەبڑھ جائے۔

بیٹیشیا کے گلے کی خرابی میں میں میامت پائی جاتی ہے کہ مائع چیز پینے میں دفت نہیں ہوتی لیکن کھوس غذا نگلنے میں دشواری ہوتی ہے۔مریض اگر کوشش کرے تو خوراک سانس کی نالی میں چلی جاتی ہے۔

پیٹشیا کی کئی بیاریوں میں فالجی کمزوری پائی جاتی ہے۔ دراصل انترایوں میں اسی کمزوری کی وجہ سے ابھارہ بڑھتا ہے۔ دواؤں کا بنیادی مزاج یا در کھنا ضروری ہے۔ بیٹشیا کی ایک خاص علامت بیہ ہے کہ اس میں پوری طرح فالج کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، صرف کوئی عضو کسی حد تک ماؤف ہوجا تا ہے اور زخموں کے گر دابیا فالجی اثر ہوتا ہے جواحساس کو مدہم کر دیتا ہے اور درد محسوس نہیں ہوتا۔ گراس خاص علامت کو یا در کھا جائے تو بیٹیشیا کا بر وقت استعال ہوسکے گا۔

مددگاردوائیں: برائیونیا۔ آرسنک۔ آرنیکا۔ پائیروجینم سلفر۔ ٹائیفائیڈینم طاقت: 30سے 200 تک

32

برائيطا كأرب

BARYTA CARB

برائیٹا کارب کی علامات کو بعض ہومیو پیتھ ایک ہی لفظ میں بیان کرتے ہیں لیعی اللہ برائیٹا کارب کا بونا پن محض جسمانی اللہ بسااوقات وہنی بھی ہوتا ہے اور یہ دونوں کمزوریاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں لیکن میں نے اپنے تجربہ میں ہمیشہ بیدد یکھا ہے کہ اگر صرف جسمانی لحاظ سے ہی بونا پن پایا جائے تو اس میں بھی برائیٹا کارب بہت اچھا کام کرتی ہے اس لئے اسے خواہ مخواہ وہنی علامات سے باندھ لینا درست نہیں ہے۔ میں نے اچھے ہم حصرار بونوں اور بہت ذہین مگر چھوٹے قد والوں کو برائیٹا کارب ستعال کروائی ہے۔ اللہ کے فضل سے دونوں صورتوں میں بہت اچھا اثر دکھاتی ہے۔ اس کے ستعال کروائی ہے۔ اللہ کے فضل سے دونوں صورتوں میں بہت اچھا اثر دکھاتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر چھوٹی طاقت میں سلیشیا بھی دی جائے یعنی 6x میں اور ساتھ کلکیر یا فلور x6 ملالی جائے ساتھ اگر جھوٹی طاقت میں سلیشیا بھی دی جائے یعنی 6x میں اور ساتھ کلکیر یا فلور x6 ملالی جائے سے دونوں ہوتا ہے۔

وہ بونے جن کا ذہن بھی نشو ونما ہے محروم ہوان میں بھی تو یہ بہر حال کام کرتی ہے۔
اس کے علاوہ وہ وہ فالح جو پرانے ہو چکے ہوں ان پر بھی برائیٹا کارب کا واضح اثر پڑتا ہے۔
خصوصاً ٹائیفا ئیڈ اور پولیو کے چھوڑ ہے ہوئے فالح کے بدا ثرات میں جہاں دوسری
دوائیں بالکل ناکام ہوگئ ہوں وہاں سلفریا رسٹاکس کے ساتھ برائیٹا کارب کو باری باری
دینا بعض دفعہ چرت انگیز نتائج فلا ہر کرتا ہے۔ ہاں اگر ٹائیفا ئیڈ کے فالح کا اثر اعصا بی نظام
دینا بعض دفعہ چرت انگیز نتائج فلا ہر کرتا ہے۔ ہاں اگر ٹائیفا ئیڈ کے فالح کا اثر اعصا بی نظام
زہراعصا ب کو مار دیتا ہے اور موت کا علاج کوئی نہیں ۔ لیکن دیگر عضلاتی فالجوں میں جہاں
اعصاب مرنہ گئے ہوں مگر کمزور پڑ چکے ہوں، خواہ وہ ٹائیفا ئیڈ کے زہر کے نتیجہ میں

ہی ہوں، مؤثر ہومیو پیتھک علاج کیا جاسکتا ہے۔ دیگر دواؤں کے علاوہ برائیٹا کارب بھی بہت واضح اثر دکھاتی ہے۔ اگر مختلف اعضاء اور ٹاگوں پر ٹائیفا ئیڈیا پولیو کااثر ہوتو ٹائیفا ئیڈ میں نسبتاً کم گر پولیو میں نسبتاً زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کمل شفانہ بھی ہوتو اتنا نمایاں فرق پڑجاتا ہے کہ مریض بہتر ہوجاتا ہے، سوکھتی ہوئی ٹائگ دوبارہ موٹی ہونے گئی ہے۔ ہاتھ سوکھ رہا ہوتو دوبارہ اپنی اصل حالت کی طرف آنے لگتا ہے مگر ضروری نہیں کہ ایسے ہر بیار کوکمل شفانصیب ہوجائے۔

برائیٹا کارب کی علامتیں رکھنے والے بچمو ماً بہت جھینی والے ہیں۔سکول میں چھیے

چھے رہتے ہیں اور کوئی اجنبی آ جائے تو فوراً جھیپ جاتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ کچھ جسمانی

ساخت کی خرابیاں بھی ہوں تو لاز ماً برائیٹا کارب دینی چاہئے۔ بچوں کی ٹانگوں میں کمزوری

کے لئے برائیٹا کارب اور کلکیر یا کارب دونوں مشہور دوا ئیں ہیں لیکن ان میں ایک فرق بہت

واضح ہے۔کلکیر یا کارب کے بچوں کی ٹائٹیں کمزور ہوتی ہیں۔ ان میں ہڈیوں کی صحیح نشو ونما نہیں

ہوتی اس لئے صاف پھ چاتا ہے کہ کمزور ٹانگوں والا بچہ ہے جوجلدی چل نہیں سکتا لیکن پیٹ موٹ اور سر بڑا ہوتا ہے۔ برائیٹا کارب کے مریض بچوں میں جسمانی لحاظ سے ٹائٹیں ٹھیک بھی ہوں تو

ہوتی ان میں کمزوری پائی جاتی ہے اور وہ بہت دیر سے چلنا سکھتے ہیں۔ ٹانگوں کی کمزوری اور دیر سے چلنا سکھتے ہیں۔ ٹانگوں کی کمزوری اور دیر سے چلنے کی علامت بوریٹس اور نیٹر م میور میں بھی پائی جاتی ہے۔ نیٹر م میور میں دو کمزوریاں

دیر سے چلنے کی علامت بوریٹس اور نیٹر م میور میں بھی پائی جاتی ہے۔ نیٹر م میور میں دو کمزوریاں

مریض چلنے میں تو دیر نہ کر کے گرمخس بولنادیر سے یکھے تو ایسے مریض کے لئے کالی فاس بہت بہتر

مریض چلنے میں تو دیر نہ کر کے گرمخس بولنادیر سے یکھے تو ایسے مریض کے لئے کالی فاس بہت بہتر

دوا ہے۔میرائج بہت مفید نے ہے۔

کے لئے بہت مفید نے ہے۔

بعض بچیوں میں بیعلامت پائی جاتی ہے کہ ان میں بلوغت کے آثار بہت دیر سے ظاہر ہوتے ہیں۔اس علامت میں برائیٹا کارب بہت مفید ہے۔اس دوا کا سب سے زیادہ اثر گلینڈز پر ظاہر ہوتا ہے۔ گلینڈز (غدود) میں سوزش ہوجاتی ہے۔ جہاں جہاں بھی گلینڈ زہوں، خصوصاً گلے کے اوپر والے حصہ میں وہاں مستقل سوجن ہوجاتی ہے۔ ہر دفعہ
یاری کا جملہ اس سوجن میں اضافہ کردیتا ہے۔ اسی طرح جسم پر چر بی کے ٹیوم بن جاتے
ہیں۔ پیٹھ اور جسم کے دیگر حصوں پر موٹی موٹی گلٹیاں نظر آئیں گی۔ بعض لوگوں کے جسم پر
بہت بھد ہے چھوٹے چھوٹے گول ابھار بن جاتے ہیں لین ان کا برائیٹا کا رب سے کوئی
تعلق نہیں ہوتا۔ ان کے لئے مزاج کو پر کھ کر زیادہ گہری تلاش کرنی پڑتی ہے۔
برائیٹا کا رب میں جو گلینڈ ایک دفعہ موٹا ہوجائے وہ کم نہیں ہوتا۔ باتی جسم سو کھ بھی جائے تو
سوجی ہوئی گلٹیاں یا بڑھا ہوا پیٹ کم نہیں ہوں گے۔ ایسی صورت میں بار بار برائیٹا کا رب
برائیٹا کا رب اوپر کے بلڈ پریشر (Systolic) میں مفید ہوتی ہے لین نچلے
اونچی طاقت میں دینی پڑتی ہے۔ برائیٹا کا رب لیے عرصہ تک مسلسل دی جائیٹی نچلے
برائیٹا کا رب اوپر کے بلڈ پریشر (Systolic) میں مفید ہوتی ہے لیکن نچلے
بلڈ پریشر (Diasystolic) پر اثر انداز نہیں ہوتی ۔ جومریض لیے عرصہ تک برائیٹا کا رب
استعال کرے اس کا بلڈ پریشر متواتر چیک کرتے رہنا چا ہے کہ کہیں اوپر کا بلڈ پریشر زیادہ تو
نہیں گرگیا۔ اگر اوپر کا بلڈ پریشر متواتر چیک کرتے رہنا چا ہے کہ کہیں اوپر کا بلڈ پریشر زیادہ تو

آرٹیر یوسکاروسس (Arteriosclerosis) یعنی ذہن کی شریانوں کے سکڑ جانے سے جو لکیفیں پیدا ہوتی ہیں ان کے علاج کے طور پر برائیٹا کارب ایک نہایت اہم دوا ہے۔ اسی طرح ایسے مریض کومتقلاً کریٹیگس (Crataegus) دینا بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ لیکن یا در کھیں کہ آرٹیر یوسکاروسس کا مریض بہت آ ہستہ آ ہستہ بنتا ہے بعنی یہ بیاری سال ہاسال میں اپنی پیمیل کو پہنچتی ہے اور دور بھی آ ہستہ آ ہستہ ہی ہوتی ہے۔ پس بیامید نہ رکھی جائے کہ ادھر برائیٹا کارب دی اور ادھر مریض دو چار مہینے کے اندر بالکل بیامید نہ رکھی جائے کہ ادھر برائیٹا کارب دی اور ادھر مریض دو چار مہینے کے اندر بالکل بیامید ہوجائے گا۔ کم سے کم ایک سال یا دو سال تک اسے صبر کے ساتھ استعال کروانا جائے ۔ اس پہلو سے یہ اکثر بوڑھوں کی بہترین دوست ثابت ہوتی ہے اور فی الحقیقت بے جائر فی الحقیقت بے ارز ل العمر کی دوا ہے۔ پس یا بچوں میں اس کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے یا بہت

ضرورت دوبارہ استعال کی جاسکتی ہے۔

بوڑھوں میں۔

بعض دفعہ بیاریاں آ کرگز رجاتی ہیں لیکن باقی رہ جانے والے اثرات چھوڑ جاتی ہیں۔ برائیٹا کارب ایسے دریا بداثرات کو دور کرنے میں مفید ہے۔ ڈاکٹر کینٹ کے مطابق برائیٹا کارب ملیریا کی بھی ایک اچھی دوا ہے لیکن اس کا مجھے کوئی تجربہ ہیں۔ ہاں ملیریا کے باقی رہنے والے بداثرات میں بیضرور فائدہ پہنچاتی ہے۔

کینٹ نے کھا ہے کہ ہرفتم کے چر بی کے غدود، رسولیاں، لیوپس (Lupus) حتی کہ سے دق کے پھوڑوں میں بھی ہرائیٹا کارب اچھا اثر دکھاتی ہے لیکن مجھے ان امور کا بھی کوئی تجربہہیں۔ جسم کی بیرونی سطح پر اجھرنے والے موٹے موٹے ٹیوم جو بہت بدزیب دکھائی دیتے ہیں اور نکلیف دہ ہوتے ہیں میں نے بار ہاان میں ہرائیٹا کارب استعال کروائی مگرفا کدہ نہیں ہوا۔ ممکن ہے وہ چر بی کے ٹیومر سے ہوتا ہے ممکن ہے وہ چر بی کے ٹیومر سے ہوتا ہے اوران میں واقعتاً بیفا کدہ دیتی ہے۔ اسی طرح میرے استعال میں لیوپس پر بھی اس کا کوئی خاص اثر ظاہر نہیں ہوا۔ کینٹ کی رائے کے مطابق اگر مریض کے مزاج کے موافق علاج کرنا ہوتو ہرائیٹا کارب کی سب طاقتیں استعال کرنی چا ہمیں۔ صرف ایک ہی پڑینسی پر انحصار کر کے بیٹونہیں برائیٹا کارب کی سب طاقتیں استعال کرنی چا ہمیں برائیٹا کارب کی چھوٹی پوٹینسی کام نہیں رہنا چا ہے کیونکہ بعض دفعہ بہت گہری بیاری میں برائیٹا کارب کی چھوٹی لوٹینسی تک بھی کرتیں۔ پچھوٹی ایک کرتیں۔ پچھوٹی بوٹینسی تک بھی مناسب وقفے ڈال کر استعال کرنی چا ہے۔ جس بیاری میں برائیٹا میں ایر ایکٹا جا ہے۔ ہواس کو مناسب وقفے ڈال کر استعال کرنی چا ہے۔ جس بیاری میں بیا بیتدا میں کا میاب ثابت ہواس کو بالآخر کلیڈ جڑ سے بھی اکھیڑ چینگی ہے۔

برائیٹا کارب کا مریض بسااوقات انجانے خطروں سے خوفز دہ رہتا ہے۔ اسی طرح یہ بعض وہموں کو دور کرنے میں بھی خصوصی اثر دکھاتی ہے۔ بعض مریضوں کو سر ہلانے پر بیا حساس ہوتا ہے کہ ان کا د ماغ بھی اندر ہل رہا ہے۔ یہ علامت خصوصیت سے برائیٹا کارب سے تعلق رکھتی ہے۔اگر د ماغ کوخون کی فراہمی کچھ عرصہ تک رک جانے کی وجہ سے مرگی کا مرض بیدا ہوجسیا کہ پنجائش (Meningitis) میں ہوجایا کرتا ہے

تواس مرگی میں برائیٹا کارب کواگر با قاعدہ لمبے عرصہ تک استعمال کیا جائے تو یہ شفا کا موجب بن سکتی ہے۔

اگرخون کی شریان بھٹ جائے اور سرخ رنگ کا خون بہنے گئے تو فاسفورس کے علاوہ برائیٹا کارب بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔ برائیٹا کارب بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔ برائیٹا کارب کی آئیکھول کی بیماریوں میں آئکھوں کے پیوٹے ایک دفعہ اندرونی

برائیٹا کارب کی آنکھوں کی بیاریوں میں آنکھوں کے پیوٹے ایک دفعہ اندرونی رساؤکے جم جانے کی وجہ سےموٹے ہوجا میں تو موٹے ہی رہ جاتے ہیں۔ برائیٹا کارب کی یہ علامت ہرتسم کےغدودوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ گلے کےغدودا گرایک دفعہ سوج جائیں تو پھر کم ہونے کانا منہیں لیتے اور مستقل سوج ہی رہتے ہیں۔

برائیٹا کارب بالوں کے گرنے، خشکی اور گنجے پن کا بھی علاج ہے۔ خشکی اور اگنجے پن کا بھی علاج ہے۔ خشکی اور اگنج پن کا بھی علاج ہے۔ انگزیما کی علامت دوسری دواؤں میں بھی پائی جاتی ہے لیکن ممکن ہے کہ برائیٹا کارب کے مریضوں کے بالوں کی جڑوں میں فاسد مادے بیٹھنے سے بال کمزور ہور ہے ہوں۔ یہ نظر کی کمزوری میں بھی مفید ہے۔ اگر ایک عمر کے بعد نظر دھندلانے کاعمل شروع ہو جائے تو برائیٹا کارب معمول کے طور پر لمہے عرصہ تک کھلا نا معزنہیں، ہاں فائدے کاامکان ہے۔ بعض دفعہ کولیسٹرول کیول نے دو ہونے کی وجہ سے آئکھوں پراٹر پڑتا ہے۔ اس صورت میں کولیسٹروینم دفعہ کولیسٹرونیم مالکر دینے سے فائدہ ہوگا۔ لیکن فاسفورس 30 اور فائٹولا کا 30 اور فائٹولا کا 130 اور فائٹولا کا رہے عرصہ تک استعال خون کوضرورت سے زیادہ گاڑھا نہ کردے۔

آ نکھ کے کورنیا کی تکلیفول میں بھی برائیٹا کارب مفید ہے۔ بعض دفعہ آ نکھوں میں گوہانجنیاں نکلنے کا رجحان ہوتا ہے ان میں بھی برائیٹا کارب اچھی دوا ہے۔ بعض دفعہ <u>گلے کے غدود سوج</u> کرکن پیڑوں کی طرح موٹے ہوجاتے ہیں ان میں بھی برائیٹا کارب بہت مفید ہے۔ مفید ہے۔

بوڑھے آ دمیوں کی زبان کے فالح کے ساتھ اس کا گہراتعلق ہے۔ اگر بوڑھوں کی چھاتی میں بلغم ہو، سینہ کھڑ کھڑا تا رہے اور دوسری دوائیں فائدہ نہ دیں تو برائیٹا کارب

ضرور استعمال کرنی جاہئے۔اسی طرح سینیگا اور امونیم کارب بھی بوڑھوں کے پھیپھڑوں کی تکلیفوں میں بہت کام آتی ہیں۔

برائیٹا کارب کا کان کے درد سے بھی تعلق ہے۔ اگر بید درد مزمن ہو جائے تو بعض دفعہ نزلے کے آثار نہیں بھی ہوتے لیکن چربھی کان میں درد ہوتا رہتا ہے۔ اگراس کے ساتھ کان میں بوجھ بھی محسوس ہوتو برائیٹا کارب بہت اچھی دواہے۔

برائیٹا کارب میں اجابت باہم جڑی ہوئی گھلیوں کی شکل میں اور سخت ہوتی ہے اور نکس وامیکا کی طرح بیا حساس رہتا ہے کہ کھل کرا جابت نہیں ہوئی۔ پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے۔
مراد نہ اور زنانہ جنسی کمزور یوں میں بھی برائیٹا کارب مفید دوا ہے لیکن اگر بہت او نچی طاقت میں دے دی جائے تو بعض دفعہ برعکس نتیجہ نکلتا ہے یعنی جنسی کمزوریاں بڑھ جاتی ہیں اس لئے رفتہ رفتہ رفتہ پڑیسی کو بڑھانا چاہئے ۔ عور توں میں جنسی کمزور یوں کے ساتھ بانجھ پن ہیں اس لئے رفتہ رفتہ رفتہ دانیاں یعنی Ovaries سوچ کرموٹی ہونے کی بجائے سکڑ کر جھوٹی ہوجاتی ہیں ۔ اس میں بیضہ دانیاں لیعنی Ovaries سوچ کرموٹی ہونے کی بجائے سکڑ کر جھوٹی ہوجاتی ہیں ۔ اس میں بیاری میں برائیٹا کارب فوراً استعال کرنی چاہئے کیونکہ یہ علامت بعض اوقات کینسرمیں بھی تبدیل ہوسکتی ہے۔

برائیٹا کارب میں گلے اورٹانگوں کا فالجے نمایاں ہے لین اگرجسم کے صرف ایک طرف فالجے کا حملہ ہوتو زیادہ ترسلفر، کاسٹیکم، رسٹاکس، حلسیمیم ،لکییسس اور کیڈمیم سلف حسب علامات استعال ہو سکتی ہیں۔ برائیٹا کارب نیچے کے دھڑ کے فالجے میں اچھی دوا ہے۔ اس کے علاوہ کا کولس بھی نچلے دھڑ کے فالجے میں خصوصی اثر رکھتی ہے گراونجی طاقت میں دینی چاہئے۔ برائیٹا کارب کی کھانسی کی یہ عجیب علامت ہے کہ جب تک مریض پیٹ کے بل لیٹار ہے کھانسی میں افاقہ رہتا ہے اور ہر دوسری کروٹ پر کھانسی بڑھ جاتی ہے۔ برائیٹا کارب میں جلد پر مسے بھی بہت اگتے ہیں۔ بسااوقات یاؤں بد بودار ہوتے ہیں۔ اگر نیچے کے دھڑ میں شدید درد ہو جو بعض دفعہ فالج کا پیش خیمہ ہو جاتی ہے تو اس میں برائیٹا کارب

مفیر ہوسکتی ہے۔

ایک بیچ کی ٹانگیں بولیو کے حملہ کی وجہ سے ٹیڑھی ہو گئی تھیں اسے سلفراور برائیطا کارب دی گئیں جن سے اتنا نمایاں فائدہ ہوا کہ وہ اب معمول کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اگر چہ مکمل صحت نہیں ہے لیکن چلتا بھرتا ہے، حالا نکہ ڈاکٹر وں نے کہا تھا کہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی یہ تکلیف بڑھتی جائے گی۔ ہومیو پیتھک دوائیں دیکھنے میں معمولی گئی ہیں مگر یہ بہت گہرے اور دوررس اثرات کی حامل ہوتی ہیں۔

مددگاردوائیں: ڈلکامارا۔سلیشیا۔سورائینم دافع اثر دوائیں: کیمفر۔اینٹی مونیم ٹارٹ۔بیلا ڈونا۔زنکم طاقت: 30سےسی۔ایم(CM) تک

33

بيلا ڈونا

BELLADONNA

(Deadly Night Shade)

بیلا ڈونا کا پوداا کٹر پورپ کے گھنے اور سابید دار علاقوں میں اگتا ہے۔ جولائی کے مہینہ میں اس کے پھول نکلتے ہیں اور ستبر میں سرخ رنگ کا پھل لگتا ہے۔ بیلا ڈونا بہت زہر یلا پودا ہے۔ جڑی بوٹیوں کے ماہرین اسے مختلف بیاریوں کے علاج کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی مرہم بنا کر زخموں پرلگائی جاتی ہے۔ جب پھولوں کا موسم اپنے جوبن پر ہوتا ہے تو اس سارے بودے سے مرق نکال کر ہومیو بیتھی دوا تیار کی جاتی ہے۔

بیلا ڈونا دوران خون پر اثر انداز ہونے والی دوا ہے۔ دل، پھیپھڑے، دماغ اور اعصابی نظام بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ایکونائٹ کی طرح بیاری کا اچپا نک حملہ بیلا ڈونا کی بھی خاص علامت ہے کیکن بیلا ڈونا ایکونائٹ کے مقابل پر زیادہ لمبا اثر رکھنے والی دوا ہے۔ بیلا ڈونا کی نمایاں خاصیت سوزش ہے جس سے خصوصاً دماغ، پھیپھڑ ہے، جگر اور انتر ٹریاں متاثر ہوتے ہیں۔

بیلا ڈونا کی علامات رکھنے والی بیاریوں میں اچپا تک بین تو بالکل ایکونائٹ کی طرح ہی ہے لیکن اس میں کوئی خاص خوف نہیں پایا جاتا۔ مریض دیے لفظوں میں تکلیف کا اظہار کرتا ہے ورنہ خاموش رہتا ہے، زیادہ بولنا پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ رات کو ڈراؤنی خوابیں آنے لگیں تو شور مجپا کراٹھ جاتا ہے ورنہ عام طور پر چپا در لے کرالگ تھلگ پڑار ہنے والا مریض ہے۔ قدموں کی ہلکی سی چپاپ یا روشنی در دوں کو بڑھا دیتی ہے، جلد بہت حساس ہوجاتی ہے اور درد کے مقام پر ذراسا کپڑا لگنا بھی نا قابل برداشت ہوجاتا ہے۔ ماؤف حصہ میں سرخی نمایاں ہوتی ہے، شدید جلن کا احساس ہوتا ہے، خون کا دباؤ

زیادہ ہونے سے تشنجی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور جھکے لگتے ہیں۔ اگر معدہ اور اعصابی نظام بگڑنے کی وجہ سے سوتے میں جسم کو جھکے لگیں تو گرائینڈ بلیا (Grindelia) بہترین دوا ہے۔ بیلا ڈونا میں بھی جسم کو جھکے لگئے کی علامت پائی جاتی ہے۔ گرائنڈ بلیا میں سارے جسم کو جھ کا نہیں لگتا بلکہ محسوس ہوتا ہے کہ دل کو جھ کا لگا ہے۔ بیلا ڈونا میں تمام جسم اچا نگ کے اور بار بارایسا ہوتا ہے، مریض کی آئکھ کی لے اور بار بارایسا ہوتا ہے، مریض سونہیں سکتا۔ بیلا ڈونا کی ایک خوراک دینے سے ہی بعض اوقات تکلیف فی الفورختم ہو جاتی ہے۔ اگر سراور آئکھوں کی بیاریوں میں روشنی نا قابل برداشت ہوتو یہ بھی بیلا ڈونا کی علامت ہے۔

بیلا ڈونا کی علامتیں اگر کسی مریض کی علامتوں سےمل جائیں تو بیاتنی زوداثر دوا ہے کہا دھرمریض کو دوا کھلائی ادھرمرض غائب ہو گیا۔ وہ حیرت سے پوچھتا ہے کہ کیا دیا تھا کہ تکلیف یکدم غائب ہوگئی۔

بیلا ڈونا د ماغ پر بھی حملہ کرتی ہے اور شدید پاگل بن کا دورہ پڑسکتا ہے۔ بیلا ڈونا کا پاگل بہت متشدد پاگل ہوتا ہے۔ بیلا ڈونا کا پاگل بہت متشدد پاگل ہوتا ہے۔ اگر کسی پاگل میں بے انتہا جوش ہو، کسی کو مار نے یا خود کشی کر نے کہ کوشش کرے، غصے میں بہت تیزی ہو اور سنجا لنے والوں کو بھی مارے تو اسے فوراً بیلا ڈونا دینا چا ہے لیکن اگر مرض مزمن ہوجائے تو پھر بیلا ڈونا کا منہیں کرے گا۔ ہاں کسی کوا چا تک پاگل بین کا دورہ پڑے، جیسا کہ بعض بیاریوں میں سرسام کے نتیجہ میں ہوجاتا ہے تو بیلا ڈونا فوری اثر دکھا سکتا ہے۔ اگر مستقل مریض ہوتو سلفر اور سٹرا مونیم وغیرہ نیا دوہ مؤثر ہیں۔ بعض پاگل استے جو شلے ہوجاتے ہیں کہ انہیں زنجیروں سے باندھنا پڑتا ہے۔ بین کہ انہیں زنجیروں سے باندھنا پڑتا ہے۔ بین میا ڈونا دے کر وقتی آرام ہوتو مطمئن نہیں ہو جانا چا ہے۔ بین گاری بن میں ضرور کوئی ہونے ہانا چا ہے۔ بیک والی دوا تلاش کرنی چا ہے۔ مزمن پاگل بن میں ضرور کوئی مزاجی دوا ڈھونڈ نی پڑے گی ۔ ایکونائٹ اور بیلا ڈونا دیر پا اثر کرنے والی دوا کیں نہیں ہونی موتو طور پر ٹھیک ہونے ہیں۔ بعض دفعہ بیاری کا حملہ عارضی ہوتا ہے لیکن مستقل بیاری وقتی طور پر ٹھیک ہونے ہیں۔ بعض دفعہ بیاری کا حملہ عارضی ہوتا ہے لیکن مستقل بیاری وقتی طور پر ٹھیک ہونے

کے باوجود موجود رہتی ہے اور باربارلوٹ آتی ہے۔ سٹرامونیم بیلا ڈونا سے زیادہ لمبااثر کرنے والی دواہے۔

ٹائیفائیڈ میں بھی بعض بیلا ڈونا کی علامات پیدا ہوجاتی ہیں، دماغ کو بخار چڑھ جاتا ہے اور مریض ہذیان بختے گئا ہے۔ اگراس میں بیلا ڈونا دیں تو وقی افاقہ تو ضرور ہوگالیکن کچھ پچیدگیاں بھی پیدا ہوسکتی ہیں کیونکہ ٹائیفائیڈ کا بیلا ڈونا سے مزاجی تعلق نہیں ہے۔ سٹرامونیم بیلا ڈونا کی نسبت ٹائیفائیڈ سے زیادہ قریب ہے کیونکہ بیسی حدتک مزمن دوا ہے۔ اس لئے بید ٹائیفائیڈ میں دماغ کی ہذیانی کیفیت کوبھی دور کرسکتی ہے اور ٹائیفائیڈ سے شفا کا موجب بھی بن ٹائیفائیڈ میں دماغ کی ہذیانی کیفیت کوبھی دور کرسکتی ہے اور ٹائیفائیڈ سے شفا کا موجب بھی بن بعض دفعہ پاگلوں میں تشدد کے علاوہ فنش گوئی کا رجمان بھی ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اندرونی جنسی عضلات میں کوئی سوزش ہے۔ اسٹھیک کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن پر پر انے صدموں کا اثر ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ پاگل ہوجاتے ہیں۔ بعض اور مالی نقصان کر پر پر انے صدموں کا اثر ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ پاگل ہوجاتے ہیں۔ بعض اور مالی نقصان کے اثر سے ذہنی تو ازن کھو ہیٹھتے ہیں۔ پاگل پن کے علاج میں بہت گہرائی میں جا کر مرض کی سختے کے طور پر سٹر امونیم اور سلفر سے پچھ نہ پچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

بیلا ڈونا کی ایک علامت ہے ہے کہ اس کا بخار مسلسل چلتا ہے، جب ٹوٹے گا تو دوبارہ نہیں ہوگا۔ ٹائیفائیڈ کا بخار بالکل الگ مزاح رکھتا ہے بعنی اکثر رات کو تیز ہوجا تا ہے اور ضح کے وقت کسی حد تک انتر جاتا ہے مگر اگلے دن پھر واپس آ جاتا ہے اور اتنی شدت کا ہوتا ہے کہ ختم ہوتا ہے نہوں کو مار بھی سکتا ہے۔ بیلا ڈونا کا بخار جب ختم ہوتا ہے تو اچا نک ختم ہوتا ہے۔ بیط ڈونا کا بخار جب ختم ہوتا ہے تو اور پھر دوبارہ ہو جا کیف فوہ بخار جو ٹھیک نہ ہول مگر کسی تیز دوا کے اثر سے دب گئے ہوں اور پھر دوبارہ اچا نک فاہر ہو جا کیں ان میں بیلا ڈونا مؤثر ثابت ہوسکتا ہے۔ مگر ایسے بخار جو آ ہستہ آ ہستہ جی بیان کی دوابیلا ڈونا نہیں۔

بیلا ڈونا کے مریض کی جلد پر نکلنے والے دانوں اور غدودوں کی تکلیف میں سوزش

نمایاں ہوتی ہے۔ گلا اچانک پھول جاتا ہے اور سخت سوزش ہوتی ہے، گھونٹ بھرنا بھی دو بھر ہوتا ہے۔ ایسی تکلیف میں بیلا ڈونا بہت مفید ہے۔ اس کی ایک خاص علامت بیہ ہے کہ بیرونی طور پر گلینڈز کے اوپر چھوٹے چھوٹے سرخ دانے بن جاتے ہیں۔ پچھ دیر تک بیسرخی رہتی ہے پھر میلے میلے سے رنگ میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ جوڑوں کے در دمیں بھی سوزش اور سرخی نمایاں ہوتی ہے جن پر بڑے رئے سرخ دانے بھی بنتے ہیں جو بعد میں رنگ بدل لیتے ہیں۔ لیکن ان میں پیسے نہیں بنتی۔

یتے کے اچا نک درد میں بھی، اگراس میں تیزی اوراشتعال پایا جائے تو بیلا ڈونا فوری آ رام پہنچا سکتا ہے مگر شرط رہے کہ یہ تکلیف گرمی سے بڑھتی ہو۔ بیلا ڈونا کے بعد پھر مستقل علاج کے لئے سلفر، نیٹر م سلف، لائیکو بوڈیم اور چیلی ڈونیم کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تے کے شنج کے علاوہ گردوں کے شدید درد میں بھی بیلا ڈونا بہت مفید ہے۔اگر اس کے ساتھ ایکونائٹ ملا کر دی جائے تو اور بھی اچھا کام کرتا ہے۔ دونوں ملا کر ایک ہزار طاقت میں دس بندرہ منٹ کے وقفہ سے دوتین بار دہرائی جاسکتی ہیں۔اگر فائدہ نہ ہواور مریض کوگرمی سے آرام آتا ہوتواس کی بجائے کولوسنتھ CM یا میگ فاس 6x یا نی میں ملا کر بار بار دینا مفید ہے۔ شنخ بظاہرا یک ہی طرح کا ہوتا ہے لیکن مزاج کے فرق سے علاج مختلف ہوجائے گا۔ بیلا ڈ ونا کے مزاج میں سوجن بھی داخل ہے۔ چوٹوں کےنسخہ میں آرنیکا کے ساتھ بیلا ڈونا ملاکر دینا آرنیکا کا فائدہ بڑھا دیتا ہے کیونکہ چوٹ لگنے کے رقبل کے نتیجہ میں خون تیزی سے متاثر ہعضو کی طرف حرکت کرتا ہے ۔اسی وجہ سے ڈ اکٹرعمو ماً فوری علاج کے طور پر ٹھنڈی ٹکور تجویز کرتے ہیں ۔ بیلا ڈونا ٹھنڈی ٹکور سے بھی زیادہ زودا ثر ہوتا ہے۔اگر آرنیکا کے ساتھ ملا کر دیں تو ہر <u>چوٹ</u> کے آغاز کے لئے یہ بہترین نسخہ ہے۔ بیلا ڈونا کے مریض کی عام تکلیفیں گرمی سے بڑھتی ہیں لیکن ماؤف حصہ پر ٹھنڈی ٹکور سے آ رام آتا ہے۔ اگر جگر اور انترایوں میں ورم اور سوزش ہوتو سارا جسم ٹھنڈا ہو جاتا

ہے۔اس صورت میں اگر مریض بیلا ڈونا کا بھی ہوگا تو بھی اسے بیرونی گرمی فائدہ پہنچائے گ۔

بیلا ڈونا میں ہر ماؤف مقام پر دھڑکن پائی جاتی ہے۔ بعض دفعہ تو ساراجسم دھڑکتا ہوا
محسوس ہوتا ہے۔ جہاں بھی در دہواگر وہ اچائک ہواوراس میں دھڑکن بھی پائی جائے ، جھکے اور
شور سے تکلیف بڑھتی ہو، گرمی کا احساس ہوتو بیلا ڈونا کام آئے گا۔اس میں تشنج کا ربحان
بھی بہت نمایاں ہوتا ہے۔ بیلا ڈونا ان اعصابی ریثوں کی دواہے جوور یدوں اوررگوں وغیرہ کے
اردگر د لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ان کو جبی اصطلاح میں سرکولر فائیبر ز (Circular Fibres)
کہا جاتا ہے۔ جہاں بھی سرکولر فائیبر ز میں تشنج ہوگا اگر وہ گرمی سے بڑھے تو بیلا ڈونا ایسے تشنج کو
دورکر نے میں بہت مؤثر ہے۔ بعض دفعہ وضع حمل کے وقت رخم کے منہ کی نالی میں تشنج ہو
جاتا ہے۔ بیلا ڈونا کی دوسری علامتیں ہوں تو فوراً اثر ظاہر ہوگا ورنہ کولوفائیلم اکثر اس تشنج کو دور

جن بچوں کی عارضی بیار یوں میں بیلا ڈونا کام آئے ان کی مزمن بیار یوں میں کلکیر یا کارب مفید ثابت ہوتی ہے۔

جو تشنج حرکت اور جھکے سے بڑھ جائے اس کا علاج بیلا ڈونا ہے۔ اس کی ایک اور عجیب علامت بیہ ہے کہ بیاری کے دوران کھانا کھانے سے طبیعت کچھ تنجل جاتی ہے بیہاں تک کہ اگر پاگل کو بھی کچھ کھلا دیں تو اس کا جوش کچھ دیر کے لئے ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ بی علامت فاسفورس اور سورائینم میں بھی پائی جاتی ہے۔ پاگل کو بھوک لگتی ہے لیکن چونکہ وہ بتا تا نہیں اس لئے اگر اسے کچھ کھانا دیا جائے تو اس کے اندر کی طلب اور بے چینی دور ہوجاتی ہے۔ فاسفورس کا مریض بھی سخت بھوکا ہوتا ہے اور کھانا کھانے کے فوراً بعداسے دوبارہ بھوک لگ جاتی ہے۔ فاسفورس کا دباؤ زیادہ ہوجائے تو اسے طرح طرح کے بیلا ڈونا میں مریض کے دماغ پرخون کا دباؤ زیادہ ہوجائے تو اسے طرح طرح کے فواب مثلاً آگ گی گئے کے خواب

بھی آتے ہیں۔ایسے مریض کو بیلا ڈونا دیں تو آگ لگنے کے خواب آنے بند ہوجا کیں گے۔ بیلا ڈونا میں گہری ہے ہوشی کار جحان ملتا ہے۔جس میں آنکھ کی ایک پہلی پھیل جاتی ہے۔ یہ علامت او پیم سے بھی ملتی ہے جبکہ او پیم باقی علامتوں میں بیلا ڈونا سے مختلف ہے۔

بیچ کا بخار بہت تیز ہواوراس کا سر پرزیادہ اثر ہو، پاؤں برف کی طرح ٹھنڈ بے ہوں تو بیلا ڈونا ہی اولین دوا ہونی چا ہئے۔ بخار میں جسم ٹھنڈا ہوجائے کین سر پر گرمی کا حساس ہوتو یہ بہت خطرناک علامت ہے۔ ما کیں جھتی ہیں کہ بخاراتر گیا ہے کین وہ بیاری کی بے ہوشی سی ہوتی ہے۔ اگر صحیح دوا دیں تو ایک دم سارا جسم گرم ہوجائے گا ور نہ خطرناک بیاریاں مثلاً گردن تو رہ بخار، مرگی وغیرہ بیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ ایسے موقع پرفوری اثر کرنے والی دواؤں میں بیلا ڈونا بھی ایک ہے۔ اگر صحیح دوا جلد نہ دی جائے تو ایسی حالت میں بیچ مربھی جاتے ہیں۔

اگر مریض کو شدید چکر آئیں اور پیجانی کیفیت ہوتو بیلا ڈونا فوری آرام دے گ۔ فاسفورس میں بھی بیہ علامت ہے۔ سر در د ہوتو سرکی جلد دکھنے گئی ہے، تنگھی کرنا یا ہاتھ لگانا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ سرکی جلد کی زود حسی ہیپر سلف میں بھی پائی جاتی ہے اور بیملامت اتنی زیادہ نمایاں ہے کہ بعض عور تیں اس کے اثر سے بے ہوش ہوجاتی ہیں۔

خیالات کے ہجوم اور ہیجانی کیفیت کی وجہ سے نینداڑ جائے تو بیلا ڈونا، کافیا اور فاسفورس سب مفید ہیں۔اعصابی ہیجان کی وجہ سے نینداڑ جائے تو زراسے شوریا بستر کو شوکر لگنے سے سخت اذبیت پہنچتی ہے اور مرض میں ایک دم اضافہ ہوجا تا ہے۔ نکس وامیکا میں بھی شور سے تکلیف بڑھتی ہے۔ چونکہ نکس وامیکا میں بیلا ڈونا کا عضر بھی پایا جا تا ہے۔ اس لئے نکس وامیکا کی کئی علامتیں بیلا ڈونا سے ملتی ہیں۔

بعض مریض بہت آ ہستہ رقمل دکھاتے ہیں۔ان کو وہی دوائیں موافق آتی ہیں جو آ ہستہ آ ہستہ اثر کرنے والی ہوں لیکن اس کے برعکس بعض مریضوں کی تکلیفیں تیزی سے برطقی ہیں اور وہی دوائیں ان کے لئے مفید ہوتی ہیں جن میں تیزی سے بھاریاں بڑھنے کا رجحان ماتا ہے۔ بعض مریضوں کے رقمل کی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ ہومیو دوائیں

ہومیو پیتھک اثر دکھانے کی بجائے اس اصل زہر کی علامتیں اس مریض میں پیدا کر دیتی ہیں جس زہر سے وہ ہومیو پیتھک دوابنائی گئ تھی۔ جو دوائی بھی دیں اس کی علامتیں مریض میں ظاہر ہونے گئی ہیں۔ اس پہلو سے اس کوا حتیاط سے دوا دینی پڑتی ہے اور دوا کی طاقت کم کرنی پڑتی ہے لین ان کی اس زود حس کا علاج بھی ضروری ہے۔ تین دوائیس ایسی ہیں جوالیسی زود حس کو دور کرسکتی ہیں۔ بیلا ڈونا ، نکس وامیکا اور زنکم میٹ سب سے زیادہ حساس دوا ہے، اتنی حساس کہ اس کا مریض بعض دفعہ چھوٹی طاقت کی دوابھی قبول نہیں کرسکتا اس لئے ایسے مریض کو کہ خیار نک دینا چا ہے جس سے جسم میں دوسری دوائیس قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوجائے گا مگرزنگ بھی چھوٹی طاقت سے شروع کرنا چا ہے مثلاً 30 طاقت میں۔

بیلا ڈونا کی ایک علامت حبلسیم سے مشابہ ہے۔ مریض کے سردرد کو پیچھے کی طرف سرجھکانے سے آرام آتا ہے اوراگر سامنے کی طرف جھکا ئیں تو تکلیف بڑھتی ہے لیکن اس میں بعض دفعہ استثناء بھی ہوتے ہیں۔ایسے مریض کو بیلا ڈونا یا حبلسیمیم دینا جا ہے ۔ بعض اوقات ناک میں جے ہوئے نزلاتی موادیا سائینس (Sinus) کے اندر جے ہوئے مواد کے باعث ہونے والے سردرد کی طرف سرجھکانے سے بڑھ جاتے ہیں۔

عام طور پر بیلا ڈونا وقتی بیاری کی دواہے جو تکلیف فی الفور آئے وہ فوراً کا فور بھی ہو جاتی ہے لیکن بھی بھی سرور دختم ہونے کے بعد بھی کئی گئی دن سر میں بوجس بن اور تھکا وٹ کا احساس رہتا ہے۔ بال کٹوانے اور حجامت بنوانے سے بھی سرمیں درد شروع ہوجا تا ہے۔ بیلا ڈونا میں آ رام کرنے سے آ رام آ تا ہے اور حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے۔ بیلا ڈونا کی اکثر مزاجی تکلیف بڑھتی ہوجائے تو جوڑوں اور کی اکثر مزاجی تکلیف میں اوپر سے نیچے کی طرف اترتی ہیں۔ اگر سرٹھیک ہوجائے تو جوڑوں اور اعساب میں اوپر سے نیچے کی طرف در دیں حرکت کریں گی۔ نیچے سے اوپر کی طرف حرکت کرنے والی بیاریوں کے علاج میں لیڈم (Ledum) نمایاں شہرت رکھتی ہے۔

بیلا ڈونا آئکھوں کی بیماریوں کے لئے بھی بہت مفید دوا ہے۔ آئکھیں غیر معمولی سرخ ہوجاتی ہیں اور بیوٹے سوج جاتے ہیں۔ آئکھوں کے سامنے تارے ناچتے ہیں۔ ایک خاص علامت یہ ہے کہ آئکھیں بالکل خشک رہتی ہیں جبکہ یوفریزیا (Euphrasia) میں سرخی کے ساتھ پانی بہتا ہے۔ بیلا ڈونا اور یوفریزیا سرخی کی علامت اور شدت میں مشابہت رکھتی ہیں لیکن یوفریزیا میں اتنی زیادہ سوزش نہیں ہوتی البتہ تیزیا نی بہتا ہے۔

آ تکھ کے بلڈ پریشر میں بیلا ڈونا بہت مفید ہے۔ ایک مریض جس کی آ تکھوں کی بلڈ پریشر کی تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ ڈاکٹر ول نے اسے لاعلاج قرار دے دیا تھا اور خطرہ ظاہر کیا تھا کہ مزید دباؤبڑھنے سے خلیے بھٹ سکتے ہیں جس سے مریض مستقل اندھا ہوسکتا ہے۔ جو نسخہ میں نے اس مریض کو دیا اس کا مرکزی جز وبیلا ڈونا تھا۔ جیرت انگیز طور پرایک ہفتہ کے اندر آ تکھ کا بلڈ پریشر اعتدال کی طرف مائل ہو گیا اور اب وہ مریض بالکل صحت یاب ہو چکا ہے۔ جسسیمیم بھی آ نکھ کے دباؤکو کم کرنے کے لئے مفید ہے اور کا لے موتیا کی بھی مؤثر دوا ہے۔ اس کے ساتھ کلکیریا فاس 6x میں دینا چاہئے۔

نکس وامیکا اور بیلاڈونا دونوں میں کیوپرم کا مادہ پایا جاتا ہے اور کیوپرم مشنج کی بہترین دواؤں میں سے ہے۔

اگر د ماغ کے اعضائی ہیجان کی وجہ سے جسم کا پنے گئے یا خون کا دباؤ بہت ہڑھ جائے۔اس وقت اس د باؤ کو کم کرنے کے لئے بیلا ڈونا استعال ہوتا ہے اور یہ مؤثر اور فوری دوا ہے۔ بعض د فعہ بیلا ڈونا کی بیاس برائیونیا سے ملتی ہے یعنی بہت شدید بیاس بیکن یائی پینے سے تسکین نہیں ملتی اور بعض د فعہ آرسنک کی طرح منہ خشک ہوتا ہے اور مریض تھوڑ اتھوڑ ایانی پی کر بیاس بجھانے کی کوشش کرتا ہے۔آرسنک اور برائیونیا کی دوسری علامتیں بیلا ڈونا سے مختلف ہیں مگر منہ کی خشکی میں تینول مشترک ہیں۔

بیلا ڈونا مزاج کی عورتوں میں تھٹی چیزیں کھانے کا شوق ہوتا ہے۔اسہال لگ جائیں تو مقدار میں بالکل تھوڑے ہوتے ہیں۔

بیلا ڈونا میں بواسیر کے مسے بھی پائے جاتے ہیں۔ بیشاب بار بارآنے کی بیاری میں

بھی بیلا ڈونا سودمند ثابت ہوتا ہے۔ بشرطیکہ گردے یا مثانے میںانفیکشن کی وجہ سے ایسا ہوور نہ براہ راست بیلا ڈونا میں پیپٹاب کے بار بار آنے کی علامت موجود نہیں۔

اگرکسی دواسے گردے کی پھری کسی دواسے پارہ پارہ ہوکر پبیثاب کے رستے نکلنے لگے تو پیدا ہونے والی سوزش کا علاج بیلا ڈونا سے بھی ممکن ہے۔

اگر رحم میں تیزی سے واقع ہونے والے تشنج کے دورے پڑتے ہوں اوریہ تکلیف گرمی سے بڑھتی ہوتو پیلا ڈونا سے اس کا فوری مؤثر علاج ہوسکتا ہے۔

بہت اچھی دوا ہے۔ اس میں بیلا ڈونا بیاری کار جمان دائیں طرف زیادہ ہوگا اور گرمی سے تکلیف بہت اچھی دوا ہے۔ اس میں بیلا ڈونا بیاری کار جمان دائیں طرف زیادہ ہوگا اور گرمی سے تکلیف بڑھے گی۔ وہ حاملہ عور تیں جن میں حمل ضائع ہونے کا خدشہ رہتا ہے اگر وہ بہت نازک طبع اور حساس ہوں، آ وازوں اور قدموں کی جاپ بھی برداشت نہ کرسکیں، اعصاب زودس ہوجائیں تو ان میں حمل ضائع ہونے کے رجمان کورو کئے کے لئے بیلا ڈونا بھی مفید ثابت ہوسکتا ہے۔ بیلا ڈونا بھی مفید ثابت ہوسکتا ہے۔ بیلا ڈونا کے مریض کی کھانسی کی آ وازعمو ما زور دار اور بھیا تک ہوتی ہے۔

یں پیلا ڈونا اگر چہ عارضی دوا ہے کیکن شروع ہی سے علامتیں پیچان کر دی جائے تو مزید بیاریاں پیدانہیں ہوتیں۔

پیلا ڈونا میں شنج سرکو پیچھے کی طرف کھنچتا ہے۔ بیلا ڈونا کی طرح ایپس میں بھی گرمی کی شدت اور سوجن کی علامت پائی جاتی ہے۔ بیلا ڈونا میں شنج سرکو پیچھے کی طرف کھنچتا ہے۔ بیلا ڈونا کی طرح ایپس میں بھی گرمی کی شدت اور سوجن کی علامت پائی جاتی ہیں۔ بیلا ڈونا اور اپیس میں فرق بیہ ہے کہ بیلا ڈونا میں چونکہ ماؤف حصہ کے علاوہ باقی جسم ٹھنڈا ہوتا ہے اس لئے مریض گرم ہونا چا ہتا ہے اور اپنے آپ کو گرم کیڑوں میں لیٹیتا ہے۔ اپیس میں مریض کا ساراجسم جلتا ہے اور اسے سی قسم کی گرمی برداشت نہیں ہوتی بلکہ اگر ایسے مریض کو آگ کے سامنے بٹھا دیا جائے تو تشنج شروع ہوجا تا ہے۔ بیلا ڈونا اور اپیس دونوں کے مریضوں کو گرمی سے چھپا کی نکل آتی ہے۔ پلسٹیلا میں بھی بیلا ڈونا اور اپیس دونوں کے مریضوں کو گرمی سے چھپا کی نکل آتی ہے۔ پلسٹیلا میں بھی

یہ علامت ہے۔ الی صورت میں پلسٹیلا اور بیلا ڈونا ملا کر دینا مفیدر ہتا ہے۔ بعض دفعہ الی چھپا کی کا معدہ سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ اگر معدہ خراب ہواوراس کے نتیجہ میں چھپا کی ہوتو پلسٹیلا اور نکس وامیکا کام آتی ہیں۔ بیلا ڈونا میں جلد پر سرخ دھبے اور پیپ والے زخم ظاہر ہوتے ہیں، سوزش بھی ہوتی ہے جوابیس سے مشابہ ہوتی ہے جلد پر ظاہر ہونے والے دانوں اور چھالوں سے بھی دواؤں کی بہچان ممکن ہے مگراس کے علاوہ بعض اور علامتیں بھی مددگار ہوجاتی ہیں۔ آرم ٹرائی فیلم بھی چھپا کی کی بہت اچھی دوا ہے لیکن اس کی ایک علامت ہے کہناک میں اور ہونے والے رادگر دھجلی ہوتی ہے۔

بیلا ڈونا کا کلکیر یا کارب سے بھی تعلق ہے خصوصاً نیم مزمن بیاریوں میں۔ جہاں بیلا ڈونا کام کرنا چھوڑ دے وہاں کلکیر یا کارب بہت کارآ مد دوا ہے۔ بعض دفعہ بیلا ڈونا کی علامتیں سلفر کی طرف منتقل ہوجاتی ہیں اور سلفر کلکیر یا کارب کی علامتیں پیدا کر دیتا ہے۔ کلکیر یا کارب بہت می دواؤں کا جنگشن یعنی مقام اتصال ہے لیکن اگر کلکیر یا کارب کے بعد سلفر دیں تو نقصان دہ ہے۔ اس لئے دونوں کے بیچ میں لائیکو پوڈیم دینا ضروری ہے۔ البتہ سلفر کے بعد کلکیر یا کارب براہ راست دی جاسکتی ہے۔

بیلا ڈونا کی علامات میں چھونے، جھٹکا لگنے، شور وغل اور ہوا کے جھونکوں سے اضافہ ہوجا تا ہے۔ نیم دراز ہونے کی حالت میں افاقہ محسوس ہوتا ہے۔

> مددگاردوائیں: کلکیریاکارب۔ایکونائٹ۔سلفر دافع انژدوائیں: کیمفر۔کافیا۔اوپیم۔ایکونائٹ طاقت: 30سے کی۔ایم(CM) تک

ىيلس 143

34 يىلى

BELLIS PERENNIS

بیلس شخنے کی موچ ، پیٹوں کے در داور چوٹ کے نتیجہ میں اجتماع خون کے لئے بہترین دوا ہے لئین ہے آرنیکا اور روٹا کی طرح بہت کثرت سے استعال نہیں ہوتی ، حالا نکہ ان کالیف میں یہ بہت اہم ہے۔ شخنے کی موچ بہت تکلیف دہ چیز ہے اور زندگی بھرٹھیک نہیں ہوتی لئین بیلس دینے سے شخنے کا بہت پرانا در دبھی رفتہ رفتہ ٹھیک ہوجا تا ہے۔ بسااوقات چلتے چلتے شخنے مڑجاتے ہیں اور شد یددر دہوتا ہے۔ آرنیکا سے وقتی فائدہ ہوجا تا ہے لیکن پچھ عرصہ کے بعد در ددوبارہ ظاہر ہوتا ہے۔ الیمی تکلیف کے دائمی ہونے کار جحان بیلس کی تکالیف ٹھنڈی ہواسے شدت اختیار کرلیتی ہیں۔ محنت کش کسانوں اور مزدوروں کی جسمانی تھکا وٹ اور درد کو دور کرنے کے لئے بیلس بہترین دوا ہے۔ لیمی عرصہ کی مسلسل محنت کے نتیجہ میں جوڑ جواب دے جائیں تو بیلس دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔

ایام میل میں عورتوں کی ٹائلوں میں اکثر وریدیں لیعنی نیلے خون کی رگیس (Vericose Viens)

اکھرآتی ہیں۔اس تکلیف میں بیلس بہت اہم دوا ہے، لیکن اکثر ہومیو پیتھ معالجین اسے بھلادیت ہیں اور دوسری دواؤں پر ہی توجہ دیتے ہیں۔ پیٹ کی بیرونی دیواروں میں در داور دکھن کے لئے بھی بیلس بہت مفید ہے۔ رحم اور پیٹ کے پھوں میں در دہوتا ہے اور بعض عورتیں بیٹھ کراٹھنے میں تکلیف محسوں کرتی ہیں اور انہیں پکڑ کراٹھا نا پڑتا ہے۔ان کے لئے بھی بید دوا مفید ہے۔ بیلس کا ریڑھ کی میڈ کی کے عضلات سے گہراتعلق ہے۔ عضلات میں کمزور کی آجاتی ہے۔ کی میر کے ادھر ادھر مڑجاتے ہیں۔ ریڑھ کی مڈی کے آجاتی ہیں۔ ریڑھ کی مڈی کے آجاتی ہیں۔ ریڑھ کی مڈی کے آجاتی ہیں۔ ریڑھ کی مڈی کے

بيلس 144

عضلات کوطافت بخشنے کے لئے بیلس بہترین ثابت ہوتی ہے۔ ایک آ دھ مہرے میں بھی تکلیف ہوتو چلنا پھرنا دو بھر ہو جاتا ہے اس صورت حال میں بیلس بہت نمایاں اثر دکھاتی ہے۔ ہے۔ دریڑھ کی ہڈی کی چوٹ اور اعصاب میں سوزش کے لئے بھی بیلس بہت اچھی ہے۔ دمجی کی تکلیف کے لئے بھی بیلس بہت اچھی ہے۔ دمجی کی تکلیف کے لئے بھی ہائی پیریم (Hypericum) بہت خاص دوا ہے۔ اسے بیلس یا آرینکا سے ملاکر دیں تو انشاء اللہ فائدہ اور بھی زیادہ ہوگا۔ ٹھنڈے یانی سے نہانے اور ٹھنڈی ہواسے مرض بڑھتا ہے۔

مددگاردوائیں: آرنیکا-آرسنگ سٹفی سگریا-برائیونیا طاقت: 30سے 200 تک

35

بنزنونيكم ايسدم

BENZOICUM ACIDUM

(Benzoic Acid)

بنز وئیک ایسڈ کی سب سے واضح علامت پیشاب میں شدید ہو ہے جو گھوڑے کے بیشاب کی بد بوسے مشابہ ہوتی ہے اور اس بیچھا حیمٹر وانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ ایسی غیر معمولی بد بوہوتی ہے کہ بعض دفعہ کیڑے دھونے سے بھی ختم نہیں ہوتی۔جس گھر میں ایسے مریض ہوں اگروہ کیڑوں کی صفائی کا خاص اہتمام نہ کریں تو ایسے گھر میں داخل ہوتے ہی شدید بو کا جھون کا آتا ہے۔بعض بیچرات کوبھی بستر گیلا کردیتے ہیں جس سے دوہری مصیبت بن جاتی ہے۔سارا گھر بد بوسے بھر جاتا ہےاور کیڑوں پرایسے داغ لگ جاتے ہیں جو دھونے سے بھی نہیں اترتے۔ بیشاب بہت گہرے رنگ کا سیاہی مائل ہوتا ہے۔ایسے مریضوں میں اگر پورک ایسڈ کی زیادتی ہوتو بیددوا کام آتی ہے۔گردوں میں درداوراس کے دیگرا فعال میں کمز وری واقع ہوجاتی ہے۔عموماً کھلا بیشاب آتا ہے لیکن بیشاب کی مقدار کم ہوجائے توجوڑوں میں در دہونے لگتاہے۔ بنز وئیک ایسڈ کا مریض لکھتے ہوئے لفظ چھوڑ دیتا ہے۔ وقتی طور پرتحریر کی غلطی ذہنی الجھاؤ کی وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہے۔بعض دفعہ ذہن بہت تیز کا م کرتا ہے کیکن ہاتھوں کی رفتاراس نسبت سے ذہنی رفتار کا ساتھ نہیں دیتی ۔ بیعلامت بعض اور دواؤں میں بھی موجود ہے۔اسے کسی خاص دواسے منسلک کرنا درست نہیں ہے۔ جب بھی تحریر میں لفظ جیموٹ رہے ہوں یا ایک لفظ کی بجائے کو ئی دوسرا لفظ کھھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ذہن الفاظ سے زیادہ معافی کی طرف متوجہ ہے۔اس لئے بیک وقت دونوں میں اعتدال قائم نہیں رکھسکتا۔ایسےلو گوں کی تحریروں میں جہاں سوچ کی رفتار لکھنے کی رفتار

سے بہت زیادہ ہوجائے ایسی غلطیاں ہوجایا کرتی ہیں۔اس لئے خواہ نخواہ ان لوگوں پر بنز وئیک ایسڈ استعمال نہیں کرنا چاہئے۔ ہاں اگر ذبنی پریشانی اور پیشاب کی علامتیں بنز وئیک ایسڈ والی ہوں اور پھر تحریر میں غلطیاں بھی ہوں تو بنز وئیک ایسڈ سے آرام آئے گا۔

بزوئیک ایسڈ میں سرمیں چکر آتے ہیں اور کسی ایک طرف گرنے کا خوف رہتا ہے۔
سردرد ہوا کے جھونکوں ،سردی گئے اور سرکونگا کرنے سے بڑھ جاتا ہے۔ کنپیٹیوں کی شریا نوں میں
گرمی کا احساس جس کی وجہ سے کا نول کے اردگر دسوزش والی تعلیمانی ورم ہوجاتی ہے۔ سردرد
کے ساتھ متلی اور نے کار جحان بھی ہوتا ہے ،سر پر ٹھنڈ ایسینہ آتا ہے ، ہاتھ بھی بہت ٹھنڈ ہے ہو
جاتے ہیں ، ناک میں خارش اور درد کے ساتھ سونگھنے کی حس کم ہوجاتی ہے ، آئھوں میں جلن اور
تیکن ، آئھوں کی تکلیفیں کھی ہوا میں اور ٹیوب لائٹ میں بڑھ جاتی ہیں۔ سردرد گدی سے شروع
ہوتا ہے۔

بنز وئیک ایسڈ میں چہرے پر سرخ رنگ کے چٹاخ بن جاتے ہیں جوصحت کی علامت نہیں بلکہ بیاری کی نشاندہی کرتے ہیں۔عموماً عورتوں کے چہرے پر بیہ علامت ظاہر ہوتی ہے۔چہرہ کے ایک جانب گرمی اورجلن کا احساس ہوتا ہے۔بعض دفعہ چہرے پر چھوٹے چھوٹے آبلے پڑجاتے ہیں۔ چہرے کی علامات بیرونی گرمی سے اور دبانے سے کم ہوجاتی ہیں۔

بنز وئیک ایسڈ میں کھانا کھاتے ہوئے بسینہ آتا ہے، معدہ میں تخی اور دباؤ کا احساس، جگر کے مقام پر چین اور درد، اسہال جھاگ والے، بد بودار اور پتلے ہوتے ہیں۔ ہوا بہت خارج ہوتی ہے۔

بنز و تیک ایسڈ میں صبح کے وقت مریض کی آ واز بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ سبزی مائل بلغم خارج ہوتی ہے۔ کھانسی رات کو بڑھ جاتی ہے۔ رات کوسوتے ہوئے در دمیں اضافہ ہوتا ہے۔ آ دھی رات کے بعد شدید دھڑکن اور گرمی کی شدت کی وجہ سے مریض کی آ نکھ کھل جاتی ہے۔ بزوئیک ایسٹر کے بارے میں اکثر کتب میں یہ کھا ہوا ہے کہ اس میں گاؤٹ (Gout) ہزوئیک ایسٹر کے جانہ کی ابتداء معدہ سے ہوتی ہے۔ معدہ میں السریا ہاضمہ کی خرابی کی وجہ سے درد ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل اس وقت ہے لیکن بعض اوقات معدہ میں گاؤٹ کی وجہ سے بھی درد ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل اس وقت میرے علم میں نہیں کہ معدہ میں گاؤٹ کسے ہوتا ہے۔ غالبًا معدہ میں پیدا ہونے والے فاسد تیز ابول میں یورک ایسٹر بھی ہوگا جوگاؤٹ بیدا کرنے والا ہے مگر معدہ میں بنز وئیک ایسٹر کے پیدا ہونے کا کوئی قطعی ثبوت میرے علم میں نہیں۔ ہاں یہ بعید نہیں کہ بنز وئیک ایسٹر جب جوڑوں کی دیگر جھلیوں میں گاؤٹ پیدا کرسکتا ہے تو یہ خون کی وساطت سے معدہ کے عضلات کو بھی متاثر دیگر جھلیوں میں گاؤٹ بیدا کرسکتا ہے تو یہ خون کی وساطت سے معدہ کے عضلات کو بھی متاثر کرے اور گاؤٹ کی تکلیف کا آغاز و ہیں سے ہو۔ یہ درست ہویا غلط، کین اکثر اسے بنز وئیک ایسٹر کی علامت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔

کلائی، گھٹنوں، پاوُس کے انگوٹھوں وغیرہ کی سوجن اور در دبنز وئیک ایسڈ کی زیادتی سے بھی ہوجاتی ہیں۔اسی طرح ریڑھ کی ہڈی میں دباؤ اور ٹھٹڈک کا احساس اور زبان کا سوجنا بھی بنز وئیک ایسڈ کی علامات ہیں جو پکرک ایسٹر اور مرکزی میں بھی پائی جاتی ہیں۔

طاقت: 30 سے 200 تک

149 *X.X.*Ü

36

ېرېرس ولگرس

BERBERIS VULGARIS

(Bar berry)

بربرس پہاڑی علاقوں میں پیدا ہونے والا پودا ہے۔ اس کے تازہ پتوں کوتپ محرقہ کے لئے استعال کیا جاتا ہے۔ بربرس کوعموماً مدر ٹنگجر میں استعال کرتے ہیں اور اکثر ہومیو پیتھک معالجین اسے صرف گردے کی تکلیفوں میں ہی دیتے ہیں حالانکہ یہ بیتے کی پیخری اور جگر کی محری یار پول کے لئے بھی ایک مؤثر دوا ہے۔ اگر جگر کی خرابی کی وجہ سے دل کی تکلیف ہوتو وہاں بھی بربرس مفید ہوگی لیکن یہ براہ راست دل کا ٹائک نہیں ہے۔ اول طور پر جگر کی خرابی کی دوا ہے۔ اگر جگر کی خرابی کی وجہ سے دل کی تکلیف ہوتو اسے بھی ٹھیک کرسمتی ہے۔ اول طور پر جگر کی خرابی کی دوا ہے۔ اگر جگر کی خرابی کی وجہ سے دل کی تکلیف ہوتو اسے بھی ٹھیک کرسمتی ہے۔

جوڑوں کے درد میں ہر برس اچھا اثر دکھاتی ہے۔ اس کے استعال ہے جسم کے تیزائی مادے بذریعہ پیثاب نکلنا شروع ہوجاتے ہیں اور جسم ہلکا ہوجا تا ہے۔ جوڑوں کے درد میں کی آ جاتی ہے۔ ہر برس کے مریض کے نقنوں میں اس طرح بے چینی اور خارش می ہوتی ہے جیسے اندر کوئی چیزرینگ رہی ہو۔ اکثر بائیں نتھنے میں نزلہ بیٹھ جاتا ہے جو سخت ضدی ہوتا ہے۔ منہ میں خشکی سے زبان چیکتی ہوئی ہوئی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ بھی بھی منہ میں دھنگی ہوئی ورئی کی طرح کا تھوڑ اتھوڑ اتھوڑ اجھا گ دار تھوک پیدا ہوتا ہے جو منہ اور گلے کو تر نہیں کرسکتا۔ بھی زبان بر چھالے بھی ہوجاتے ہیں۔

مردوں کی بیشاب کی نالی جوخصیوں کے اندر مادہ منویہ کی نالی میں سے گزرتی ہے اس میں درد کی لہریں دوڑتی ہیں جو گردے اور مثانے کی تکلیف کے دوران زیادہ زور پکڑ جاتی ہیں۔ بیشاب کے بعد بیاحساس رہتا ہے کہ ابھی کچھ بیشاب باقی ہے اور انسان دہر 150 *U.s.s.*

تک اسے نکالنے کے لئے زورلگا تار ہتا ہے۔ پیشاب میں بھی بھی بیپ جیسی چیزیانا کے جیسا مادہ اور بھی سرخ ذرے شامل ہوتے ہیں اور پیشاب سخت متعفن ہوتا ہے۔

کندھوں، باز وؤں، ہاتھوں، ٹانگوں اور پاؤں میں اور ٹاخنوں کے اندرلہر دار درد اور کمزوری بربرس کی خصوصی علامتیں ہیں۔

ربرس کے دردوں کی خاص علامت سے ہے کہ بیا یک مقام سے سائکل کے پہیہ کے تاروں کی طرح چاروں طرف پھیتے ہیں۔ گردے کے درد کی بھی یہی عادت ہے کہ نیچے مثانہ کی طرف بھی ٹیسیں چلتی ہیں اوراو پر کمراور جگر کی طرف بھی۔ درد کی جواہریں نیچے اترتی ہیں وہ مردوں کے خصیوں کی طرف جانے والے اعصابی ریشوں کے راستے خصیوں میں بھی محسوس ہوتی ہیں۔ اکثر ایسے مریض کو پیشاب کی حاجت بیٹھے بیٹھے اگر نہ بھی محسوس ہوتو کھڑا ہوتے ہی یا چلنے پر بیشاب کی سخت حاجت ہوتی ہے جس کا روکنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر مریض مردانہ یورینل بیشاب کی سخت حاجت ہوتی ہے جس کا روکنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر مریض مردانہ یورینل بیشاب کی سخت حاجت ہوتی ہے جس کا روکنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر مریض مردانہ یورینل بیشاب کی سخت حاجت ہوتی ہونے میں ہی نہیں آتی اور یوں لگتا ہے کہ گردہ مسلسل ہونے کے باوجود پیشاب کی تیلی دھارختم ہونے میں ہی نہیں آتی اور یوں لگتا ہے کہ گردہ مسلسل بیشاب بنائے چلا جارہا ہے۔

بربرس میں پیشاب کی تکلیف کی جوعلامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ان میں بھی پیشاب زیادہ اور پتلا ہوجاتا ہے اور بھی کم اور گاڑھا ہوکر بہت بد بودار ہوجاتا ہے کیونکہ اس میں بہت فاسد مادے موجود ہوتے ہیں۔ پیشاب کی زیادتی یا پیشاب کی کمی یہ دونوں علامتیں بربرس میں پائی جاتی ہیں۔اگر پیشاب زیادہ آئے تو گردے صاف ہوجاتے ہیں اور بد بووغیرہ ختم ہوجاتی ہے۔ پیشاب بہت کم ہوجائے تو بہت گہرے رنگ کا تھوڑا پیشاب آئے گا جوسخت بد بودار ہوتا ہے۔ جب بیشاب کم ہوتو پیشاب کی نالی میں کچھ بچھ جلن ہوتی رہتی ہے۔

پریرابر یوا (Pereira Brava) کا گردے کا دردغموماً ایک رخ پر چلتا ہے۔ اکثر گردے کے نیچران کی طرف اتر تا ہے کیکن بربرس میں دردخواہ گردے میں ہویا پتے میں، چاروں طرف بھیاتا ہے۔ اس علامت کے ساتھ پتے کی درد میں بربرس بہت مؤثر ہے۔ ہفتہ دس دن کے اندر ہی پتے کی پتھریاں ٹوٹ ٹوٹ کر فضلے کے ساتھ خارج ہونے گئی ہیں۔

بربرس میں وجع المفاصل (Rheumatism) یعنی عام بڑے جوڑوں کے دردسے زیادہ کاؤٹ (Gout) یعنی ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں کے درد کی علامت پائی جاتی ہے۔ پنجوں اور ہاتھوں کی انگلیوں وغیرہ میں جودرد ہوتے ہیں ان کا بنزوئیک ایسٹر (Benzoic Acid) کی طرح بربرس سے بھی گہراتعلق ہے۔ کولہوں یا ٹائگ کا درد کھڑے ہونے پر شروع ہوجا تا ہے کی طرح بربرس سے بھی گہراتعلق ہے۔ کولہوں یا ٹائگ کا درد کھڑے ہونے پر شروع ہوجا تا ہے اور تھوڑا ساچلنے سے ہی ٹائگ درد سے بھر جاتی ہے۔ پاؤں میں بھی خصوصاً ایرٹریوں اور تلووں میں تکلیف ہوتی ہے۔

نقرس (Gout) کے دردوں میں بعض دفعہ بنز وئیک ایسڈ ، بربرس کا بہترین متبادل ثابت ہوتا ہے۔ان دونوں دواؤں کوادل بدل کربھی دیا جاسکتا ہے۔

بربس کے بارے میں اچھے ہومیو پیشک معالجین بتاتے ہیں کہ جگر کی خرابی کے میتے ہمیں اگر دل کمزور ہو تو یہ پہلے جگر ٹھیک کرتی ہے چردل بھی خود ہی ٹھیک ہوجا تا ہے۔ اگرجسم میں کہیں تیز ابی مادے اور پوریا وغیرہ جمع ہوجا ئیں تو یہ دواان کو ہاں سے ہلاتی رہتی ہے اور خون میں تیز ابی مادے شامل ہو میں شامل کرتی ہے چران کوگردوں کے ذریعہ باہر نکال دیتی ہے۔ خون میں تیز ابی مادے شامل ہو جائیں دل جائیں تو وقتی طور پر دل بھی متاثر ہوسکتا ہے اور جب تک بیر تیز ابی مادے خارج نہ ہوجا ئیں دل میں احساس رہتا ہے ورنداس دوا کا براہ راست دل کی بیاریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر بر برس کے استعمال کے دوران دل پر برااثر پڑے تو مریض کوزیادہ پائی پلانا چا ہے تا کہ پیشا ب زیادہ آئے اور فاسد مادے اور تیز اب پیشا ب کے ذریعہ تیزی سے خارج ہوں اور دل کوئیگ نہ کریں۔

اور فاسد مادے اور تیز اب پیشا ب کے ذریعہ تین کی بے اختیار چینیں نکل جاتی ہیں۔ بر برس کے مریض کی بے اختیار چینیں نکل جاتی ہیں۔ بر برس کے مریض کی مین پر آ ہستہ آ ہستہ پاؤں رکھتا ہے اور اس کی قراب کے دوران کی بھر سے مریض کی بین بر آ ہستہ آ ہستہ پاؤں رکھتا ہے اور اس کی موقت لگتا ہے۔

سرکے اوپر کسی چیز کے لیٹنے کا احساس ہوتا ہے۔ گلونائن میں بھی سر پر پٹی بندھی ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ٹو پی اور بند کالرنا قابل بر داشت ہوتے ہیں لیکن بر برس میں سر پر کچھ بھی نہ ہو پھر بھی کچھ بندھے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔سورائینم کے مریض کی 152 *U.*1.7.

طرح بربرس کے مریض کوبھی بھوک کے دورے پڑتے ہیں۔

بربرس کی دردوں کی ایک علامت یہ ہے کہ جیسے کسی نے چاقو گھونپ دیا ہوخصوصاً حگراور پتے دونوں میں یہ چاقو گھو پننے کا سااحساس ہوتا ہے۔اس کی دردیں ماؤف جگہ سے پھلجڑی کی طرح چاروں طرف پھیلتی ہیں۔

بربرس میں برقان بھی پایا جاتا ہے اور اجابت کارنگ بدل کرمٹی کی طرح ہوجاتا ہے۔
الیں صورت میں کارڈووس میریانس (Carduus Marianus) بھی ساتھ ملا کردینی فائدہ مند
ہوتی ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی مددگار ہوجاتی ہیں۔ میں
حگر کی تکلیف میں مدر گیجر دیتا ہوں جبکہ گردے کی تکلیف اور گاؤٹ وغیرہ میں 30 طاقت میں
جھی دی جاسکتی ہے۔ بربرس اور کارڈووس دونوں کے مزاج ملتے ہیں۔

گردے کی شدید درداور پھری کے لئے بربرس مفید ہے کین یہ بچھ لمباعرصہ کھلانی
پڑتی ہے تا کہ پھری رفتہ رفتہ گھل کر ہا ہم آ جائے کیکن آگر پھری اگز الک ایسڈ کی ہوگی تو بربرس فائدہ
نہیں دے گی بلکہ کلیتا ہے اثر ہوگی۔ اگز الک ایسڈ کی پھری Oxalates سے بنتی ہے اور وہ بہت
سخت ہوتی ہے اور ایک خاص قسم کی شعاؤں سے اس کا علاج ہوتا ہے۔ میرے تجربہ کے مطابق
سلیثیا اور کلکیریا فلور 6x ملاکر بچھ عرصہ کھلایا جائے تو یہ رفتہ اس پھری کو بھی گھلادیتی ہیں۔

بربرس کی ایک علامت میہ ہے کہ منہ میں کوئی چیز چیکنے کا احساس رہتا ہے۔جھاگ کی طرح چیکنے والاتھوک بنتا ہے۔ زبان پر بہت باریک باریک دانے نکل آتے ہیں اور زبان خری ہوجاتی ہے۔ زبان پر بہت باریک باریک باریک دانے نکل آتے ہیں اور زبان خری ہوجاتی ہے۔

بربرس میں حرکت کرنے اور کھڑے ہونے سے ٹانگوں میں درد کے ساتھ پیشاب کی تکلیف بھی بڑھ جاتی ہے۔

> دافع اثر دوائیں: کیمفر بیلاڈ ونا کیمومیلا طافت: مدر ٹیکچر (Q)

المحتمر المحتم

37



BISMUTHUM

بسمتھ کو پرانے زمانے میں ایلو پیتھک ڈاکٹر اسہال کی بیاری میں استعمال کرتے تھے۔
یہ اسہال کوتو خشک کر دیتی ہے مگر انٹڑیوں کی اس مرض کو دور نہیں کرتی جس کی اسہال محض ایک
علامت ہوتے ہیں۔ درد کا احساس بدستورر ہتا ہے۔ ہومیو پیتھی میں اس کی د ماغی علامات بہت
نمایاں ہوتی ہیں۔ مریض ایک منٹ کے لئے بھی تنہا نہیں رہنا چا ہتا۔ ہر وقت کسی نہ کسی کو اپنی
ساتھ رکھنا چا ہتا ہے۔ بڑھا ہے میں اکثر ایسے مریض ملتے ہیں جن کے پاس ہر وقت ضرور کوئی نہ
کوئی ہونا چا ہتا ہے۔ بڑھا ہے میں اکثر ایسے مریض ملتے ہیں جن

بسمتھ دانت کے دردول میں بھی مفید ہے۔ مسوڑ سے سوج جاتے ہیں۔ زبان سفیداور متورم ہوجاتی ہے۔ کناروں پر سیاہی ماکل زخم ہوجاتے ہیں جوگینگرین کی یا ددلاتے ہیں۔ بسمتھ کے مریض کی قوت ہاضمہ کمزور ہوجاتی ہے اور فاسفورس اورا پیھوزا کی طرح معدے میں پانی نہیں گھرتا، گرم ہوتے ہی قے ہو جاتی ہے جبکہ گھوس غذا کھانے پرقے نہیں ہوتی۔ بہت بد بودار ڈکار آتے ہیں۔ پیٹے کا درد ڈائسکو ریاسے مشابہ ہوتا ہے۔ مریض پیچے کی طرح جھکتا ہے۔ درد کی نوعیت عام پیٹ دردسے مختلف ہوتی ہے جسے مریض بیان نہیں کرسکتا۔ اسہال کے دوران در ذہیں ہوتا۔ بسمتھ سے اسہال خشک کردیئے جائیں تو درد شروع ہوجائے گا۔ معدہ میں سوزش ہوتی ہے۔

بسمتھ انجائیا میں بھی مفید دواہے۔اس میں عموماً سینے کی مڈی کی بجائے بائیں طرف دل سے درداٹھتا ہے اور کندھے سے ہو کرانگلیوں کے کناروں تک جاتا ہے۔ بسا اوقات 154

یہ در دانجائنا کے علاوہ معدے میں السریا سوزش کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں بسمتھ دوا ہوسکتی ہے۔

بسمتھ میں بائیومس کی طرح پر تشدد جنسی خوابوں کا رجحان ماتا ہے۔ بسمتھ کے اسہال میں ضرور کوئی فاسد مادہ ایسا ہوتا ہے جونبیند کے دوران انتز یوں سےخون میں مل کرد ماغ پر اثر انداز ہوتا ہے اور پریشان خوابیں اس کے نتیجہ میں آتی ہیں۔

مددگار دوائیں: آرسنگ بیلا ڈونا کرئیوزوٹ دافع اثر دوائیں: نکس وامیکا کیسیکم طاقت: 30 سے 200 تک بوريكس 155

38

بور بکس

BORAX

(پیول کیا ہواسہا گہ)

بوریکس کوابلو پیتھک طریقہ علاج میں آئکھوں کی نکلیفوں میں استعال کیا جاتا ہے۔ اس

کے علاوہ گلے کی نکلیفوں میں اسے شہد کے ساتھ ملا کر دیتے تھے۔ ہومیو پیتھک طریق علاج میں

بوریکس زیادہ وسیج الاثر دوا ثابت ہوتی ہے اور عور توں کی بعض گہری امراض میں بھی بہت اچھا اثر

دکھاتی ہے۔ دودھ پلانے والی عور توں کے منہ میں زخم اور چھالے بن جائیں اور ان کے

نیج بھی اس بھاری سے متاثر ہوں تو ان کے لئے یہ بہترین دوا ہے۔ بوریکس میں زخم اور چھالے

بننے کا رجی ن عام ہوتا ہے۔ زبان پر بھی سرخ اور دکھن پیدا کرنے والے آبلے سے بن جاتے

میں۔ بوریکس کا مزاج رکھنے والی عور توں میں بہت گرم اور جلن پیدا کرنے والا لیکوریا بہت زیادہ

مقدار میں بہتا ہے۔ اس بھاری میں مبتلا اکثر عورتیں بانجھ بن کا شکار ہوجاتی ہیں۔ جب تک ان

کا علاج بوریکس سے نہ کیا جائے بچے بیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے اس علامت کو بانجھ بن کا علاج

کرتے وقت پیش نظر رکھنا چاہئے۔ بوریکس اس میں بے مثل دوا ہے۔ بوریکس کی مریضہ کو چھرکے

وقت سے پہلے اور بہت کثر سے سے آتا ہے۔ اس دوران پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے جو کمر کے

وقت سے پہلے اور بہت کثر سے سے آتا ہے۔ اس دوران بیٹ میں شدید درد ہوتا ہے جو کمر کے

یکھیے تک جاتا ہے۔

کالی کھانسی میں بھی بوریکس ایک مفید دوا ہے۔ تشنجی کھانسیوں میں اکثر اچھااثر دکھاتی ہے۔ اس میں کھانسی کا دورہ انتہائی شدت سے ہوتا ہے۔ چھاتی کے اندر سے کھڑ کھڑ اہٹ کی آواز آتی ہے۔ سینے میں درداور سوئیاں چھنے کا احساس ہوتا ہے۔ پاؤں کے تلووُں میں بھی سوئیاں چھتی ہیں۔

بوریکس کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ نیچے کی طرف حرکت کرتے ہوئے خوف

محسوس ہوتا ہے۔ اگر بچے کو کھٹو لے میں اتا را جائے تو وہ گھبراہٹ محسوس کرتا ہے اور خوفز دہ ہوکر چنتا ہے۔ یہ علامت صرف بچوں میں ہی نہیں بڑوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ لفٹ سے ینچے اتر تے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے یا کاراونچائی سے ینچے ڈھلان پر آ رہی ہوتو دل بیٹھنے لگتا ہے۔ آ واز وں سے زود حسی پائی جاتی ہے۔ مریض کسی اچا نک شور اور دھا کے کی آ واز سے گھبرا جاتا ہے۔ اس دوا میں گلا بیٹھنے کار جحان بھی پایا جاتا ہے۔ بور کیس کے تمام اخراجات میں گرمی پائی جاتا ہے۔ اس دوا میں گلا بیٹھنے کار جحان بھی پایا جاتا ہے۔ بور کیس کے تمام اخراجات میں گرمی پائی بہتا ہے لیکن اس میں جلن نہیں ہوتی بلکہ نزلاتی علامات نمایاں ہوتی ہیں۔ آ تکھول کے ککروں میں بھی مفید ہے۔ ناک میں مواد خشک ہوکر جم جاتا ہے جوا کثر سخری مائل ہوتا ہے۔

بوریکس کے مریضوں کا معدہ خراب ہوتو زیادہ ہوا پیدا ہونے کے علاوہ قے کا رجحان ہوتا ہے۔ ہوتا ہے جوایک دفعہ شروع ہوجائے تو رکنے میں نہیں آتی۔ سبزی مائل کھٹا مواد خارج ہوتا ہے۔ اعصابی تھکاوٹ کی وجہ سے رات کو پسینہ آتا ہے۔ اگر کسی بیاری کے نتیجہ میں جنسی طاقتیں جواب دے جائیں توان کے لئے بھی بوریکس بہت کار آمد دوا ہے۔

بلوریس (یعنی ذات البحب) میں بوریس کی علامتیں برائیونیا سے ملتی ہیں۔ اگر برائیونیا فائدہ نہ دے یا ایک مقام پررک جائے تو بوریس اس کے اثر کوآگے بڑھاتی ہے۔ مرگ میں بھی بوریس کومفید دواسمجھا جاتا ہے۔اس کی تکیفیس گرمیوں میں بڑھ جاتی ہیں۔

> مددگاردوائیں: برائیونیا۔سلفر۔کلکیریا کارب دافع اثر دوائیں: کیمومیلا۔کافیا

غیرمطابقت: ایسیٹک ایسڈ ۔ وینی گر (سرکہ) ۔ شراب

طاقت: 30

بووسٹا 157

39

بووسطا

BOVISTA

بووسٹا کوعام انگریزی میں Puff - Ball بھی کہتے ہیں۔ بیروایٹا بچول کے ایگزیما میں استعال ہوتی رہی ہے۔ ایسے مریض جنہیں ایگزیما ہواور خون بہنے کا رجحان ہواور وہ کچھ ہکلاتے بھی ہوں تو ان کے لئے بدایک بہت اعلیٰ دوا بتائی جاتی ہے۔ عام انسانوں کے مقابل براس کے مریضوں کا دم لکڑی کے دھوئیں سے بہت زیادہ گھٹتا ہے۔اگر دھواں ادھ جلے کو کلے کا ہوتو اس سے ہرانسان کے خون میں کاربن مونو آ کسائیڈ (Carbon Mono Oxide) شامل ہوکراہے گہری نیندسلا دیتی ہے۔ یہ نیندصحت مندنہیں ہوتی بلکہاس زہر کے مہلک اثر سے آتی ہے۔اگرفوری طوریراس کا علاج نہ ہواور مریض کوایسے کمرے سے کھلی ہوا میں باہر نہ لے جایا جائے تواکثر اس کی بیٹھی نیندا سے موت سے ہم آغوش کر دیتی ہے۔ ساری جلد کارنگ نیلا پڑ جاتا ہے۔ کاربووت کا اور آرنیکا 30 طاقت میں ملا کر دینا اس کا فوری کا میاب علاج ہے کیکن بعض کتابوں میں بووسٹا کوبھی اس تکلیف کے ازالے کے لئے ایک اچھی دوا بتایا گیا ہے۔ بووسامیں منہ اور ناک کے کناروں پر زخم بن جاتے ہیں اور زخموں پرایک پلے حھلکے کی طرح تہد آ جاتی ہے۔نیٹرم میور میں بھی بہعلامت ہے لیکن اس کے زخموں میں کیا بن یا یا جاتا ہے اور کوئی تہہ نہیں جمتی ۔ بووسٹا میں نزلاتی مواد'' کوئس'' (Coccus) کی طرح دھاگے دار ہوتا ہے۔ ناک اور مسوڑھوں سے خون بہتا ہے۔ سرکی جلد میں تھجلی کے ساتھ

د ماغ میں بھی مبہم سی در د کا احساس رہتا ہے۔ بووسٹا میں تنگ کپڑوں سے گھبرا ہٹ ہوتی ہے۔

کوئی چیز بھی کسی ہوئی ہوتو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ علامت کیکیسس میں بھی ہے۔

بووسٹامیں دوحضوں کے درمیان کسی وقت اسہال لگ جاتے ہیں۔ حیض کا خون اکثر وقت سے پہلے اور بہت کھلا آتا ہے۔ جس کے بعد سبزی مائل گاڑھے کیکوریا کی شکایت بھی پیدا ہوجاتی ہے۔ بعض دفعہ دوحضوں کے درمیان ہلکا ساخون جاری ہوتا ہے یا داغ لگنے گئا ہے۔ پیدا ہوجاتی ہے۔ دردکو آگے جھکنے سے آرام ملتا ہے اور ناف کے اردگر ددر دزیا دہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ قولنج پید کے دردکو آگے جھانا قہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ درد قولنج میں کھانے سے کھانا قہ ہوتا ہے۔

بووسٹامیں بغل کے بسینہ سے بیاز کی بو آتی ہے۔ ہاتھوں کی بیت پرا گریماہوجاتا ہے۔ جذبات کی شدت اور بیجانی کیفیت سے جلد کی علامات پر بدا تر پڑتا ہے۔ بووسٹا میں جلد پر دباؤڈ النے سے گڑھا سابن جاتا ہے جوکافی دیر تک رہتا ہے۔ جلد کی تکلفیں گرمی سے بڑھتی ہیں۔ بیرانی چھپا کی میں اگر رسٹاکس پورا فائدہ نہ دی تو بووسٹا مکمل شفاء کا موجب بن سکتی ہے۔ کلکیریا، رسٹاکس، سپیا اور سی سی کوٹا (Sicicuta) سے موازنہ کرکے دیکھیں۔ ان سے موازنہ کرنا طبیب کے لئے اس کوبہتر سیجھنے میں معاون ثابت ہوسکتا ہے۔ بعض کتابوں میں 3 سے موازنہ کرنا طبیب کے لئے اس کوبہتر سیجھنے میں معاون ثابت ہوسکتا ہے۔ بعض کتابوں میں 3 سے موازنہ کرنا طبیب کے لئے اس کوبہتر سیجھنے میں معاون ثابت ہوسکتا ہے۔ بعض کتابوں میں بہترین کام آتی میں سے دور سے مقعد میں بہت تھبلی ہوتی ہے اور سارے جسم پر پھنسیاں بھی نکل آتی ہیں۔ صبح اٹھنے پر چھپا کی ہوجاتی ہے جس میں نہانا بہت مضر سارے جسم پر پھنسیاں بھی نکل آتی ہیں۔ صبح اٹھنے پر چھپا کی ہوجاتی ہے جس میں نہانا بہت مضر شابت ہوتا ہے۔ بووسٹا کوکول تارکا ایک اچھا تریا تی بتایا جاتا ہے۔

بروميم

40

بروميم

BROMIUM

برومیم کوایک زمانے میں خناقی (Diphtheria) کے لئے خاص دواہمجھا جاتا تھا۔
ایک لمبے عرصہ تک بینوآ موز ہومیو بیتھ معالجوں کی پہندیدہ دواتھی۔ آج کل مغرب میں مدافعتی شکوں کی وجہ سے خناق پر بہت حد تک قابو پالیا گیا ہے مگر غریب ممالک میں اب بھی بعض دفعہ یہ بیاری وہا کی طرح بھوٹ پڑتی ہے۔ اس میں برومیم سے بہت بہتر اور مؤثر دوائیں میور ٹیک ایسڈ، کالی میوراور ڈفتھرینم ٹابت ہوتی ہیں۔

برومیم میں ڈفتھیریا کی بجائے گلے کی دوسری بیاریاں عام ملتی ہیں۔غدودسوج کر سخت ہوجاتے ہیں اور گھلیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں،گل کراور پیپ بن کرختم نہیں ہوتیں۔اس دوا کا غدودوں کی ہرفتیم کی سوزش سے گہراتعلق ہے لیکن عام ہومیو پیتھ اس سے پورا استفادہ نہیں کرتے۔تھا ئیرائیڈ (Thyroid) کی ہرفتیم کی خرابی میں بہت کارآ مدہے۔اگر دوسری دوائیں علامات ملنے کے باوجود کام نہ کریں اور غدود بہت سخت ہو جائیں اور رفتہ رفتہ بڑھیں تو ایس صورت میں برومیم کوفراموش نہیں کرنا چاہئے۔اس میں بیصلاحیت موجود ہے کہ سخت جمی ہوئی گھلیوں کو بھی آ ہستہ گھلانے لگ جاتی ہے گراسے تدریجاً لمبے عرصہ پر پھیلا کردینا چاہئے۔ گھلیوں کو بھی آ ہستہ گھلانے لگ جاتی ہے گراسے تدریجاً لمبے عرصہ پر پھیلا کردینا چاہئے۔ گھلیوں کو بھی آ ہستہ گھلانے لگ جاتی ہے گراسے تدریجاً لمبے عرصہ پر پھیلا کردینا چاہئے۔ گھلیوں کو بھی از دی پر مردونی دین بھر کچھ دیر گھہر کر 1000 اور پھراس سے اونچی طافت

اس کے مریضوں میں معدے کے زخم عام پائے جاتے ہیں۔اگریسی ہوئی کافی کے رنگ کی الٹیاں آئیں اور معدے میں السر ہوا ور گھلیوں کا بھی رجحان ہوتو اس صورت میں برومیم بہت مفید ثابت ہوتی ہے بلکہ یہ معدے کے کینسر کی بھی بہت اہم دوا ہے۔ برومیم نرخرہ کے ورم (Laryngitis) میں بھی بہت مفید ہے کیونکہ اس میں بھی زخم بننے کا رجان ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں کو دمے میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ سینے کی ہڑی میں جلن اور درد بھی برومیم کی علامت ہے۔ اس میں تشنج بھی ہوتا ہے اور بیسانس گھنے میں بھی مفید ہے۔ اس کے مریضوں کو سمندر کے کنار ہے جاکر آرام محسوس ہوتا ہے اور سمندر سے دور خشک علاقوں میں بیاری بڑھ جاتی ہے۔

مددگاردوائیں: کونیم سپونجیا۔ آئیوڈم ۔ارجنٹم نائیٹر کیم دافع اثر دوائیں: ایمونیم کارب کیمفر طاقت: CM تک برائيونيا 161

41

برائيونياايلبا BRYONIA ALBA

برائیونیا ایلبا جنگلی درختوں اور جھاڑیوں پر چڑھنے والی ایک خودرو بیل ہے جس کی جڑ نہایت زہریلی اور کڑوی ہوتی ہے۔ اس کو پیس کر ہومیو پیتھی پڑینسی میں دوا بنائی جاتی ہے۔ برائیونیا کا انسانی جسم کے اکثر اہم اعضاء سے تعلق ہے۔ جن میں بھیپھڑ ہے، جگراور دل شامل ہیں۔ ان کی بیرونی جھلیوں پر برائیونیا زیادہ اثر انداز ہوتی ہے گر جگر کے معاملہ میں زیادہ گہرا اثر رکھتی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ بھیپھڑوں کی گہری بیاریوں مثلاً نمونیہ اور اس کے بدا ثرات میں بھی مفید ثابت ہوتی ہے لیکن تب دق اور دوسری کمبی چلنے والی بیاریوں میں برائیونیا اکیلی فائدہ مند نہیں بلکہ دوسری زیادہ گہری دواؤں کی مدد گاربن جاتی ہے۔

برائیونیاعضلات کےعلاوہ انترایوں کی جھلیوں پربھی اثر رکھتی ہے۔ برائیونیا کامریض اکثر قبض کاشکار ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ اسے شخت بیچین بھی شروع ہوجاتی ہے۔ جس میں خون شامل ہوتا ہے۔ خشکی کی وجہ سے انترایاں جگہ جگہ سے بچٹ جاتی ہیں اور سخت تکلیف دہ کھلی پیچش لگ جاتی ہے۔ اگر مریض میں برائیونیا سے ملتی جلتی علامات پائی جائیں تو بیچیش میں بہونوری اثر رکھنے والی دوا ہے۔

بعض ہومیو پیتھک ڈاکٹر زنے اپنی کتب میں برائیونیا کے بارے میں بہتا ثر دیا ہے کہ یہ کمزور، ڈھلے ڈھالے اور جلدتھک جانے والے عضلاتی ریشوں کی دوا ہے حالا نکہ یہ درست نہیں۔ برائیونیا مضبوط، طاقتو رعضلاتی ریشوں کی بھی بہترین دوا ہے۔ برائیونیا کے لئے ہرگزیہ شرطنہیں کہ ریشے کمزور ہوں گے تو یہ اثر کرے گی۔سارے جسم کے عضلات میں درد ملیریا کے بخار میں پیدا ہونے والے درد کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ

علامت برائیونیامیں نمایاں طور پریائی جاتی ہے۔

بعض لوگوں کو ایسی بیاریاں لگ جاتی ہیں جن کے نتیجہ میں ان میں چلنے پھرنے کی سکت نہیں رہتی۔ ان میں عام کمزوری نہیں ہوتی لیکن پچھ عرصہ چلنے سے جسم بھاری محسوس ہوتا ہے اور یہی بھاری بی بھاری بی بے اور یہی بھاری بن گہرے در دمیں تبدیل ہوجا تا ہے۔ ٹانگیں بے جان ہوجاتی ہیں۔ ایسے مریضوں میں برائیونیا بہت مفید ہے لیکن اسے مستقل دینا پڑتا ہے۔ لبی سیر پر جانے سے پہلے یا سخت کھیلوں کے آغاز پر ہی برائیونیا 1200 آرنیکا کے ساتھ ملا کر استعال کی جائے تو بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔

بعض اوقات عورتوں میں بچے کی پیدائش کے بعد ٹانگ سوخ جاتی ہے۔ کہتے ہیں۔ غالبًا خون کے جمنے کے نتیجہ میں خون کا داران رک جاتا ہے۔ بعض خوا تین کا بیمرض پرانا ہوجائے اور وہ معذور ہوجا ئیں اور کوئی علاج نہ ہو سکے اور ٹانگوں پر بعض خوا تین کا بیمرض پرانا ہوجائے اور وہ معذور ہوجا ئیں اور کوئی علاج نہ ہو سکے اور ٹانگوں پر نیلے اور کا لے دھیے بننے لگ جائیں اور ویری کوز و نیز کی علامتیں ظاہر ہوجائیں تو بیاری کے اس درجہ تک چہنچنے کے بعد آر نیکا اور برائی او نیا ملا کر دینا بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ہاں ان کے علاوہ ایسکولس 30 میں دی جائے تو بہتر نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ آگر یہی تکلیف بائیں طرف ہوتو ہیں۔ آگر یہی تکلیف بائیں طرف ہوتو ہیں۔ آگر یہی تکلیف بائیں طرف ہوتو ہیں۔ آگر یہی تکلیف بائیں کے ساتھ اول بدل کردیا جائے تو مزمن بیاریوں کو بھی جڑ سے اکھیڑ سکتی ہے۔ جگر کی گہری بیاریوں میں حسب ذیل نسخہ جائے تو مزمن بیاریوں کو بھی جڑ سے اکھیڑ سکتی ہے۔ جگر کی گہری بیاریوں میں حسب ذیل نسخہ بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ برائیونیا 200 دن میں ایک دو بار اور سلفر 30 دن میں 30 دفعہ روز انہ اس کے ساتھ کارڈ ووس میریانس مرشکیر کے چند قطر بے پانی میں ملا کر دن میں 30 دفعہ روز انہ اس کے ساتھ کارڈ ووس میریانس مرشکیر کے چند قطر بے پانی میں ملا کر دن میں 30 دفعہ دی جائے۔

المجان ا

کے بعد لاعلاج قرار دے دیا۔ جب یہ مجھا کہ اب دو تین دن کے مہمان ہیں تو انہیں ہسپتال سے فارغ کرکے گھر بھجوا دیا گیا۔ اس وقت جب اسی نسخہ سے ان کا علاج کیا گیا تو تین دن میں مرنے کی بجائے تین دن میں صحت کے آثار واپس لوٹ آئے جس کی پہلی علامت بی ظاہر ہوئی کہ پیاس اور بھوک جو بالکل مٹ چکی تھی از سرنو بحال ہونے گئی۔ جگر کے بہت سے دوسر سے مریضوں نے بھی اس نسخے سے استفادہ کیا ہے اور ابھی تک بقید حیات ہیں۔

بعض اوقات جگری امراض تلی میں منتقل ہوجاتی ہیں خصوصاً مزمن ملیریا میں ایسا ہوتا ہے۔ پہلے جگر خراب ہوتا ہے بھر تلی پھول جاتی ہے۔ ایسے مریضوں کوکارڈ ووس میریانس کے علاوہ سیانوھس (Ceanothus) مرر گیجر میں دینی چاہئے۔ سیانوھس تلی کی بہترین دوا ہے۔ بعض دفعہ ایسے مریضوں کے بیٹ بھول جاتے ہیں، تلی اور جگر کی جگہ پر سوزش اوران میں شخق بیدا ہوچکی ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں کا علاج جگر کی مندرجہ بالا ادویہ اور سیانوھس سے کرتے ہیں۔ بیدا ہوچکی ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں کا علاج جگر کی مندرجہ بالا ادویہ اور سیانوھس سے کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے دوتین مہینے کے اندراندر جبرت انگیز طور پر شفا ہوجاتی ہے یہاں تک کہ بیٹ اپنے پہلے جم پر واپس لوٹ آتا ہے اور دبانے سے بھی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ جن علاقوں میں ملیریا کثر ت سے ہوتا ہے وہاں یہ کیفیس عام ہوتی ہیں۔ وہاں یہی نسخہ استعال کرنا چاہئے۔

ہر حرکت سے درو اور بیار حصہ کی تکلیف کا بڑھنا برائیونیا کا خاصہ ہے۔اس کی رسٹاکس سے بھی کچھمشا بہت ہے۔رسٹاکس کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ آ رام کرنے سے درد بڑھتا ہے اور حرکت سے کم ہوجا تا ہے۔ یہ بات بعینہ درست نہیں۔رسٹاکس کا مریض جب چلتا ہے۔ یہ بات بعینہ درست نہیں۔رسٹاکس کا مریض جب چلتا ہے۔ تو گوشروع میں اس کا درد بڑھتا ہے اور کچھ چلنے کے بعد آ رام محسوس ہوتا ہے مگر اس دوران درد کلیتًا رفع نہیں ہوتا بلکہ کھڑے ہونے پر یا آ رام کرنے پر پہلے سے بھی بڑھ کر تکلیف محسوس ہوتی ہے۔

برائیونیا کا مریض دو جاردن مسلسل آرام کرے تواسے افاقہ ہوجا تا ہے کیکن رسٹا کس کا مریض آرام کرے تو در داور بڑھتا چلاجائے گا۔ اکثر وہ تکیفیں جوسردی کے موسم کے ختم ہونے کے بعد گرمیوں کے آغاز میں شروع ہوتی ہیں ان میں برائیونیا بہت کام آتی ہے۔ اس تبدیل ہوتے ہوئے موسم میں عموماً نمونیہ بہت کشرت سے ہوتا ہے کیونکہ جب اچا نگ گرمی آتی ہے توجسم کا بیرونی حصہ تکلیف محسوں کرتا ہے لیکن اندرونی حصہ ابھی اس تبدیل کا عادی نہیں ہوتا اس لئے میدم گرم کیڑے اتاردیے سے گی فتم کی بیاریاں لاحق ہوجاتی ہیں جو براہ راست گرمی سے نہیں بلکہ گرمی میں شمنڈ لگنے سے بڑھتی میں ۔ ایسے موسم کے نمونیہ کے لئے برائیونیا بہترین دوا ہے۔ برائیونیا کی علامات والانمونیہ اکثر دائیں چھپچرٹے ہے گئی متاثر کرتا ہے اور وہاں شہر جاتا ہے۔ برائیونیا میں تک کی خمونیہ دائیں سے بائیس کرت نہیں کرتا۔ لائیکو پوڈ بم کا نمونیہ دائیں اور سے نیچ کی طرف بھی حرکت کرتی ہیں اور رفتہ رفتہ چھپچرٹ وں کے نچلے حصہ میں منتقل ہوجاتی ہیں اور وہاں جا کر مقام بنالیتی ہیں۔ برائیونیا چونکہ مزمن بیاری کی اس حالت میں اور دوائیں دینے بیٹر تی ہیں۔ برائیونیا چونکہ مزمن بیاری کی اس حالت میں اور دوائیں دینے دینے جو پھپچرٹ وں کے خواسے دولی کی دوانہیں ہے اس لئے بیاری کی اس حالت میں اور دوائیں دینے بڑتی ہیں۔ برائیونیا چونکہ مزمن بیاریوں کی دوانہیں ہے اس لئے بیاری کی اس حالت میں اور دوائیں دینے بڑتی ہیں۔ آرسنگ آئیوڈ ائیڈ اور کالی آئیوڈ ائیڈ بھی مفید ہیں۔

اگر تپ دق کی وجہ سے پھیپھڑوں پر داغ پڑجا ئیں اور سوراخ ہوجا ئیں تو مرکسال اور کالی کارب دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ایک خاتون کے پھیپھڑوں میں سل کے نتیجہ میں سوراخ ہوگئے تھے اور ڈاکٹروں کے نزدیک ان کا کوئی علاج نہیں تھا۔ جب ہومیو پیتھک طریق پر ان کا علاج مرکسال 200 اور کالی کارب 30سے کیا گیا تو چند مہینوں میں وہ بالکل صحت یاب ہو گئیں۔ جب ہسپتال کے ڈاکٹروں نے ایکسر لیا تو ان سوراخوں کا نام ونشان بھی نہیں تھا۔ وہ سے لیا توان سوراخوں کا نام ونشان بھی نہیں تھا۔ وہ سے لیقین کرنے کے لئے تیار نہیں تھے کہ بیوہ ہیں۔

ہومیو بیتھی دوائیں جب اثر دکھاتی ہیں تو پہتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو کتنی عظیم دفاعی طاقتیں عطافر مائی ہوئی ہیں جن کا ڈاکٹروں کوابھی تک بہت باریک ریسر چ کے باو جود پینے نہیں چل سکا۔ان عظیم دفاعی طاقتوں کا جسم کی کیمسٹری سے گہراتعلق ہے مثلاً جگرکو یہ پیدا مہاتا ہے کہ فلال بیاری سے مقابلہ کرنے کے لئے فلال کیمیکل کی ضرورت ہے، وہ بیدا کرنا شروع کردو۔کسی اندھے ارتقائی عمل سے تو بیمکن نہیں۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اتن گہری با تیں اتفا قاً کیک طویل ارتقائے عمل سے خود بخو دا کیہ مضبوط اور مر بوط نظام بن کرجسم کا حصہ بن جا ئیں اورالی قطعیت کے ساتھ کام کریں کہ ان کے باریک شخفی اسرار بھی مٹ نہیں۔اگر کسی کی صحت اچھی ہوتو روایتی علاج کی ضرورت بھی پیشنہیں آتی اور نظام دفاع ازخود بیاریوں سے کیے لیتا ہے لیکن اگر طبعی نظام دفاع ازخود مقابلے کے لئے تیار نہ ہوتو ہومیو پیتھ کہ دوااس کو متحرک کردیتی ہے۔سادہ زندگی گزار نے والے لوگ جومخت کس ہوتے ہیں وہ اکثر امیر لوگوں کی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی ہوسے سے نیچر ہے ہیں کیونکہ ان کے جسم کے اندر ہروقت ایک دفاعی نظام ان کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔حالا نکہ وہ اسی فضا میں سانس لیتے ہیں اوراسی علاقہ میں رہے خدا تعالی کے وجود اور اس کی عظمتوں کی نشاند ہی کرتا ہے۔ ہومیو پیتھ کے معالجین کو اس پر بھی غور وہ کی دوالی نظام کی خوبیوں کو اجا گر کرتا ہے اور انہیں ایک غوروں کو اجا گر کرتا ہے اور انہیں ایک وورو کو کہ دولا میں ہوئی ہو کہ کو کر کرتا ہے اور انہیں ایک ورثن حقیقت کے طور پر سامنے لے آتا ہے۔

برائیونیا کے مریض جوڑوں کے دردوں میں گرمی سے آ رام محسوس کرتے ہیں۔ کھانسی عموماً حرکت اور شور کی وجہ سے زیادہ ہوجاتی ہے اور بیلا ڈونا کی علامتیں دکھائی دیتی ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ برائیونیا میں بیلا ڈونا کا اچا تک پن نہیں ہے۔ برائیونیا میں آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ تکیفیں بڑھتی ہیں اور آخر اتنی شدت اختیار کر لیتی ہیں کہ ہرفتم کی حرکت، آ واز اور شور سے تکلیف ہونے گئی ہے اور پھر ایبا مریض تیارداری کے لئے آنے والوں کو بھی ناپیند کرتا ہے اور چڑنے گئا ہے۔ اس غصہ اور چڑ چڑا ہٹ کی وجہ سے کہ مریض کو ہرحرکت سے تکلیف ہوتی ہے۔ منہ کی حرکت سے بھی اسے تکلیف ہوتی ہے اور وہ بولنا نہیں چا ہتا اور وہ کمزوری بھی محسوس کرتا ہے۔ اگر ایسے مریض کو نمونیہ ہویا

سرمیں درد ہوتو اسے ہرگز بلا نانہیں چاہئے۔ وہ ایک غنودگی کی کیفیت میں رہتا ہے۔ اگر مرض لمبا ہو جائے تو مستقل بے ہوثی طاری ہو جاتی ہے لیکن حرکت کرنا اور بولنا بالکل فائدہ نہیں دیتے۔

برائیونیا کے مریض کے سردرد کوسردی سے آرام آتا ہے۔ دردعموماً سرکے بچھلے حصہ میں یا ماتھے میں ہوتا ہے۔ پیاس کی شدت بھی برائیونیا کی نمایاں علامت ہے، مریض بہت ٹھنڈا پانی پیندکرتا ہے۔ پانی پی کراسے سکون ماتا ہے لیکن تھوڑی دیر میں ہی دوبارہ پیاس بھڑک اٹھتی ہے۔ بہت زیادہ پانی کی پیاس برائیونیا کی یا دولاتی ہے۔ لیکن برائیونیا میں بعض صورتوں میں پیاس بالکل غائب بھی ہوجاتی ہے۔ معدہ میں سوزش ہوتی ہے۔ منہ خشک ہوجاتا ہے اور زبان لکڑی کی طرح اکڑ جاتی ہے مگر پیاس بالکل نہیں ہوتی۔ اس وقت زبان پرزردی مائل تہ جمنے گئی ہے۔ یہ اولاً سیمیم کی خاص علامت ہے جوشاذ کے طور پر برائیونیا میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ کینٹ نے بھی یہی لکھا ہے کہ برائیونیا میں بعض اوقات پیاس بالکل خم ہوجاتی ہے۔

برائیونیا کے چکر کانوں میں خرابی کی وجہ سے اور حرکت کرنے سے آتے ہیں۔گاڑی یا سمندری جہاز میں جو چکر آتے ہیں اور ملی ہوتی ہے ایسے مریضوں کے لئے فوری علاج کی خاطر بعض نسخے استعال کئے جاسکتے ہیں جو بہت مفید ہیں۔ایسے موقعوں پر نسخوں کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کہ ہر مریض سے انفرادی طور پر علامت پو چھنا بسااوقات ممکن نہیں ہوتا۔ اس نسخہ میں برائیونیا، کا کولس، تکس وامیکا اور اپی کاک شامل ہیں۔کا کولس کا تعلق بھی کا نوں کی خرابی کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے چکروں سے ہے جن میں یہ سب سے گہری دوا ہے۔ دراصل کان کی خرابی کے چکروں میں برائیونیا اور کا کولس مشابہ ہیں۔کا ن کی درمیانی ٹیوبوں میں ایک مائع موجود رہتا ہے جو ذرا بھی کا کولس مشابہ ہیں۔کان کی درمیانی ٹیوبوں میں ایک مائع موجود رہتا ہے جو ذرا بھی کرکت کر بے تواعصاب کے ذریعہ دماغ تک اس حرکت کی اطلاع پہنچتی ہے اور توازن یا عدم توازن کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ مسلسل بدلنے والی حرکت سے چکر آنے گئے ہیں۔

احساس کی جھلیاں ہیں۔ وہ غیر معمولی طور پر حساس ہو جا ئیں تو اس کے نتیجہ میں جو چکر آتے ہیں ان کا علاج برائیونیا اور کا کولس سے کیا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ برائیونیا میں کان کی سوزش کے نتیجہ میں حرکت سے چکر آتے ہیں لیکن کا کولس میں حرکت سے چکر اعصا بی خرا بی کی وجہ سے آتے ہیں۔ جہاں ظاہری طور پر کان میں کوئی مستقل خرا بی نہ ہو اور پھر بھی چکر آئیں وہاں کا کولس مفید ہے۔ جہاں انفیکشن اور چکر ہوں وہاں برائیونیا بہتر ہے۔

برائیونیا کا لے موتیے میں بھی مفید ہے لیکن اگریپاس مفقود ہوتو بہتر دوا جلسیمیم ہے۔ بی^{بھی} اعصابی چکروں کی اچھی دوا ہے مگر برائیونیا کا دائرہ زیادہ وسیع ہے جومختلف جھلیوں پر اورکسی حد تک اعصاب پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ کا لےموتیے کا زیا دہ تعلق اعصاب سے ہے۔ برائیونیا اور حبلسیمیم کے ساتھ کلکیریا فاس x 6 اور کا لی فاس 6x میں دی جائیں تو بہت مؤثر ثابت ہوتی ہیں ۔بعض اوقات برائیونیا دیئے کے بعد پیاس غائب ہو جاتی ہے اس وقت حکسیمیم دی جاسکتی ہے اور ان دونوں کوایک دوسرے کے بعد استعال کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوائیں سر درد کے لئے بھی احجھی ہیں لیکن حبلسیمیم کے سر در د میں ٹھنڈی ہوا سے تکلیف بڑھتی ہے اور برائیونیا کے سر در د میں ٹھنڈ سے آرام آتا ہے۔ویسے جلسیمیم میں سردی وگرمی کا فرق لازم نہیں کیونکہ جب در دبڑھ جائے تواس پرسر دی یا گرمی کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ برائیونیا کا سر در دلا زماً گدی ، ماتھے یا آئکھوں میں آپنا مقام بنا تا ہے۔ اگر آنکھول میں تھہر جائے تو بہت شدت اختیار کرلیتا ہے۔ درد کی لہریں اٹھتی ہیں ۔بعض دفعہ کسی تیز دوا کے اثر سے جوڑوں کے دردٹھیک ہو جائیں توان کاحملہ آنکھوں پر ہوجا تا ہے اور در د آنکھ کواپنا مرکز بنالیتا ہے۔ آنکھ میں ذراسی حرکت بھی ہوتو محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے نشتر چبھو دیا ہے۔ اس تکلیف کا ہر برس کی طرح برائیونیا ہے بھی تعلق ہوسکتا ہے۔ جلسیمیم کا در دسارے سرکے علاوہ پیچیے کی طرف جا کر گردن اور بازوؤں کے اعصاب تک ممتد ہو جاتا ہے۔ حبلسیمیم کے درد کا عمومی تعلق روزمرہ کے اوقات، جن کا انسان عادی ہو، کی بے قاعدگی سے بھی ہوتا ہے۔

اگر نیند کے وقت میں فرق پڑ جائے یا کھانے کے اوقات بدل جائیں تو بعض دفعہ سر در د شروع ہوجا تا ہے۔اییا سر در د جلسیمیم سے ٹھیک ہوسکتا ہے۔ برائیونیا کا سر در د وجع المفاصل ،معدہ کی خرابی یا بخاروں سے تعلق رکھتا ہے۔

ملیر یا اور ٹائیفا ئیڈ دونوں بیاریوں میں برائیونیا بہت مؤثر ہے۔ برائیونیا میں اگر جسم د کھے گا تو سر در دبھی ضرور ہوگا۔ بخار کی حالت میں بعض دفعہ در د کے ساتھ م**ن**ریان بھی شروع ہوجاتا ہے اور مریض اوٹ پٹانگ باتیں کرنے لگتا ہے۔ ویسے برائیونیا کے ہذیان میں مریض زیادہ باتیں نہیں کرتا۔ بائیوسمس،سٹرامونیم،سلفراور بیلا ڈونا کے مذیان شدت میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بخاروں کے زہر ملیے مادوں کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں۔اگر سر در د کی دوا پیچانی جائے تو مرض کی شناخت بھی ہوجاتی ہے۔ بیلا ڈونا کا سر در دخواہ ٹائیفا ئیڈ میں ہو یا کسی اور بیاری میں ،ا جا تک ہوگا۔سر در د کے ساتھ چہرہ تمتمانے لگے گا خواہ جسم میں خون کی کمی ہی کیوں نہ ہو۔ خوف کی بجائے تشد د کا رجحان یا یا جاتا ہے۔ کمزور ہونے کے با وجود غیر معمولی طاقت آجاتی ہے اور ایسے مریض کو قابو میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہائیوس (Hyscyamus) میں مریض مذبیان کے نتیجہ میں گند کینے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ بیعلامت اتنی نمایاں ہے کہ گھر والوں کے علاوہ ڈاکٹر بیچارہ بھی شرم سے یانی یانی ہو جاتا ہے۔ مریض کے اخلاق اور رجحانات میں کوئی خرابی نہیں ہوتی ۔ لیکن ایسا صرف اعضائے تناسل میں سوزش کی وجہ سے ہوتا ہے جس سے دماغ میں بھی تیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ بیسب علامات مل کر مذیان کی کیفیت پیدا کرتی ہیں۔ ہائیومس کے مریض کی ایک اور خاص پیجان پیرے کہ وہ چٹکیاں بھر بھر کے جسم اور کپڑوں کو چیتنا اور نوچتار ہتا ہے۔ایسی کوئی علامت برائیونیا میں نہیں يائى جاتى۔

برائیونیا کی ایک علامت یہ ہے کہ ہونٹوں کے کنارے بھٹ جاتے ہیں اور ہونٹوں پر پپڑیاں سی جم جاتی ہیں، مریض گھبرا کر انہیں اتارنے کی کوشش کرتا ہے تو خون رسنے لگتا ہے۔ نیٹر م میور میں بھی بیعلامت ہے اور نیٹر م میور برائیونیا کی مزمن دوا بھی ہے۔ برائیونیا کے مریض کے اخراجات رک جائیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن پیدنہ

آئے تو یہ مریض کے لئے باعث رحمت ہے۔ برائیونیا کی کھانسی میں بلغم بہت خشک اور چیٹی ہوئی ہوتی ہے اور بہت مشکل سے نکلتی ہے۔ چیٹ رہنے والی بلغم میں برائیونیا اور اپی کاک کے علاوہ ہیپر سلف اور کوکس بھی اہم دوائیں ہیں۔ برائیونیا میں چھپچھڑ ہے کی خرابی بڑھے سے خشکی کے باعث جگہ ہے جھلیاں بھٹ جاتی ہیں جن سے ہاکا ہاکا خون رس کر بلغم میں شامل ہوجا تا ہے اور یہ بلغم لو ہے کے زنگ کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ یہ زنگ نما بلغم برائیونیا کی خاص نشانی ہے۔ برائیونیا ہڑیوں کے کینسر میں فاسفورس کی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسے تیس طاقت میں فاسفورس کے ساتھ ادل بدل کردینا چاہئے۔

اگر عور توں کی دائیں بیضہ دانی میں تکلیف ہوتو برائیونیا فائدہ پہنچاسکتی ہے۔ سینے کی کلٹیوں میں خواہ وہ کینسر کی ہوں یا بغیر کینسر کے ،اگران میں ختی پائی جائے اور حرکت سے در دہو تو سب سے پہلے برائیونیا استعال کرنی چاہئے۔ برائیونیا کا مریض جسے دائیں طرف بھیچوٹ سے کانمونیہ ہو وہ عموماً دائیں طرف ہی لیٹنا ہے کیونکہ دیے ہوئے پہلو میں سانس کے آنے جانے سے حرکت کم ہوتی ہے۔

بعض اوقات سوتے ہوئے میں جسم کو جھٹکے لگنے ہیں اور آنکھ کل جاتی ہے۔ ہومیو پیتھی میں بخار کے لئے عام طور پر تین اصطلاحیں استعال ہوتی ہیں۔ Continuous Fever یعنی مسلسل چڑھنے والا بخار جوایک دفعہ چڑھے تویا جان لیوا ثابت ہوتا ہے یا اگر اتر جائے تو پھر دوبارہ واپس نہیں آتا۔

Remittent Fever وہ بخار ہے جواون کچ نیج دکھا تا ہے۔ بھی کم ہوجا تا ہے اور بھی زیادہ لیکن بخار ٹوٹنا نہیں بلکہ جاری رہتا ہے۔

Intermittent Fever اس بخار کو کہتے ہیں جو بھے میں بالکل ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہوجاتا ہے۔ملیریا اسی قسم میں داخل ہے بینی بار بار آنے والا بخار۔ٹائیفا ئیڈ Remittent بخار کہ کہلاتا ہے جو کم تو ہو جاتا ہے مگر ٹوٹا نہیں۔ برائی اونیا مسلسل بخاروں میں نہیں بلکہ Remittent بخاروں میں کام آسکتی ہے۔ ملیریا میں بسا اوقات برائیونیا کی ضرورت پڑتی ہے اور ٹائیفا ئیڈ میں بھی ہے کام آتی ہے۔

برائیونیا کی غدودوں کی بیماریاں آ ہستہ پیدا ہوتی ہیں اور پھر بڑھتے بڑھتے مستقل ہوجاتی ہیں۔اس پہلوسے یہ کاسٹیکم میں مستقل ہوجاتی ہیں۔اس پہلوسے یہ کاسٹیکم میں بھی بیماریاں بڑھنے کی رفتار آ ہستہ ہوتی ہے کیکن مسلسل بڑھتی چلی جاتی ہیں اور رفتہ رفتہ ریشوں اور غدودوں میں تبدیلیاں واقع ہونے گئی ہیں اور گلینڈز میں مادے بیڑھ جاتے ہیں۔اگر غدود مستقل طور پر متورم ہوکران کی ہیئت میں تبدیلیاں پیدا ہوجا ئیں تو برائیونیا بھی دوا ہو سکتی یا در کھنا چاہئے۔

غدود ول کی بیار یول میں برائیونیا کی مشابہت فائٹولاکا سے بھی ہے۔ دونوں میں غدود پھول جاتے ہیں۔ اگر برائیونیا اثر نہ دکھائے تواس کے بعد فائٹولاکا دینا چا ہئے۔ کالی میور، سلیشیا، فیرم فاس، کلکیر یا فاس، کلکیر یا فلوروغیرہ ملا کر بار بار دی جائیں تو یہ بھی غدودوں کی پرانی بیار یوں کے لئے موثر نسخہ ہے۔ گلے کی خرابی سے جو تعضی بخار ہوتے ہیں وہ نہایت ضدی بیار یوں کے لئے موثر نسخہ ہے۔ گلے کی خرابی سے جو تعضیٰ بخار ہوتے ہیں وہ نہایت ضدی اور خطرناک ثابت ہوسکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انفیاشن گلینڈ زکے ایسے حصوں میں اپنی جگہ بناتی ہے جہاں خون کا دوران پورانہیں ہوتا اس لئے جسم کے دفاعی ماد ہے بھی وہاں زیادہ اثر مندرجہ بالا دوائیں فائدہ نہیں دکھا سکتے۔ اگر بیاری شروع ہونے کے بعد دوتین دن کے اندر مندرجہ بالا دوائیں فائدہ نہ دیں تولازم ہے کہ زیادہ اثر کرنے والی بالمثل دوا تلاش کی جائے۔

گلے کے جس انفیکشن میں بخارروزانہ پہلے سے زیادہ ہوتا چلا جائے اور خصوصاً رات کے آخری حصہ میں بہت زوردکھائے تو صبح کے وقت درجہ حرارت کم ہونے پر ہر گزیہ بیں سمجھنا چاہئے کہ مریض ٹھیک ہورہا ہے۔اس غلط ہمی کے نتیجہ میں بے احتیاطی اور بد پر ہیزی بھی ہوجاتی ہے۔دوسری رات کو بخار پہلے سے بھی زیادہ ہوگا۔اگر دو تین دفعہ ایسا ہوتو بچوں میں بیجان لیوا ثابت ہوسکتا ہے اس لئے گلے کے بخار کو معمولی نہیں سمجھنا چاہئے۔ ڈاکٹر عموماً فوراً اینٹی بائیوٹک دے دیتے ہیں جن سے بخار تو اتر جاتا ہے لیکن اس کے نتیجہ میں اس کا حملہ بار بار ہونے لگتا ہے۔ بعض دفعہ ایک حملہ کے خم ہوتے ہی دوسرا حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر زیادہ طاقتور اینٹی بائیوٹک دینی بڑتی ہے۔

ایسے مریضوں کا جگر لاز ما تباہ ہو جاتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، بیچے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کررہ جاتے ہیں، گلے مزید پھو لنے لگتے ہیں، بخار غدودوں کواور بھی موٹا کر دیتا ہے۔ پس جہاں تک ممکن ہوا بنٹی بائیوٹک دواؤں سے بیخے کی کوشش کرنی چاہئے۔ سلفراور پائیروجینم 200 کی طاقت میں انفیشن کا مقابلہ کرنے کے لئے عمو ما اچھی دوائیں ہیں اور بہت گہراا تررکھتی ہیں۔ اسی طرح سلیشیا بھی او نچی طاقت میں بعض دفعہ بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ یہ فائدہ نہ دیں تو بیلا ڈونا، فائیٹو لاکا، کلکیر یا فلور، فیرم فاس اور پپٹیشیا 30 میں ملاکر باربار دی جائیں تو بعض دفعہ ایک ہی رات میں بیمرض قابو میں آ جاتا ہے۔ اس نسخہ کے علاوہ اگر فیرم فاس، سلیشیا، کا لی میور، کلکیر یا فاس، میگ فاس کی میں ملاکر دن میں چھسات مرتبہ جاری رکھی جائیں تو بہت فائدہ مند ثابت ہوسکتا ہے۔ اگر اس سے ایک رات میں بخار ندٹو ٹے تو عمو ماً دو تین را توں کے اندر کم ہوتے ہوتے ٹوٹ جاتا ہے۔

تکس وامیکا کی طرح اگر برائیونیا بھی ضرورت سے زیادہ استعمال کی جائے تو سردرد شروع ہوتا ہوجا تا ہے۔ دونوں کا تریاق جلسیمیم ہے۔ برائیونیا میں بیاری کا ادلنا بدلنا دوطرح سے شروع ہوتا ہے۔ ایک میا اخراجات یا پیدنہ وغیرہ کے رکنے سے تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ علاج کریں تو اخراجات دوبارہ شروع ہوجاتے ہیں۔ اندرونی جھلیاں بھیگ جاتی ہیں اور جلدسے پانی کا عام اخراج شروع ہوجاتا ہے۔ دوسرے یہ کما گرعورتوں کا ماہا نہ نظام بند ہوجائے توناک سے خون جاری ہوجاتا ہے۔ اگر ایسی صورت میں برائیونیادیں تو بہت جلدا فاقہ ہوتا ہے۔

سانس کی نالی میں چپکی ہوئی بلغم سے عارضی دممے کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔کھانس کھانس کر بہت مشکل سے ایسی بلغم کو زکالنا پڑتا ہے۔اگر بلغم دھا گے دار ہوتو کوس بہر حال اس کی سب سے بہتر دوا ہے۔اگر بزلہ بگڑ جائے اور گہری انفیکشن ہوجائے تو بلغم کارنگ سبزی مائل ہو جا تا ہے جومرض کے مزید بگڑنے کی علامت ہے۔

برائیونیا میں مرض آ ہستہ آ ہستہ بڑھتے ہیں لیکن بیمرادنہیں ہے کہ کئی دن کے بعد

بیاری ظاہر ہوتی ہے۔اگر برائیونیا کے مریض کوضح سر دی گئی ہوتو شام کواس کے اثر ات ظاہر ہو جائیں گےاورا گلے روزصبح تک مرض پوری شدت سے حملہ کرچکا ہوتا ہے۔ جوڑوں کے در داور اعصاتی تکلیفیں بڑھتی اور مزمن شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ جوا مراض فوری نوعیت کے ہوں ان میں بھی برائیونیا کا یہی مزاج ہے۔ برائیونیا کی بیاریاںعموماً نو بجے شام کوزیادہ ہوجاتی ہیں اور ساری رات رہتی ہیں۔ کیمومیلا اور نیٹرم میور میں صبح نو بچے تکلیفیں بڑھتی ہیں۔ان اوقات کی یا بندی کی کوئی تھوں اطمینان بخش وجہ معلوم نہیں ہوسکی مگر قدرت نے دواؤں کوابیا ہی بنایا ہے۔ برائیونیا کی طرح چیلی ڈونیم (Chelidonium) دائیں طرف کی دوا ہے۔ جگر کی خرانی سے گہر اتعلق رکھتی ہے۔اس کے ہراخراج میں زردرنگ نمایاں ہوتا ہے۔بلغم بھی زرد ہوتی ہے۔ چیلی ڈونیم میں جگر کی دردیں پیچھے کمر کی طرف نکلتی ہیں جیسے بیتے کی دردیں پیچھے کمرکو جاتی ہیں اور حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے۔اگر حاملہ عورت بہت تھک جائے یالو لگنے سے حمل کے ساقط ہونے کا خطرہ لاحق ہو جائے تو برائیونیا دینی جاہئے لیکن آرنیکا 200 ساتھ ملالی جائے تو تھ کاوٹ کے بداثرات کی بھی روک تھام ہوجاتی ہے۔اگر کوئی چوٹ لگ گئی ہوتو برائیونیا آرنیکا کے ساتھ ملا کراسقاط کا خطرہ ٹالنے میں بہت مفید ہے مگرفوراً دینی جاہے اور ساتھا یکونائٹ بھی ملالینی جاہے۔

> مددگاردوائیں: رسٹائس۔ایلومینا دافع اثر دوائیں: ایکونائٹ۔کیمومیلائنس وامیکا طاقت: 30سے1000 تک

بوفو

42

بوفو

BUFO

بوفو مینڈک (Toad) کی گردن کے غدود سے نکلنے والے لعاب سے تیار کی جاتی ہے۔ یہ خاص طور پر زہنی صلاحیتوں اور د ماغ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے مریض کی یا دواشت کمزور ہوجاتی ہے۔ ذہن دھندلا جاتا ہے اور سخت ذہنی تھکا وٹے محسوں ہوتی ہے۔ بوفو اعصاب کی بہترین دواؤں میں سے ہے۔ اعصابی کمزوریوں، فالجی احساسات اور عضلات کے نشنج میں مفید ہے۔ چھوٹے چھوٹے عضلات میں تشنجی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ آئھ یا کسی خاص عضوکا پھڑ کنا، جگہ جگہ اچپا نگ تشنجی کیفیات کا پیدا ہونا بوفو کی خاص علامت ہے۔

بوفو میں جلد میں زخم پیدا کرنے کار جھان پایا جاتا ہے۔ اکثر عام عکسالی کے ہومیو پیقے معلی ہے۔ اکثر عام عکسالی کے ہومیو پیقے معلی ناسے معلی امراض میں تواستعال کرتے ہیں مگر جلدی امراض اور عضلاتی تشجات میں اسے شاذ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی نو جوان بے راہ روی کا شکار ہوجائے تو اس کی دوا بوفو ہے اور یہ جلق (Self-abuse) کوروکتی اور اس کے بدا ٹر ات کو دور کرتی ہے۔ بعض نو جوان جنہوں نے اپنی بیوتو فیوں سے اپنی جان پر ظلم کیا ہواوروہ مرکی کا شکار ہوجا کیں تو ان کے لئے بھی بوفو بہت مفید دوا ہے۔ ایسے مرگی کے مریض کو پہلے بوفو دینی جا ہے پھر اس کی ناکامی کی صورت میں دوسری دوا کیں تلاش کرنی جائیں۔

بونو میں بھی سار سپر یلا (Sarsaparilla) کی طرح بڑھا بے کا وقت سے پہلے آنا۔ پایا جاتا ہے۔ برائیٹا کارب میں بھی یہ علامت ہے لیکن بوفو کا عمر سے پہلے کا بڑھا پا جلد کے سکڑنے یا جمریوں سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ د ماغی کیفیت سے تعلق رکھتا ہے یعنی د ماغ میں پاگل بن کی بجائے بھولا بن آ جاتا ہے۔ اگر ساٹھ سال کا بوڑھا آ دمی پندرہ سولہ سال کے لڑکوں کی طرح باتیں کرنے لگے تو اسے بھی بوفو دینی چاہئے۔ اگر وقت پر علاج نہ ہوتو ایسا شخص مجہول سا ہوجا تا ہے۔ اس میں لوگوں سے بات کرنے اور اسے دوسروں کو سمجھانے کی صلاحیت نہیں رہتی۔

بونو میں تضادات پائے جاتے ہیں۔ مریض تنہائی پسند ہوتا ہے، لوگوں سے گھبرا تا ہے۔ لیکن تنہائی میں ڈرتا ہے۔ اس کے نتیجہ میں اسے بہت غصہ آتا ہے اور غصے میں آکر چیز وں کو دانت سے کا ٹنے لگتا ہے۔ گویا اپنی بے بسی اور بے اختیاری کا اظہاراس طریقہ سے کرتا ہے مگر دوسر بے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا تا۔ مریض ہنستا بھی ہے، رونے بھی لگ جا تا ہے اور بچوں کی طرح اچھل کو دبھی کرتا ہے۔ بونو کے مریض کا کرداراس کی معصومیت جا تا ہے اور بچینے سے پہچانا جا تا ہے۔ ثا ذکے طور پر یہ کیفیت بڑھ کر پاگل پن میں بھی تبدیل ہوجاتی ہے۔ بونو اس سلسلہ میں بہت گہری دوا ہے اور لمبے رصہ تک مسلسل اثر کرتی ہے۔ بونو میں جزوی فالح کے کا رجمان ملتا ہے۔ مختلف اعضاء کے مفلوج ہونے کے نتیجہ میں ان کے اویر کی جلد بے حس ہوجاتی ہے۔

اس میں عضلات کا تینج بھی عام ہے۔ مرگ کے جملہ سے پہلے تینج کے نتیجہ میں منہ پورا کھل جاتا ہے۔ منہ سے خون نکلتا ہے اور جھکے سے زبان یا ہونٹ کٹ جاتے ہیں اور بہت تکلیف دہ صورت حال پیدا ہوجاتی ہے۔ اس کے ساتھ عموماً سر در دکا حملہ ہوتا ہے، آئھ کی پتلیاں پھیل کر ایک جگہ ساکت و جامد ہوجاتی ہیں۔ مریض روشنی بر داشت نہیں کر سکتا۔ جلد میں زخم اور ناسور بننے کار جحان ہوتا ہے۔ آئھ خون سے بھر جاتی ہے۔ آئھ کے کو رنیا میں بھی زخم ہوجاتے ہیں۔ آئھ اور بدن پر کہیں کہیں کہیں جہیں جی بن جاتے ہیں جو بچھوں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ آئھ مونیم کروڈ اور کہیں کہیں کہیں جی ایسے چھالوں میں مفید بتائی جاتی ہیں۔ بوفو ہر تسم کی جلدی امراض میں مفید بیٹی مونیم کی جلدی امراض میں مفید ہو جاتے ہیں۔ بوفو ہر تسم کی جلدی امراض میں مفید ہو تکا میں مفید ہو تائی ہوں بوفو میں ایم براگر دییا کی طرح موسیقی سے نفر سے ہو

جاتی ہے۔ مریض میں رفتہ رفتہ ہکلانے اور تصحصلانے کا رجحان پیدا ہوجا تا ہے۔ مریض کی بات سبحضی مشکل ہو جاتی ہے جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ ایسا مریض جس میں مرگی کی معروف علامتیں نہ پائی جاتی ہوں لیکن مریض بیٹے بیٹے ساکت و جامد ہوجا تا ہو، آ تکھیں کھی کی کھی رہ جاتی ہوں اور مریض ہر چیز سے بے نیاز ہوجا تا ہو، بونواس کیفیت کے لئے بہترین دوا ہے۔ یہ کیفیت وقتی طور پر ہوتی ہے۔ جب مریض کے ہوش وحواس بحال ہوجا کیں تواسے ملم نہیں ہوتا کہ اسے کہا ہوا تھا۔

چونکہ بونو کی مرگی کا جنسی کمزوری سے بھی تعلق ہے۔ اس لئے بعض مریضوں کو ہم بستری کے وقت بھی مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ اس کی مریض عورتوں میں حیض وقت سے بہت پہلے آتے ہیں یابالکل بند ہوجاتے ہیں۔ رحم میں جلن اور شنج کے رجحان کے ساتھ چھالے نکل آتے ہیں جن سے گندا موادرس رس کے پیپ یا خون ملا لیکوریا خارج ہوتا ہے جو گینگرین کے مادہ کی طرح سخت بد بودار ہوتا ہے۔ ان علامات میں بیدوا بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ یہ جھاتی کے کینسر میں بھی مفید ہے۔ مکمل شفا بخش تو نہیں ہے لیکن آرام دیتی ہے اور دوسری دواؤں کی مددگار بن جاتی ہے اور تکلیف کو کم کردیتی ہے۔

بونو کی کھائسی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ بلغم کے ساتھ خون کا اخراج بھی ہوتا ہے اور جلن کا احساس بہت نمایاں ہوتا ہے۔ اس کی بیاریاں بہت تیزی سے بڑھتی ہے اور پھیلتی ہیں اور مریض جلدموت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اس کی تکالیف گرم کمرے اور نیندسے جا گئے پر بڑھتی ہیں جبکہ نہانے اور گرم یانی میں یاؤں رکھنے سے افاقہ ہوتا ہے۔

مددگاردوائیں: برائیٹا کارب دافع اثر دوائیں: لیکیسس ۔سینیگا طاقت: 30 سے 200اوراونچی طاقتیں ليكش 177

43 کیکٹس گرینڈی فلورس

CACTUS GRANDIFLORUS

(Night-Blooming Cereus)

کیکٹس یعنی تھو ہر کا درخت صحراؤں میں اگتا ہے۔ اگر چہ یہ بہت بدزیب سمجھا جاتا ہے لیکن صحراؤں میں اس کا بھی ایک عجیب حسن ہوتا ہے۔ ہر طرف بھیلا ہوا آئکھوں کو بھلا دکھائی دیتا ہے۔ تھو ہر کا بھل بہت لذیذ ،خوشما اور خوبصورت ہوتا ہے۔ رس بھی مزیدار ہوتا ہے لیکن پینے کے بعد ناخوشگوارسی بو آتی ہے۔ اس بھل کے زیادہ استعال سے گردوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ بیشناب کی سخت تکلیف ہو جاتی ہے۔ نہ صرف جلن بلکہ سننج بھی شروع ہو جاتا ہے۔ کہنے مرس میں بھی پیشاب میں بہت جلن ہوتی ہے۔ قطرہ قطرہ آگ کی طرح جلتا ہوا بیشا ب آتا ہے۔ کہنے مرس میں بھی پیشا ب میں بہت جلن ہوتی ہے۔ قطرہ قطرہ آگ کی طرح جلتا ہوا بیشا ب آتا ہے۔ کہنے میں میں اس جلن کے ساتھ شنج بھی پایا جاتا ہے۔ یہ کیکٹس کی خاص علامت ہے کہ جہال بھی تکلیف ہو وہاں تشنج ضرور ہوگا۔

کی بیار یوں کے حملے میں اچا تک پن پایا جاتا ہے۔ دل پر بھی جملہ اچا تک ہوتا ہے جیسے کسی نے یک بیار یوں کے حملے میں اچا تک پن پایا جاتا ہے۔ دل پر بھی جملہ اچا تک ہوتا ہے جیسے کسی نے یک لخت شکنج میں جکڑ دیا ہو۔ دل کی بیار یوں میں خصوصاً وہ بیاریاں جن میں عضلات پھیل جائیں اور والوز خراب ہوجائیں کیکٹس بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ گلے میں بھی شنج کی علامت ظاہر ہوتو سخت قسم کی جکڑن کا احساس ہوتا ہے۔ ہر جگہ خون کا دباؤ زیادہ ہوجاتا ہے۔ دل، گردوں ، انتر یوں اور چہرے کی طرف خون کا اجتماع کیکٹس کے علاوہ پیلا ڈونا میں بھی پایا جاتا ہے۔ دھڑ کن اور شنج کی علامات بھی مشترک ہیں لیکن کیکٹس میں بخار نہیں ہوتا۔ بیلا ڈونا میں ماؤف حصہ گرم ہوجاتا ہے۔ گرمی اس کی خاص علامت ہے۔ گرمی اس اور

بخار نہیں ہوتے۔ کیکٹس کے مریض مرض کے اچا نک حملہ سے خت خونزدہ ہو جاتے ہیں اور ایکونائٹ کی طرح علامتیں ظاہر ہوجاتی ہیں۔ بیاری کے اچا نک پن اور کیکٹس کے خصوصی مزاج کی وجہ سے موت کا خوف طاری ہونا قدرتی بات ہے۔ ماؤف حصہ میں بنخ اتنا شدید ہوجاتا ہے کہ جیسے لوہ کی تارین کسی جارہی ہوں۔ ہرجگہ گلی اور گھٹن کا احساس غالب ہوتا ہے۔ کلے میں ہوتو کالر کے بٹن بند کرنا بھی مشکل ہوجاتا ہے۔ کیکیسس اور گلونائن میں بھی کسی حد تک سے علامت پائی جاتی ہے۔ کیکٹس میں شنخ کی وجہ سے ماؤف حصہ زخمی ہوجاتا ہے۔ رقم کے اندر سے میں کہوں ہوتا ہے۔ رقم کے اندر سے میں کہوں ہوجاتا ہے۔ ایکیسس ہوتی ہوجاتا ہے۔ رقم کے اندر سے سے تنظیمت ہو۔ جسم کے کسی ایسے حصہ پر جہاں عموماً شنخ کا اثر نہیں ہوتا وہاں گھٹن اور شنخ کا وجہ سے احساس ہوتو یہ کیکٹس کی نمایاں علامت ہے۔ گنٹھیا اور بائی کی در دوں میں بھی ماؤف حصہ میں شنخ ملتا ہے۔خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ کولچیکم اور بنز وئیک ایسٹر میں باؤں کا انگوٹھا سوجتا ہے مگر شنخ ملتا ہے۔خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ کولچیکم اور بنز وئیک ایسٹر میں باؤں کا انگوٹھا سوجتا ہے مگر شنخ ملتا ہے۔خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ کولچیکم اور بنز وئیک ایسٹر میں باؤں کا انگوٹھا سوجتا ہے مگر شنخ ملتا ہے۔خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ کولچیکم ہوجاتا ہے۔

یددوا دل کے لئے تب مفید ٹابت ہوتی ہے جب تکلیف دل یک ہی محدودرہے اور وہیں جکڑن کا احساس ہو۔ انجا ئنامیں سینہ کے درمیان کی ہڈی میں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر دل بڑھ جائے اور اس کی حرکت معمول کے مطابق ندرہے، تیز سوئی کی چیمن کی طرح در دہوا ور سر سراہٹ ہونے گئے (بشر طیکہ دل کے گر دسخت جکڑن کا احساس ہو) تو ایسا انجائنا کا مریض بھی کیکٹس سے کلی شفایا سکتا ہے۔

کر دوں کی تکیفیں مزمن ہوجائیں توجسم میں پھلپھلی ورمیں پیدا ہوجاتی ہیں۔ خصوصاً پاؤں اور ٹانگوں میں۔ الیمی صورت میں کیکٹس کی دوسری علامتیں نمایاں ہوں تو بفضلہ تعالیٰ یہ سارے بدن کوشفا بخش دیت ہے۔ بعض دفعہ کوئی اور علامت نمایاں نہ ہوتو سکڑن کا اچا تک بین اور اس کی شدت کیکٹس کو ظاہر کرنے کے لئے کافی ہے۔ اس لئے ان علامتوں کے ساتھ بلاتر دد کیکٹس دے دینی چاہئے کیونکہ اگر کیکٹس ہی دوا ہوتو افاقہ تیزی سے ہوگا۔ اگر نہ ہوتو نقصان بھی نہیں۔ کیکٹس کو ہنگامی دواؤں کے طور پر ہمیشہ اپنے تیزی سے ہوگا۔ اگر نہ ہوتو نقصان بھی نہیں۔ کیکٹس کو ہنگامی دواؤں کے طور پر ہمیشہ اپنے

كىكىش 179

ساتھ رڪنا چاہئے۔

بائی کی دردیں جو کیکٹس سے تعلق رکھتی ہیں ان میں بازوؤں اور رانوں کے عضلات میں کھچاؤاورسکڑن کی علامت ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ کیکٹس کا صرف چھلے دارریشوں سے تعلق ہے۔ لمبے عضلات پراس کا تشنجی اثر نہیں ہوتا۔ کولوسنتھ (Colocynthis) لمبے عضلات پر اثر رکھنے والی اہم دوا ہے۔ بیلا ڈونا بھی مفید ہے لیکن کیکٹس کا لمبے عضلات پر اثر نہیں ہے۔ بیلا ڈونا میں خون کا دوران دماغ کی طرف ہوجائے تو بیاری کے شدید حملہ کی صورت میں کیو پرم کے اثر کی طرح جکڑن کا احساس ہوگالیکن کیکٹس دماغ میں سکڑن کا احساس پیدا نہیں کرتا کیونکہ دماغ میں چھلے دارر پشے نہیں ہوتے۔ کیکٹس کا مریض دماغ پر حملہ سے بے ہوش اور مدہوش سا ہوجاتا ہے لیکن اسے تشنج نہیں ہوتا۔ بیلا ڈونا میں دماغ کا حملہ سے بے ہوش اور مدہوش سا ہوجاتا ہے لیکن اسے تشنج نہیں ہوتا۔ بیلا ڈونا میں دماغ کا حملہ سے بے ہوش اور مدہوش سا ہوجاتا ہے لیکن اسے تشنج نہیں ہوتا۔ بیلا ڈونا میں دماغ کا حملہ سے بے ہوش اور مدہوش سا ہوجاتا ہے لیکن اسے تشنج نہیں ہوتا۔ بیلا ڈونا میں دماغ کا حملہ سے بے ہوش اور مدہوش سا ہوجاتا ہے لیکن اسے تشنج نہیں ہوتا۔ بیلا ڈونا میں دماغ کا کھیاؤیاؤں کے انگو تھے تک اثر کرتا ہے اور وہاں تشنج شروع ہوسکتا ہے۔

کیکٹس میں چکر بھی نمایاں ہیں جو جسمانی محنت اور تھکاوٹ سے بڑھ جاتے ہیں۔ آرام سے افاقہ ہوتا ہے، حرکت سے نکلیف۔ سر در دوائیں طرف زیادہ جوشوراور تیز روشنی سے بڑھ جاتا ہے۔ کیکٹس میں دھڑکن بھی پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات ساراجسم دھڑک رہا ہوتا ہے۔ بیلا ڈونا میں بھی بہت دھڑکن ہے کیکن ساتھ جسم میں گرمی اور حدت کا احساس بھی ہوتا ہے جو کیکٹس میں مفقو د ہے۔

اگر بائیں بازو میں سن ہونے کا رجحان ہواور کھپاؤ بھی محسوں ہوتو یہ علامت کیکٹس کا تقاضا کرتی ہے۔ بعض دفعہ دل کی بیاری کے آغاز میں یہ علامت پیدا ہوتی ہے گر ضروری نہیں کہ بائیں بازو کا دردول ہی کا ہو، معدے کی تیزابیت سے بھی یہ علامت پیدا ہوتی ہے ۔ لیکن اگر تنگی اور گھٹن ساتھ ہوجیسے کسی نے مضبوطی سے جھپنچ دیا ہے یا دھڑ کن اور سن ہونے کا بھی احساس ہوتو کیکٹس ہی دوا ہوگی۔

ا گرمھی کیکٹس کے مریض کو بخار ہوتو گیارہ بچے ضبح شروع ہوتا ہے۔قبل از دوپہر

شدید سردی لگتی ہے۔ پیاس، سردرد اور بخار کے وقت جسم میں گرمی اور سانس میں دفت محسوس ہوتی ہے۔ د ماغی محنت سے سرمیں گرمی کا احساس کیکٹس کی خاص علامت ہے۔ سرشکنجہ میں کسا ہوا، سکتہ کا خدشہ اور آئکھیں سرخ۔خون کے اجتماع کی وجہ سے شنوائی پر بھی اثریٹہ تا ہے، کا نوں میں تیکن اور جنبھنا ہے گی آ وازیں آتی ہیں۔غذا کی نالی میں سکڑن ، زبان خشک،خوراک نگلنے میں دفت اور نگلنے کے لئے یانی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ معدہ میں بھی سکڑن اور دھڑ کن ، بوجھل بن کا احساس ،خون کی قے آنے کا احمال ، ا جابت سخت اور کالے رنگ کی ہوتی ہے لیکن اگر اسہال گئیں تو صبح کے وقت لگتے ہیں بواسیر کے مسے جومتورم ہوں اور در دکریں، مقعد میں بو جھمحسوس ہو، بیسب کیکٹس کی کیکٹس میں مثانہ کی گردن بھی سکڑتی ہے جس کی وجہ سے پیپٹا ب رک جاتا ہے۔بعض د فعہ مثانہ سے خون بھی جاری ہوجا تا ہےا در بھی پینون پینیاب کی نالی میں منجمد ہو کر مرض کواور بھی شکین بنا دیتا ہے۔ ہاتھ پاؤل متورم، ہاتھ نرم اور ٹھنڈے برف، یا وُں بڑے ہونے کا احساس اور ٹانگول میں بے چینی سب علامات کیکٹس کی تصویریہیں جورات کو بڑھ جاتی ہیں اسی طرح بائیں کروٹ لیٹنے سے، شور وغل سے، روشنی، گرمی، دھوپ اور محنت سے بھی علامات بڑھ جاتی ہیں۔

> دافع انر دوائيں: كيمفر _ ا يكونائث _ حيائنا طاقت: 30

44

کیڈمیم سلف

CADMIUM SULPH

کیڈمیم سلف بہت گہرا اثر رکھنے والی دوا ہے۔اس کے مریض جسمانی اور ڈبنی محنت سے بہت گہراتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرنا چاہتے۔انہیں کام سے نفرت ہوتی ہے۔سلفر کے مریض بھی نکھٹو ہوتے ہیں۔ بہت بیسہ کمانے کی سکیمیں بناتے رہتے ہیں لیکن انہیں کام کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔او پیم کا مریض بھی خیالی بلاؤ پکا تا رہتا ہے اور مختلف ترکیبیں سوچتار ہتا ہے لیکن اس کے لئے ہاتھ یاؤں ہلانا اور کام کرنا سخت دو بھر ہوتا ہے۔

کیڈمیم سلف میں بے چینی اور بے قراری نمایاں ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ آرسینک سے مشابہ دوا ہے کین آرسینک کے مرابح کا ایک پہلوکیڈمیم سلف کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ آرسینک کا مریض اپنی روز مرہ زندگی میں کوئی بھی بے تریبی برداشت نہیں کرتا۔ ہر چیز قرینہ سے رکھتا ہے اور محنت سے بھی نہیں گھبرا تا جبکہ کیڈمیم سلف کا مریض سلفر کے مریض کی طرح سست ہوتا ہے اور اس کی چیز وال میں بے تریبی ملتی ہے۔

معدہ میں کیڈمیم سلف کا اثر آرسینک کی طرح ہوتا ہے۔ معدہ میں ہے جینی ہوتی ہے۔
بعض مریض اس بے چینی کی وجہ سے سوبھی نہیں سکتے۔ کیڈمیم سلف الیں بے چینی کے لئے اچھی
دوا ہے۔ اس کا آرسینک سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ آرسینک کا مریض بے چینی سے کروٹیں بدلتا
رہتا ہے اور ایک حالت میں نہیں رہ سکتا جبکہ کیڈمیم کا مریض حرکت سے تکلیف محسوس کرتا ہے۔
اس کی کا بلی اور سستی بے چینی پر غالب آجاتی ہے اور وہ کوئی حرکت بھی پیند نہیں کرتا۔ وہ اپنی بے
چینی کا اظہار صرف زبان سے کرتا ہے۔

کیڈمیم سلف میں تشنج بھی پایا جاتا ہے اور زنگ کی طرح اس کا اثر عضلات پر ظاہر ہوتا ہے۔ زنگ کا مریض متاثر ہ عضوکو ہر وقت حرکت دیتار ہتا ہے اور اپنا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر ملتا رہتا ہے باٹا نگ ہلاتار ہتا ہے۔ کیڈمیم کا مریض جسم میں ہر جگہ بے چینی تو محسوس کرتا ہے مگر زنگ کی طرح متحرک نہیں رہتا۔

کیڈمیم سلف آ نکھ کی تکلیفوں میں بھی مفید ہے۔ پوٹوں کے درم، آ نکھ کے درد، زخموں اور ناسوروں میں آگر دیگر علامتیں ملتی ہوں تو بہت کارآ مد ہے۔ یہ آ نکھ کے چھپر کے فالج کے لئے بھی استعال ہوتی ہے۔ آ نکھوں کے ظاہری عوارض کے علاوہ اندرونی اعصا بی ریشوں کو طاقت بخشنے میں بھی مفید ہے۔ کیڈمیم زیادہ تر ایک جانب کی تکالیف کی دواہے۔ اس میں مرض عموماً ایک ہی طرف پایا جاتا ہے۔ میں نے اسے عموماً بائیں طرف کے فالح میں مفید دیکھا ہے۔ فالح کا اثر ایک آ نکھ پریاجسم کے ایک جانب ہوتا ہے۔ بالی میں مرزوی کی مفید دیا ہے۔ بازویاٹا نگ میں کمزوری رہ جائے تو فاسفورس بھی مفید دوا ہے۔

کیڈمیم کے مریض میں جلد کے فالج کے بعد بے حس تو معروف بات ہے گئن ہیا م نظر انداز نہیں ہونا چاہئے کہ فالج ہونے سے پہلے جلد بہت زیادہ زود حس ہوجاتی ہے۔مفلوج حصوں میں در داور چیونٹیاں رینگنے کا احساس ہوتا ہے۔ بعض اعضاء انفر ادی طور پرسن ہوجاتے ہیں چنا نچینا کیا کان کاسن ہو جانا بھی اس دوا میں نظر آتا ہے۔ایک تکلیف دہ علامت سے ہیں کہ نگلنے کی طاقت کم ہوجاتی ہے اور نگلنا مشکل ہوجاتا ہے۔ بسا اوقات عمر کے ساتھ ساتھ سے طاقت کم ہونے لگتی ہے اور کھانا سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے اور بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ایسے مریضوں کے لئے کیڈمیم سلف بہت مفید بلکہ ضروری دوا بن جاتی ہے۔ بعض بچوں میں بھی یہی علامت یائی جاتی ہے۔

کیڈمیم سلف ہڈیوں پر بھی اثر انداز ہونے والی دواہے۔ کیڈمیم سلف کا نزلہ مزمن ہو جائے تو ناک کی ہڈیاں گلنے گئی ہیں۔مرکری کی طرح کیڈمیم میں بھی پیعلامت یائی جاتی ہے۔ کیڈمیم سلف میں جلد پر چھوٹے جھوٹے دانے اجرا تے ہیں جیسے رو نگئے کھڑے ہوجانے پر ہوتا ہے۔ اگر مرغانی کے پرنوج لئے جائیں تواس کی جلد پر جیسے دانے نمایاں ہوتے ہیں یہ دانے بھی ان سے مشابہ ہوتے ہیں۔ انہیں انگریزی محاورے میں Goose Flesh کہا جاتا ہے۔ کیپسیکم میں بھی یہ علامت نمایاں ہے۔

کیڈمیم سلف معدہ کے لئے بھی بہت مفید دوا ہے۔ اگر معدہ بالکل جواب دے جائے ،کوئی چیز ہضم نہ ہو،خوراک معدہ میں ہی گلنے سڑنے لگے، گندے بودار ڈکار اور شدید متلی اورا ابکا ئیاں آئیں تو کیڈمیم سلف بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ بید کینسر میں بھی مفید ہے لیکن شفانہیں دیتی صرف تسکین بخش سکتی ہے اور تکلیف کی شدت کو کم کرتی ہے۔ اگر مفید ہے لیکن شفانہیں دیتی صرف تسکین بخش سکتی ہے اور تکلیف کی شدت کو کم کرتی ہے۔ اگر بیاری کے نتیجہ میں عضلات گلنے گئیں اور مریض رفتہ رفتہ کمز ور ہوجائے تو کیڈمیم سلف ایسے گرتے ہوئے مریض کو سنجال لیتی ہے۔

کیڈمیم سلف میں حرکت کرنے اور سونے سے تکلیفیں بڑھتی ہیں۔کھانا کھانے کے بعد آ رام کرنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ مریض ہر وقت بھوک محسوس کرتا ہے۔ معدہ اور نظام ہضم جواب بھی دے جائیں لیکن بھوک ختم نہیں ہوتی۔اگر کسی مریض کواس فتم کی بھوک کے ساتھ سیاہ رنگ کی الٹیاں آئیں اور حالت اتنی بگڑ جائے کہ گویا موت کی علامتیں ظاہر ہوں تو اس وقت کار بووت کے بجائے کیڈمیم سلف موت سے واپس تھینچ لاتی ہے بشر طیکہ تقدیر جاری نہ ہوچکی ہو۔

طاقت: 30 تک

45

كيليريم

CALADIUM

(امریکه میں اگنے والا ایک شلجم)

کیلیڈیم کو عام طور پرتمباکوکی عادت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے استعال کیا جاتا ہے اوراسی وجہ سے اس دوانے شہرت پائی ہے حالانکہ یہ محض اتنی مخضرا ثر والی دوانہیں ہے۔

اس میں کئی اور نمایاں علامات بھی پائی جاتی ہیں۔ اس کی دماغی علامات بہت عجیب وغریب ہیں۔ کیلیڈیم کے زہر کایا دواشت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ کوئی کام کرتے ہی بھول جاتا ہے۔

لیلیڈیم کے زہر کایا دواشت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ کوئی کام کرتے ہی بھول جاتا ہے۔

کیلیڈیم کے نہر یانوں کی سختی کی بھی دوا ہو سکتی ہے۔ نثریانوں کی سختی کیایڈیم کی یا دولاتا ہے لیکن سے آرٹیر یوسکل وسس کی براہ راست دوانہیں ہے۔

آرٹیر یوسکل وسس کی براہ راست دوانہیں ہے۔

کیلیڈیم کی خاص علامت سے ہے کہ مریض کوئی کام کر کے سوچ گا کہ اس نے کیا ہے یا خہیں ۔ کوئی بات کسی کوئی بات کسی کوئینی میں معلوم کہی کہ نہیں ۔ خط لکھنا تھا، لکھا تھا کہ نہیں ۔ غرضیکہ روز مرہ کی زندگی میں ایک غیر بقینی صور تحال پیدا ہو جاتی ہے لیکن سے علامت کھانے پینے کے معاملہ میں ظاہر نہیں ہوتی ۔ مثلاً ناشتہ کر کے نہیں بھولے گا، روز مرہ کی با تیں اس لئے بھولتی ہیں کہ انسان اپنی سوچوں میں کھویار ہتا ہے اور اسے یا دنہیں رہتا کہ جو کام اسے کرنا تھاوہ کیا ہے یا نہیں ۔ بعیر نہیں کہ کیلیڈیم کام ریض ذبنی دباؤمحسوں کرتا ہو کیونکہ اس کا دماغ بیک وقت دوطرح کے کام کرتا ہے۔ کیلیڈیم کام ریض ذبنی دباؤمحسوں کرتا ہو کیونکہ اس کا دماغ بیک وقت دوطرح کے کام کرتا ہے۔ ایک اپنے روز مرہ کے کام اور دوسرے دماغی طور پر اپنے خیالات میں جکڑار ہنا۔ اسی لئے دماغ غیر حاضر رہتا ہے ۔ جیسے فلسفی باتیں بھول جاتے ہیں ۔ ایسے مریض ذبنی طور پر بہت تھک جاتے غیر حاضر رہتا ہے ۔ جیسے فلسفی باتیں بھول جاتے ہیں ۔ ایسے مریض ذبنی طور پر بہت تھک جاتے غیر حاضر رہتا ہے ۔ جیسے فلسفی باتیں بھول جاتے ہیں ۔ ایسے مریض ذبنی طور پر بہت تھک جاتے ہیں اور آخر علمی کام ان کے بس میں نہیں رہتا ۔

یہ تمباکونوشی کی کٹرت سے پیدا ہونے والی جنسی کمزوریوں میں بھی مفید ہے۔اس لحاظ سے یہ پکرک ایسڈ اور سیلینیم سے مثابہ ہے۔اس کا مریض مستقل خوف کا شکار رہتا ہے۔اندھیرے کا خوف، ستقبل کا خوف حی کہا ہے سایہ سے بھی خوفزدہ ہوجا تا ہے۔

کیلیڈ یم کے مریض کو چکر بھی آتے ہیں۔آئکھیں بند کرنے سے چکروں میں اضافہ ہوجا تا ہے۔کونیم میں چکروں کی علامت اس سے بالکل برعکس ہوتی ہے اور چکرآئکھیں کھولئے سے بڑھتے ہیں۔لیٹنے اورآئکھوں کو حرکت دینے سے بھی چکرآنے لگتے ہیں۔ایسے چکروں میں کونیم اکیلی فائدہ نہیں ویتی بلکہ کا کوس کے ساتھ ملا کردینے سے چکروں کی بہت طاقتور دوابن جاتی ہونے سے نکیف بڑھتی ہے۔

کیلیڈیم میں گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے۔ گرم موسم یا گرم کمرہ میں بیاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ جبکہ جسم کو ٹھنڈک پہنچانے سے آ رام ملتا ہے مگر معدے میں ٹھنڈی چیزوں سے تکلیف بڑھ جاتی ہے اس لحاظ سے یہ فاسفورس کے بالکل برعکس ہے۔ فاسفورس میں معدہ کو ٹھنڈی چیز سے آ رام ملتا ہے۔

کیلیڈیم کے مریض کی نیند ملکے سے شور سے بھی متاثر ہوتی ہے۔ ایک دفعہ آ نکھ کل جائے تو دوبارہ ساری رات نینز ہیں آتی۔

کیلیڈیم میں جلد میں سنستاہ ہے ہوتی ہے جیسے کوئی کیڑا چل رہا ہے۔اس کے پسینہ میں میٹھی سی بوہوتی ہے جس کے اور کھیاں جنبھ مناتی ہیں، جلد پر بہت خارش ہوتی ہے جس کی کوئی معین و جہنہیں ہوتی ہے جس میں کیڑا چلنے کا احساس بہت بڑھ جائے تو سارے بدن پر ہر وقت خارش ہونی ہے۔ ایگزیمایا دانوں کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی ۔ بعض دفعہ کورتوں میں یہ خارش اندرونی اعضاء میں شدید عذاب کی صورت اختیار کر کے اعصاب شکنی کا باعث بنتی ہے۔ کیلیڈیم کی تکالیف حرکت سے بڑھ جاتی ہیں۔ پسینہ آنے اور سونے سے تکلیف میں کمی ہوجاتی ہیں۔ پسینہ آنے اور سونے سے تکلیف میں کمی ہوجاتی ہے۔

مددگاردوا: نائیٹرک ایسڈ۔ دافع اثر دوا: آرمٹرائی فلم۔ طاقت: 30

46 کلکیریا آرس CALCAREA ARS

مرگی کے مرض میں اگر چوکلگیریا سلف زیادہ مشہور ہے لیکن کلگیریا آرس بھی مرگی کی اہم دوا ہے اور کلگیریا سلف کے بعد اس کا نمبر آتا ہے۔ اس کے متعلق ڈاکٹر کینٹ نے لکھا ہے کہ کلگیریا آرس کے استعال سے مرگی کی بیاری سے کممل نجات مل سکتی ہے۔ ہر مرگی قابل علاج نہیں ہوتی ہوتی ہے۔ اس کا ابریشن ضروری ہوتا ہے۔ اس کا ابریشن ضروری ہوتا ہے۔

کلکیریا آرس میں جسم کے اعصاب پھڑ کنے کار جھان پایا جاتا ہے اور فالجی کمزوریاں بھی ملتی ہیں۔ دراصل کیلئیم ایک شدید کمزوری پیدا کرنے والی دوا ہے۔ اگرجسم میں اس کا توازن معمولی سابھی بگڑ جائے تو بہت زیادہ کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر بھی متاثر ہوتا ہے اور بعض دفعہ مریض اچا تک بے دم ہوکر گر جاتا ہے۔ مویشیوں میں یہ بیاری عام ماتی ہے۔ کیلئیم کا توازن بگڑ نے سے وہ ایک دم نڈھال ہوکر گر جاتے ہیں۔ تاہم عموماً روزمرہ کی کمزوری کا شکار ہونے والے مریضوں کا کلکیریا کے توازن بگڑ نے سے تعلق نہیں ہوتا بلکہ معدے میں تیزاب پیدا ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ اچا تک کمزوری کے دورے پڑتے ہیں۔ یہ کمزوری خطرنا ک اور ڈراؤنی تو ضرور محسوں ہوتی ہے مگرمہلک ثابت نہیں ہوتی۔ ایسے مریض بعض دفعہ بوتی بھی ہوجاتے ہیں نزدگی کا مستقل حصہ ہوتے ہیں۔ اچا تک بے ہوتی کا دورہ لازم نہیں کہ مرگی کی وجہ سے ہی ہوتی اور خرانی کی وجہ سے ہی ہوتی کے حملے ہوں تو وہ مرگی کی اور دران کی سے بیتہ جل جاتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر کمزور کر کر ور کی کا مرض جو پیدائش ساخت کی خرابی کی وجہ سے ہوتے کہ وہ ذہنی طور پر کمزور کی کا مرض جو پیدائش ساخت کی خرابی کی وجہ سے ہوتے کہ وہ ذہنی طور پر کمزور کی کا مرض جو پیدائش ساخت کی خرابی کی وجہ سے ہوتی کہ وہ ذہنی طور پر کمزور کی کا مرض جو پیدائش ساخت کی خرابی کی وجہ سے ہوتی جاتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر کمزور

ہے۔اس کی آنکھوں میں بھی پچھ مافت کے آٹارنظر آتے ہیں یا اگروہ غیر معمولی حساس ہو تو اپنی چھوٹی چھوٹی سوچوں میں مگن رہتا ہے اور شجیدہ ، گہر نے وروفکر کے قابل نہیں ہوتا۔

بعض معاندین آنخضرت اللہ اور دیگرا نہیاء پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہیں الہام وغیرہ پچھ نہیں ہوتا تھا ، میکش مرگی کی ہی ایک قسم تھی جو انہیں لاحق تھی ۔لیکن انہیاء جو ظیم کا م دنیا میں کرتے ہیں ان پر اس قسم کے لغواعتر اضات وار دہو ہی نہیں سکتے ۔ انہائی شدید دباؤ کہ دنیا میں کرتے ہیں ان پر اس قسم کے لغواعتر اضات وار دہو ہی نہیں سکتے ۔ انہائی شدید دباؤ مرگی کے مرض کا حملہ ضرور ہونا چا ہے ۔ظیم رومن شہنشاہ سیزر کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ الی تقریروں کے حملہ ضرور ہونا چائی خطرناک حالات کا سامنا کرتے ہوئے اور بھی زیا دہ مستعدا ورسب دور ان جب شدید ذہنی دباؤ ہوتا تھا لوگوں کے سامنے بے ہوش ہوکر گر جایا کرتا تھا جبکہ تخضرت ہوئی انہائی خطرناک حالات کا سامنا کرتے ہوئے اور بھی زیا دہ مستعدا ورسب صحابہ سے بڑھ کر چاق و چو بند ہو جاتے تھے۔ اُحد کی سنگلاخ زمین اور خمین کا میدان کا میدان کا رزار ان بد بخت معرضین کے منہ میں خاک ڈالتے رہیں گے۔ الہام کے وقت بعض دفعہ جور بودگی تی طاری ہوتی ہے وہ ہرگز مرگی ہے کوئی دور کی مشابہت بھی نہیں رکھتی۔

اعصابی دباؤ اور معدے کا تیزاب مل کر بعض دفعہ سخت کمزوری پیداکر دیتے ہیں یہاں تک کہ انگل ہلانا بھی مشکل ہوجا تا ہے۔ مجھے خودیہ تکلیف ہو چکی ہے اور تکلیف کے دوران بعض دفعہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ ابھی جان نکل جائے گی۔ کئی کئی دن تک بستر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ یہ مرض عارضی ہوتا ہے۔ اگر تیز ابیت کا مؤثر علاج کر دیا جائے تو یہ تکلیف ہمیشہ کے لئے پیچھا چھوڑ دیتی ہے۔

کلکیریا آرس میں جو کمزوری پائی جاتی ہے وہ بھی ضروری نہیں کہ مرگ ہی کی علامت ہو۔کلکیریا آرس کے مرکب میں آرسنک کا جزومعدہ میں تیزاب پیدا کرنے میں نمایاں کرداراداکرتا ہے۔لیکن اس سے جوشدید کمزوری پیدا ہواس کے علاج کے لئے آرسنگ سے بہت زیادہ موثر دوائنس وامیکا ہے۔

کلکیریا آرس کانکس وامیکا اور دوسری دواؤں سے فرق یہ ہے کہ اس میں مستقل فالجی کنروریاں پائی جاتی ہیں جبکہ محض تیز اب کی زیادتی کی وجہ سے فالجنہیں ہوا کرتا۔کلکیریا آرس کی فالجی علامتیں شروع ہوں تو ہاتھ کا پہنے لگتے ہیں اور جسم پر بھی کیکی طاری ہونے لگتی ہے۔ یہ فالجی کا آغاز ہے۔

مرگی کا مرض پہچانے کے لئے ڈاکٹروں نے اورا (Aura) کا محاورہ استعال کیا ہے لیعنی مرگی کے حملہ کے آغاز میں جسم میں کسی جگہ جوشنسی پیدا ہوتی ہے اسے 'اورا'' کہتے ہیں۔ بعض مریضوں کا ''اورا'' معدے سے شروع ہوتا ہے بعض کا دل سے۔ مثلاً دل پر کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور گھبرا ہٹ ہوتی ہے۔ کلکیریا آرس میں مرض کے حملہ کا آغاز ہمیشہ دل سے ہوتا ہے اس لئے اگر مریض کو بیاحساس ہو کہ دل میں پھھ ہور ہا ہے اور پھر مرگی سے مشابہ دورہ پڑے تو ایسی صورت میں کلکیریا آرس مکمل شفا بخشنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایک اور علامت بھ ہے کہ مرگی کا دورہ پڑنے سے پہلے آواز بیٹھ جاتی ہے اور مریض بول نہیں سکتا۔

سیر هیاں چڑھتے وقت اگر سانس اکھڑے تو کلکیریا آرس اچھی دوا ہے۔اس میں بیاریاں زیادہ تربا کیں طرف محلہ کرنے کار جحان رکھتی ہیں۔ سٹیفی سیریا (Staphysagria) کی طرح اس دوا میں بھی غصہ، نالبندیدگی اور ناراضگی کے بدا ثرات سے بیدا ہونے والی بیاریاں شامل ہیں۔ اس میں جو خیالی نظارے دکھائی دیتے ہیں ان میں بھوت پریت اور دیگر وہمی نظارے شامل ہیں۔ بعض دفعہ اس کے مریض آگ کی خوا بیں بکثرت دیکھتے ہیں۔ بیطامت نیٹرم میور میں بھی ہے جس میں زیادہ تر آگ کی نوا سیانیوں کے خواب آتے ہیں۔ اگران غلامتوں کے ساتھ مستقل پاگل بن کا حملہ ہو جائے تو ایسے پاگل بن میں کلکیریا آرس اچھی دوا ثابت ہو سکتی ہے۔

اگرخون کا دباؤا چانک سر کی طرف زیادہ ہوجائے اور چکر آنے لگیں اور توازن برقرار نہ رہے، ساتھ شنجی کیفیت بھی ہوتو کلکیریا آرس اس میں بھی مفید ہے۔ پرانے اور ضدی سر درد میں کلکیریا آرس بھی کام آسکتی ہے۔ اگر کسی اور دواسے فائدہ نہ ہوتو

کلکیریا آرس کوبھی استعال کر کے دیکھ لینا چاہئے۔ اس کے سردرد کی علامت سیمی فیوجا کلکیریا آرس کوبھی استعال کر کے دیکھ لینا چاہئے۔ اس کے سردرد کی علامت سیمی فیوجا میں ماؤف حصہ کے بل لیٹنے سے درد میں اضافہ ہوجا تا ہے بلکہ بعض دفعہ دکھتے حصہ کو دبانے سے اعصاب بھی پھڑ کئے لگتے ہیں۔ کلکیریا آرس میں جس کروٹ مریض لیٹے گا اس کے نخالف سمت درد شروع ہوجائے گا۔ اگر دائیں طرف میر درد کا حملہ بائیں طرف ہوجائے گا۔ جب بائیں طرف سر درد کا حملہ بائیں طرف ہوجائے گا۔ جب بائیں طرف سر کے گا تو درد دائیں طرف منتقل ہوجائے گا۔ یہ کلکیریا آرس بہت مؤثر ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ اورکوئی واضح علامت ایسی نہیں ہے جوکلکیریا آرس بہت مؤثر ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ اورکوئی واضح علامت ایسی نہیں ہے جوکلکیریا آرس کے سردرد کا خاصہ ہو۔

چہرے اور سرکی جلد پر اکیزیم اس میں عام پایا جاتا ہے۔ گردوں میں بھی در دہوتا ہے اور دھن کا احساس ہروقت رہتا ہے جو پھری کی وجہ سے نہیں بلکہ عام سوزش کی وجہ سے نہیں بلکہ عام سوزش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں لیکور یا زر درنگ کا ہوگا جو کاٹے والا تیزانی مادہ رکھتا ہے۔ بعض دفعہ لیکوریا عور توں کے لئے تکلیف کا باعث بننے کے علاوہ نفیاتی الجھنیں بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اس قسم کے لیکوریا میں کلکیریا آرس کے علاوہ کالی فاس اور آرسنگ بھی مفید دوائیں ہیں جو سخت بد بودار اور سوزش والے لیکوریا کا توڑ ہیں۔

رحم کے کینسر میں اگرمسلسل ہلکا ہلکا خون جاری رہےاوروہ تیز ابی اور بد بودار ہوتو اس میں بھی کلکیریا آرس بہت فائدہ بخش ہے۔

> دافع اثر دوائیں: کاربوو تج کی گونائن پلسٹیلا طاقت: 30 سے 1000 تک

47 کلکیریا کاربونیکا CALCAREA CARBONICA

کیلشیم کار بونیٹ دودھ کا بنیادی جزو ہے۔اس سے ہڈیاں، آئھ کا سفیر حصہ اور بعض دیگرا ہم اعضاء تخلیق پاتے ہیں۔ دودھ جومکمل غذائیت کا حامل ہے اس میں کیلشیم سب سے اہم کردارادا کرتا ہے۔ کیلٹیم کا توازن بگڑنے سے متفرق عوارض خصوصاً ہڈیوں کی بیاریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔کلکیریا کارب غدودوں، جلد اور مڈیوں پر اثر انداز ہونے والی اہم دوا ہے۔ ایسے مریض کو بہت جلد سردی لگ جاتی ہے، یا وُں بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں اور بھی گرم۔ چھاتی میں جکڑے جانے کا احساس ہوتا ہے۔ کھانسی رات کوخشک اور دن کوعام طور پر بلغمی ہوتی ہے۔ بلغم زردی مائل بد بودار ہوتا ہے اور بہت مشکل سے نکلتا ہے۔ بچوں کے دانت نکالنے کے زمانے میں انہیں جو کھانسی شروع ہوجاتی ہے اور بآسانی پیچھانہیں جپھوڑتی بسااوقات وہ کلکیریا کارب سے ٹھیک ہوجاتی ہے۔کلکیریا کارب کا مزاج رکھنے والے لوگوں کے چیرے عموماً بے رونق ہوتے ہیں،جلد چکنی اور زردی مائل بعض ایسے مریض بات کرتے کرتے ایک دم نڈھال ہوجاتے ہیں اورخون کی کمی کابھی شکارر ہتے ہیں۔ د ماغی محنت انہیں کمز ورکر دیتی ہے جس ہے بعض دفعہ وہ پسینہ پیپنہ ہوجاتے ہیں اور سانس لینے میں انہیں دفت پیش آتی ہے۔ سردی اورنمی کو پیندنہیں کرتے۔ تازہ ہوااورخنگی سے بھی نفرت ہوتی ہے۔ بھیگنے پر رسٹائس کی طرح بیاریاں فوراً آ گھیرتی ہیں۔ خون کی کمی میں کلکیر یا کارب نمایاں اثر رکھتی ہے۔خون کی بیکی دراصل معدے کی جھلیوں کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں وہ لعاب پیدانہیں ہوتے جووٹامن بی 12 کوہضم کرتے ہیں۔خون کی ایسی کمی کامنتقل علاج محض وٹامن بی 12 سے

کرناممکن نہیں البتہ یہ بیاری کے ظاہری بدائر ات کو دور کرنے کے لئے مسلسل دینی پڑتی ہے۔ چونکہ معدہ اسے ہضم نہیں کرتا اس لئے اسے بذر بعیہ بجیکشن دینا پڑتا ہے اور ایسے مریض کوعمر بھروٹامن بی 12 کے ٹیکے لگانے پڑتے ہیں۔ایسے مریض کواگر ہومیو پیتھی دوا کی صورت میں کلکیریا کارب دی جائے تو ان ٹیکوں کی ضرورت نہیں رہتی اور جسم خود بخو دخون بنانے لگتا ہے۔

کلکیر یا کارب میں عضلات کا ڈے سیلا بن پایاجا تا ہے۔ اگر عضلات ڈے سیلے ہوکر لئک جائیں اور جسم موٹا ہونے گئے تو سارا نظام صحت بگڑ جاتا ہے۔ بچھ عرصہ تک مسلسل کلکیر یا کارب دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ جسم میں کیلیٹیم کی کمی واقع ہوجائے تو ہومیو پیتھی پڑینسی میں دوا کھلانے سے یہ کی دور ہوجاتی ہے۔ بعض اوقات اچانک کھڑا ہونے سے گھنے کے عضلات جسم کا بوجھ ہر داشت نہیں کر سکتے اور انسان گرجاتا ہے۔ بلڈ پریشر کی کمی کی وجہ سے بھی ایک دم کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اگر عضلاتی کمزوری سے ایسا ہوتو کلکیر یا کارب سے بھی ایک دم کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اگر عضلاتی کمزوری سے ایسا ہوتو کلکیر یا کارب بہت مفید ہے۔ گہری اور مزاج سے مطابقت رکھنے والی دوائیں جو انسانی جسم کی تعمیر میں نویہ علاج کہنایاں کر دارا داکر سکتی ہیں اگر مناسب وقفوں کے ساتھ مستقل استعال کی جائیں تو یہ علاج وقت تو لے گا مگر بہت مفید اور دیر پا اثر ات کا حامل ہوگا اور ہر بیاری کا الگ الگ علاج کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی ۔ مریض بحثیت مجموعی شفایا جاتا ہے۔

یا در ہے کہ کلکیر یا کارب کے بعدا گرسلفر دینی ہوتو پہلے لائیکو پوڈیم دینی ہوگی پھرسلفر دی جاسکتی ہے۔سلفر سے جواندرونی بیاریاں جلد پراچھلتی ہیں بسا اوقات نکس وامیکا ان کا توڑ ثابت ہوتا ہے (مثلاً بواسیر کے مسول میں) لیکن بواسیر کے مسول کے علاج کے لئے کلکیر یا کارب سے مشابہ ہیں۔ کلکیر یا کارب سے مشابہ ہیں۔ مثلاً ایسکولس (Aesculus) میں بھی کلکیر یا کی طرح بواسیری مسول میں خون اور پیپ کی علامات ملتی ہیں۔

کلکیریا کارب کینسر کے رجحان کورو کئے کے لئے ایک اونچا مقام رکھتی ہے لیکن

مریض کاعمومی مزاج اس سے ملنا ضروری ہے ورنہ کا منہیں کرے گی۔ بعض بیاریوں میں زخموں
کو چیرادینا پڑتا ہے۔ کلکیریا کارب ایسے چیرول کی ضرورت کوختم کرسکتی ہے۔ گہرے پھوڑ ہے
جو بیرونی جلد کی سطح کے نیچے ہوتے ہیں ان میں کلکیریا کارب بہت موثر ثابت ہوتی ہے اور
سلیشیا سے بھی بہتر اثر دکھاتی ہے۔ پھوڑایا تو ازخود کھل کرغائب ہوجاتا ہے یا پیپ بنتی ہے تو
معمولی اور پھوڑ ابغیر کسی تکلیف اور ٹیکن کے گھل جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بیوقتی دوا کے طور پر
فائدہ دے گی۔

کلکیریا کارب کا مریض واضح طوریر پیجانا جاتا ہے۔جسم فربھی مائل ہو، زر درنگت، سرنسبتاً بڑا، پسینه آنے کا رجحان ہو۔جسم بھی ٹھنڈا بھی گرم، سارےجسم کا نظام ست ہوتو یہ کلکیر یا کارب کے مریض کی عمومی تصویر ہے لیکن مریض میں اس کی ہرعلامت کا موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی ایک علامت اکیلی کلکیریا کارب کی نشا ند ہی کرسکتی ہے۔ مثلاً بعض بچوں کا سرپیدائشی بناوٹ کے لحاظ سے بڑا ہوتا ہے،ضروری نہیں کہوہ کلکیریا کارب کے مریض ہوں، بعض ہوبھی سکتے ہیں۔بعض دفعہ کلکیریا کی علامتیں عمر کے ساتھ رفتہ رفتہ ظاہر ہوتی ہیں۔ کلکیر یا کے مریض کے ناک میں اکثر مواد اکٹھا ہو کر جم جاتا ہے اوراس کی وجہ سے سانس لینے میں دفت محسوں ہوتی ہے۔ کلکیریا کارب دینے سے بیمواد جھلیوں سے الگ ہوکر بآسانی باہرنکل جاتا ہےاورکسی قتم کےاریش کی ضرورت پیش نہیں آتی۔جسم میں کیلشیم کا توازن بگڑنے سے بعض دفعہ مڈیوں کے کونے بڑھنے لگتے ہیں اور گھٹنوں کے جوڑوں کی ہڈیوں میں کیلشیم کے ابھار سے بن جاتے ہیں جو بہت نکلیف دہ ہوتے ہیں اس کا علاج کلکیر یا کارب سے ہوجا تا ہے۔اگر کوئی بچہٹا نگوں میں کمزوری کی وجہ سے دہریسے چلنا سیکھے تو کلکیر یا کارب اس کا علاج ہے۔اگر بچہ دریہ سے بولنا شروع کرے تو برائیا کارب بہترین ہے۔ جہاں بیدونوں علامتیں یائی جائیں تونیٹر میورمفید ہوگی۔ اگر بیجے کے جسم میں پیدائشی طور پر سوڈیم کا توازن بگڑ جائے تو اس سے دہنی

صلاحیتوں پراثر پڑتا ہے نیز ٹانگیں بھی کمزور ہوجاتی ہیں اور مریض سو کھے کا شکار ہوجاتا ہے۔ نیٹرم میور کی خاص علامت ہے ہے کہٹانگیں اور اوپر کا دھڑ دونوں بیک وقت سو کھتے ہیں اور زبان پر بھی اثر ہوتا ہے چنانچہ بچہ دیر سے چلنا اور بولنا سیکھتا ہے ۔ لیکن کلکیر یا کارب میں زبان متاثر نہیں ہوتی اور بچہ معمول کے مطابق بولنا سیکھ لیتا ہے، ہاں چلنا دیر میں سیکھتا ہے۔ چھوٹا قد بھی کلکیر یا کارب کی ایک علامت ہے۔ اگر جسمانی کمزوری کے ساتھ ذہنی کمزوری بھی نمایاں ہوتو یہ برائیٹا کارب کی علامت ہے۔ اگر کلکیر یا کارب کے مزاجی مریض کی ہڑیوں میں طیڑھا بن پیدا ہونے لگے اور وہ بدنما دکھائی دینے لگیں تو کلکیر یا کارب دینے سے بتدری مگر واضح بہتری کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔

مریض اندرونی طور پر سردی محسوس کرتا ہے مگر بعض اوقات ہاتھ پاؤں جلتے ہیں۔ طوفان آنے سے قبل مریض کی بیاری کی علامات بڑھنی شروع ہوجاتی ہیں مثلاً اگر گرد کا طوفان آنے والا ہوتو کئی گھنٹے پہلے دے کی علامات والا مریض وہ علامات ظاہر کرتا ہے جوگر دکی صورت میں بعد میں ظاہر ہوتی ہیں۔ایسے مریضوں کی ایک دواکلکیریا کارب بھی ہے۔وہ مریض جوزیا دہ لمباعرصہ ذہنی کام نہ کر سکے اور تھک جائے اور جسم کے دوسر ہے حصول میں بھی کمزوری کی علامتیں ظاہر ہوں، اس کا سارا نظام ہی کمزور ریڑ جاتا ہے اور وہ بہت جلد تھکنے لگتا ہے۔ کلکیریا کارب دینے سے وہ آ رام محسوں کرے گا اور بے چینی زیادہ عرصہ باقی نہیں رہے گی۔ اگر کلکیریا کا مریض بہت ہیجانی (Excited) ہو جائے تواسے کی قسم کے نظارے دکھائی دینے لگتے ہیں۔خصوصاً نوکدار چیزیں نظر آنے لگیں گی، تصویریں اور اجسام ناچتے ہوئے دکھائی دیں گے۔اسی طرح بے جان اشیاء، کیل، تار، چینے اور کاٹنے والی چیزیں نظر آئیں گی۔اگر بچوں میں ایسی علامتیں ہوں تو کلکیریا کارب الا ماشاءاللہ یقینی دوا ہے۔ عام کمزوری کی علامت ہو، سردی محسوس ہوتی ہومگر ہاتھ یا وُل جلیں تو بھی کلکیر یا کارب علاج ہے۔کلکیر یا کا ڈبنی مریض اکثر چٹکیاں بھرتار ہتا ہےاورا سے سونے سے پہلے مختلف چہرے دکھائی دیتے ہیں لیکن موت کا خوف نہیں ہوتا۔ نا خنوں کے ساتھ جلدا کھڑ جاتی ہے جو بہت تکلیف کابا عث بنتی ہے۔ یہ علامت

یٹرولیم میں بھی ہے،جلدخشک ہوکرنا خنوں کو چھوڑ دیتی ہے جیسے خشک ایگزیما ہو۔

عام طور پر غم اور گہری اداسی کے دورے میں سوڈ یم کی دوائیں مؤثر ہوتی ہیں ان
میں نیٹر م میور، آرم میوراور گریشیولا (Gratiola) بھی شامل ہیں۔ اگر مریض غم زدہ ہو کر زندگی
میں دلچیسی لینا چھوڑ دے تو ایجرا گریسا اور آر نیکا بھی مؤثر ہیں۔ کلکیریا کارب کی ایک خاص
علامت ڈپریشن ہے جو کسی اور دوا میں نہیں کہ ایک چھوٹی سی عمر کی بچی بھی غمز دہ ہو کر ہر چیز سے
علامت ڈپریشن ہے جو الانکہ ابھی اس کے کھیلنے کو دنے کے دن ہوتے ہیں۔ اگر بلوغت سے
بہلے خصوصاً لڑکیوں میں اداسی کا ایسا دورہ پڑے تو اس کے فوری علاج کی ضرورت ہے کیونکہ وہ
مایوس ہو کر بعض دفعہ خود کشی کی خواہش کی تیں لیکن ان میں تشد ذبیس ہوتا اور نم کی کوئی ظاہری
وجہ بھی دکھائی نہیں دیتے۔ یہ کلکیریا کارب کی ایک خاص علامت ہے۔ اس کا مریض زیادہ سوچ
بچار نہیں کرتا ہے اگر کلکیریا

کلکیر یا کارب کے مریض کو طرح طرح کے ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور اندھیرے میں جن بھوتوں کے خیال سے ڈرتا ہے۔خواب میں اپنے آپ کوزخمی یا کسی حادثے میں ملوث دیکھے گایا آگ لگنے کے خواب دیکھے گا۔ اس کی علامتوں میں ہرقتم کا سر در دہوتا ہے لیکن دوسری دواؤں سے تمیز کرنے والی نشانی ہے کہ سر در در وشنی سے برط هتا ہے۔ دن کے وقت رات کی نسبت زیادہ سر در دہوتا ہے۔ گریفائٹس کا سر در دبھی روشنی سے برط هتا ہے کیونکہ دونوں میں کار بن کا عضر موجود ہے۔ کار بووج میں بھی یہی علامت ہے۔ سر در د میں شھنڈی گلور سے آرام محسوس ہوتا ہے۔

اگر بچے کا سر بڑا ہونے گئے ، آنکھوں کی پتلیاں کمزور ہوجائیں اور بچے رات کو سوتے میں در دناک چیخ مارے تو عموماً لیسے بچوں کا اپریشن کروانا پڑتا ہے جس میں شفاکے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ بچے نیم پاگل سا ہوکررہ جاتا ہے۔ اگر وقت پر ہومیو پیتھی علاج کیا جائے تو کلکیریا کا م کرسکتی ہے مگر زیادہ تر سلیشیا کی ضرورت پڑتی ہے جس

کے اثر سے بعض دفعہ آنکھوں کے رہتے اور بعض دفعہ کا نوں کے رہتے اچا نک پانی خارج ہونا شروع ہوجا تا ہے۔ بھی ایک آنکھ یا کان سے بکثرت پانی بہہ کر بچے کا تکیے گیلا کر دیتا ہے اور اس طرف سے سرچھوٹا ہونے لگتا ہے۔ پھر چند دن کے بعد یہی عمل دوسری طرف شروع ہوجائے گا۔ اس بیاری کا جسے انگریزی میں ہائیڈرو کیفیلس (Hydrocephalous) کہتے ہیں، گا۔ اس بیاری کا جسے انگریزی میں ہائیڈرو کیفیلس بیا اور کلکیر یا کارب سے ایسے متعدد بچوں کا کا میاب معلاج کیا ہے۔ اگر بیاری کافی زیادہ آگے بڑھ چکی ہوتو کلکیر یا کارب اونچی طاقت میں مفید خابت ہوسکتی ہے گرضروری نہیں۔

آ نکھ کے کورنیا میں بعض دفعہ سفید مواد آ جاتا ہے جو آ ہتہ آ ہتہ بہنے لگتا ہے اگر انفیشن پرانی ہوتو مواد میں زردی آ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں بعض اور مشابہ دواؤں کے علاوہ کلکیر یا کارب بھی مفید ہے۔ اگر کان کا مواد زرد رنگ کا ہوتو کلکیر یا کارب کے دوا ہونے کا امکان اور بھی ہڑھ جاتا ہے۔ کان کے بردوں میں پیدا ہونے والی کمزوری یا آ ہتہ آ ہتہ ظاہر ہونے والا بہرہ بین جس میں کان رفتہ رفتہ آ وازوں کی تمیز کرنا چھوڑ دیتا ہے کلکیر یا کارب کا تقاضا کرتا ہے۔ بعض اور دوا نمیں بھی مثلاً چینو پوڑ یم (Chenopodium) مفید ثابت ہوسکتی تقاضا کرتا ہے۔ بعض اور دوا نمیں بھی مثلاً چینو پوڑ یم (Onosmodium) مفید ثابت ہوسکتی دوا ہے لیکن اونو سموڈ بھر اور دباؤے سے پیدا ہونے والی کمزوری میں بھی کلکیر یا کارب اچھی دوا ہے لیکن اونو سموڈ بھر جو آ کر ٹھر جواتا ہے لیکن زیادہ شدت اختیار نہیں کرتا۔ اگر حلیسے سے میں سر میں درد بھی ہوتا ہے جو آ کر ٹھر جواتا ہے لیکن زیادہ شدت اختیار نہیں کرتا۔ اگر حلیسے سے موتا ہے جو آ کر ٹھر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ موسم برلئے سے حلیسے سے بوشل اور پڑمردہ ہوجاتی ہے۔ نفا میں کوئی ایسا اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے جہم وقی طور کے بہر کرزوری میں متقل بھاریوں کی دوا ہے کیکٹر وری میں متقل بھاریوں میں کلکیر یا کارب کی شفایا بی کا عمل بھی آ ہتہ ہوتا ہے اور لمہا عرصہ چنے والی بھاریوں کی دوا ہے عرصہ تک وقفہ ڈال ڈال کرد بی بڑتی ہے۔

کلکیر یا کارب کے مریضوں میں انڈا کھانے کی شدیدخواہش ہوتی ہے۔علاوہ ازیں

بچہ ایسی چیزیں بھی کھا تا ہے جوہضم نہیں ہوتیں مثلاً مٹی، کاغذ وغیرہ۔اکثر ایسے بچے مستقل بدہضمی کا شکار ہوجاتے ہیں۔مریض کوسر کی چوٹی پر بوجھ کا حساس ہوتا ہے،سر میں درد ہوتو ہاتھ یا وال مھنڈے ہوتے ہیں۔ ذہنی دباؤ سے سر درد میں اضافہ ہوجا تا ہے۔سر کی جلد پر خارش ہوتی ہے۔آ تکھیں روشنی برداشت نہیں کرسکتیں۔

برانی قبض میں بھی کلکیریا کاربِ مفیدہے۔سلیشیا اور وریٹرم البم (Veratrum Album) بھی قبض کی اچھی دوائیں ہیں۔وریٹرم البم عموماً کھلے اسہال میں کام آتی ہے اس لئے معالج کا ذ ہن قبض کی طرف نہیں جاتا حالانکہ یہ بخت ضدی قبض کے لئے بھی مفید ہے۔ بچوں میں ایسی ضدی قبض سلیشیا ہے بھی کھل جاتی ہے لیکن اگر وہ اثر نہ کرے تو وریٹرم البم ضرور دیں۔ کلکیر یا کارب کی علامتیں ہوں تو وہی کام کرے گی۔اس کےاستعمال سے چند دنوں میں پیٹ میں نرمی پیدا ہوجاتی ہےاور قبض آ ہستہ آ ہستہ تم ہوجاتی ہے۔اس بیاری میں اس کا فوری الزنہیں ہوتا۔ کلکیر یا کارب مردوں اورعور توں دونوں کی اندرونی کمزوریاں دورکرنے کے لئے بھی استعال ہوتی ہے۔ رحم کے نیچے کی طرف گرنے کے رجحان کوروکتی ہے۔ یہ ماہواری نظام کی خرابیاں بھی دورکرتی ہے اور عاد تأبہت زیادہ خون جاری ہونے کی بہت اہم دواہے۔ بیصرف بلیڈنگ (Bleeding) ہی نہیں روکتی بلکہ اندر جوغدودیں وغیرہ بڑھ جاتی ہیں ان کا بھی علاج کرتی ہے۔ جہاں کسی ایک دوا کی واضح تشخیص نہ ہو سکے حسب ذیل تین دوا کیں ملا کر دی جائیں تو حیض کے دوران زیادہ خون جاری ہونے کا اکثر مؤثر علاج ثابت ہوتی ہیں۔ وہ دوائیں یہ ہیں۔ کلکیریا کارب، میوریکس (Murex) اور سبائنا۔ 30 طاقت میں چند مہینے تک دی جائیں،شروع میں تین دفعہ روزانہ، پھر فائدہ ہونے برصرف ایک دفعہ روزانہ کا فی ہے۔ رحم کی رسولیوں کا بھی بیمؤٹر علاج ہے۔کلکیریا مزاج کی عورتوں کو بعض دفعہ بہت گاڑ ھاہروقت رہنے والا لیکوریا لاحق ہوتا ہے۔اگرایسی مریضہ میں باربار حمل ضائع ہونے کا رجحان بھی ہوتو کلکیریا کا رب بہت قیمتی دوا ثابت ہوتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ

ایک الیں ہی مریضہ کو یہ دوا دی جس نے اتنا اچھا اثر دکھایا کہ اسے اگلے حیض سے پہلے ہی حمل مھہر گیا اور بیجے کی پیدائش تک اسقاط کی تکلیف نہیں ہوئی حالا نکہ اس سے پہلے گئ حمل ضائع ہو چیئے تھے۔ اسقاط حمل سے بیچاؤ کے لئے صبح دوا کی معین تشخیص بہت ضروری ہے۔ فیرم فاس ،کلکیریا فاس اور کالی فاس جوعمومی کمزوری اور خون کی کمی کو دور کرتی ہیں۔ یہ دوران حمل بھی اسقاط کے خلاف اچھا اثر دکھاتی ہیں۔ دوسری مددگار دوا جو اسقاط میں بہت مفید ہے کولو فائیلم ہے۔ لیکن اگر مریض کی ساخت کلکیریا کارب والی ہوتو اسے بلاتر دد کلکیریا کارب ہی دیں پھرکسی اور دوا کی غالبًا ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

چونکہ کلکیریا کومزاجی دوا کے طور پر لمبے عرصہ تک دینا پڑتا ہے اس لئے مسلسل دیتے چلے جانے کی بجائے وقفے ڈال ڈال کر دینا بہتر ہے۔ بھی دیں اور بھی روک لیں۔ مریض کے ٹھیک ہونے کے بعد بھی چھے ماہ تک یہی عمل جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

اگر کھانسی کمبی ہوجائے اور تھوک کے ذریعے خون آئے تو یہ بھی کلکیریا کی علامت ہے۔ اس میں کالی کارب کی طرح پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اگر عمومی کمزوری بہت بڑھ جائے تو ایسا مریض زیادہ دیر تک بیٹے بھی نہیں سکتا اور کرسی سے پھسل پھسل جاتا ہے۔ اگر کسی مریض میں انتہائی کمزوری کے باعث باربار سرتکھے سے نیچے ڈھلکتار ہے تو اس کی سب سے نمایاں دوا میوریٹک ایسٹہ (Muriatic Acid) ہے جو فوری اثر دکھاتی ہے۔ اگر روزم ہاسی طرح ہوتو اس کی بہتر دوا کلکیریا کارب ہے۔

کلکیر یا کارب میں <u>کمر کے نچلے حصہ میں درد</u> ہوتا ہے، کمر میں کمزوری محسوس ہوتی ہےاور بیٹھ کراٹھنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔

مددگار دوائیں: سلفر، کلکیریا سے پہلے اور لائیکو بوڈیم بعد میں اور بیلاڈونا۔رسٹائس۔سلیشیا دافع اثر دوائیں: کیمفر۔اپی کاک۔نکس وامیکا۔ٹائیٹرک ایسٹر طافت: 30سے سی ایم (CM) تک

48

كككيريا فلوريكا

CALCAREA FLUORICA

(Fluoride of Lime)

کیلشیم فلورائیڈ ایک معدنی عضر ہے جو چیکدار پھریلی شکل میں دنیا بھر میں پایا جاتا ہے۔ صنعتی دنیامیں بدایک بہت مفیداور کارآ مدشے ہے۔انسانی جسم میں دانتوں، مڈیوں کی سطح،جلد کے کیکدار ریشوں،عضلات اورخون کی رگوں کی بہاریوں سے اس کا گہراتعلق ہے۔اس کی کمی سے غدودوں میں پھر کی طرح کی شختی پیدا ہو جاتی ہے اور دانت اور ہڈیاں بھر بھرے ہو جاتے ہں۔ ہومیو پیتنی اٹینسی میں تیار کردہ دواکلکیر یا فلور خلیوں اور عضلات میں پیدا ہونے والی سختی کو دور کرنے کے لئے بہترین دوا ہے اور بہت گہرااثر رکھتی ہے۔اس کاجسم کے ہرعضو سے تعلق ہےخصوصاً مڈیوں کی نشو ونما متاثر ہوتی ہے۔ مڈیوں کی سطحاور ورپیروں میں گاٹھیں اور گومڑ سے بن جاتے ہیں۔ رحم ڈھیلا ہوکراٹک جاتا ہے۔ ناخن بدنما ہوجاتے ہیں۔ عورتوں کے سینے میں سخت گلٹیاں بنتی ہیں۔ بہاور دوسری ہرقتم کی گلٹیاں جن میں کینسر بننے کا رجحان ہوان میں کلکیریا فلوراستعال کرنی جاہئے۔میرےمشاہدہ میں کئی ایسے مریض آئے ہیں جن کی کلائی کے غد ود پھول کر سخت ہو گئے تھے۔ شروع میں روٹا اور ملتی جلتی دوائیں استعمال کروایا کرتا تھالیکن افاقة نهيس ہوتا تھا۔ كلكيريا فلوردينے سے ایسے ہر مریض كونمایاں فائدہ ہوا۔ بعض دفعہ تكھنوں کے بچچلی طرف کے خم میں گلٹیاں بن جاتی ہیں،ان میں بھی کلکیرییا فلورا حیمااثر دکھاتی ہے۔ رحم کے غدودوں کے نسخہ میں دیگر دواؤں کے علاوہ کلکیریا فلور بھی ضرور شامل کرنی جاہئے _____ نسااوقات بدا کیلی ہی بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔

کلکیر یافلور آ نکھے پردہ کے زخمول میں بھی بہت مفید ہے۔خصوصاً اگر کنارے بہت

سخت ہوگئے ہوں۔ آئکھوں کے سامنے ستارے ناچتے ہوں، کور نیا پرد ھے نظر آتے ہوں، آئکھ کی رگیس سخت ہو جائیں تو کلکیر یا فلور کو یا در کھیں۔ کا نوں کے پردوں میں سختی پائی جائے،
کا نوں میں گھنٹیاں بجتی ہوں، کان بہتے ہوں اور ناک کے پچھلے حصہ کے غدود جو گلے کے جوڑ سے ملتے ہیں بڑھ جائیں تو ان کے لئے کلکیر یا فلور کے علاوہ برائیٹا کارب بھی اچھی ثابت ہوتی ہے، لیکن جو غدود آ ہستہ ہڑھ کر پھر کی طرح سخت ہوجائیں ان کی سب سے اہم دواکلکیر یا فلور ہے ملاوہ برائیٹا کارب بھی اچھی ثابت ہوتی ہے، لیکن جو غدود آ ہستہ آ ہستہ بڑھ کر پھر کی طرح سخت ہوجائیں ان کی سب سے اہم دواکلکیر یا فلور ہی ہے۔ نزلدز کام میں سخت بد بودار اور گاڑھی سبزی مائل رطوبت خارج ہوتی ہوئی دواکلکیر یا فلور ہی ہوئے ، زبان ہے۔ رخساروں اور جبڑوں کی ہڈی پر سوزش، دانتوں میں درد، مسوڑ ھے سوجے ہوئے ، زبان پر ختی اور سوزش نمایاں، دانت بلنے لگتے ہیں اور کھانا کھاتے ہوئے سخت درد ہوتا ہے۔ حلق میں درد جسے گرم مشروب پینے سے آرام آتا ہے اور ٹھنڈی چیزوں سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ مردوں اور عورتوں کے جنسی اعضاء کی تکلیفوں سے بھی اس کا تعلق ہے۔ بعض اوقات مردوں اور عورتوں کے جنسی اعضاء کی تکلیفوں سے بھی اس کا تعلق ہے۔ بعض اوقات سے بھی سے کہ میں مردوں اور عورتوں کے جنسی اعضاء کی تکلیفوں سے بھی اس کا تعلق ہے۔ بعض اوقات سے بھی سے کہ کا سے نواز کی سے کہ کا سے نواز کی سے کھی سے کہ کو سے کھی سے کہ کی سے کہ کی سے کہ کیں ہو کی کہ کو سے کہ کیا کی کیا گوں کے کہ کیا گوں سے بھی سے کہ کیا گوں کیا گوں کیا گوں کے کہ کیا گوں کو کیا گوں کیا گور کیا گوں کیا گوں کیا گور ک

مردوں اور فورلوں کے بھی اعضاء کی تعلیقوں سے بھی اس کا معنی ہے۔ بھی اوقات اعضائے رئیسہ میں خون کی نیلی رگ بن جاتی ہے جس سے خون نکلنے لگتا ہے۔اس کے لئے کلکیریا فلور کے علاوہ برائیٹا کارب بھی مفید ثابت ہوسکتی ہے۔

کلکیر یا فلوراس بواسیر میں بہت کارآ مدہ جبس کے مسے پھول کر بہت شخت ہو چکے ہوں اور اگر تھا ئیرائیڈ کلینڈ بھی سوج کر پھر کی طرح سخت گلہڑ بن گیا ہوتو وہ بھی کلکیر یا فلور کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ ایک دفعہ ایک مریض کوایسے ہی پھر کی طرح شخت مسوں کے لئے میں نے کلکیر یا فلور 1000 طاقت میں دی۔ ان کا تھا ئیرائیڈ بھی بہت بڑھا ہوا تھا جسے وہ کپڑے سے ڈھانپ کرر کھتے تھے اور جھے اس کاعلم نہیں تھا۔ آئہیں شدید بخار ہوگیا لیکن وہ بہت بہا در آ دمی تھے۔ سمجھ گئے کہ دوا کا اثر ظاہر ہوا ہے۔ کسی اور علاج کی طرف راغب نہ ہوئے۔ ایک ہفتہ کے اندرا ندر بخار اتر گیا اور بواسیر کے پھر یلے مسے کے علاوہ گلہڑ بھی غائب ہوگیا۔ اس کی صرف تھیلی سی باقی رہ گئی۔ وہ بھی آ ہستہ آ ہستہ سکڑ کر چھوٹی ہوگئی۔ اسی طرح ایک نوے سالہ بزرگ مریض کو موتیا کے لئے کلکیر یا فلور اور زنم سلف ہوگئی۔ اسی طرح ایک نوے سالہ بزرگ مریض کو موتیا کے لئے کلکیر یا فلور اور زنم سلف اونچی طافت یعنی CM میں استعال کروائی۔ اللہ کے فضل سے ان کی آ نکھ شیشے اونچی طافت یعنی C کا کین استعال کروائی۔ اللہ کے فضل سے ان کی آ نکھ شیشے

کی طرح صاف ہوگئی اور وفات تک انہیں موتیا کی تکلیف دوبارہ نہیں ہوئی ورنہ اتنی زیادہ عمر میں اپریشن بھی ناممکن تھا۔موتیا کے سلسلہ میں بیہ بات یا در کھیں کہ کلکیر یا فلور کا لے موتیے میں مفید نہیں ہے کیونکہ اس کی وجو ہات بالکل اور ہوتی ہیں۔

کلکیر یا فلور میں متلی اور قے کی علامت بھی ملتی ہے خصوصاً بچوں کو غیر ہضم شدہ غذا کی قے آتی ہے۔ جو بچے پڑھائی کا بہت ہو جھ محسوس کرتے ہیں اور ذہنی تھا وٹ کا شکار ہو جاتے ہیں وہ عموماً کھانے کے بعد متلی اور قے کا ربحان رکھتے ہیں۔ وجع المفاصل کی تکلیف کے ساتھ اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔ بواسیر کے ساتھ کمر اور پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ کمر کا درد حرکت سے اس میں کمی آجاتی ہے۔ کمر کا درد حرکت سے اس میں کمی آجاتی ہے۔ بچوں کی ریڑھ کی ہڈی میں سوزش کی وجہ سے ران کی ہڈی بھی بڑھ جاتی ہے جو بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ پیٹھ کے نچلے حصہ میں درداور گردن کے غدودا کڑے ہوئے ہوں۔ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ پیٹھ کے نچلے حصہ میں درداور گردن کے غدودا کڑے ہوئے ہوں۔ انگلیوں کے جوڑوں پر گافتیں اور سوزش اور گھٹنوں اور ٹائلوں میں اچپا نگ شد بید درد مشروع ہوجا تا ہے۔ پاؤں پر سخت بد بودار پسینہ آتا ہے۔ ہاتھوں، بازوؤں، ٹائلوں اور کمر

کلکیر یا فلور میں مختلف جگہ جلد بہت نمایاں سفید ہو جاتی ہے۔ اپریشن کے بعد سلے ہوئے زخموں کے اردگر د جلد سکڑ جاتی ہے، زخموں میں پبیپ بنتی ہے اور کنارے سخت ہوکرا بھر جاتے ہیں۔

کلکیر یا فلورعموماً آہستہ اثر کرنے والی دوا ہے اس لئے مسلسل کچھ عرصہ تک وقفوں وقفوں کے ساتھ استعال کرنا چاہئے۔ جب نتائج ظاہر ہونے لگیں تو بلا وجہ بار بار دہرانے سے احتراز لازم ہے۔ بسااوقات اونچی طاقت میں زیادہ بہتر کام کرتی ہے۔ اس کی تکیفیں موسم کی تبدیلی ، آرام اور مرطوب موسم میں بڑھ جاتی ہیں، گرمی پہنچانے اور عکور سے افاقہ ہوتا ہے۔

طاقت: بائيوكيمك 6x يا بوميو پيتھك 30 سے ي - ايم (CM) تك

49

كككيريا آيوڈائيڑ

CALCAREA IODIDE

(Iodide of Lime)

کلکیر یا آ یوڈائیڈ خاص طور پر غدودوں سے تعلق رکھنے والی دوا ہے۔غدودسوج کر موٹے ہوجاتے ہیں۔ یہ علامت کئی دواؤں میں پائی جاتی ہے۔ جب لڑکیاں بلوغت کی عمر کو پہنچیں اور ان کے گلے کے غدود (Thyroid Glands) پھول جا کیں تو اس وقت کلکیر یا آ یوڈائیڈ کوفراموش نہیں کرنا چا ہئے۔کلکیر یا کا خصوصیت سے اس دور سے تعلق ہے۔ الی بچوں کو بلاتا خیر یہ دواد پنی چا ہئے۔

کلکیریا آیوڈائیڈ میں رحم کی رسولیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ عام طور پر بچوں اور بعض دفعہ بڑوں میں ناک اور کان کی اندرونی حجلیاں بچول جاتی ہیں اور چھوٹی حجوٹی تھیلیاں ہی دفعہ بڑوں میں ناک اور کان کی اندرونی حجلیاں بچول جاتی ہیں اور چھوٹی حجوٹی تھیلیاں ہی میں ایسی علامتیں بیدا ہوں تو مریض بہت خرائے لینے لگتا ہے۔ ایسی صورت میں کلکیریا آیوڈ ائیڈ بہت کار آمد بتائی جاتی ہے لیکن 30 طاقت میں اسے دو تین ماہ تک استعمال کرنا چاہئے۔ غدود موٹے ہوجا ئیں توایک دم چھوٹے نہیں ہوسکتے۔

کلکیریا آبوڈ ائیڈ کے زخموں میں مزمن ہونے کار جھان پایاجا تا ہے۔ کالی آبوڈ ائیڈ میں میر بھان اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں زخم آ کر تھم جانے ہیں۔

کلکیریا آیوڈ ائیڈ میں بال گرنے کا مرض بھی ملتا ہے۔ بال گرنے سے رو کئے کے لئے کوئی ایسی دوانہیں ہے جو بالعموم ککسالی کے نسخے کے طور پر استعمال کی جاسکے۔

ایک ضروری بات یا در کھیں کہ عموماً کلکیریا کے بعد سلفر نہیں دی جاتی کیونکہ اس سے نقصان پہنچتا ہے لیکن کلکیریا آیوڈائیڈ کے بعد سلفر آیوڈائیڈ بہترین کام کرتی ہے۔ چے میں کوئی دوسری دواداخل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی عموماً کلکیر یا کے بعد لائیکو پوڈیم دے کر سلفردیتے ہیں پھرکلکیر یا آلیوڈ ائیڈ کے بعد سلفرآ لوڈ ائیڈ کی ضرورت پیش آتی ہے جو بعد مطفرت دی جاسکتی ہے۔ کلکیر یا آلوڈ ائیڈ سے مریض کی حالت کچھ بھلتی ہے کیکن مکمل شفا نہیں ہوتی اس کے لئے سلفرآ لوڈ ائیڈ دینا ضروری ہے۔

طاقت: 30 ياحسب ضرورت اونچي طاقت ميں

50

كلكيريا فاس

CALCAREA PHOSPHORICA

کلکیریا فاس کیلیسم اور فاسفورس کا مرکب ہے اور اس پہلو سے بہت گہری دوا ہے،اس سے زیادہ تربائیو کیمک طریقہ علاج میں استفادہ کیا گیا ہے۔لیکن وہاں بھی اس کا استعال مزید توجہ کامختاج ہے۔کلکیریا فاس میں بیہ بات یا در کھنے کے لاگق ہے کہ بیغورتوں کی بہترین دوست دوا ہے اور اس کی بہت سی علامتیں الیسی ہیں جو عورتوں کی روز مرہ بیاریوں میں ملتی ہیں۔ان میں کلکیریا فاس کو ہمیشہ یا در کھنا چاہئے۔جب بچیوں میں بلوغت کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو کئی قسم کی تکلیف فاس کو ہموجاتی ہیں۔ چیش کے ایام بہت تکلیف دہ ہوں،خون زیادہ آئے یا ایام میں بوتو کلکیریا فاس کی ضرورت پڑتی ہے۔اگر اس ابتدائی دور میں سردی لگنے کی وجہ سے میں کمی بیشی ہوتو کلکیریا فاس کی ضرورت پڑتی ہے۔اگر اس ابتدائی دور میں سردی لگنے کی وجہ سے ایام میں بے قاعد گی بیدا ہو جائے تو ساری عمر کا روگ لگ جاتا ہے اور اس وقت تک پیچھا نہیں ایام میں بے قاعد گی بیدا ہو جائے تو ساری عمر کا روگ لگ جاتا ہے اور اس وقت تک پیچھا نہیں جھوڑ تا جب تک کلکیریا فاس استعال نہ کی جائے۔

حیض کے ایام میں پیدا ہونے والی ہر بے قاعدگی کو فوراً وقتی طور پر پیدا ہونے والی علامتوں سے پہچانا بہت مشکل ہے جب تک بیاری کے پور بے پس منظر سے واقفیت نہ ہو۔اگر بڑی عمر میں جاکرالی تکلیفیں ظاہر ہوں تو علاج کرتے ہوئے عموماً خیال نہیں آتا کہ بچپن میں کیا بدا حتیاطی ہوئی تھی۔اس لئے ضروری ہے کہ بیارخوا تین سے ان کے آغاز جوانی میں واقع ہونے والے اندرونی عوارض کی تفصیل پوچھی جائے اور پتہ کیا جائے کہ بیاری کا آغاز کب اور کسے ہوا تھا؟ اگر حیض کے ایام میں سردی لگ جائے اور حیض کی بے قاعدگی شروع ہو جائے تو کلکیریا فاس کو فوراً استعال کروانا چاہئے۔اس کے استعال کے بعد یہ تکلیفیں خدا کے فضل سے دوبارہ نہیں ہوں گی۔

کلکیریا فاس اور سیمی می فیوجامیں بیعلامت مشترک ہے کہ حیض کے آغاز میں رخم میں اینٹھن ، در داور شنج ہوتا ہے لیکن ایک بیچان ایسی ہے جو دونوں کو ایک دوسر ہے ہے متاز کر دیتی ہے وہ یہ کہ سیمی می فیوجامیں جوں جوں خون کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے تکلیف بڑھتی ہے جبکہ کلکیریا فاس میں خون شروع ہونے سے پہلے در دیں شروع ہوجاتی ہیں اور بہت تکلیف دہ تشنجی دور سے پڑتے ہیں اور بہت تکلیف کے تشنجی دور سے پڑتے ہیں اور سخت تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن جبخون جاری ہوجائے تو آ رام محسوس ہوتا ہے اور دوران حیض کوئی تکلیف محسوس ہوتی ۔ کلکیریا فاس کی بیعلامت اسے دوسری دواؤں سے متاز کرتی ہے۔

عام طور پرمیگنیشیافاس ششنج کی بہترین دوانمجی جاتی ہے اور صرف رحم میں ہی نہیں بلکہ سارے جسم کے شنج میں کام آسکتی ہے۔اگر شنج کوگر می پہنچانے سے آرام محسوں ہوتو میگنیشیافاس دیں لیکن اگر سردی سے آرام آئے تو بیلا ڈونا، ایپس، سیکیل اور پلسٹیلا بھی اچھی دوائیں ہیں۔ کلکسریافاس کے شنج میں بھی گرمی پہنچانے سے آرام آتا ہے۔

کلکیر یا فاس کے نشنج میں بھی گرمی پہنچانے سے آرام آتا ہے۔

کلکیر یا فاس عور توں کے جنسی اعضاء میں نشنج کی بہترین دوا ہے۔ اگر جنسی خواہشات ضرورت سے زیادہ ہوجائیں جوایک طبعی کیفیت کے نتیجہ میں نہیں بلکہ بیاریوں کے نتیجہ میں بہتر یا فاس کے علاوہ پلاٹیٹا، گریشیولا اور اور کی گئیم (Origanum) کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہیں تو کلکیریا فاس کے علاوہ پلاٹیٹا، گریشیولا اور اور کی گئیم یا فاس دینی بھی کام آسکتی ہیں۔ اگر پیشاب کرتے ہوئے رخم باہر آجائے تو فوراً کلکیریا فاس دینی چاہئے۔ کلکیریا فاس میں عموماً کالے رنگ کے خون کے لوٹھڑے آتے ہیں جب کہ کلکیریا کارب اور فاسفورس میں خون کارنگ سرخ ہوتا ہے۔

حیض عموماً وقت سے پہلے جاری ہو جاتا ہے۔ اگر جلدی خون شروع ہو جائے تو وہ سرخ ہوگالیکن اگر در ہوجائے تو خون سیاہی مائل ہوجاتا سے کلکیر یافاس میں لیکوریاا فڈے کی سفیدی کی طرح ہوتا ہے۔ شبح کے وقت علامات شدت اختیار کرلیتی ہیں۔ دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ کین ہوجا تا ہے اور بچددودھ پینے سے انکار کردیتا ہے۔ کلکیر یافاس کا مریض بے ساختہ آہیں بھرنے لگتا ہے۔ سینہ دکھتا ہے۔ دم گھٹے والا کھائسی کلکیر یافاس کا مریض بے ساختہ آہیں بھرنے لگتا ہے۔ سینہ دکھتا ہے۔ دم گھٹے والا کھائسی

شروع ہوجاتی ہے۔ لیٹنے سے آ رام محسوس ہوتا ہے۔ آ واز بیٹھ جاتی ہے۔ بائیں پھیچھڑ ہے کے نکیے حصہ میں درد ہوتا ہے۔ ہوا لگنے یا خنکی سے جوڑوں کا درد شروع ہوجاتا ہے۔خصوصاً کمراور گردن میں اکڑاؤ پیدا ہوجاتا ہے۔ سر بوجھل محسوس ہوتا ہے اوراعضاء سن ہوجاتے ہیں۔ سردی یا موسم کی تبدیلی سے بیاریوں میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تھ کاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد دردیں شروع ہوجاتی ہیں۔ پچھ کھا پی لینے سے تکلیف میں افاقہ ہوتا ہے۔ گرمی اور خشک موسم میں بیاری کم ہوجاتی ہیں۔ پچھ کھا پی لینے سے تکلیف میں افاقہ ہوتا ہے۔ گرمی اور خشک موسم میں بیاری کم ہوجاتی ہے۔

کسی صدمہ کے اثر سے یا دداشت میں فرق پڑجا تا ہے۔ مریض کہیں اور جانے کی خواہش کرتا ہے تا تکلیف میں کمی ہو۔ کلکیریا فاس میں سردرد بہت شدید ہوتا ہے۔ سرگرم محسوس ہوتا ہے اور بالوں کی جڑوں میں دردہوتا ہے۔ گلے کے غدودسوج جاتے ہیں اور منہ کھو لئے سے دردہوتا ہے۔ بچہ کے دانت نکا لئے کے زمانے کی تکلیفوں کے لئے بھی یہ مفید ہے۔ اس میں دانت بہت آ ہتہ بڑھتے ہیں اور کیڑا لگنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ بچوں میں ایک علامت یہ ہے کہ وہ سارا وقت دودھ بینا چاہتے ہیں اور پھر الٹی کر دیتے ہیں۔ بیٹ میں شدید درد ہوتا ہے اور مروڑ اٹھتے ہیں۔ سخت اجابت کے بعدخون بھی آنے لگتا ہے۔ بچلوں کا جوس پینے سے اسہال جاری ہوجاتے ہیں جوسزی مائل ہوتے ہیں۔ بیشاب بہت آ تا ہے جس کے ساتھ کمزوری ہوجاتی ہے۔ گردوں کے مقام پر دردہوتا ہے۔ اگر بوجھ اٹھایا جائے وکم میں دردہوتا ہے۔ اگر بوجھ اٹھایا جائے تو کم میں دردہوتا ہے۔ اگر بوجھ

مددگاردوائیں: روٹا۔ ہیپرسلف طاقت: بائیوکیمک 6x میں ہومیو پیتھک 30 سے ہی۔ ایم (CM) تک

51

كلكير بإسلف

CALCAREA SULPHURICA

(Sulphate of Lime-Plaster of Paris)

کلکیر یا سلف اور کار بونیم سلف میں سلفر کا عضر مشترک ہے اور سلفر کی بہت ہی علامات بھی ، لیکن کاربن کی بجائے کلکیر یا کا عضر شامل ہونے کی وجہ سے دونوں دوا کیں الگ الگ مزاح رکھتی ہیں۔ کلکیر یا سلف کی ایک خاص علامت گرے Abscess یعنی بچھوڑ سے پیدا ہونے کا رجحان ہے۔ اس لحاظ سے بیسلفراور کلکیر یا کارب دونوں سے ملتی ہے اور یا ئیروجینم سے بھی اس کی مشابہت ہے۔ یا ئیروجینم (Pyrogenium) متعفن بچھوڑ وں میں اس صورت میں کام آتی ہے جب خون میں تعفن بچیل جائے۔ سلیشیا کے بچھوڑ وں میں بھی تعفن ہوتا ہے لیکن اس میں عموماً خون میں تعفن نہیں ہوتا ، جب ہوتو بہت شخت ہوتا ہے۔ گند ہے خون کے نتیجہ میں جو بچھوڑ نے نکلتے ہیں ان میں یا ئیروجینم کے علاوہ کلکیر یا سلف مفید ہے۔ اسی طرح کینسر کا رجحان رکھنے والے بچھوڑ وں سے بھی اس کا گہراتعلق ہے اور بچھونہ بچھوا کدہ ضرور پہنچاتی ہے۔ وہ کینسر کے زخم جوجلد پر ظاہر ہوکرنا سور بن جاتے ہیں اور رسنے لگتے ہیں ان میں بھی مفید ہے۔

کلکیریاسلف مرگی کی بہترین دوا بتائی جاتی ہے۔اس زمانہ میں مرگی کی بیاری میں بہت اضافہ ہوگیا ہے۔اس کی گئی وجو ہات ہوسکتی ہیں۔ وضع حمل کے وقت بعض ایسے علاج کئے جاتے ہیں جن کا بچوں کے دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ بعض دواؤں کے بدا ترات کے نتیجہ میں بھی مرگی کے دورے پڑنے گئے ہیں۔ایسے بچوں کے لئے ٹکسالی کے نتخوں کے علاوہ الیں دوائیں ڈھونڈنی جا ہئیں جن سے مرگی کا مکمل علاج ہو سکے۔کلکیریاسلف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے مرگی کا قلع قمع ہوسکتا ہے۔ ڈاکٹر کینٹ جو ہومیو پہتے بنے سے پہلے جاتا ہے کہ اس سے مرگی کا قلع قمع ہوسکتا ہے۔ ڈاکٹر کینٹ جو ہومیو پہتے بنے سے پہلے

بہت چوٹی کے ایلو پیھک ڈاکٹر اور سرجن بھی تھے اور سارے جسمانی نظام کو سمجھتے تھے وہ کلکیر یاسلف کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیمر گی کو جڑوں سے اکھیڑد بی ہے۔ بعض اوقات د ماغ میں ٹیومر کی وجہ سے بھی مرگی کے دورے میں ٹیومر کی وجہ سے بھی مرگی کے دورے میں ٹیومر کی وجہ سے بھی مرگی کے دورے برٹ نیومر کی وجہ سے بھی مرگی کے دورے برٹ نی نیوم کی موق ہوتی ہے کہ درکھتے ہی برٹ نی نیوم کی کا مریض ہوتا ہے جس کا پیتہ چل جاتا ہے کہ بیمرگی کا مریض ہوتا ہے جس کا جڑسے اکھیڑا جانا بظاہر ناممکن ہے۔ کینٹ کا بیفقرہ کہ کلکیریا سلف مرگی کا علاج ہے، ایسے پیدائش مریک طور پر بھوں کو مریضوں کو مریضوں کو کلکیریا سلف نے غیر معمولی فائدہ دیا ہے۔

اگر بچپن میں کوئی ایسی بیاری لاخق ہوجس کے نتیجہ میں مرگی کے دورے پڑنے لگیں تو الیہ مرگی کا علاج ممکن ہے۔ ان بیار یوں میں ہیضہ اور پیچش بہت نمایاں ہیں۔ اگر زہر یلے دست اور خطرنا کہ پیچش ہواور ڈاکٹر کوئی دوادے کراس کوزبردتی ٹھیک کردیں تواس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ ایسے بیچ کومرگی ہوجائے۔ میں ایسے مریضوں کو کیو پرم دیتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ آرٹی میسیا (Artemisia) مرٹیکر بھی دی ہے۔ وقتی فائدہ تو ضرور ہوتا ہے لیکن ان کے ذریعہ کمل شفا نہیں دیکھی۔ یہ دوروں میں بھی دے کردیھی ہیں۔ دوروں نہیں دیکھی ۔ یہ دوائیں مستقل دینی پڑتی ہے۔ اونچی طاقت میں بھی دے کردیھی ہیں۔ دوروں میں لمباوقفہ تو ضرور پڑ جاتا ہے لیکن مکمل شفانہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بعض اور میں تلاش کرنی چا ہمیں جومرگی کومستقلاً جڑ سے اکھیڑ دیں۔ کینٹ کے نزدیک کلکیریا سلف یہ طاقت رکھتی ہے۔

میرے مشاہدہ میں مرگی سے کممل شفائحض اس صورت میں ہوئی ہے کہ وہ بیاری عود کر آئی جس کو دبارہ ظاہر ہونے پر بعض آئی جس کو دبارہ ظاہر ہونے پر بعض مددگار دوائیں دی جاسکتی ہیں مثلاً بخار کے لئے آرسنک وغیرہ اور پبیٹ کا شنج دور کرنے کے لئے میگ فاس وغیرہ کیا نیٹی بائیوٹک اور بہت طاقتور دوائیں جو بیاری کو دبا دیں ، ان سے احتر از لازم ہے۔

مرگی کا علاج کرتے ہوئے بیدد میصنا جاہئے کہ" اورا" (Aura) کہاں سے شروع ہوا ہے۔اس ____ کی تفصیل کے لئے دیکھیں کلکیریا آرس۔بعض مریضوں میں جہاں خون کار جمان چہرہ اور سر کی طرف ہو،عموماً بیلا ڈونا کی طرف خیال جاتا ہے لیکن بیلا ڈونا اس میں علاج نہیں ہے، کچھ تھوڑا فائدہ دے کر رک جاتی ہے۔ اور بھی کئی دواؤں میں خون کا رجحان سر کی طرف ہوتا ہے مثلاً ہائیڈروسائینک ایسڈ (Hydrocyanic Acid)۔ بیگردن کے اندرسانس کی نالیوں میں تشنج پیدا کرتا ہے اور چہرہ ایک دم تمتمااٹھتا ہے۔خون چہرہ کی طرف ایک دم اکٹھا ہوجا تا ہے۔الیمی صورت میں ہائیڈروسائینک ایسڈ بھی مرگی کی دواؤں میں ایک نمایاں دوابن جاتی ہے۔اس کے علاوہ ہائیڈروفویینم (Hydrophobinum) کا بھی اس بیاری سے تعلق ہے۔اس میں چبکدار چیزوں سے مریض کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔اگر جیمکدار چیزیں دیکھنے سے مرگی کادورہ پڑنے کا احتمال ہوتواس صورت میں ہائیڈروفوینم بہت مفید ہے اور بیالی دواہے جسے ہائیڈروسائینک ایسٹر سے ملا کربھی دیا جائے توبیا یک دوسرے سے مگراتی نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کی مددگار ہوجاتی ہیں۔ جس مریض کی مرگی ہومیو پیتھک دواؤں سے قابومیں نہ آئے اسے لاز ما ایلو پیتھک طب کی طرف منتقل کر دینا حامیئے ۔ایسی بہت طاقتو رایلو پیتھک دوا ئیں دریافت ہوچکی ہیں جوشنج کو روک دیتی ہیں اور مریض ایک قسم کی دائمی غنودگی میں رہتا ہے لیکن تکلیف سے بچار ہتا ہے اور اس سے زیادہ اس کے لئے کچھ ہونہیں سکتا۔ ایلو بلیتی کےعلاوہ چینی طریقہ علاج بھی آ زمایا جاسکتا ہے۔ کلکیر یا سلف عضلات کے تھیاؤ میں بھی بہت مفید دواہے۔ اگر طاقت سے بڑھ کر بو جھا ٹھالیا جائے تو کمریر بو جھ بڑ جاتا ہے۔ بعض دوسری دواؤں کےعلاوہ کلکیریاسلف بھی اس میں مفید دوا ثابت ہو سکتی ہے لیکن اس کا صرف کمر کے عضلات سے نہیں ِ بلکہ سارےجسم کےعضلات سے تعلق ہے۔ بوجھا ٹھانے سے ٹانگ یا بازو کے پیٹھے گئج جاتے ہیں۔ یہ دوا ایسے سب عضلات پر اچھا اثر دکھاتی ہے جو طاقت سے بڑھ کر بوجھ

اٹھانے سے بیار پڑ جائیں۔

اگر چہرہ پرخون کا دبا و بہت زیادہ ہوجائے اور شد پرشنج پیدا ہواور تشخی رجان صرف چہرہ پر ہی نہیں بلکہ جسم کے مختلف اعضاء میں بھی پایا جائے، چھاتی، بازو، ٹانگ یا سرمیں بھی اچا نک خون کا دبا و اور جکڑنے کا احساس ہوتو کلکیر یا سلف بھی علامتیں ملنے پر بہت موثر ثابت ہوسکتی ہے۔ ہڈیوں کی دردوں میں بھی مفید ہے۔ گلینڈز کی سوزش اور عضلات کے بھڑ کنے لگیں۔ کمزور پھڑ کنے میں بھی کلکیر یا سلف کام آتی ہے خصوصاً اگر چہرے کے اعصاب پھڑ کنے لگیں۔ کمزور اعصاب کے مریضوں میں ذہنی دباؤ ہواور عضلات ذہنی دباؤ کی وجہ سے پھڑ کنے لگیں تو اس مرض میں کلکیر یا سلف کے علاوہ ایگیر کیس اور کالی فاس بھی مفید ہیں۔ مریض کی تکلیف کھڑے ہونے سے بڑھتی ہے۔ بعض دفعہ وہ عور تیں جو کھڑے ہوکر کھانا وغیرہ بناتی ہیں ان میں بہ عونے سے بڑھتی ہے۔ بعض دفعہ وہ عور تیں جو کھڑے ہوکر کھانا وغیرہ بناتی ہیں ان میں بہ علامت نمایاں طور پر یائی جاتی ہے۔

کلکیر یاسلف میں شروع میں تو چلنے سے مریض کو آرام آتا ہے کین چلنے کے بعد جب خون گردش میں آتا ہے اورٹا نگلیں گرم ہوجاتی ہیں تواس کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔

کلکیر یا سلف کا مریض عموماً اندینوں کی حالت میں صبح آ نکھ کھولتا ہے۔ یہ علامت کلکیر یا سلف کی دوسری علامتوں کے ساتھ مل کراسے یقنی بنادیتی ہے۔ ذہنی محنت سے دماغ جلد تھک جائے یا چکر آنے لگیں اور چکر کے ساتھ مرگی سے مشابہ دورے پڑنے لگیں تو بھی کلکیریا سلف مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔

آئکھوں کی بیاریوں میں اگر چیزیں دودونظر آنے لگیں اورروشی آئھوں میں چھے تواس دوا
کویادر کھیں۔ بردی عمر میں کانوں میں ہر طرح کی آوازیں آنے لگیں تو بھی یہ دوا مفید ہے۔
کلکیر یا سلف میں مستقل جاری نزلہ ہوتا ہے جو آ کر ٹھہر ہی جاتا ہے اور اندرونی جھلیوں کو گلا دیتا ہے۔ ایسے مستقل نزلاتی مریض بہت تکلیف دہ زندگی گزارتے ہیں۔ اگر دیگر علامتیں ملتی ہوں تواس بیاری کے لئے یہ تیر بہدف دوا ثابت ہوتی ہے۔
کلکیر یا سلف زبان کے کھیا و اور سختی کے لئے بھی مفید ہے یعنی یہ فالجی کیفیت پر

اثر انداز ہوتی ہے اور اس میں اچا تک تشنج کی علامت پائی جاتی ہے اور دم گھٹتا ہے۔ اس قسم کی گھٹن کا مزاج ہیپر سلف میں بھی ملتا ہے۔ سانس کی نالی میں گھٹن اور تنگی کا احساس اور نزلہ کے بعد مستقل خراش باقی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے معمولی ہوا اندر جانے سے یا بولنے سے بھی سانس گھٹتا ہے۔

اگرتشخیص درست ہوتو کلکیریاسلف گردے کی پرانی سوزش میں بھی مفیدہے۔ کلکیریاسلف میں کسی ایک جگہ گرمی محسوس نہیں ہوتی بلکہ سارے جسم کو گرم کپڑا اوڑ ھنے سے اور بستر کی گرمی سے گھبرا ہے ہوتی ہے۔

کلکیر یا سلف جس کی مزاجی دوا ہوگی اس کے دے اور کان کی تکلیفوں میں بھی فائدہ دے گی۔اسی طرح جس شخص کی بیمزاجی دوا ہواس کے ملیریا کے قلع قبع کے لئے بھی یہ بہت کافی ہے۔اس تعلق میں اس کی صرف بی علامت بیان کی گئی ہے کہ بخار کے آغاز میں سردی پاؤں سے شروع ہوتی ہے۔لیکن بہت سی دوسری دواؤں میں بھی یہی علامت پائی جاتی ہے۔ اس لئے صرف اسی علامت سے کلکیریا سلف کی شناخت نہیں ہوسکتی۔ علامت کی تمیز کرنے کے لئے دیگر علامتوں کو بھی دکھنا ہوگا۔

 سکون بسااوقات اس کے پریشان خوابوں سے بھر جاتا ہے۔اس دوا کی چندخورا کوں ہی سے وہ پریشانی خواب وخیال ہوجاتی ہےاور مریض کی نیند گہری اور پرسکون ہوجاتی ہے۔

طاقت: 30 سے یں۔ایم (CM) تک

كيانارولا 215

52

كبلنثرولا

CALENDULA OFFICINALIS

(Marigold)

کیانڈولا کے لوش کو عام طور پر زخمول کے علاجے کے لئے ہیرونی طور پر استعال کیا جاتا ہے۔ مگراندرونی طور پر بھی بید دوا ہومیو پیتھک پڑینسی میں کھلانے سے زخمول کے بھرنے میں بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔ پر انے زخم جو مندل ہونے کا نام نہ لیں ان میں اند مال کا رجحان بیدا کرنے میں کیلنڈ ولا 200 کطافت میں بہت مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ جن زخموں میں ہیرونی طور پر لوشن کے استعال سے فائدہ نہیں ہوتا ، بیان کو بھی خشک کردیتی ہے۔ کیلنڈ ولا اور ہیپر سلف یاسلیشیا میں یہ بیادی فرق ہے کہ کیلنڈ ولا اور ہیپر سلف یاسلیشیا میں یہ بیار کرتی ہے جبکہ ہیپر سلف اور سلیشیا انفیکشن کا مقابلہ کرتی مرمت کے لئے جسمانی صلاحیت کو بیدار کرتی ہے جبکہ ہیپر سلف اور سلیشیا انفیکشن کا مقابلہ کرتی ہیں۔ ایسے مریض جن کے اپریشن ہوئے ہوں اور ان کے زخم مندل نہ ہوتے ہوں ان کے لئے کیانڈ ولا بہت مفید ہے بشر طیکہ ریڈی ایشن (Rediation) کے ذریعہ زخم کے اردگر دیے خلیوں کو ضائع نہ کردیا گیا ہو۔مقامی طور پر زخموں پر خالص شہد لگانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور شہد میں کھی بڑھ کرشفا کا اثر ماتا ہے۔

ہر قتم کے بیڈر سور (Bed Sores) کے لئے عموماً آرنیکا اور ہائی پیریم (Hypericum) استعال کئے جاتے ہیں لیکن اگر بیدونوں دوائیں کام نہ کریں تو کیلنڈولا دوسوطا قت میں دینے سے کچھ فائدہ ضرور ہوگا۔ کمل شفا بھی ہوسکتی ہے۔ دانت نکلنے کے بعد خون بند نہ ہوتو کیلنڈولا اس میں بھی مفید ہے۔ مرطوب اور ابر آلودموسم میں اس کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ كيانڈولا كيانڈولا

مددگاردوائیں: بہیر سلف دافع اثر دوائیں: چیلی ڈونیم طافت: Q تا 2000 كيم فر 217

53

كيمفر

CAMPHORA

(Camphor)

کیمفر یعنی کا فور کی سب سے نمایاں علامت سے ہے کہ اس کے مریض میں بیاری کے دوران جسم کی بیرونی سطح بالکل ٹھنڈی ہوجاتی ہے لیکن اندرونی طور پر مریض کو بہت گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ بے حد نقابت اور کمزوری محسوں ہوتی ہے۔ تشنجی کیفیات بھی بہت نمایاں ہیں۔ اگرجسم بالکل ٹھنڈا ہواورتشنج کی کیفیت یائی جائے تو کوئ<mark>ی بھی بیاری ہواس میں کیمفر مفید ہوگ۔</mark> ہیضہ میں بھی بہت مؤثر دواہے خصوصاً گم ہیضہ جس میں بغیر درد کے دست ہوتے ہیں یا دست ہوتے ہی نہیں لیکن میکرم توانا کی ختم ہو کر ساراجسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔اس میں کیمفر چھوٹی طاقت میں دینے سے غیرمعمولی فائدہ پہنچا ہے۔اگر ہیضہ کی حالت میں معدہ اور ہاتھ یاؤں میں تشنج نمایاں ہوتو کیویرم دواہے لیکن کشنج کے ساتھ اعضاء برف کی طرح ٹھنڈے ہوجا ئیں اور تھنڈالیپینہآئے توبیہ کیمفر کی خاص علامت ہے۔ کیمفر کے ہیضہ میں مثلی بھی نمایاں ہوتی ہے۔ کیمفر میں شدیدخوف اور اندیشے بھی یائے جاتے ہیں۔اس پہلوسے بیا یکونائٹ سے مشابہ ہے سوائے اس کے کہا یکونائٹ میں ایسی سردی نہیں ہوتی جو کیمفر کا طروُ امتیاز ہے۔اگرا یکونائٹ کی طرح ا جا نک بیاری شروع ہواوراس میں خوف غالب ہواور تشنج بھی یا یا جائے کیکن مریض بہت ٹھنڈا ہو توا يكونائك كى بجائے كيمفر دواہوگى _اگر بيارى ميں شدت، تپش اور تيزى يائى جائے توا يكونائك

کیمفر کاکینتھرس(Cantharies) ہے بھی ایک تعلق ہے اور کینتھرس کے اثر کوزائل بھی کرتا ہے۔ کینتھرس میں گردوں کی جھلیاں متورم ہو جاتی ہیں اور پیپیٹاب کی نالی میں جلن كيم فر 218

اورسوزش پیدا ہوجاتی ہے۔قطرہ قطرہ پیشاب بہت جل کرآتا ہے۔ بیعلامتیں ایک حدتک کیمفر میں بین ہواتی ہیں۔ بعض اوقات کینتھرس کا زہر دینے سے گردوں میں مستقل سوزش کھہر جاتی ہے جومریض کواعصا بی کھاظ سے بھی متاثر کرتا ہے، ایسی صورت میں کیمفر اس اثر کوزائل کرتی ہے اور بیصرف عارضی دوانہیں بلکہ مستقل طور پر بھی بعض بیاریوں کے بداثر ات مٹانے کے لئے مفید ہے۔

کیمفر کامریض ذہنی کھاظ سے بہت کمزور ہوجا تا ہے۔ حافظہ جواب دے دیتا ہے،

اکیلے رہنے سے خوف محسوں کرتا ہے، چکر آتے ہیں اور بے ہوشی طاری ہوجاتی ہے۔ آسکے بند کرکے لیٹار ہتا ہے، لگتا ہے کہ سوگیا ہے کین سوتا بھی نہیں۔ دنیا سے بے تعلق سا ہوجا تا ہے۔

اس میں جنون اور شدید غصہ کی علامت بھی پائی جاتی ہے۔ بیہ علامت کینتھرس اور ہائیوسس اس میں جنون اور شدید غصہ کی علامت بھی پائی جاتی ہے۔ سوزش دماغ کی طرف منتقل ہوتی ہے اور مریض دیوانگی اور تشدد پراتر آتا ہے۔

اگر رحم کے انفیکشن کے نتیجہ میں بخار ہوتو پائیر وجینم اور سلفر کے علاوہ کیمفر بھی اچھی دوا ہے۔ اگر جسم ٹھنڈ ا ہوتو کیمفر سے علاج شروع کرنا چاہئے۔ بعض اوقات بخار دب جاتا ہے اور جسم ٹھنڈ ا ہوجاتا ہے۔ اس وقت سلفر کی بجائے کیمفر ضروری ہے۔ جب وہ بخار کو باہر نکال لائے تو سلفراور یا ئیروجینم ملاکردین چاہئے۔

کیمفر میں جسم شعنڈا ہونے کے باوجود پسینہ میں تربتر ہوتا ہے لیکن مریض جسم پر کپڑا اوڑھنابرداشت نہیں کرتا،اندرونی گرمی کے شدیداحساس کی وجہ ہے بعض دفعہ کپڑے بھی اتار پھینگتا ہے۔جسم پر کپڑابرداشت نہ کرنے کی علامت سکیل (Secale Car) میں بھی پائی جاتی ہے۔لیکن فرق ہیہے کہ سکیل کا مریض گرمی محسوس کرتا ہے اوراس کا جسم بھی گرم ہوتا ہے۔ کیمفر کا مریض باوجود شعنڈا ہونے کے کپڑ انہیں لیتا۔ کیمفر کی علامتیں ایکونائٹ کے علاوہ کیمومیلا سے بھی ملتی ہیں۔ کیمومیلا کا مریض غصیلا اور غیر مطمئن ہوتا ہے، کوئی چیز مائگے تو لے کر پرے پھینک ویتا ہے۔اگر ایسے مریض کیمومیلا کا نمایاں مزاج نہ رکھتے ہوں تو پھر کیمفر سے ان کا علاج کیا جا سکتا ہے۔

کیمفر میں گرمی اور سردی کا ادلنا بدلنا بھی پایا جاتا ہے۔ جب جسم تھنڈا ہوتو درمیان میں ایک دم جسم تھوڑی دیر کے لئے گرم بھی ہوجاتا ہے۔ یہ کیفیتیں ادلتی بدلتی رہتی ہیں جس کا مطلب ہے کہ بخار دب کراندرونی اعضاء میں منتقل ہور ہاہے۔ جب بخار دب کراندرویڑ ھی ہڈی میں چلا جائے یاد ماغ میں منتقل ہوجائے تو جسم ٹھنڈا ہوجا تا ہے۔ مگر جسم بار بار بیاری کے خلاف مدافعت کرتا ہے اور اسے دھکیل کر با ہرلانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا جسم بھی ٹھنڈ ااور بھی گرم ہوجاتا ہے۔ الس صورت حال میں کیمفر بہت مفید ہے۔

عورتوں کی ادھیڑعمر میں جب حیض بند ہونے کا وقت آئے تو بسااوقات کئی قسم کی المیفیس شروع ہوجاتی ہیں۔ اس میں دوسری دواؤں تکلیفیس شروع ہوجاتی ہیں۔ چہرے پر گرمی کی لہریں محسوں ہوتی ہیں۔ اس میں دوسری دواؤں کے علاوہ کیمفر کوبھی پیش نظر رکھنا چاہئے۔ایسی عورتیں جو کیمفر سے آرام محسوں کرتی ہیں کپڑاا تار دیں توسخت ٹھنڈمحسوں کرتی ہیں اور کپڑااوڑھیں تو پسینہ سے تربتر ہوجاتی ہیں۔

کیمفر کا سر در د سارے سر میں نہیں ہوتا بلکہ یا تو سر کی پشت پر شروع ہوگایا پیشانی پر۔ وہ سر در دجو سر کے بیچھےاور گردن کے نچلے حصہ میں محدود ہونیز دھڑکن بھی پائی جائے اس کا کیمفر سے علاج ممکن ہے۔

تشنج اور دندل پڑنے (بتیسی بند ہونے) میں کیمفر بطور علاج مشہور ہے۔ بسااوقات کرمی کی شدت سے بااندرونی کمزوریوں کی وجہ سے عورتوں کو دندل پڑجاتے ہیں۔ مندز بردتی کھول کراندر دواڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیمفر کی جیموٹی طاقت کی ہومیو دواسے صرف ہونٹ گیلا کر دیں تو وہ خو داثر دکھائے گی اور یہ کیفیت جاتی رہے گی۔ نشنج اور دندل پڑنے سے ہونٹ نیلے ہو جاتے ہیں۔ صرف ہونٹ ہی نہیں بلکہ زبان بھی نیلی ہوجاتی ہے۔ یہ کیمفر کی خاص علامت ہے۔ کیمفر کی خاص علامت ہے۔ کیمفر کے مریض کی بیاس پانی پینے کو دل جا ہتا ہے۔ گیس کی تکلیفوں میں متلی اور قے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ قے کے بعد معدے میں ہے۔ گیس کی تکلیفوں میں متلی اور قے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ قے کے بعد معدے میں

ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ اگرمتلی اور قے نہ ہوتو جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہوتا ہے، غذا کا ذا کقہ کڑوامحسوں ہوتا ہے۔

کیمفر میں اسہال کی نسبت نے کا زیادہ رجان ہوتا ہے۔ اسہال تھوڑ ۔ تھوڑ ۔ آتے ہیں اورالٹیاں بہت تھوڑ ۔ آتے ہیں اوران کے ساتھ کمزوری اور شنج ضرور ہوتے ہیں۔ اگر اسہال اورالٹیاں بہت زیادہ ہوں اور نشنج بیٹر لیول پر اثر کرے تو وریٹر م البم (Veratrum Album) چوٹی کی دوا ہے۔ دونوں دواؤں میں جسم ٹھنڈ اہوتا ہے لیکن وریٹر م البم میں صرف بیشانی پر ٹھنڈ البینہ آتا ہے۔ وریٹر م البم دوانتہاؤں کے در میان ہے، یا سخت قبض ہوتی ہے یا بہت کھلے اسہال ۔ انتہائی سخت اور ضدی قبض جو ہفتہ ہفتہ چل رہی ہو، اس میں جب کوئی اور دواکام نہ آئے تو وریٹر م البم کی چندخوراکیں اثر دکھاتی ہیں۔

مثانے میں فالجی اثرات نمایاں ہوں اور زورلگا کر پیشاب آئے تو کیمفر مفید
دوا ہے۔ مثانہ پیشاب سے جراہونے کے باوجود پیشاب رک جاتا ہے۔ جملن اور شنج پیدا ہوتا
ہے۔ مثانے کے فالجی اثرات میں کیمفر بہت نمایاں ہے۔ کیمفر کا جنسی اعضاء پر بھی اثر
ظاہر ہوتا ہے۔ اگر بہت زیادہ مقدار میں استعال کیا جائے تو مریض ہمیشہ کے لئے جنسی
طافت سے محروم ہوجاتا ہے۔ بعض اوقات اس کے بالکل برعکس نتیجہ پیدا ہوتا ہے اور غیر
معمولی جوش پیدا ہوجاتا ہے جوصحت کی علامت نہیں ہے۔ جہاں کسی دوا میں اس فتم کی متضاد
علامتیں ملتی ہوں اسے خاص طور پر ذہن میں رکھنا چاہئے تا کہ عین موقع پر وہ دوایا د آجائے۔
علامتیں ملتی ہوں اسے خاص طور پر ذہن میں رکھنا چاہئے تا کہ عین موقع پر وہ دوایا د آجائے۔
کیمفر میں بار بار نزلے اور بلغی کھانسی کا بھی رجان سے اور اس لحاظ سے یہ
بار بار نزلے کو دعوت دیتی ہو، دور کرتی ہیں۔ موسم کی معمولی سی تبدیلی سے فوراً نزلے شروع
ہوجاتا ہے۔ ناک ٹھنڈی ہوتی ہے اور رطوبت بہتی ہے۔ ہوا کی نالیوں میں بلغم سے نے کا
مانسی شروع ہوجاتی ہے اور دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے۔ موالی نالیوں میں بلغم سے نے کا ہے، سانس کھینچنے پر
کھانسی شروع ہوجاتی ہے اور دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے۔

كيمفر 221

کیمفر کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ درد کا احساس درد کی جگہ پر توجہ دینے سے کم موجا تا ہے۔ مریض سر دی اور چھونے سے زود حس ہوتا ہے جس سے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اپریشن کے بعد اگر جسم کا درجہ حرارت بہت زیادہ گرجائے اور خون کے دباؤمیں کمی ہوتو کاربوو تج کے علاوہ کیمفر کی چند خوراکوں سے بھی فوری فائدہ ہوتا ہے۔

کیمفر کے مریض کی آئھیں بے ہوثی کی حالت میں ایک جگہ گڑی ہوئی اور پتلیاں پھیلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اسے تمام اشیاء بہت چمکدار اور بھڑ کیلی نظر آتی ہیں۔ آئکھوں کی تکلیفیں آئکھوں کے سامنے چنگاریاں اور روشنی کے دھیے نظر آتے ہیں۔ آئکھوں کی تکلیفیں سورج کی روشنی میں بڑھ جاتی ہیں۔ چہرہ زرد اور کھنچا ہوا اور زندگی کے احساسات سے عاری معلوم ہوتا ہے۔ ٹھنڈ الپیپنہ بھی آتا ہے جو کینسر کا خاصہ ہے۔

عام طور پر سردی لگنے سے دست شروع ہو جاتے ہیں جوسیا ہی مائل ہوتے ہیں اور بہت کمزوری پیدا کرتے ہیں۔ زبان اور منہ میں ٹھنڈک کا احساس نمایاں مگر ساتھ ہی ایک نہ بجھنے والی پیاس۔

كينترس	مددگاردوا: دافع اثر دوائیں: طاقت:
فاسفورس په او پیم	دافع اثر دوائيں:
30 تک	طاقت:

54 کینیس انڈیکا

CANNABIS INDICA

کینیس انڈریکا ہندوستانی حشیش یعنی بھنگ کو کہتے ہیں۔ بیکوہ ہمالیہ کی وادیوں اور تبت کی سطح مرتفع پراگتی ہے۔ قدیم زمانہ سے آج تک اسے نشہ کے لئے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ جو لوگ بھنگ کو بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔وہ گوہا آ سانوں کی سیر کرتے ہیں، ان کے لئے وقت کھم جاتا ہے اور ایک لمحہ قبل کی یا تیں بھی صدیوں پرانی معلوم ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جینگی کی زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہومیو پلیتھی میں اس دوا کی جوعلامتیں ظاہر ہوئی ہیں ان میں بھی اڑنے اور فضا میں لہرانے کا احساس بیان کیا جا تا ہے۔ وقت تھہر جا تا ہے،گز رتا ہی نہیں۔اگریپہ کیفیت کسی عام آ دمی کی ہوتو اس کی روزمرہ کی زندگی اجیرن ہوجائے ۔تھوڑا سا کام کرکے بیمحسوں ہوتا ہے کہ میں گھنٹوں سے کام کرر ہاہوں۔احساسات اور جذبات میں مبالغہ کی شدت پیدا ہو جاتی ہے۔سب اعضاء میں جوش ہوتا ہے جس کی وجہ سے بعض دفعہ ہاتھ یا وُل لرزنے لگتے ہیں اور بے حد کمزوری پیدا ہوجاتی ہے۔خون کا دوران دماغ کی طرف نہیں جاتا، چہرہ خون سے بھر جاتا ہے اور آئکھیں بچھرا جاتی ہیں۔اس بیاری کانام Catalepsy ہے۔ کینیس Catalepsy میں بہت مفید ہے۔اس کی کئی علامتیں او پیم سے ملتی جلتی ہیں۔او پیم بھی Catalepsy کی بہترین دواہے۔ کینیس میں جلد کی حسختم ہوجاتی ہے۔مریض خیالات اور نظاروں سے مزے اٹھا تا ہے جبکہ ہائیوسمس اور

بھنگ پینے والے اپنے وجود کو دوحصوں میں تقسیم سمجھتے ہیں۔ ایک ان کی ذاتی شخصیت ہوتی ہے اور دوسری کو وہ آ سانوں میں مقیم سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کے اکثر

نشہ بازوں کو بہت پہنچے ہوئے پیر سمجھا جاتا ہے۔

کینیس کے مریض شجیدہ باتوں پر بھی ہنتے رہتے ہیں۔ نہنسی پر قابوہوتا ہے نہ رونے پر بھی ہنتے ہیں و نہنتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ رجحان پر بھی ہنتے ہیں چلے جاتے ہیں اور روتے ہیں تو روتے ہی چلے جاتے ہیں۔ بیر جحان گہرے مرض کی نشاند ہی کرتا ہے۔ ہنسنا اور رونا دھوپ چھاؤں کی طرح ساتھ ساتھ چلے اور اس میں پاگل بن کی مستقل علامت کی بجائے وقتی نشے کی کیفیت ہوتو یہ کینیس انڈیکا کی علامت ہے۔ نشہ ختم ہونے کے بعد جوعلامتیں پیدا ہوتی ہیں وہ الگ سے جھنی چاہئیں۔ دماغ کونقصان پہنچنے کے نتیجہ میں مریض موت سے بہت خوفز دہ رہتا ہے۔

کینیبس کے مریض کو ہروفت بیخدشہ بھی رہتا ہے کہ وہ پاگل ہوجائے گا۔اندھیرے سے ڈرتا ہے۔ایس کی سوچ میں منطقی ربط نہیں رہتا ہے۔اس کی سوچ میں منطقی ربط نہیں رہتا۔ بھنگ کے عادی لوگ عام طور پر بات کرتے ہوئے فقرہ کممل نہیں کرتے۔جولوگ نشہ کے بغیر ہی ایسار جمان رکھتے ہوں۔ان کو کینیبس کے استعال سے فائدہ ہوسکتا ہے۔

ہومیو پیچے معالجوں نے پروونگ (Proving) کے دوران یہ تجربہ کیا ہے کہ کینیس کے مریض میں خیالات کا بچوم اتنا زیادہ ہوجاتا ہے کہ ان کے بیان کی کوشش میں مریض بے ربط جملے ہو لئے لگتا ہے۔خیالات برا پیختہ ہوجاتے ہیں۔ دماغ میں صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ خیالات اور تصورات بھی نامکمل ہوتے ہیں۔ اچھی بھلی بات کرتے کرتے بغیر دلیل اور بغیر منطق کے پچھاور ہولئے لگتے ہیں کیونکہ اچا تک ایک نیا خیال ذہمن میں آجاتا ہے۔ اس سے وہ بہت پر جوش ہوجاتے ہیں اور پھراسی کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تصور کی دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ موسیقی سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بھی جذبات میں جوش اور انتشار بھی پایا جاتا ہے۔ کینیس کے مریض کے سرمیں لہریں مارتے ہوئے درد کا احساس ہوتا ہے ۔ کنیٹیوں میں بھی جس کے ساتھ دھڑ کن بھی سائی جاتی ہے، گدی میں ہو جھے محسوس ہوتا ہے ، کنیٹیوں میں بھی دھڑ کن کا حساس ہوتا ہے ۔ کنیٹیوں میں بھی

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ایک شخص کے زہنی خیالات دوسرے کے زہن کی طرف منتقل ہوسکتے ہیں۔ دور کی جگہ پررکھی ہوئی چیزیں ایک چھٹی حس کے ذریعیہ معلوم ہوجاتی ہیں۔ دنیا کے بعض مؤ قر سائنس دانوں نے اپنے تجربات سے بذریعیہ حقیق بیثا ہے کہ میمض وہم نہیں بلکہ انسان کے اندرایک دبا ہوا ملکہ ہے۔ اگر کسی نفسیاتی بیاری کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتو کینیس استعال کرنی جا ہے۔

کینیس کا مریض نیند میں دانت کٹکٹاتا ہے۔ بولتے ہوئے ہکلاتا ہے۔ پانی پینے سے تو نہیں گھبراتا مگر پانی سے ہاتھ پاؤں دھونے اور نہانے سے گھبراتا ہے۔ پیٹ میں بہت ہوابنتی ہے۔سارے پیٹ میں سخت تناؤ ہوتا ہے۔

کینیس کے مریض کو بکٹرت پیشاب آتا ہے اور بیطامت اسے اوپیم سے ممتاز
کرتی ہے۔ اوپیم میں پیشاب رک جاتا ہے اور خشکی پائی جاتی ہے۔ تمام اخراجات خشک ہو
جاتے ہیں۔ کینیس میں گردوں کی بیاریاں بھی ہوتی ہیں۔ باربار پیشاب آتا ہے لیکن ہر دفعہ
پیشاب آنے کے لئے کچھا نظار کرنا پڑتا ہے اور پیشاب ختم بھی آہ ستہ آہ ستہ ہوتا ہے۔ پیشاب
کی نالی میں جلن اور ہلکے درد کی شکایت بھی ہوتی ہے۔ کینیس سٹائیوا میں بھی بیعلامت ملتی ہے
لیکن کینیس انڈیکا کے مقابل پر بہت زیادہ۔ اس لئے سوزاک کی دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا
ہے۔ سوزاک کے بعض مریضوں کو اس کی CM میں ایک ہی خوراک دینے سے شفا ہو جاتی
ہے۔ بید بے ہوئے سوزاک کو ابھار نے اور پھرٹھیک کرنے میں بھی بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔
اس مرض کے ازالے کے لئے مرک کا ربھی CM طاقت میں مفید بتائی جاتی ہے۔

کینیس انڈیکا میں حیض دب جاتا ہے اور حمل ضائع ہونے کا رجحان بھی ہوتا ہے۔ جنسی جوش اور تحر کیک پائی جاتی ہے۔ دل کی تکلیف رات کو زیادہ محسوں ہوتی ہے۔ دباؤ اور سانس گھٹے کا احساس ساری رات رہتا ہے جو دن میں چلنے پھرنے سے ٹھیک ہوجا تا ہے۔ درات ہوتے ہی تکلیف دوبارہ شروع ہوجاتی ہے۔ کمر کے عضلات کی کمزوری کی وجہ سے کئی لوگ کبڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر شروع میں علامات پید اہوتے ہی

بیددوادی جائے تو فائدہ کا امکان ہے ورنہ یہ بیاری بڑھ جانے کے بعد کوئی دوا فائدہ نہیں دیتی۔
وقت سے پہلے کبڑے پن کے رجحان کوختم کرنے کے لئے کینیس انڈ یکا مفید ثابت ہوسکتی
ہے۔ نیچادھڑ میں خصوصاً چلتے ہوئے ٹانگوں میں دردیں ہوں تو کینیس انڈ یکاسے فائدہ ہوگا۔
بازوؤں اور ہاتھوں میں کیکیا ہے ہوتی ہے جو نیچا دھڑ تک جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ٹانگوں
میں فالجی کیفیت بھی پائی جاتی ہے۔ کینیس انڈ یکا کی پہچان کرنے والی ایک علامت سے کہ مریض کونیند آتی ہے کیکن وہ سونہیں سکتا۔

کینیس انڈ ریکا میں جلد کسی ہوئی اور تن ہوئی ہوتی ہے۔ بیا مت او پیم میں بھی پائی جاتی ہے۔

ہوں ہ کینیس کی تکلیفیں صبح کے وقت ، دائیں لیٹنے اور تمبا کو وغیر ہشم کے نشوں کے استعمال سے بڑھ جاتی ہیں۔ تازہ ہوا اور آرام کرنے سے سکون محسوس ہوتا ہے۔ نیند آتی ہے برنہیں آتی۔

طاقت: بالعموم 30 طاقت يا بهت اونچی

55 کینیبس سٹائیوا

CANNABIS SATIVA

کینیس سٹائیوا کی علامتیں کینیس انڈیکا سے بہت حد تک ملتی ہیں بلکہ کی ہومیو پیتھ ایک کی جگہ دوسری کوبھی استعال کر لیتے ہیں۔ بیا یک دوسرے کے اثر کوزائل بھی کرتی ہیں۔

کینیس سٹائیوا کی علامات کینیس انڈیکا سے زیادہ شدید ہوتی ہیں۔ مثلاً کینیس انڈیکا کے مریض میں بیاحساس پایاجا تا ہے کہ میں دوشخصیتوں میں منقسم ہوگیا ہوں۔ مریض بہت انڈیکا کے مریض میں بیاحساس پایاجا تا ہے کہ میں کرتا ہے کہ وقت دود نیاؤں میں بس رہا ہے لیتین، وضاحت اور لطف کے ساتھ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ بیک وقت دود نیاؤں میں بس رہا ہے لیکن کینیس سٹائیوا میں ذاتی تشخص کے بارے میں مستقل شک پیدا ہوجا تا ہے کہ میں کیا ہوں۔ بولنے اور لکھنے میں کنٹرول نہیں رہتا۔ لکھتے ہوئے لفظ بدلتا جا تا ہے۔ اس کی بات چیت نا قابل فہم ہوجاتی ہے۔ فقروں میں غیرضروری لفظ داخل کرتا رہتا ہے۔ اس حالت میں جب وہ بولتا ہے تو سمجھتا ہے کہ کوئی اور بول رہا ہے۔ نفسیات کے ماہرین اس قسم کی باتوں پرغور کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ صرف تسکین بخش ادو یہ دے دیتے ہیں۔ لیکن ہومیو پیتھی میں صحیح دواد ہے سے ایسے مریض ٹھیک ہو سکتے ہیں۔

کینیس سٹائیوا کے مریض کو بیا حساس ہوتا ہے کہ سر کے اوپر یا بچھیلی طرف ٹھنڈے پانی کی بوند س گررہی ہیں۔

اس کے مریض کی آئھ کے اسے بھر جاتی ہیں۔ آئھ میں اور آئھ کے اردگر درگیں ابھر آتی ہیں۔ آئھ میں اور آئھ کے اردگر درگیں ابھر آتی ہیں۔ نکسیر بھی پھوٹتی ہے۔ ایک رخسار سرخ اور دوسرازر دہوجا تا ہے۔ مرگھٹتا ہے۔ مرگھٹتا ہے۔

نگلنے میں نکلیف ہوتی ہے۔مریض سخت تھکا وٹ محسوں کرتا ہے۔

گردول میں سوزش ہوجاتی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ جلن کے ساتھ باربار آتا ہے۔
پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد شدیدٹا نکہ بھرنے والے درد کا احساس ہوتا ہے۔ آخر میں
مثانے کی نالی اور پیشاب کا سوراخ اچا نگ شنخ کی وجہ سے بند ہوجاتے ہیں اور شخت تکلیف ہوتی
ہے۔ پیشاب کی نالی میں شدید در د ہوتا ہے اور مریض کو چلتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے۔

کینیس سٹائیوامیں دمہ کی علامت بھی پائی جاتی ہے۔ چھاتی سے گڑ گڑا ہٹ کی آ واز آتی ہے۔ کھلی ہوا میں سکون ملتا ہے۔ اگر مثانے کی تکلیف اور دمہ اکتھے ہوں تو کینیس سٹائیوا مکند دوا ہوسکتی ہے۔ دراصل چھاتی کی بہت ہی امراض دیے ہوئے سوز اک کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہیں اور اس وجہ سے دمہ بھی ہوتا ہے اور اس کا اثر پیشا ب کی نالی پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اگر پیشا ب کی نالیوں میں سوزش کی مشابہت سوز اکی امراض سے ہواور دمہ بھی ہوتو کینیس سٹائیوا بہت مفید دوا ہے۔

کینیس سٹائیوا میں دل سے بھی پانی کی بوندیں گرنے کا احساس ہوتا ہے۔ دھڑکن کے ساتھ در دمجسوس ہوتا ہے۔ سٹر ھیاں چڑھتے ہوئے گھٹنے کی ہڈی میں تکلیف ہوتی ہے اور پاؤں بوجل ہوجاتے ہیں۔ لیٹنے کے بعد بھی تکلیفیں بڑھتی ہیں۔

دافع اثر دوا: کیمفر

لاقت: 30

56 کینتھرس

CANTHARIS

کینتھرس ایک زہریلی کہ ہے۔ پرانے زمانے میں سمندر میں سفر کرنے والے ملاح اس کا زہر فاحشہ عورتوں کو استعال کرواتے تھے کیونکہ اس سے جنسی اعضاء کو انگیخت ملتی ہے۔ اس زمانے میں اکثر بندرگا ہیں فحاشی کے اڈے بن چکی تھیں۔ اب قانونی طور پر کینتھرس کے استعال پریا بندیاں لگادی گئی ہیں۔ اس کھی کے کاٹنے سے شخت جلن پیدا ہوتی ہے۔

ہومیو پیتھی میں اس کے زہر کو جلنے کی تکالیف دور کرنے کے لئے بھی استعال کیا جاتا ہے۔ اس کے چھالے بہت بڑ نے ہیں ہوتے۔ بڑے چھالوں میں رسٹا کس پنتھرس سے بہتر کام کرتی ہے۔ اس کے چھالے سے بہت بڑ نے ہوتو کردیا ہوتو کرتی ہے۔ اگر آگ نے سارے بدن کو متاثر کردیا ہوتو رسٹا کس 1000 طاقت میں چند بارد سے سے جلنے کی غیر معمولی تکلیف میں بہت جلد کمی آ جاتی ہے۔ کیانٹہ ولا بھی ان دواؤں میں سے ہے جوایسے موقعوں پر کام آتی ہیں۔

کینتھرس میں اچا تک ہر چیز سے لاتعلقی، ذہنی پراگندگی اور بے ہوشی کی علامت پائی جاتی ہے۔ بجیب وغریب خیالات کا ہجوم ہوجاتا ہے۔ یہ سب علامتیں کینیس انڈیکا کی یا دبھی دلاتی ہے لینیس انڈیکا میں مریض پراگندہ دلاتی ہے لیکن ان دونوں میں ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ سینیس انڈیکا میں مریض پراگندہ خیالات کا لطف اٹھارہا ہوتا ہے۔ بیاری کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن کینتھرس میں ذہنی پراگندگی بہت بڑھ جاتی ہے اور مریض کو کچھ بجونہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ بیاحساس بھی ہوتا ہے کہ کوئی بیرونی طاقت اس پر قبضہ کئے ہوئے ہے جس کے زیراثر وہ بول رہا ہے۔ کینیس سٹائیوا میں بھی اسی قتم کی علامت ملتی ہے۔

کینتھرس میں زہر کے اثر کے دوران مریض اپناتشخص بالکل کھو دیتا ہے اور بیمحسوس کرتا ہے کہ وہ کسی اور شخص کے زیر تصرف ہے۔ بیا حساس مستقل ہوجائے تو یہ پنتھرس کے زہر کا نہیں بلکہ مستقل دماغی خلل کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ ہوسکتا ہے ایسے مریض کو کینتھر س او نچی طاقت میں دینے سے یہ بیاری ٹھیک ہوجائے۔

کینتھرس کا مزاجی مریض تشدد پیند اوراذیت پیند ہوتا ہے۔اسے غصہ بہت سخت آتا ہے۔ایسے غصہ بہت سخت آتا ہے۔ایسے اذیت پیند لوگوں کے لئے کینتھرس اونچی طافت میں بہترین علاج ثابت ہوسکتی ہے۔ایسے افزیت پیند ہوتے ہیں ان کے لئے کینتھرس مفید ہے۔

لینتھرس میں مریض پانی سے خوفز دہ ہوتا ہے۔ تھلکتے ہوئے پانی کی چمک دیکھتے ہی اسے شنج ہوجا تا ہے۔ اس میں بہت ہوتی ہے جوشد بدغصہ پر منتج ہوتی ہے۔ کینتھرس کی جلن بہت ہوتی ہے۔ وحشت اور غصے کے دورے پڑتے ہیں قبل کرنے کار جحان پیدا ہو جاتا ہے۔ ہوجا تا ہے۔ ہائیوہمس کی طرح معصوم بچیوں کا فخش کلامی کرنا کینتھر س میں بھی پایا جاتا ہے۔ کا شنے والی شدید دردوں میں بھی کینتھرس بہت مفید ہے۔

اعصابی رگوں کے ساتھ ساتھ جلد پر چھالے اور سوزش پائے جاتے ہیں۔ یہ چھالے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت خطر ناک اور بہت گہرے اثر ات چھوڑ جاتے ہیں۔
اگر آنکھوں کے قریب چہرے کے اعصاب پر ہوں تو مریض اندھا بھی ہوسکتا ہے۔ اگر صرف ایک ہی طرف اثر ہوتو ایک آنکھ ضائع ہوسکتی ہے۔ اس لئے اس کا فوری علاج ضروری ہے۔ عام طور پر آرسنک ، لیڈم اور لیکیسس کا نسخہ مفید ہے۔ اگر بے چینی نہ ہوتو آر نیکا لیکیسس اور لیڈم فوری طور پر دیں۔ اگر ان دونوں نسخوں سے فرق نہ پڑے تو پھر کینتھرس کے استعال میں تاخیر نہ کریں۔ اگر جھالے بڑے ہوئی اس کے مقابل پر دیں۔ اگر ان دونوں نسخوں سے فرق نہ پڑے تو پھر کینتھرس کے استعال میں تاخیر نہ کریں۔ اگر جھالے بڑے ہوئی اس کے مقابل کینتھرس کے مقابل کینتھرس کے مریض کو بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے جو آرسنگ سے مشابہ ہے۔ کینتھرس کے مقابل ہو جاتی ہے اور چہرے پر گینگھرس دینی جا ور اردگرد کی ساری جلد سیاہی مائل ہو جاتی ہے اور چہرے پر گینگرین کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اس کیفیت میں بلاتا خیر کینتھرس دینی جا ہے۔

کمس کے ساتھ جلن کا شدیدا حساس ہوتا ہے۔ اگرانتہائی سردی کے نتیجہ میں خون کا درجہ حرارت بھی تیزی سے گرنے لگے تواسے مریض کی زندگی بچانے کے لئے کینتھرس بھی بہت کام آتی ہے۔ یہ بچھتے ہوئے رغمل کو بیدار کردیتی ہے۔

کینتھرس میں پیٹ ہوا سے تن جاتا ہے،معدہ اور خوراک کی نالی میں جلن ہوتی ہے اور سخت پیاس گتی ہے۔

مرک کارکینتھر س کی مزمن دوا ہے۔ پیشاب کی شدید تکلیفوں میں مبتلا مریضوں کو مرک کار CM دینے سے بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔

اچھااٹر دکھاتی ہے۔ نیٹرم میور بھی 200 یا اونچی طاقت میں مفید ثابت ہوسکتی ہے۔اگر کسی کے بیشاب میں البیو من (Albumen) آئے تو کینتھر س کی دوسری علامتیں موجود ہونے کی صورت میں بیشاب میں البیو من کا بھی مؤثر علاج ہے۔البیو من نہ ہوتو عموماً کینتھر س کے مریض کے بیشاب کی رئیت گہری سرخ ہوتی ہے۔

عورتوں کی علامتوں میں حیض کی میخصوص علامتیں شامل ہیں کہ حیض جلداور بہت زیادہ آتے ہیں۔ سیاہی مائل خون کا اخراج ہوتا ہے۔ اگر بچے کی پیدائش کے بعد آنول (Placenta) اندررہ جائے توسیکیل کی طرح کمینتھرس کی مریضہ میں بھی رحم میں گینگرین بننے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ بیاری اس حد تک نہ بڑھی ہوتو رحم عموماً سوزش کا شکار رہتا ہے اور گندی رطوبت کا مسلسل اخراج ہوتا رہتا ہے۔ بیضۃ الرحم (Ovaries) میں بھی شدید درداور جلن پائے جاتے ہیں۔ دل کی دھڑکن کمز وراور بے قاعدہ ہوتی ہے۔ کمر کے نچلے حصہ میں دردر ہتا ہے۔

کینتھرس کی تکلیفیں کمس سے ،ٹھنڈ نے پانی سے اور بیشا ب کرتے ہوئے بڑھ جاتی ہیں۔

دافع اثر دوائیں: ایکونائٹ کیمفر پلسٹیلا کینییس سٹائیوا طاقت: 30 یا بہت اونچی کیپسیکم 233

57 کیپسیکم CAPSICUM

(Cayenne Pepper)

کیپسیکم سرخ مرج سے تیارکردہ دوا ہے۔اگرکوئی دبلا پتلاسوکھا ہوا شخص آ رام سے نہ بیٹے سکے تواس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے مرچیں لگ رہی ہیں لیکن کیپسیکم کا مریض اس سے بالکل متضاد ہوتا ہے۔خوب موٹا تازہ ،عضلات ڈھیلے ہوکر لگئے ہوئے اور چہرے پرخون کی رگت اور تمازت کے لحاظ سے کیپسیکم کا مریض عادی کی رگوں کا جالا سابنا ہوا۔ چہرے کی رنگت اور تمازت کے لحاظ سے کیپسیکم کا مریض عادی شرابی کے مشابہ دکھائی دیتا ہے۔شراب کا اثر چہرہ کے باریک ریشوں پر پڑتا ہے اور وہاں سرخ رنگ کے جالے سے بین جاتے ہیں۔مرچیں کھانے سے بھی خون کا دوران باربار بیرونی سطح یعنی جلد کی طرف ہوتا ہے کیونکہ مرچ خون میں غیر معمولی تموج پیدا کردیتی ہے۔غذا گرم ہویا سرد، بلان کو اس کی تیزی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔گرم چیز زیادہ گرم اور شخٹری چیز زیادہ شخٹری معلوم ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو مرچیں کھانے کی عادت ہوجب وہ مرچیس چھوڑ دیں تو ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے کیونکہ غدود اور معدے کی جھلیوں کو مرچوں سے انگیزت کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے۔ جب مرچیں تج کیک پیدا کریں تو غدود وہ تیزاب نکا لتے ہیں جو بھوک لگا تا ہے۔

اگرچہ مرچیں جلن اور گرمی پیدا کرتی ہیں لیکن کیپسیکم کا مریض خود ٹھنڈا ہوتا ہے اور گرم کمرے میں رہنا پیند کرتا ہے۔ اس کی ایک جیرت انگیز علامت بیہ ہے کہ مریض زیادہ دریگھرسے با ہز نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی زیادہ مرچیں کھانے کا عادی نہ بھی ہواور اسے گھرسے باہراداسی کا دورہ پڑتا ہوتو کیپسیکم کی ایک دوخورا کیس دینے سے اس میں گھر جانے کی تمناکسی حدتک کم ہوجاتی ہے۔

کیپسیکم کا مریض بہت ضدی ہوتا ہے۔ لہذا بعض ایسے علاقوں کے لوگ جہاں بہت مرچیں کھائی جاتی ہیں مرج کھانے والاضروری نہیں کہ ضدی ہو۔ کیپسیکم میں غصہ ، چڑچڑا بین او بے اطمینانی کی علامات کیمومیلا سے ملتی ہیں۔ایک گال سرخ ہوتا ہے اور ایک زرد۔ بچوں کی بیاریوں میں بیعلامت اکثر دکھائی دیتی ہے۔سرکی جلد پر پسینہ آتا ہے۔

مریض کوخودکشی کا خیال تو آتا ہے لیکن عملی قدم نہیں اٹھا تا اور ڈرتا ہے۔ اکیلا رہنے کی خواہش کرتا ہے۔ سریا کوئی اور عضو بڑا محسوس ہونے گتا ہے۔ سباڈیلا میں بھی بیعلامت ہے۔

کیپسیکم میں دھڑکن کا احساس بھی ہوتا ہے۔ سرمیں شدید درد جو آرام کرنے سے زیادہ ہوجا تا ہے اور حرکت سے کم۔

گلاخراب ہونے سے <mark>کان کے بیجھیے کی ہڈی میں سوزش</mark> ہوجاتی ہے جومستقل کھہر جاتی ہے۔اس کے لئے فائٹولا کا اور کو نیم وغیرہ بھی مفید دوائیں ہیں۔

کیپسیکم کے نزلیہ میں مریض کا چہرہ تمتمایا ہواا ور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ناک کی نوک سرخ ہوتی ہے۔ ناک میں جلن اور سرسراہٹ ہوتی ہے، ناک بند بھی ہوجا تا ہے۔ کھانسی کے ساتھ شدید ہوآتی ہےاور حلق میں در دہوتا ہے۔ زبان پر چھوٹے چھوٹے آبلے بن جاتے ہیں جن کوچھونے سے در دہوتا ہے۔ نگلنے میں دقت ہوتی ہے۔

کیپسیکم کے مریض کے چہرے پرجلد حجمریاں پڑجاتی ہیں۔جلد کی لیک ختم ہوجاتی ہے۔ اور موٹی موٹی کیبرین نمایاں ہونے گئی ہیں۔عضلات ڈھیاور لٹکے ہوئے ہوں اور دوران خون میں خلل واقع ہوجائے تو کیپسیکم مفید دواہے۔

خسرہ میں چہرہ بہت تمتمایا ہوا ہواورکوئی دوسری دوااثر نہ کرے تواس میں کیپسیکم دی جا سکتی ہے۔اگر کلے کے غدود پھول جائیں لیکن سخت نہ ہوں بلکہ اسفنج کی طرح پھولے ہوئے اور دباؤڈا لنے سے دب جائیں توبیہ کیپسیکم کی خاص علامت ہے۔

کیپسیکم میں کھانے کے بعد معدہ کی جلن نمایاں ہوجاتی ہے۔ پیچیش اوراسہال میں گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ فارغ ہونے کے بعد بھی جلن رہتی ہے۔ ٹھنڈے یانی کی شدید پیاس ہوتی ہے۔ بواسیر کے مسے تھلیھلے اوران میں سرخی اورجلن نمایاں ہوتی ہے۔

اگر آوازمستقل بیره جائے تو یہ بھی کیپسیکم کی ایک علامت ہے۔ اگر مزید علامتیں بھی کیپسیکم کی ایک علامت ہے۔ اگر مزید علامتیں بھی کیپسیکم سے ملتی ہوں تو اس سے فائدہ ہوگا۔ آواز بیرہنے کی صورت میں فاسفورس، کاسٹیکم، سلفر، لائیکو یوڈیم، کوکا، سورائینم اور بور کیس عموماً کام آتی ہیں۔

مجرہ اور ہوائی نالی میں خشک کھانسی کے ساتھ سرسراہ ٹ اور کھانسے سے مثانہ میں دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ سانس کے ساتھ سینے میں درد، دل کے نچلے حصہ میں پسلیوں کے پاس درد، مریض کھلی ہوا پہند نہ کرے، گری سے اور کھانا کھانے سے پچھآ رام آئے، مریض جھٹکے بھی لگتے ہوں، نپٹی کی میں درد محسوں کرے، چہرے کے بعض عضلات میں درد کے ساتھ جھٹکے بھی لگتے ہوں، نپٹی کی میں درومحسوں کرے، چہرے کے بعض عضلات میں درد کے ساتھ جھٹکے بھی لگتے ہوں، نپٹی کی میں درومحسوں کرے، چہرے کے بعض عضلات میں درد کے ساتھ جھٹکے بھی لگتے ہوں، نپٹی کی میں درومحسوں کرے، چہرے کے بعض عضلات کے سے سامتیں کی پسیکم میں پائی جاتی ہیں۔

گیپسیکم ان بوڑھے آدمیوں کے لئے مفید دوا ہے جنہوں نے تمام عمر دماغی محنت کی ہو گری عمر میں حوادث زمانہ سے ان کارئین سہن اچھانہ رہا ہو۔

دافع اثر دوائيں: سائنا، کيليڈيم طاقت: 30 سے 200 تک

58 ينيميلس كاربوا

CARBO ANIMALIS

کار بوالیمیلس ، کار بووت کے سے بہت مشابہ دوا ہے۔ کار بووت کن نباتات کے کو کلے سے بنتی ہے جبکہ کاربوالیمیلس حیوانات کے کوئلے سے بنائی جاتی ہے۔ اگرچہ کیمیاوی لحاظ سے ان دونوں میں بہت تھوڑا فرق ہے گربعض علامتوں میں نمایاں فرق دکھائی دیتا ہے۔ کار بوانیسمیلس کی علامتیں رکھنے والی بہاریاں کینسر کی شکل اختیار کر لینے کار ججان رکھتی ہیں۔عمر رسیدہ افراد کی بیاریوں میں بیدوا بطور خاص بہت مفید ہے۔اس کا مریض خون کی کمی کا مستقل شکار رہتا ہے۔ چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے،قوی مضمحل ہو جاتے ہیں اورجسم کی دفاعی طاقتیں جواب دینے گئی ہیں۔کار بوو بج کی طرح اس میں بھی غدود سخت ہوجاتے ہیں جو کینسر میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔اگر دریدوں میں خون جم جائے اوروہ نیلے جال کی صورت میں جگہ جگہ سے ابھرگئی ہوں تو اس بیاری میں بھی کار بوالیسمیلس مفیدہے۔اس بہلوسےاس دوا کا مزاج ایسکولس سے ملتاہے۔ کار بوانیمیلس کامریض ممکین،اداس اور تنهائی بیند ہوتا ہے۔عموماً خاموش رہتا ہے،رات کویے چین اور خوفز دہ ہوجاتا ہے۔خون کا دوران سر کی طرف ہوتا ہے۔ ذہن الجھا ہوا،نظر دھندلا جاتی ہے، آنکھوں پر بوجھمحسوں ہوتا ہے، گدی میں در دہوتا ہے، ہونٹ اور گال نیلگوں ہوجاتے ہیں، ناک سوج جاتا ہے اوراس پر نیلے رنگ کی غدودتی ابھرآتی ہے۔قوت شنوائی بھی متاثر ہوتی ہے،آوازوں کی سمت کا اندازہ لگانامشکل ہوتا ہے،خشک ز کام ہوتا ہےاور توت شامہ ختم ہو جاتی ہے۔ چہرے پر تا نبے کے رنگ کے دانے اور کیل بنتے ہیں۔ سراور چہرے برگرمی کا احساس ہوتا ہے۔ بوڑھے لوگوں کے چیرےاور ہاتھوں پر مسے نکلتے ہیں ۔مریض ڈراؤنےخواب دیکھاہے۔ کار بوانیمیلس کے مریض کو معدے میں شدید کمزوری اور خالی پن کا احساس ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد تھکن اور کمزوری ، وزن اٹھانے اور محنت مشقت سے بھی سخت کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ کولہوں اور کلائیوں میں در د ہوتا ہے۔

عورتوں کے رحم کے منہ پر کینسر ہوجائے تو معالجین رحم نکالنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ حالانکہ بیعلاج بھی کارگرنہیں ہوتا۔ اگر کاربوائیہ کیسس آغاز میں ہی دے دی جائے تو شفا بخش ثابت ہوتی ہے۔ عام سوزش اور در دول میں بھی مفید ہے۔ رحم کے منہ پر زخم ہوجائے تو کیکوریا بھی جاری ہوجا تا ہے جس میں بہت جلن ہوتی ہے۔ کاربووج میں بھی ایسی ہی جلن کی علامت ہوتی ہے لیکن صرف اندرونی طور پر، بیرونی سطح پر شخنڈک کا احساس رہتا ہے۔ رحم سے جلن دار کیکوریا کا اخراج ہوتو فوراً کاربوائی عیاس استعمال کروانی چاہئے۔ اگر تا خیر ہوجائے تو علامتیں بڑھ کرکینسر میں تبدیل ہوسکتی ہیں۔

حمل کی متلی کی بھی اچھی دوابتائی جاتی ہے اوراس کی خاص علامت یہ ہے کہ رات کے وقت متلی میں اضافہ ہوجا تا ہے۔

اگر دودھ بلاً نے کے زمانے میں شخت کمزوری واقع ہوجائے اوراعصاب جواب دے جائیں تو کاربوائیمیلس کوفراموش نہیں کرنا چاہئے۔ نیم رحم کی طرح رحم کے عمومی کینسر کی بھی دواہے۔

اس کی خاص علامت ہیہ ہے کہ غدودیں پھول جاتی ہیں۔ ہونٹوں اور گالوں کا رنگ نیلا ہوجا تا ہے۔

کار بوائیمیلس میں حیض عموماً جلد اور مقد ار میں زیادہ اور لمباچلنے والا ہوتا ہے۔ حیض کے دوران مریضہ شخت کمزور ہوجاتی ہے۔ سپیا سے مشابہ ناک کے اوپر سیا ہی مائل نشان بن جاتا ہے جو رخساروں کے اطراف میں گالوں پر اتر تا ہے۔ سپیا سے یہ نشان دور نہیں ہوتا کیونکہ سپیا کا اپنا ایک خاص مزاج ہے۔ جب تک وہ نہ ہوسییا سے فائدہ نہیں ہوتا۔ عور توں کی جسمانی کیفیت اور ساخت سپیا کی پیچان ہے، وہ نسبتاً تیلی ہوتی ہے، اپنوں سے اجنبیت محسوس کرنے گئی ہے، محبت کے جذبات میں کمی آجاتی ہے۔

ساعت کی خرابی میں بھی ہے اچھا کام کرتی ہے۔ بسااوقات دونوں کا نوں کی قوت ساعت بگڑ جاتی ہے۔ ساعت میں آ وازوں کی بہچان نہیں رہتی۔ آ واز کی سمت کا تعین کرنا مشکل ہوجا تا ہے۔ ساعت پر اثر انداز ہونے والی نمایاں دواؤں میں چینو بوڈ یم (Chinopodium) بھی شامل ہے۔ اگر اعصائی کمزوری پیدا ہوجائے یا رطوبتوں کے لمبے عرصہ تک جمتے رہنے سے کان بند ہوجا ئیں تو چینو بوڈ یم دوا ہوسکتی ہے۔ اسے 30 یا 200 طاقت میں دو تین مہینے استعال کرتے رہنا چا ہے۔ بعض دفعہ ایسے مریض کواچا تک فائدہ محسوس ہوتا ہے اور اس سے پہلے کان میں بار بار جھیکے آنے لگتے ہیں۔

کار بوالیمیلس مواد جمنے کا علاج نہیں بلکہ بڑھتی ہوئی اعصابی کمزوری کا علاج ہے اور بسااوقات بیر کمزوری دونوں کا نوں میں بیک وقت پائی جاتی ہے جبکہ چینو بوڈیم کااثر اکثر ایک ہی کان پر بڑتا ہے۔

چہرے پر کیل مہاسے نکلیں۔ ہاتھ پاؤں سردی کی وجہ سے متورم ہو جائیں تو کار بوانیمیلس اچھی دواہے۔ ہاتھوں اور چہرے پر مسے نگلنے کار جحان رو کئے میں بھی بیہ مفید ثابت ہوتی ہے۔

بہم میں تخلیقی توازن بگڑنے سے ہڈیوں میں غیرضروری بڑھوتی ہونے گئی ہے جس میں کینسرکا رجحان پایاجا تا ہے۔ اگرجسم میں کوئی غیر معمولی تبدیلی رونما ہوتو کاربوائیمیلس فوراً دینی چاہئے۔ کاربوائیمیلس کے مریضوں کے شخنے کمزور ہوجاتے ہیں جو چلتے چلتے باربار مڑجاتے ہیں اس لئے ان میں موچ آنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ ٹخنوں کوتقویت دینے کے لئے یہ لمباعرصہ 30 طافت میں دینی چاہئے۔ گراس مرض میں بیلس (Bellis) کونہ بھولیں۔

ہاتھ سوجاتے ہیں، کلائیوں، پنڈلیوں میں درد اور شنج چلتے ہوئے زیادہ ہوتا ہے۔ انگلیوں کے جوڑوں میں بختی پائی جاتی ہے۔ <u>کمر میں درد</u>ادر کھچاؤ ہوتا ہے۔

کار بوالیمیلس کے مریض کے چھپپر وں میں زخم بن جاتے ہیں۔ سینے میں شنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ کھانسی کے ساتھ سبزی مائل بلغم خارج ہوتی ہے۔ رات کو بد بودار پسینہ آتا ہے۔ شنڈی ہوا میں علامات میں اضافہ ہوجاتا ہے، گرمی سے کمی محسوس ہوتی ہے۔

مددگاردوائیں: ہیلونیس کلکیریافاس دافع اثر دوائیں: آرسنگ نکس وامیکا

طاقت: عموماً 30 _ كينسر كے علاج ميں 200 سے CM تك

59

كاربووتج

CARBO VEGETABILIS

کاربووت بناتاتی کاربن (Vegetable Carbon) کو کہتے ہیں لین لکڑی کا کوئلہ۔
وُل کڑ ہانیمن نے جب اسے اپنے اوپر آ زمایا تو آنہیں اس میں بعض ایسے دیریا اثر ات نظر آئے جن
کی وجہ سے انہوں نے اسے بہت گہری بیاریوں میں استعال کیا۔ ایلو پیتھک طریقہ علاج میں
کاربووت کو کئیہ کی شکل میں پیٹ کی ہوا کم کرنے کے لئے استعال کیا جاتا ہے۔ یہ کئیہ معدہ کی ہوا
کوکسی حد تک جذب کر لیتی ہے مگر معدے میں پیدا ہونے والے تیز اب کے خلاف رو کمل نہیں
دکھاتی۔ ہومیو پیتھی میں بھی کاربووت کو پیٹ میں پیدا ہونے والی ہوا دور کرنے کے لئے
استعال کیا جاتا ہے۔ معدہ میں جو عوامل ضرورت سے زیادہ ہوا پیدا کرنے کابا عث بنتے ہیں بیان
کے خلاف بھی رقمل دکھاتی ہے۔

کار بووت کے ایک ایسی دواہے جس کا شار زندگی بچانے والی چوٹی کی دواؤں میں کیا جاتا ہے۔ جب کسی بیاری کے بہت بڑھ جانے کے نتیجہ میں زندگی کی رمق کا لعدم ہوجائے تو ان نازک لمحات میں کار بووت کی ڈوبتی ہوئی زندگی کو واپس کے پنچ لانے میں اہم کر دارادا کرتی ہے۔ کار بووت کے ان غیر معمولی اثرات کی کند تک پنچنا تو مشکل امر ہے لیکن بارہا تجر بوں سے بیثابت ہو چکاہے کہ جب زندگی بالکل ختم ہونے کے قریب ہوتو کار بووت کی فوراً اثر کرتی ہے اورجسم کی حرارت بحال کر دیتی ہے۔ اس خاص اثر سے میں نے بیا ندازہ لگایا کہ کار بووت کی گرتے ہوئے بلڈ پریشر کو بھی اونچا کرتی ہوگی۔ جب میں نے بیا ندازہ لگایا کہ کار بووت کی گرتے ہوئے بلڈ پریشر کو بھی واضح ہوئی کہ یہ ہوگی۔ جب میں نے اس پر تجربہ کیا تو واقعتاً بیاثر نمایا ل نظر آیالیکن میات بھی واضح ہوئی کہ یہ ہو جو بلڈ پریشر فرنیا دہ تو بیات ہوئی ایک میں ہو تو بیا سے زیادہ ہو جائے گا بلکہ اگر خون کا دباؤ معمول سے زیادہ گرگیا ہو تو بیا سے ضرورت سے زیادہ ہو جائے گا بلکہ اگر خون کا دباؤ معمول سے زیادہ گرگیا ہو تو بیا سے ضرورت سے زیادہ ہو جائے گا بلکہ اگر خون کا دباؤ معمول سے زیادہ گرگیا ہو تو بیا سے خوادہ کی کو کیا ہو تو بیا سے خوادہ کی کیا ہو تو بیا سے خوادہ کی جو کیا جو تو بیا سے خوادہ کی کار بود کیا ہو تو بیا سے خوادہ کیا کیا کہ اگر خون کا دباؤ معمول سے زیادہ گرگیا ہو تو بیا سے خوادہ کر گرگیا ہو تو بیا سے خوادہ کیا کہ کار بود کیا تو کہ کار کیا ہو تو بیا کیا کہ کار کوئیا ہو تو کیا کہ کار کوئیا ہو تو کہ کیا کہ کیا کہ کار کوئیا کوئیا کیا کہ کار کوئیا کوئیا کر کوئیا کیا کہ کر کیا ہو تو کیا کہ کر کیا ہو تو کیا کیا کہ کار کوئیا کوئیا کوئیا کہ کار کوئیا کہ کر کر کے کار کوئیا کر کوئیا کوئیا کر کوئیا کوئیا کیا کہ کوئیا کوئیا کر کوئیا کر کوئیا کر کوئیا کوئیا کر کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کر کوئیا کوئیا کر کوئیا کیا کوئیا کوئیا کر کوئیا کر کوئیا کر کوئیا کر کوئیا کو

نارمل کر دیتی ہے۔ مریض جب آخری دموں پر ہوتو خون کا دباؤاکٹر گر جاتا ہے۔
کاربووت کی کی ایک خوراک سے ہی اچا تک گرمی پیدا ہونے گئی ہے۔ ایک دفعہ ایک مریض
کودل کا شدید حملہ ہوا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ بظاہر بے جان ہو چکے تھے۔ ماتھے پر سخت شخنڈ ایسینہ تھا اور سانس کا لعدم تھا۔ میں نے فوراً کاربووت کے دوتین قطرے ان کے منہ میں ٹرچا دیئے۔ تھوڑی دیر میں ہی ان کا سانس بحال ہوگیا۔ ماتھے کا پسینہ تم ہوگیا اور جسم میں آ ہستہ آ ہستہ گرمی پیدا ہونے گئی۔ ان کی حالت سنجھنے پر میں نے انہیں دل کی طاقت کے لئے دوائیں دیں لیکن اس مزید علاج کے قابل بنانے میں کاربووت کے نے چرت انگیز ان دکھایا۔ ان کے علاوہ میں نے اور ہمیشہ اسے بہت مؤثر پایا دیا ہے۔ اس کئے زندگی بچانے کی دوا کے طور پر اسے ہمیشہ اسے بہت مؤثر پایا ہے۔ اس کئے زندگی بچانے کی دوا کے طور پر اسے ہمیشہ اسے پاس رکھنا چا ہئے۔

کار بوون کا گراتعلق دمہ سے بھی ہے۔ دمہ میں بیعوماً بیے مریضوں کے کام آتی ہے جن کا جسم سخت ٹھنڈ ااور پیدنہ سے شرابور ہو جائے اور کمزوری کا بیا عالم ہو کہ بلغم باہر نکا لئے کی بھی طاقت نہ ہو۔ ایسے مریض عموماً دوطرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو امونیم ٹارٹ کی علامات رکھتے ہیں۔ ان کی علامتیں امونیم ٹارٹ کی سطح تک پہنچنے سے پہلے اپنی کاک سے ملتی ہیں۔ جب اپی کاک کی علامتیں زیادہ بگڑ جا ئیں تو پہلے اپنٹی مونیم کروڈ کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ساتھ ہی معدے کی تکلیف بھی شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے زبان پر بہت گہری سفید رنگ کی تہہ جم جاتی ہے۔ اگر ایسے مریض کی حالت زیادہ مرتب ہو جائے ، سینہ بلغم سے بھرا ہوا ہوا ور وہ شخت کمزور ہو چکا ہوتو اپنٹی مونیم ٹارٹ مرتب ہو جائے ، سینہ بلغم سے بھرا ہوا ہوا ور اس خطرناک مرحلہ سے اسے باہر نکال لاتی ہے۔ لیکن یہ دمہ کامستقل علاج نہیں ہے۔ کار بووج بھی اپنٹی مونیم ٹارٹ سے ملتی جلتی دوا ہے۔ ایک دفعہ دمہ کا ایک مریض اس کے بعد دمہ کا شخص۔ میں نے اسے کار بووج کری سے فوراً اس کے جسم میں کچھ طاقت پیدا ہوئی۔ بلغم شخص۔ میں نے اسے کار بووج کری جس سے فوراً اس کے جسم میں کچھ طاقت پیدا ہوئی۔ بلغم شکلی اور سانس جو بند ہور ہی تھی بسہولت دوبارہ جاری ہوگئی۔ اس کے بعد دمہ کا بہر نکالی اور سانس جو بند ہور ہی تھی بسہولت دوبارہ جاری ہوگئی۔ اس کے بعد دمہ کا بہر نکالی اور سانس جو بند ہور ہی تھی بسہولت دوبارہ جاری ہوگئی۔ اس کے بعد دمہ کا باہر نکالی اور سانس جو بند ہور ہی تھی بسہولت دوبارہ جاری ہوگئی۔ اس کے بعد دمہ کا

علاج کیا گیا اور وہ مریض شفایاب ہوگیا۔ کاربوہ بج بہت نا زک کمحات میں کام آنے والی دوا ہے اور دمہ کی بیاری میں اس کی خاص علامت یہ ہے کہ ٹھنڈا پسینہ آتا ہے اور مریض کا بدن بھیگ جاتا ہے لیکن وہ ہوا کا مطالبہ کرتا ہے چنا نچہ بعض دفعہ اس کے چہرے پر تیزی سے پنکھا جھلنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس آرسنگ کا مریض بالکل خشک ہوتا ہے اور اس کے سینہ میں بلغم بھی نہیں کھڑ کھڑ اتی۔ سینہ میں بلغم بھی نہیں کھڑ کھڑ اتی۔

کار بووج دل کی بیمار بول میں جہاں دل کے اعصاب جواب دے رہے ہوں،

ہہت مفید ہے۔ بیمو ماً عصاب کا بہترین ٹا نک ہے۔ معدہ میں ہوا کا دباؤ او پر کی طرف

ہوتو اس میں بھی کار بووج اچھی دوا ہے۔ بہت سی دواؤں میں پیٹ کی ہوا کا ذکر ملتا ہے اور

صرف علامتوں سے دوا پیچا ننا مشکل ہے اس لئے مختلف دوا ئیں آزمانی پڑتی ہیں۔ لمباطبی

تج بہدواؤں کو پیچا نے میں مدددیتا ہے یعنی دوائیں بار بار کے تج بہت اپنی علامتیں خودظا ہر

کرتی ہیں خواہ پروونگ (Proving) میں وہ علامتیں ظاہر نہ ہوئی ہوں۔ آرسنگ آبوڈ ائیڈ

میں بھی معدہ کی ہوا کاذکر ملتا ہے۔ لیکن دراصل بیمعدہ کے تیز ابی نا سوروں اوران کے بدا تر

حصہ میں او پر کی طرف دباؤ ڈ التی ہے جس میں تعفن بھی پایا جاتا ہے۔ کار بووج کے اسہال میں بھی بد بو ہوتی ہے اور مریض بہت کمزوری میں زیادہ گہری دوا ہے اور ٹائیفا ئیڈ کے بد بودار

بیٹیشیا سے ملتی ہیں لیکن پیٹیشیا اس بیاری میں زیادہ گہری دوا ہے اور ٹائیفا ئیڈ کے بد بودار

اسہال میں بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔کار بووج وہ وہاں کا مزہیں کرتی۔

اسہال میں بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔کار بووج وہاں کا مزہیں کرتی۔

کار بووت کی علامات میں ہاتھ اور پاؤں کا سونا بھی شامل ہے۔ ٹانگیں بھی سن ہوجاتی ہیں خاص طور پر پنڈلیوں کے اعصاب پر اثر ہوتا ہے۔ پنڈلیوں کے عضلات کوعموماً دوسرا دل کہا جاتا ہے کیونکہ بیخون کو پنچ سے پمپ کر کے اوپر جھیجتے ہیں۔ اچانک کھڑے ہونے سے سرخالی خالی ہوجائے تو بیاس بات کی علامت ہوتی ہے کہ پنڈلیوں سے خون صحیح طرح پہپ ہو کر اوپر نہیں آیا۔ اس کیفیت میں کار بووج بہت مفید ہے کیونکہ یہ دوران خون کی کمزوری اور عضلاتی کمزور یوں دونوں کودور کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موت کے قریب کے لمحات میں نئ حرکت پیدا کرنے میں کار بوو تج کام آتی ہے۔

کار بووج کی ایک اوراہم بنیا دی علامت یہ ہے کہ یہ جسم کو کالی کارب کے لئے تیار کرتی ہے۔کالی کارب میں بہت می علامتیں کار بووج سے ملتی ہیں لیکن کار بووج اپنے اثر ات کے لحاظ سے بہت نرم دوا ہے جبکہ کالی کارب بہت سخت ردعمل دکھاتی ہے۔ چونکہ کالی کارب کی اکثر بیاریاں مزمن ہوتی ہیں اورا گر براہ راست کالی کارب سے ہی شروع کیا جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ بہت شدید ردعمل پیدا ہوجائے گا۔اس لئے کالی کارب سے کیا جائے کار بووج کے درد میں علاج کا بہتے خصوصاً ہاتھ پاؤں اور کلائی کے جوڑوں کے درد میں علاج کا آغاز کار بووج کے سے کرنا جائے۔

جب میں نے ہومیو پیتھی شروع کی تو شروع میں میں پہلے کاربووج دیتا قا۔ تجربہ سے مجھے علم ہوا کہ کاربووج کبندات خود دردوں اور تکلیفوں میں کچھ نہ کچھ اثر دکھاتی ہے اور کمر درد اور اعصا فی دردول میں مفید ثابت ہوتی ہے لیکن اگر بلڈ پریشر زیادہ مواور چہرے پر تناؤ ہوتو بیلا ڈونا اور ایکونائٹ کاربووج کی نسبت زیادہ مفید ہیں۔ ایکونائٹ اور بیلا ڈونا کے علاوہ رسٹاکس دینے کے بعد بھی حسب علامات کاربووج یا کالی کارب دیے جا سکتے ہیں اور ان کے بعد اثر کومزید آگے بڑھانے کے لئے کلکیریا کارب کام آتی ہے۔ ان دواؤں میں کاربن کا عضر مشترک ہے اور کاربن کا عصاب سے گراتعلق ہے۔

کار بووج کے مریض کے معدے میں تیزابیت کی زیادتی ہائیڈروکلورک ایسڈ لیعنی نمک کے تیزاب کے زیادہ پیدا ہونے سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے برعکس اکثر اس کی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جب معدے کا قدرتی تیزاب کم ہوتو کھانا اندرگلتا سڑتا رہتا ہے اوراس کے نتیجہ میں فاسد تیزاب پیدا ہونے لگتے ہیں۔ان تیزابوں کی زیادتی نظام ہضم پر قیامت ڈھا دیتی ہے۔مبتدی کو سمجھانے کی خاطر سادہ الفاظ میں یہ بتانا کافی ہوگا کہ معدے کی دوگر دنیں ہوتی ہیں جن کے کنارے پر منہ بنے ہوتے ہیں جو بند بھی ہو

سے ہیں اور کھل بھی سے ہیں۔ معدے کا ایک منہ اوپر کی طرف دل کے قریب واقع ہوتا ہے اس کو Cardic End کہتے ہیں بعنی دل والا کنارہ اور دوسرا منہ معدے کی اس گردن کے کنارے پر ہوتا ہے جو نیچ انتر یوں کی جانب کھلتی ہے۔ فاسد تیز ایوں ک باعث بید دونوں منہ سکڑ جاتے ہیں اور کھانے کامحلول جس میں فاسد تیز ابوں کا غلبہ ہوتا ہے ، گیسوں سے معدے کو بھر دیتا ہے۔ اوپر کی طرف کا منہ نسبتاً آسانی سے کھل جاتا ہے۔ ایس گیسوں سے معدے کو بھر دیتا ہے۔ اوپر کی طرف کی منہ نسبتاً آسانی سے کھل جاتا ہے۔ ایس بد بودار گیسوں کے ڈکار کچھ تیز اب کے ساتھ کھانے کی نالی کی طرف چڑھتے ہیں۔ اس بد بودار گیسوں کے ڈکار کچھ تیز اب کے ساتھ کھانے کی نالی کی طرف چڑھتے ہیں۔ اس انتر یوں کی طرف واقع منہ پر جب دباؤ زیادہ ہوتو تب کھاتا ہے۔ ویسے بھی کھانے کو ہضم ہونے نے لئے معدے میں تین گھٹے درکار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بیکلول بنچ انتر یوں کی طرف اتر جاتا ہے۔ اور ساری انتر یوں کی نالی کو تعفن سے بھر دیتا ہے۔ اس محلول پر گوش میں جرثو ہوتو ہے اور پیٹ کے کیڑے بھی خوب بیتے ہیں جن کی وجہ سے مزید تعفن پیدا ہوتا ہے۔ کار بووج کان علامتوں کی اصلاح کے لئے استعال کی جاتی ہے جو پچھ دیر کے مسلس کار بووج کان علامتوں کی اصلاح کے لئے استعال کی جاتی ہے جو پچھ دیر کے مسلس استعال کی جاتی ہے جو پچھ دیر کے مسلس کے بعد اس نظام کو معمول پر لئے تی ہے۔

کار بووج اور کار بواین میلس دونوں اس پہلو سے قدر مشترک رکھتی ہیں کہا گر انہیں مناسب طاقت میں دیا جائے تو پیٹ کے جرثو مے اور کیڑے مارنے کے کام آتی ہیں لیکن بعض جرثو مے اور کیڑے معدہ اور انتڑیوں میں مستقل ٹھکا نہ بنالیتے ہیں اور ان سے نجات حاصل کرنا بہتے مشکل ہوتا ہے۔

میرے تجربہ میں پیٹ کے عام کیڑوں کے لئے سب سے مؤثر دوائیں سینٹوئینم (Cina) اور ٹیوکریم (Teucrium) ہیں۔ ان کے علاوہ اگرچہ ہومیو پیتھی کتابیں، سباڈیلا کا ذکر نہیں کرتیں اور سباڈیلا کو محض چھینکوں اور ناک کی فارش کے شمن میں بیان کیا جاتا ہے لیکن میں نے اسے پیٹ کے کیڑوں کے لئے بھی کا میا بی سے استعال کیا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ناک کی الرجی اور خارش وغیرہ نظام ہمضم میں کیڑوں کی موجودگی کی وجہ سے بھی ہوسکتی ہے۔ وہ جومعدے اور انتز یوں میں سنسنا ہٹ

پیدا کرتے ہیں وہی ناک اور منہ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ بورک (Boericke) کی رپیرٹری میں بھی سباڈ یلا کا ذکر کیڑوں کے تعلق میں موجود ہے۔ حالانکہ سباڈ یلا کے باب میں بورک اس کا ذکر نہیں کرتا۔ علاوہ ازیں ایک دوا کا ربوائیمیلس ہے جو بیٹ کے میں بورک اس کا ذکر نہیں کرتا۔ علاوہ ازیں ایک دوا کا ربوائیمیلس ہے جو بیٹ کے کیڑوں کیٹروں (Hookworms) کے لئے چوٹی کی دوا ہے اور بھی بہت سی دوا کیں ہیں جو پیٹ کے مختلف کیڑوں کے تدارک کے لئے استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے لئے عندالضرورت کی تفصیلی ربیرٹری کا مطالعہ کریں۔

کار بووت کی میں شام کے وقت گلا بیٹھنے کی علامت پائی جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں سوتے ہیں۔ د ماغی اور جسمانی طور پرستی طاری ہوجاتی ہے اور سارانظام حیات ہی ست رفتار ہوجاتا ہے۔ جسم کے اندرجلن کا احساس ہوتا ہے جبکہ بیرونی طور پرسر دی محسوس ہوتی ہے۔ مریض عموماً غم ،خوشی اور تعجب کی خبروں سے بے نیاز ہوجاتا ہے گویا، د ماغ ان باتوں کوکوئی اہمیت نہیں دیتا محسوس ہوتا ہے کہ سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی۔

اس میں سردرد عموماً گدی میں بیٹے جاتا ہے جس کا نزلہ سے تعلق ہوتا ہے۔ بالآخر سارے سر میں درد محسوس ہوتا ہے جیسے ہتھوڑ ہے چل رہے ہوں۔ ہتھوڑ ہے چلنے کی بیہ علامت نیٹر م میور میں بھی ہے۔ سر کے بال بھی گرنے گئتے ہیں۔ ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ آتا ہے۔ رات کومریض خوفز دہ ہوجاتا ہے اور جنوں اور بھوتوں کا خیال آن لگتا ہے۔ کا نول سے سخت بد بودار ما دے خارج ہوتے ہیں جوعموماً کسی گہری افکیشن اور بخار کے نتیجہ میں نکلتے ہیں۔ کاربووت میں دائمی مزلہ جسم کے کسی بھی عضو پر جملہ آور ہوسکتا ہے اور عموماً سے دبا دیا جائے تو خطرنا ک نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر کاربووت کے سے ہی علاج ہونا چاہئے۔ کاربووت کے میں بینو بی بھی ہے کہ کسی دبی ہوئی بیاری کی علاج سے نہی ملاج ہونا چاہئے۔ کاربووت کے میں بینو بی بھی ہے کہ کسی دبی ہوئی بیاری کی علاج شیں واضح نہ ہوں تو انہیں نمایاں کر دیتی ہے۔ منہ میں زخم ہو جائیں اور سفید سفید نشان بن جائیں، مسوڑ ھے خراب ہوجائیں اور دانت ملنے گئیس تو بشرطیکہ کاربووت کی کی دیگر علامتیں موجود مسوڑ ھے خراب ہوجائیں اور دانت ملنے گئیس تو بشرطیکہ کاربووت کی کی دیگر علامتیں موجود

ہوں،اس بیاری کا بھی یہی علاج ہے۔

معدے کے زخموں کے لئے بھی یہ ایک مفید دوا ہے۔ اس میں اسہال سخت متعفن اور بد بودار ہوتے ہیں اور جگر بھی متورم ہوجا تا ہے۔ تمام اعضاء ڈھیلے پڑجاتے ہیں اور رفتہ رفتہ ٹائکیں اور پاؤں مرجھانے لگتے ہیں۔ پاؤں میں کئی قسم کی تکلیفیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ویر یکوزوینز (Varicose Veins) میں بھی یہ مفید دوا ہے۔

کالی کھانسی کے آغاز میں اور کھڑ کھڑ اتی ہوئی کھانسی کے لئے بھی یہ اچھی دوا ہے۔ کھانسی کی علامتیں اگر رحم اپنی جگہ سے گرجائے اور سخت بد بودار سیاہ رنگ کا مواد نکلنے کئے تو کاربوو تج دینی چاہئے۔ آگر دودھ یلانے والی عورت کا دودھ کم ہوجائے اور کمزوری

سے دیا و بروں دیں چہے کہ در روح پہلے وہ کی دوک و در سے کہ اور کر اس کے مریض عموماً آگ لگنے، بہت ہوا وربار بار بخار ہوتا ہوتو کاربووج بہت مفید ہے۔اس کے مریض عموماً آگ لگنے،

چوری ہونے اور حادثات کی خوابیں دیکھتے ہیں۔

مددگاردوائیں: کالی کارب بے ڈروسرا دافع اثر دوائیں: کیمفر بے ایمبراگرییا بے آرسنک طاقت: 30 سے 200 تک

60 كار بالك ايسٹر CARBOLIC ACID

ایک زمانے میں کاربالک ایسٹر سے بنا ہوا صابن ہپتالوں اور ڈسپنسریوں میں جراثیم
کے خلاف حفظان صحت کے لئے بہت استعال ہوتا تھا۔ اس کی بو بہت تیز ہوتی ہے۔
ہومیو پیتھک دوا کے طور پر کاربالک ایسٹر کا استعال بالکل مختلف ہے۔ شہد کی قصیاں یا بھڑ
کاٹنے کی وجہ سے جب جسم میں خطرناک رڈمل اور الرجی ظاہر ہوتو اس میں کاربالک ایسٹر
کہترین دوا ثابت ہوتی ہے۔ اس کی ایک دوخوراکیں دینے سے ہی مکمل شفا ہوسکتی ہے۔
کاربالک ایسٹر احساسات پر اثر انداز ہونے والی دوا ہے۔ اس کے مریض کی سونگھنے کی صلاحیت غیر معمولی طور پر محسوس نہیں
ہوتی ایسے مریض کوفوراً محسوس ہوجاتی ہے۔ معمولی سی بوبھی جو عام طور پر محسوس نہیں
ہوتی ایسے مریض کوفوراً محسوس ہوجاتی ہے۔

کاربالک ایسڈ میں درد بہت شدید اور اچانک ہوتے ہیں۔ اچانک آتے ہیں اور اچانک آتے ہیں اور اچانک آتے ہیں اور اچانک چلے بھی جاتے ہیں۔ بعض اعضاء پر دبڑ کے بینڈ بندھے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ہونٹوں اور گالوں کے اندر سوزش کے حلقے بن جائیں تواس میں بھی کاربالک ایسڈ مفید ثابت ہوتی ہے۔

آ نکھ کے اوپر اور اس کے اردگر داعصا نی درد ہوتا ہے۔ اگرید درد آ نکھ میں اپنا مستقل مقام بنالے تو کاربالک ایسٹر مفید دوا ثابت ہوگی۔

اس کی ایک علامت یہ ہے کہ بھوک غائب ہوجاتی ہے، ہوا سے بیٹ میں تناؤ محسوس ہوتا ہے۔ بیٹ کے ایک خاص حصہ میں ہوا کا غیر معمولی زور کار بالک ایسڈ کی خاص علامت ہے کیونکہ کار بالک ایسڈ چھوٹے دائروں میں تشنجی کیفیات پیدا کرتا ہے۔ انسڑیوں وغیرہ کے کسی حصہ پراس کا اثر پڑتا ہے اور ایسی جگہوں پر ہوا تناؤ بیدا کرتی ہے۔

اس صورت میں کاربا لک ایسڈ کودیا در کھنا جا ہے ۔

کاربا لک ایسٹر کے مریض کے منہ کا مزا بگڑ جاتا ہے۔ پیاس مٹ جاتی ہے، بھوک کم ہو جاتی ہے۔ بھی شدید قبض اور بھی بہت اسہال لگ جاتے ہیں۔ اسہال بہت بد بودار ہوتے ہیں۔ اسہال بہت بد بودار ہوتے ہیں۔ اگر قبض ہوتو سانس سے بھی بد بو آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دوا میں بہت تعفن کا مادہ پایا جاتا ہے۔ قبض کے دوران جو متعفن ما دہ با برنہیں نکل سکتا وہ انتر پول کی جھلیوں کے مواستہ خون میں جذب ہوکر چھپھڑ وں تک پہنچتا ہے اور سانس میں بد بو پیدا کرتا ہے۔ کاربا لک ایسٹر البیومن (Albumen) کی بہت اہم دوا ہے۔ اس کے مریض کو اگر البیومن آئے تو آتی زیادہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ گتا ہے کہ پیشا ب کی بہت مفید ہے۔ اگر البیومن آئے تو آتی زیادہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ گتا ہے کہ پیشا ب کی بہت مفید ہے۔ کاربا لک ایسٹر کے مریض کورات کو باربار پیشا ب آتا ہے جو پروسٹیٹ گلینڈ کی خرابی سے بھی کورات کو باربار پیشا ب آتا ہے جو پروسٹیٹ گلینڈ کی خرابی سے بھی ہوسکتا ہے۔ یہ دوا گر دول اور پراسٹیٹ گلینڈ دولوں کی الفیکشن میں مفید ہے۔ اگر دات کو باربار پیشا بی عاجت محسوس ہوتو اس کو بھی زیر نظر رکھیں۔ بعض معاجین کا خیال ہے دات کو باربار پیشا بی عاجت محسوس ہوتو اس کو بھی زیر نظر رکھیں۔ بعض معاجین کا خیال ہے کہ اس تکیف میں ہید 1 پولیشی میں اچھا کا م کرتی ہے لیکن میرا اس بارے میں ذاتی تج بہ بہس سے میں ناتی تھیں میں اچھا کا م کرتی ہے لیکن میرا اس بارے میں ذاتی تج بہس سے میں سے بہت میں سے بیاں میں میں اس سے میں داتی ہوس سے میں داتی ہوس سے میں سے بیاں میں داتی ہوس سے بہت میں سے بیاں بیاں ہوس سے بیاں ہوتوں کی میں اس میں میں اس میں میں اس سے بیاں میں داتی ہوس سے بیاں میں داتی ہوس سے بیاں ہوس سے بیاں ہوتوں کی میں داتی ہوسکی میں دائی ہوسکی میں ہوتوں میں ہوتوں کی ہوسکی میں دائی ہوتوں کی ہوسکی میں داتی ہوتوں کی ہوسکی میں دائی ہوتوں میں اس میں دائی ہوتوں کی ہوتوں میں داتی ہوتوں کی ہوتوں میں داتی ہوتوں کی ہوتوں

کاربا لک ایسڈ کمر کے اذیت ناک درد میں بھی کارآ مد ہوسکتی ہے۔خاص طور پر <u>اگر</u> در د کمر سے نیچے دونوں کولہوں میں انرے تو بیاس کی خاص علامت ہے۔

اگر بچیوں میں آغاز بلوغت سے قبل کیکور یا ہوجائے تو کار بالک ایسڈشا فی دوا ثابت ہوسکتی ہے۔ ٹابت ہوسکتی ہے۔ اس کے مریض کے حیض اور لیکوریا کی رطوبت میں بد بوہوتی ہے۔ اگر کار بالک ایسڈ کا مریض ہوتو اس کے پاؤس اور ٹائلوں میں اینٹھن اور ہڈیوں میں درد کا رجحان بھی اسی دوا کے استعال سے ختم ہوسکتا ہے۔ اس کی جلدی علامات میں خارش بیدا کرنے والے چھالے ، جلن اور درد ملتے ہیں۔

دافع اثر دوائيں: سركه - چاك - آئيوڈم طاقت: 30 تك

61

كاربونيم سلفيوريثم

CARBONEUM SULPHURATUM (Alcohol Sulphuris-Bisulphide of Carbon)

کار بونیم سلف میں سلفراور کاربن کے عناصر موجود ہوتے ہیں لہذایہ بھی انسانی نظام پر ایک بہت گہرااثر کرنے والی دواہے۔اس کا دائر ہ بہت وسیع ہے اور بہت گہری بیاریوں میں کام آتی ہے۔

ہوجا تا ہے۔ دونوں کے اثر ات الگ الگ طریق پر ظاہر ہوتے ہیں۔

کی ہومیو پیتھک معالجین نے اپنے تجربہ کی بناء پر لکھا ہے کہ کار ہو پیم سلف چہرے پر ظاہر ہونے والے خطرناک مرض لیولیس (Lupus) کی بہترین دوا ہے اوراس سے کممل شفا ہو جاتی ہے۔ ہومیو پیتھک معالجین کواس پر مزید تجربہ کرنا چاہئے۔ میں نے اس سلسلہ میں کافی مطالعہ کیا ہے لیکن لیولیس کے بارے میں کوئی امتیازی علامت الیی نہیں ملی جواسے دوسری علامات سے الگ کردے۔

کینسر کو بڑھنے سے رو کئے کے لئے بھی کار بونیم سلف بہت مفید پائی گئی ہے۔
کاربن اور سلفر سے مل کرائیں دوابنتی ہے جو سارے انسانی جسم پر بہت گہرااثر ڈالتی ہے۔ جو دوا
لیوپس جیسی بیاری میں شفاد ہے سکے وہ لاز ماً بہت اہم اور گہری دوا ہوگی۔ مختلف قسم کے کینسر کی
شفا کے لئے الگ الگ دوائیں چاہئیں لیکن بعض دوائیں ایسی ہیں جو ہرقسم کے کینسر میں اتنا
فائدہ ضرور دے دیتی ہیں کہ ایک دوسال تک کینسر کی بڑھوتی رک جاتی ہے اور اس عرصہ میں
اصل دوا تلاش کی جاسکتی ہے۔ کار بونیم سلف، آرسنک، آئیوڈ ائیڈ اور گریفائیٹس، تین چوٹی کی
دوائیں ہیں جو کینسر میں مفید ہیں۔ جلد کے کینسر میں پائیر وجینم اور سورائینم بھی مفید ہیں۔ ان
میں فرق کرنا مشکل نہیں ہے کیونکہ ان کے مریضوں کی اپنی اپنی شخصیت اور مزاج ہوتے ہیں۔
میں فرق کرنا مشکل نہیں ہے کیونکہ ان کے مریضوں کی اپنی اپنی شخصیت اور مزاج ہوتے ہیں۔
علی خرق کرنا چاہئے جوانتڑیوں کے کینسر میں بھی بہت مفید ہے۔

کار بو پنم سلف جوڑوں کے درد سے بھی تعلق رکھتی ہے خصوصاً اگریہ تکلیف پرانی ہو جائے تو کار بو پنم سلف رفتہ رفتہ شفا دے دیتی ہے۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں شنج اور درد ہوتا ہے۔ جولہروں کی صورت میں حرکت کرتا ہے، بار بارعود کرآتا ہے۔ بازواور ہاتھ سن ہوجاتے ہیں۔اعصاب میں سوجن بھی نمایاں ہوتی ہے۔

کار ہونیم سلف کے دونوں عناصر کاربن اور سلفر ایک دوسرے سے متضاد علامات رکھتے ہیں۔سلفرگرم اور کاربن بہت ٹھنڈی دوا ہے۔اس میں بیرونی طور پر ہمیشہ سردی کا احساس ہوتا ہےاورجسم ٹھنڈار ہتا ہے لیکن اندرونی طور پر بعض جگہوں میں جلن ہوتی ہے۔سلفر میں مسلسل گرمی پائی جاتی ہے جوجسم کا جزوین جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں اور سر کی چوٹی جلتے ہیں۔ پلسٹیلا میں بھی گرمی کا احساس ہوتا ہے لیکن فرق سیہ ہے کہ پلسٹیلا میں پیاس نہیں ہوتی اور سلفر پیاس والی دواہے۔

کار ہوئیم سلف کا مریض سردی برداشت نہیں کرتا پاؤں ذرا بھی ٹھنڈ ہے ہو جا کیں تو فوراً بیار پڑجا تا ہے۔اگرکسی کا مزاج کار بوئیم سلف کا ہوتواسے اپنے پاؤں گرم رکھنے چا ہمیں۔

کار بوئیم سلف کی بعض علامتیں آرنیکا سے بھی ملتی ہیں۔ آرنیکا میں خواہ ظاہری چوٹ گئے نہ گئے نہ گئے، چوٹ سے مشابہ درد پیدا ہوتے ہیں جیسے جسم کوکوٹا پیٹا گیا ہو۔کار بوئیم سلف کی دردیں بھی اس سے مشابہ ہوتی ہیں۔ ذہنی علامتوں کے لحاظ سے بھی یہ بہت اہم دوا ہے۔ مریض بہت جوشیلا ہوتا ہے، قوتِ برداشت نہیں رہتی، غصہ بہت آتا ہے، کھوٹے کھرے کی تمیز ختم ہوجاتی ہے، خود کشی کرنے کار جحان بھی پایا جاتا ہے۔ سرمیں خشکی ،سکری اور بال جھڑنے کی علامات بھی مئی ہیں۔ آتکھوں کے پیوٹوں کی بیاریوں میں بھی کار بوئیم سلف بہت مفید ہے لیکن اسے متن ہیں۔ آتکھوں کی تیکوٹوں کی بیاریوں میں بھی کار بوئیم سلف بہت مفید ہے لیکن اسے آتکھوں کی تکلیفوں میں صرف اس وقت استعال کریں جب بیمزاجی دوا ثابت ہو۔

کاربونیم سلف میں سردردزیادہ تربائیں طرف ہوتا ہے لیکن دائیں طرف بھی ہوسکتا ہے۔
اس میں دائیں بائیں کافرق قطعی نہیں ۔ ہاں عموماً صرف ایک طرف دردہونے کار بھان پایاجا تا ہے۔
نظر کی کمزوری اور رنگوں کی پہچان کا فقدان بھی کاربو نیم سلف کی علامت ہے۔
کاربو نیم سلف میں کان سے بدبودار مواد نگلتا ہے جس میں خون کی آ میزش بھی ہوتی ہے۔
قوتِ سامعہ کمزور ہوجاتی ہے۔ کانوں میں گھنٹیاں بجنے کی آ واز آتی ہے۔ کانوں کی تکلیف
کی وجہ سے چکر آتے ہیں، جلد بے س ہوجاتی ہے، خارش کے ساتھ چھوٹے چھوٹے زخم بن
جاتے ہیں جو پھیلتے ہیں، چہرے پرکیل مہاسے بھی نکلتے ہیں۔ ایک اور بات جو
خصوصیت سے کاربونیم سلف میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جلداورا ندرونی جھلیاں رفتہ رفتہ
بے حس ہوجاتی ہیں اور زبان بھی احساس سے عاری ہو جاتی ہے۔ منہ کے اندرونی حص

خصوصاً زبان کا بے حس ہونا اس دوا کا نمایاں حصہ ہے۔وہ اعصابی ریشے جوجلدیا اندرونی جھلیوں کے قریب ہوں ان کا فالح کاربونیم سلف سے تعلق رکھتا ہے، اسے یا درکھنا چاہئے۔ دانت کے اعصاب کے کنارے ننگے ہوجا کیں تو وہاں سردی سے زود حسی پائی جاتی ہے۔

شخٹری ہوا سے دانت اور چہرے کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں اور صرف دانت کے اعصاب ہی نہیں سارے چہرے کے اعصاب نودحس ہوجاتے ہیں۔کاربونیم سلف میں غدودوں کی عمومی تنی بھی پائی جاتی ہے۔

کار بونیم سلف بہت می مردانہ کمزور بول میں بھی مفید ہے اور عور توں کی کمزور بوں میں بھی مفید ہے اور عور توں کی کمزور بوں میں بھی۔ بیضہ دانی (Ovary) پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور اس کے سکڑنے کی علامت اس دوا میں پائی جاتی ہے جو دراصل کینسر کا آغاز ہوتا ہے۔ دوانسبتاً اونچی طاقت میں استعال کرنی جائے۔ 200 طاقت سے آغاز اچھی تدبیر ہے۔

اگر پاؤل کی انگلیول اور ٹخنول میں اکڑ اؤ ہوتو کار بونیم سلف اگر مزاجی دوا ہوگی تو اسے بھی ٹھیک کردے گی۔

طاقت: 30 سے 1000،200 یا حسب ضرورت ایک لاکھ تک

62

كارسينوسن

CARCINOSIN

(کینسرکے مادہ سے تیار کردہ ایک دوا)

ہومیو پیچے ڈاکٹروں نے کینسر کے مواد سے مختلف ہومیو پیچےک دوائیں بنائی ہیں جن میں کارسینوس امتیازی مرتبہ رکھتی ہے۔اسے پھیپے طول کے کینسر Carcinoma کے فاسد ماد سے تیار کیا گیا ہے۔سب سے پہلے ڈاکٹر برنٹ (Dr. Brunt) نے اس پر تجربات کئے۔ بعد میں ڈاکٹر کلارک (Dr. J.H. Clarke) نے ان کے تجربات کوآ گے بڑھایا۔

کارسینوس سینے کے کینسر میں بہت مفید ہے۔ اگر ٹائلوں میں نیلے خون کی رگیں بڑھ جا نیں تو ان کو بھی کارسینوس سے افاقہ ہوتا ہے۔ اگر انترا یوں میں کینسر کار جان ہوتو کارسینوس کے اثر سے مریض کی انترا یوں سے خارج ہونے والے مواد پر پلنے والے گئ قتم کے چمونے اور دیگر کیڑے نفیلے میں نکلنے لگتے ہیں۔ علاوہ ازیں ایسے مریضوں کو جن میں خاندانی طور پر کینسر کی روایات ملتی ہیں جب بھی کارسینوس دی جاتی ہے اگر ان کے اندر کینسر کا دبا ہوا مادہ ہوگا تو ضروران کے گلوں کے غدود پھول جاتے ہیں اور جو بہت پر در دہوتے ہیں۔ یہ بہت قطعی علامت ہے جو اگر چہ کتابوں میں نہیں کھی ہوئی گر مجھے اپنے تجربہ سے معلوم ہوئی ہے۔ اس امر کا کسی مخصوص ملک ،علاقے یا آب و ہوا سے تعلق نہیں بلکہ یہ بات دنیا بھر پرُ کیساں اطلاق پاتی ہے۔ جن لوگوں میں بیرون کو بیرون کو بیران کو بیران کا کہ میں بیرون کو بیرون کو بیران کو بیرون کو بیران کو بیرون کو بیران کو بیرون کو

ڈاکٹر کینٹ نے کارسینوس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سے کینسر کے درد کی شدت، چیس اور جلن میں کمی آ جاتی ہے۔ مریض کئی سال چین سے زندہ رہتا ہے۔

کینٹ کے نز دیک اگر چہ مکمل شفانہیں ہوتی گرکینسر پھیلنے کی رفتار بہت کم ہوجاتی ہے اور تکلیف کا فی حد تک قابو میں آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر کینٹ کی با تیں اکثر درست ہوتی ہیں۔ اس لئے غالبًا ان کا یہ تبصرہ بھی درست ہوگا۔لیکن میں نے کینسر کے بعض مریضوں میں کارسینوسن کواس طرح کا میابی سے استعمال کیا ہے کہ پھر سالہا سال تک ان میں کینسر کی کوئی علامت لوٹ کرنہیں آئی گرمریضوں کی اکثریت کے معاملہ میں کینٹ کا بیان ہی درست ہے۔

کارسینوس کے علاوہ دودوا کیں کینسر کے زخم پر پلنے والے بیکٹیر یا سے تیار کی گئی ہیں۔ یہ دونوں کینسر کے علاج میں زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوئیں۔ مائیکر وکو کسین (Micro Coccine) مائیکر وکو کس جر ثومہ سے تیار کی گئی ہے۔ ڈاکٹر ونیٹر نے اسے صرف کینسر کی زود حسی دور کرنے میں مفید پایا ہے۔ دوسری دوااوسلوکو کسین (Oslo Coccine) ہے جواگر چہ کینسر میں فائدہ مند نہیں ہے مگر انفلوئنزا میں بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔ ڈاکٹر فوبسٹر (Dr. Fobester) نے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ کارسینوس کھانے سے کینسر کی سب علامتیں پروونگ اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ کارسینوس کھانے سے کینسر کی سب علامتیں پروونگ ہوتی جوتی بلکہ جن حصوں میں کمزوری ہو وہاں پچھ تبدیلی ظاہر وقتی ہے۔ ہوسکتا ہے (Lymphatic Glands) کارڈِمل گئے کی سوزش کی صورت میں اسی وجہ سے ظاہر ہوتا ہو کہ ان میں کینسرکا مادہ پایا جاتا ہو۔ ان سب باتوں میں ابھی تحقیق کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر فوبسٹر نے اپنا ایک تج بہ بتایا ہے کہ کارسینوس کھانے کے دیں دن بعد جسم کا درجہ حرارت زیادہ ہوجا تا ہے اور بخارر سیخلگتا ہے۔

ڈاکٹر فوبسٹر کے مطابق جن مریضوں میں کینسر کار جھان ہوان میں مندرجہ ذیل دوائیں مفید ثابت ہوتی ہیں۔ ٹیو برکولینم ، میڈ ورایئنم ، نیٹرم میوراورسپیا۔ان دواؤں کا تفصیلی ذکر کتاب میں موجود ہے۔الیو مینا، آرسنک الیم، آرسنک آیوڈائیڈ، پلسٹیلا، سٹفی سگریا، فاسفورس اورکلکیریا فاس وغیرہ بھی بہت مفید ہیں اور کینسر کے تعلق میں زیر نظر رہنی جا ہئیں۔سییا اورسٹفی سگریا کا جذبات کو دبا دینے کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی بھاریوں جا ہئیں۔سییا اورسٹفی سگریا کا جذبات کو دبا دینے کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی بھاریوں

سے تعلق ہے جن میں سے ایک کینسر بھی ہوسکتی ہے۔ فاسفورس اور کلکیریا فاس کا ہڈیوں کے کینسر سے گہراتعلق ہے اور یہ بھی پھڑووں سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ لائیکو پوڈیم کا تعلق پتے اور لیلے (Pancrias) کے کینسر سے ہے۔ اس میں بیخو بی ہے کہ بیجگر کے لعاب یعنی صفراء کو پتلا کرتا ہے اور وہ نارال ہو جاتا ہے۔ سلیٹیا کو پراسٹیٹ کے کینسر میں بہت مفید پایا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ایڈز کی انتہائی مہلک بھاری میں بھی سلیٹیا CM طاقت میں انتہائی موثر فابت ہوئی ہے۔ ایڈز بھی کینسر ہی کی طرح ایک لا علاج بھاری سجی جاتی ہوئی ہے۔ مختلف مما لک فابت ہوئی ہے۔ ایڈز بھی کینسر ہی کی طرح ایک لا علاج بھاری سجی جاتی ہوئی ہوئی میں ایڈز پر میرے زیر گرانی سلیٹیا ہے۔ کینسر سے تعلق رکھنے والی دواؤں پر مزید تحقیق ہوئی سلیٹیا نے جیرت انگیز اثر دکھایا ہے۔ کینسر سے تعلق رکھنے والی دواؤں پر مزید تحقیق ہوئی سلیٹیا نے جیرت انگیز اثر دکھایا ہے۔ کینسر سے تعلق رکھنے والی دواؤں پر مزید تحقیق ہوئی حواد کے بعد ہومیو پیتھک دواد کے کر دوبارہ ٹیسٹ ہوں تا کہ جن مریضوں کو لینی طور پر فائدہ ہوا ہے ان کی اندرونی تبدیلیوں کاعلم ہو سکے کہ ان میں کیا تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ اس کے لئے جدیدترین کلینیکل لیباریٹریٹر سے تعاون لینا پڑے گا۔

سب ہومیو پیتھک دواؤں کو کینسر کے حوالے سے غور سے پڑھیں اور پھرسب علامات کے فرق کو ذہن نشین کرلیں۔اس طریق پر کار بند ہونے سے آپ خود بھی استفادہ کرسکیں گے اور تمام بنی نوع انسان کو بھی فائدہ پہنچاسکیں گے۔شرط یہ ہے کہ اپنے کامیاب تجربات کو بخل سے کام لیتے ہوئے اپنے تک ہی محدود نہ رکھیں۔

کارسینوس، ریڈیم برومائیڈ (Radium Bromide) کے ساتھ ادل بدل کر CM پڑینسی میں دینا تا بکاری کے مہلک اثر ات سے طبعی دفاع پیدا کرسکتی ہے۔ كارسينوسن 258

مدد گارد وائنس: ریڈیم برومائیڈ نیز کینسر کی نوعیت اور حملے کی شدت کے اعتبار سے مذکورہ مالا دوا کیس جواس کی مدد گار بتائی گئی ہیں ان میں سے کوئی ایک پاایک سے زائد حسب ضرورت استعال ہوسکتی ہیں۔عام طور پر مڈیوں اور چھیپھ^و وں میں کینسر کااثر تھیلنے سےرو کنے کے لئے فاسفورس اور برائیونیا بہت ضروری ثابت ہوتی ہیں۔ان کو اس مقصد کے لئے اکثر 30 طاقت میں ہی استعال کرنا جاہئے۔30 طاقت کام کرنا چھوڑ دے تو پھر 200 طاقت میں دی جائیں۔ طاقت: 200 سے ایک لا کھ طاقت میں مفید ثابت ہوئی ہے۔ تکرار: عام طور پر 15 دن میں ایک بار کافی ہے مگر کینسر کے شدید حملے کی صورت میں خصوصاً جبکہ جراحی کاعمل ہو چکا ہو پہلے چندروز، روزانہایک لاکھ میں ایک خوراک دی جاسکتی ہے۔ جراحی کے مل کے بعد یے چینی کودور کرنے کے لئے آ رسنیک CM بھی بہت زوداثر ثابت ہوتی ہے جسے ایک خوراک دینے کے بعداس وقت تک نہ دہرایا جائے جب تک یے چینی کا حملہ دویا رہ مائل بشد ت نہ ہو۔ایسی صورت میں ضرور دہرائیں۔

63 کارڈس میریانس CARDUUS MARIANUS

کارڈس میریانس جگر کی ایک بہت اہم دوا ہے۔ میں نے اسے بارہا جگر کے مریضوں میں با قاعد گی سے استعال کروایا ہے۔ اسے لمباعرصہ کھلاتے رہنے سے بھی کوئی منفی اثر نہیں دیکھا۔ اس دوا کا خاص اثر جگراور دورانِ خون کے نظام پر ہوتا ہے۔

گواسے عموماً جگری دواہی سمجھا جاتا ہے کیکن اس میں اور بھی بہت ہی علامتیں ملتی ہیں مثلاً اس کے مریض میں نکسیر بہنے کا رجحان ہوتا ہے اس کے ساتھ سر پر شخنڈی ہوامحسوس ہوتا ہے ، ڈیلا باہر کوا بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہوتی ہے ، آنکھوں میں باہر کی طرف دباؤمحسوس ہوتا ہے ، ڈیلا باہر کوا بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بیلا ڈونا میں بھی یہ علامت ہے ۔ کارڈس میریانس میں پہلے ناک میں جلن محسوس ہوتی ہے پھرنکسیر پھوٹتی ہے۔

کارڈس میریانس میں معدے کی علامتیں بھی ملتی ہیں کیونکہ جگر خراب ہوتو معدہ ضرور متاثر ہوتا ہے۔ منہ کا مزہ کڑوا ہوجا تا ہے یا پھیکا اور بدمزہ ۔ زبان گندی ہوجاتی ہے، کھانے کی خواہش مٹ جاتی ہے۔ معدے کی خرابی سے پیدا ہونے والی بد بوبھی آتی ہے۔ اگر معدے میں بیاحساس ہو کہ درد بائیں سے دائیں طرف حرکت کررہا ہے تو بیجھی کارڈس میریانس کی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جگر کی بیاری معدے تک پھیل گئی ہے۔ اس صورت میں سیاہ رنگ کے خون کی قے آتی ہے۔ دائیں پسلیوں میں اور سینے میں درد ہوتا ہے جو حرکت سے بڑھتا ہے۔ سینے کا درد کندھوں، کمراور پیٹ تک پنچتا ہے۔

بائیں جانب لیٹنے سے دائیں طرف در دہوتا ہے جیسے کوئی نیچے کی طرف گھیدٹ رہا ہو۔ پیملامت اور بھی بعض دواؤں میں ملتی ہے۔ ید دوایتے کی بیھر یول میں بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔ یتے کی جھلی کے اویر سوجن آ جاتی ہےاور در دہوتا ہے۔ تلی کے یاس چیجن کا احساس ہوتا ہے۔ بائیں طرف کی جلد بہت زود حس ہوجاتی ہےاورد کھتی ہے۔شدیقبض ہوجاتی ہے جوسلسل جاری رہتی ہے۔اجابت مٹیالے رنگ کی ہوتی ہے۔خونی بواسیر بھی ہوجاتی ہے۔ بیشا ب اکثر گہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ جگری بیاریوں کی وجہ سے کھانسی ہوجاتی ہے۔جس کااثر دائیں چھیپھڑے کے نچلے حصہ یر ہوتا ہے۔ چیلی ڈونیم اور ایسکولس کے مریضوں کی طرح شانے کی چیٹی مڈی (Scapula) میں درد ہوتا ہے۔ دائیں کو لیے کی ہڑی اور جوڑ میں بھی درد ہوتا ہے جو نیچے ٹا نگ تک بھیاتا ہے۔ نشنج بھی ہوتا ہے۔اگر کو لہے کی تکلیفیں حرکت سے بڑھیں تو اس میں کارڈس میریانس بہت مفید دوا ہے۔ کارڈس میریانس میں ویریکوزوینز Vericose) (Veins ابھرنے کا رجحان بھی ملتا ہے۔ وہ تمام دوا ئیں جن میں سیاہ خون بہنے کی علامت یا ئی جاتی ہےان میں نیلی رگوں کے جالے بننے کار جحان بھی ملتا ہے۔ یاؤں متورم ہوجاتے ہیں۔ یا وُں اور پنڈلیوں میں تشنج ہونے گتا ہے جس کی وجہ سے چلنامشکل ہوتا ہے۔اگر تیز چلنے سے تشنج ہوتو برائیونیا اور آرنیکا ملا کر دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔کارڈس میریانس کے مریضوں کی تکلیف جب بڑھ جائے تو چندقدم چلنے سے بھی تشنج ہونے لگتا ہے۔ یا وُں میں کمزوری کا احساس ہونا ہے کارڈس میریانس ایسے انفاؤئنز امیں بھی مفید ہے جس میں جگر متاثر ہو۔

طاقت: Q ہے 30 تک کیکن اکثر مدر ٹنگجر میں استعال کی جاتی ہے

64 کولو**فائیلم** CAULOPHYLLUM

کولوفائیلم ہاتھ اور پاؤں کی انگیوں کے جوڑوں میں نقرس یعنی Gout کی وجہ سے درداور تختی پیدا ہونے کا اچھا علاج ہے۔ نقرس نہ بھی ہوتو ہاتھ پاؤں کی انگیوں اور جوڑوں کے عمومی درد میں اور جگہ بدلتے رہنے والے دردوں میں بہت کارآ مدہے عام طور پر ماؤف حصوں میں شنج کار ججان ماتا ہے۔

کولوفائیلم کو میں نے مخصوص علامتوں والے کنگڑی کے درد (Sciatica) میں بھی بہت مفید پایا ہے حالانکہ اس بہلو سے اس کا کتابوں میں ذکر نہیں ملتا۔ یہ درد کمر سے دونوں ٹانگوں میں یا بعض دفعہ ایک ٹانگ میں نیچ اتر تا ہے اور کولوفائیلم کی مریض عور توں میں حمل کے دوران جو تکلیفیں ملتی ہیں ان سے مشابہت رکھتا ہے۔ اسی مشابہت کی بنا پر میں نے اسے ننگڑی کے درد میں کا میابی کے ساتھ استعال کرا کے دیکھا ہے۔ کنگڑی کے درد کو انگریزی میں مختصراً کے درد میں کا میابی کے ساتھ استعال کرا کے دیکھا ہے۔ کنگڑی کے درد کو انگریزی میں مختصراً کے درد میں کامیابی کے ساتھ استعال کرا کے دیکھا ہے۔ کنگڑی کے درد کو انگریزی میں مختصراً کے درد میں کامیابی اسے جودراصل ان اعصاب کانا م ہے جن میں یہ درد پایا جاتا ہے۔

کولوفائیلم عورتوں کے لئے دوران حمل بہت ہی مفید اور اہم دوا ہے۔ یہ رحم کو طاقت بخشی اور مضبوط بناتی ہے۔ میں نے بہت دفعہ ایسے موقعوں پر جب حمل ضائع ہونے کا شدید خطرہ تھا کولوفائیلم کواستعال کروایا ہے۔ اللہ کے فضل سے حمل کا بقیہ زمانہ بخیر وعافیت گزرا۔ اگر بچہ کی بیدائش کے وقت در دیں رحم کی طرف منتقل ہونے کی بجائے دونوں رانوں کے اندر کی طرف یا ران کے پیچھے کی طرف عرق النساء (Sciatica) کے اعصاب کے خطوط پر اتریں اور رحم کی گردن میں شنج ہوتو کولوفائیلم بہترین ثابت ہوتی اعصاب کے خطوط پر اتریں اور رحم کی گردن میں شنج کولوفائیلم بہترین ثابت ہوتی ہے۔ سیکیل کاربھی فم رحم کے شنج کی دوا ہے لیکن اس کا شنج کولوفائیلم کے شنج سے بہت زیادہ سخت ہوتا ہے اور سیکیل کی دوسری علامتیں اسے کولوفائیلم سے واضح طور پر

جدا کردیتی ہیں۔ اگرایسی تکلیف سیکیل کے غلط استعال سے پیدا ہوتو اس کے توڑ کے طور پر کو فائیلم کام آسکتی ہے۔ بعض معالج حمل کے آخری مہینہ میں با قاعد گی سے تیس طاقت میں کولو فائیلم دیتے ہیں۔ اس سے وضع حمل میں بہت آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور زیجگی کا بیہ عرصہ سہولت سے گزرتا ہے اور کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی۔

وہ جنین جورحم میں تر جھا پڑا ہواس کی قدرتی پیدائش قریباً ناممکن ہوتی ہے اس کے لازماً عمل جراحی کے ذریعہ سے اسے نکالنا پڑتا ہے۔ پلسٹیلا دینے سے بھی اس کی پوزیشن درست نہیں ہوتی۔ اگر کوئی دوا کام آسکتی ہے تو وہ کولوفائیلم ہے جسے 200 طاقت میں آر نیکا 200 کے ساتھ ملا کر دینے سے بسااوقات جنین کی حالت درست ہوجاتی ہے۔ اگرایک دو ہفتے تک ہفتہ میں دوتین بارآر نیکا اور کولوفائیلم 200 طاقت میں دینے سے کوئی واضح فائدہ نہ ہوتو غالباس کا علاج صرف بروقت جراحی سے ہو سکے گاجس کے متعلق کوئی اچھا سرجن ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ کب ہونی چاہئے؟ بعض اوقات حمل کے ایام پورے ہونے سے پہلے ہی جراحی ضروری جھی جاتی ہے۔

اگرغورتوں کے چہرہ پر بھور نے تائیں تک آئیں تو کولوفائیلم اس کی بہترین دوا ہے جو بعض دفعہ مردوں میں بھی کام آتی ہے۔ اس کے استعال سے بھی تو اتنا فائدہ پہنچتا ہے کہ چہرہ بالکل صاف ہوجاتا ہے اور تلوں کا نام ونشان مٹ جاتا ہے۔ چہرے کی جلد کارنگ بدل جائے اور سیا ہی سی چھا جائے تو اس کی بھی کولوفائیلم دوا ہو سکتی ہے جوا بنی دیگر عمومی علامتوں سے پہچانی جائے گی۔ اس کی اولین دوا آرسنگ سلف فلیوم جوا بنی دیگر معمومی علامتوں سے پہچانی جائے گی۔ اس کی اولین دوا آرسنگ سلف فلیوم کو این دوا آرسنگ سلف فلیوم کو این دوا آرسنگ سلف فلیوم کا مریضہ ہوتوں میں سیکیل کور ہی رنگت درست کرسکتی ہے۔ کولوفائیلم کا اثر کافی (Scale Cornatum) سے زائل ہوجاتا ہے۔ اس لئے اس دوا کے استعال کے دوران کافی سے پر ہیز کرنا چاہئے۔

مددگاردوا: آرنیکا طافت: 30سے 200 تک كاستيكم 263

65 کاسٹیکم CAUSTICUM

کاسٹیکم ایک بہت گہرااثر رکھنے والی دوا ہے جو عام روزمرہ کی بیاریوں میں بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اسے عموماً فوری علاج کے لئے اور عضلاتی فالج خصوصاً لقوہ کے لئے ہی استعال کیا جاتا ہے حالانکہ وہ امراض بہت ہیں جن میں کاسٹیکم مفید ہے۔ کاسٹیکم کے اکثر امراض آ ہستہ آ ہستہ بڑھتے ہیں۔ اگر سردی لگنے کی وجہ سے فالجے ہوجائے توسمجھا جاتا ہے کہ اچا نک ہوگیا ہے لیکن دراصل میسردی چنددن پہلے گئی ہے اور رفتہ رفتہ جسم میں بے چینی، کمزوری اور تھکا وٹ کا احساس ہونے لگتا ہے پھر فالج کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اچا نک فالج کی امراج ایکونائٹ میں پایا جاتا ہے۔ کاسٹیکم میں دو تین دن پہلے یا کم از کم چوہیں گھٹے پہلے سردی لگنے سے اس کے بدائر ات آ ہستہ آ

ایسے مریضوں میں جہاں خوف وجہ نہ ہو بلکہ ہکلانے کا آغاز زبان کے جزوی فالج سے ہوا ہو کاسٹیکم بہترین علاج ہے۔ اس فالج کے نتیجہ میں اگر بچہ ایک دفعہ ہکلانا شروع کر دے تو خوف بھی آخر ساتھ شامل ہوجاتا ہے۔ ایسے موقع پراگر سٹرامونیم کے ساتھ کاسٹیکم ملاکر دی جائے تو فالج کا اثر بہت جلد زائل ہونے لگتا ہے۔

کاسٹیکم کی بیاریوں میں اعصاب پر ایبااثر ہوتا ہے جواعضاء کامستقل حصہ بن جاتا ہے۔گلٹیاں سخت ہوکراکڑ جاتے ہیں۔ ہے۔گلٹیاں سخت ہونے لگتی ہیں۔اگر فالج کا بہت لمبااثر ہوتواعضاء سخت ہوکراکڑ جاتے ہیں۔ اگر دیگر علامات بھی کاسٹیکم کی ہوں تو یہ بہترین علاج ہے۔

ہسٹریا بھی آ ہستہ آ ہستہ بڑھتا ہے اور اس کے دوروں میں رفتہ رفتہ شدت پیدا ہونے لگتی ہے بیہاں تک کہ شنج شروع ہو جاتا ہے۔ کاسٹیکم کی علامات رکھنے والا مریض بہت حساس ہوتا ہے، شور اور ذراسی کمس بھی برداشت نہیں کرسکتا، سردی اور گرمی دونوں ہی موافق نہیں۔ عموماً اسلیحا سیلے عضلات پرشنج کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ جوڑوں کے درد میں گرمی پہنچانے سے آرام آتا ہے، سوائے انگلیوں کے جہاں گرمی کی بجائے سردی سے آرام ملتا ہے۔ اس کی کھانسی میں بھی یہی مزاج ہے کہ ٹھنڈے پانی سے آرام آتا ہے۔ پس اگر مریض کا مزاج کی سٹلیکم کا ہوتو اس کوعموماً گرمی سے تکلیف پہنچتی ہے سوائے گلے اور ہما گرمی سے تکلیف پہنچتی ہے سوائے گلے اور ہما تھوں کے۔ کاسٹیکم بے چینی پیدا کرنے والی دوا ہے۔

کاسٹیکم کا مُرگی کے آغاز سے بھی تعلق ہے۔ سرکی ساخت کی خرابیوں میں اور خطرناک حادثات کے خرابیوں میں اور خطرناک حادثات کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی مرگی کسی علاج سے ٹھیک نہیں ہوا کرتی بلکہ اس کا علاج اگرممکن ہے تو سرجری سے ممکن ہے۔ اس ضمن میں امریکہ کے ایک ڈاکٹر کو دائمی مرگی کے 34 کا میاب ایریشن کرنے یرنوبل انعام بھی ملاتھا۔

کاسٹیکم کی ایک علامت یہ ہے کہ اگر جلٰدی امراض کو دبا دیا جائے تو د ماغی امراض پیدا ہوجاتی ہیں۔

سر درد جو فالح پر منتج ہواس کی بھی کاسٹیکم دوا ہوسکتی ہے۔ بعض قتم کی سر در دسے مریض وقتی طور پر اندھا ہوجا تا ہے۔ اگر ایسی سر در دسے بینا ئی جاتی رہے کین کچھ عرصہ کے بعد واپس آ جائے اور کوئی فالجی علامت ظاہر نہ ہوتو کاسٹیکم کی بجائے حکسیمیم زیادہ مؤثر ہوگی۔ اگر فالجی علامتیں ظاہر ہوں تو پھر کاسٹیکم دواہے۔

آ نکھوں کے چھپر کا تدریجی فالج بھی کاسٹیکم کیکا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ مرض چونکہ ست رفتار ہے اس لئے شفا کاعمل بھی وفت چا ہتا ہے۔مستقل مزاجی سے علاج جاری رکھنا جا ہے کبھی بھی سلفر کے ساتھ ادلنا بدلنا بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔

بعض اوقات آنکھوں میں مختلف قتم کے دھے نظر آتے ہیں۔ سبز رنگ کے دھے کاسٹیکم کی خصوصی علامت ہیں۔ کاسٹیکم میں مسے بھی بہت ہوتے ہیں۔ اگر باریک اور نرم نرم ہوں تو تھو جااور میڈورائینم دونوں مفید ہیں۔ لیکن اگر بہت بڑے بڑے اور بکثر ت مسے ہوں تو کاسٹیکم اور نائٹر کیم ایسٹر زیادہ مفید ہیں۔ ان دونوں کے مسے الگ الگ

پہچانے جاتے ہیں۔ کاسٹیکم کے مسے چہرے اور ناک پر نکلتے ہیں۔ ناک پر موٹا سامسہ نکل آئے تو یہ کاسٹیکم کی خاص نشانی ہے۔

کاسٹیکم کی ایک اور علامت گلے کے اندر فالجی کیفیات کا پیدا ہونا ہے۔ کاسٹیکم میں صبح کے وقت گلا بیٹھتا ہے۔ کاسٹیکم کے گلے کی فالجی علامات تدریجاً پیدا ہوتی ہیں اور نگلتے ہوئے خطرہ ہوتا ہے کہ لقمہ غلط نالی میں نہ چلا جائے۔الیی بہت ہی اور دوائیں بھی ہیں مگر کام وہی آئے گی جومزاجی ہو۔

کاسٹیکم کا مزاجی مریض وہمی نہیں ہوتا اور کاسٹیکم کے مریض کی بھوک بعض دفعہ کھانا دیکھتے ہی ختم ہوجاتی ہے۔

کاسٹیکم میں یہ علامت نمایاں ہے کہ اگر انتر یوں میں خصوصاً بڑی آنت کے آخری حصہ (Rectum) میں فالج ہور ہا ہوتو اجابت غیر شعوری طور پر ہوتی رہتی ہے کیونکہ وہاں فضلہ جمع ہوکر گھلیاں ہی بن جاتی ہیں۔اس کئے چلتے پھرتے وہی گھلیاں لاشعوری طور پر نکلتی رہتی ہیں۔ گو ایسے مریض بہت کم ملتے ہیں مگر میرے مشاہدہ میں بھی دو تین

ایسے مریض آئے ہیں۔ایسے تمام مریض بوڑھے تھے۔

کاسٹیکم کے مریض کی زبان پرسرخی مائل چبک پائی جاتی ہے۔خواتین کے ماہانہ ایام کے دوران خون آنے سے پہلے اور بعد میں شنج ہوتا ہے لیکن حیض کے دوران تشنجی علامات نہیں ہوتیں۔اگرخون رک جائے تو تشنج ہوگا، چل پڑے تو تشنج ٹھیک ہوجائے گا۔

اگر ماہانہ ایام کے دوران کوئی صدمہ پہنچ جائے یا کسی وجہ سے خوف طاری ہو یا کسی عزیز کی وفات ہو جائے تو حیض بند ہوجاتے ہیں۔اس صورت میں کاسٹیکم بھی دوا ہوسکتی ہے۔اسی طرح کسی صدمہ یاغم کی خبر سے دودھ پلانے والی عورتوں کا <u>دودھ خشک</u> ہوجاتا ہے۔اسی طرح کسی صدمہ یاغم کی خبر سے دودھ پلانے والی عورتوں کا <u>دودھ خشک</u> ہوجاتا ہے۔اس وقت بھی کاسٹیکم مفید ہے۔

کاسٹیکم کے مریض کے گلے کے فالج کا صرف نگلنے کے عضلات سے ہی تعلق نہیں ہوتا بلکہ بولنے کے آلے پر بھی بیا ثرانداز ہوتا ہے۔

فاسفورس، برائیونیا اور کاسٹیکم ۔ یہ تین دوائیں ایسی ہیں جن کی آپس میں مثابہت ہے۔اگرانہیں عارضی بیاریوں میں ملاکر دیا جائے تو نقصان نہیں پہنچتا بلکہ شبت اثر برخ ھ جاتا ہے۔ یہ نسخہ 30 طاقت سے اونچا استعال نہیں کرنا چاہئے۔لیکن اگر یہ نسخہ کام نہ کر سے اوراس میں شامل کوئی ایک دوا مریض کی علامتوں سے زیادہ مشابہ ہوتو نسخہ ناکام بھی ہوجائے تو وہ اکیلی دواکام کر جاتی ہے۔

مددگاردوائیں: کاربووجے۔ پیٹروسیلینم (Petrosel) دافع اثر دوائیں: کولوسنتھ۔ڈلکا مارا۔ گائیکم کیس وامیکا طاقت: 30 سے سی۔ایم (CM) تک سيانونھس

66 سيانونھس EANOTHU

CEANOTHUS

سیانوهس ، نیوجری امریکہ میں اگنے والی ایک چائے کی طرح کی ہوٹی کا نام ہے۔ یہ بنیادی طور پر تلی (Spleen) کی دوا ہے۔ ملیریا کی وجہ سے تلی متاثر ہوتی ہے۔ ایسامریض خون کی کمی کا شکار ہوجا تا ہے۔ اس کی تکلیفیں عموماً بائیں طرف نمایاں ہوتی ہیں۔ اس طرف ہو جھاور ابھار محسوں ہوتا ہے۔ صرف جگر بڑھنے کے نتیجہ میں پیٹ کے دائیں طرف شخی ملتی ہے مگر تلی بھی خراب ہوجائے تو دونوں طرف شخی محسوں ہوگی۔ تلی کی خرابیوں کے لئے اس سے بہتر دوا میر ے علم میں نہیں۔ اگر تلی میں شخی پیدا ہوجائے تو خون کی شریا نیں شخت ہوجاتی ہیں۔ اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے ایسے مزمن بلڈ پریشر میں جس کا تعلق جگر اور تلی سے ہوسیا نوھس کو استعمال کرنا چاہئے۔ یہ خون کے دباؤ کو کم کرتی ہے۔ بلڈ پریشر کا تعلق عموماً دل اور گردے سے ہوتا ہے لیکن جب بھاری کا مرکز جگر اور تلی ہوتو اس صورت میں سیانو تھس دینی چاہئے۔

بعض دفعہ وہ عورتیں جن کے جسم میں خون کی کمی ہوجائے انہیں حیض کا خون مسلسل آنے گتا ہے جوخون ملے پانی کی طرح کچلہوا ہوتا ہے اور بندنہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں بھی سیانوھس بہت مفید دواہے۔

جگراورتلی کے مریض کو قبض یا اسہال میں سے کوئی ایک عارضہ ضرور لگار ہتا ہے۔
سیانو تھس کے مریض کو زیادہ تر اسہال گئتے ہیں۔ بیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہے۔
بیشا ب جھاگ دار ، سبزی مائل ہوتا ہے اور اس میں صفراء اور شوگر دونوں پائے جاتے
ہیں۔ اسی تعلق میں ایک دوا ٹینو سپورا کارڈی فولیا (Tinospora Cordifolia)
ہیں۔ سی تعلق میں ایک دوا ٹینو سپورا کارڈی قولیا ہوتی ہے اور

268

سانوھس اسے بہت مفید پایا گیا ہے۔ . اس کی تکالیف میں حرکت کرنے اور بائیں طرف لیٹنے سے اضافہ ہوتا ہے۔

طاقت: مدر نیج ریا x1

كيموميلا كيموميلا

67

كيموميلا

CHAMOMILLA

کیمومیلا ایک ایسی ہوئی سے تیار کی جانے والی دوا ہے جوگندم اور کمئی کے کھیتوں میں اگتی ہے۔ اسے مختلف بھاریوں کے علاج میں استعمال کیا جاتار ہا ہے۔ خصوصاً بچے کی پیدائش کے بعد رحم کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لئے مفید ہے۔ اکثر لوگ اس کی پتیوں کو بطور چائے بھی استعمال کردوا تیار کرتے ہیں۔ ہومیو پیتھی میں اس کے تازہ پود ہے کو پھولوں سمیت پیس کر الکھل میں ملا کردوا تیار کی جاتی ہے۔ یہ بہت حساس اور زودر نجے بچوں کی دوا ہے جو بہت ضدی اور خصیلے ہوتے ہیں۔ ذرا ذراسی بات پر ان کا پارہ آسمان پر چڑھ جاتا ہے۔ بیمار ہوجا کیس تو آئیس سنجالنا مشکل ہوتا ہے۔ جس طرح بھی بہلانے کی کوشش کریں غصہ کم نہیں ہوگا۔ کوئی چیز مانگیں گے لیکن ملنے پر پھینک دیں گے۔ کہیں جانا چا ہیں تو وہاں بہنچ کرد ھکے دیں گے کہ مجھے کیوں یہاں لائے ہو؟ غصہ کی حالت میں برتمیز ہوجاتے ہیں۔

اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کیمومیلا کا مریض واقعناً عام لوگوں کی نسبت تکلیف کو زیادہ محسوس کرتا ہے۔ اس کی بیاریاں اعصاب اور جذبات سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ بے انتہا حساس لوگوں کی دوا ہے جو بظاہر بدخلق بھی ہوں لیکن اندرونی طور پر بے حدحساس ہوتے ہیں۔ خاموش رہتے ہیں لیکن معمولی ہی بات پر بھی ایک دم خصہ میں آجاتے ہیں، اعصا بی تناوی پیدا ہوجا تا ہے۔ بظاہر بہت خاموش اور سست رود کھائی دیتے ہیں۔ ایسے مریض کو کیمومیلا اونچی طاقت میں فوری فائدہ پہنچاتی ہے۔ ایک تو احساسات اعتدال پر آجاتے ہیں، دوسرے باقی دواؤں کو کام کرنے کا موقع مل حاتا ہے۔

یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی جاہئے کہ مریض پر کوئی جنون سوار ہوتو جب

تک وہ ٹھیک نہیں ہوگااس وقت تک عام دواؤں کوجو فائدہ دینا چاہئے وہ نہیں دینتیں کیونکہ سارے جسم کی توجہ ایک خاص طرف ہی رہتی ہے۔انسانی رڈمل توجہ کوچا ہتا ہے۔

اگر کیمومیلا کا مریض ہواور بعض علامتیں کیمومیلا کی نہ ہوں تو عین ممکن ہے کہ وہ معین یاری ٹھیک نہ ہو کیون ہے دوا کا ایک آ دمی کے مزاج کے سوفیصد مطابق ہونا ضروری نہیں۔انسانی جسم بہت ہی وسیع اور بہت پیچیدہ نظام رکھتا ہے اس لئے بعض دفعہ ایک دوا کے بعد اور دواؤں کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔

بچوں کو معمولی سی تکلیفوں اور بخار وغیرہ سے تشنجے ہوجائے ، اگر مزاج کیمومیلا کا ہوتو فوری فائدہ دیتی ہے۔ کیمومیلا بچوں کی پیچیش میں بہت اچھی دواہے۔ ایسی پیچیش جولیس دار ہواور سنر رنگ کی ہو جیسے اس میں گھاس کتر کر ڈالا گیا ہوتو اس میں کیمومیلا کو اولیت حاصل ہے۔ اپی کا کہمی اس کی اچھی دواہے۔ اس میں اجابت کی علامتیں کیمومیلا سے ملتی ہیں لیکن مزاج کا بہت نمایاں فرق ہے۔

تکلیفوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔

کیمومیلا میں اکثر دردگری سے آرام پاتے ہیں۔ سوائے دانتوں، چرے اور جبڑے
کاعصاب کے جنہیں ٹھنڈ سے آرام ماتا ہے۔ کیمومیلا کے مریض کے اعصاب ڈھکے چھے ہوں
تو انہیں گری سے آرام آئے گا۔ اگر اعصاب کے کنارے نگے ہوں تو وہاں گری سے تکلیف ہو
گی۔ بیسب تفصیلات عموماً کتابوں میں درج نہیں ہوتیں۔ معالجین کو باریک بنی سے سب
علامات کا جائزہ لینا چاہئے تا کوئی البھون د ماغ میں نہ رہے اورضح دوا تک رسائی ممکن ہوجائے۔
کیمومیلا کے دانت کے درد میں ایک خاص بات بیہ ہوتی ہوتی ہوتی ہوگر وی ہوگر وی کے بعد
غائب ہوجاتا ہے۔ عموماً رات کے پہلے حصہ میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ بارہ ایک بجے کے بعد
جب رات شبح کی طرح پلٹ جائز دردختم ہونے لگتا ہے۔ آرسنگ کے دانت دردکا ساری رات
سیتعلق ہے۔ کیمومیلا میں مسوڑ ھے سوج جاتے ہیں، چھالے بنتے ہیں اور دانت مسوڑ ھوں
کو چھوڑ نے لگتے ہیں۔ وہ لوگ جو دانتوں کی صفائی میں بداحتیاطی سے کام لیتے ہیں عمو ماً ان

کیمومیلا کے مزاج کی یہ مستقل علامت ہے کہ اس کے مریضوں میں فراخ دلی کی کمی ہوتی ہے، طبیعت میں کسی قدر خساست پائی جاتی ہے۔ کسی دوسرے کی پرواہ نہیں کرتے ، نہ کسی کی تکلیف محسوس کرتے ہیں نہ کسی کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں لیکن ہر وقت اپنے معاملہ میں بے حدزود حس ہوتے ہیں۔ ہروقت اپنی ہی ذات سے چھٹے رہتے ہیں اور صرف اپناذاتی مفاد ہی پیش نظر رہتا ہے۔ دوسروں پراچا تک غصہ آ نا بھی اسی مزاج کا حصہ ہے۔

کیمومیلا کی تکلیفیں نیٹرم میور کی طرح صبح نو بجے زیادہ ہوجاتی ہیں۔بعض اوقات رات کونو بجے بھی علامات تیز ہوجاتی ہیں۔ مریض کے کا نوں میں شور کی آ وازیں آتی ہیں، پٹا نے بجتے ہیں اور کان ہوا کے جھونکوں کے لئے بہت حساس ہو جاتے ہیں اور تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ویسے مریض کھلی ہوا کو پیند کرتا ہے لیکن کا نوں کو ڈھانپ کر ہا ہر نکلتے ہیں وہ یا تو بہت سردی محسوس کرتے نکلتا ہے۔ جولوگ عام طور پر مفلر با ندھ کر با ہر نکلتے ہیں وہ یا تو بہت سردی محسوس کرتے نکلتا ہے۔ جولوگ عام طور پر مفلر با ندھ کر با ہر نکلتے ہیں وہ یا تو بہت سردی محسوس کرتے

ہیں یا ویسے ہی ہواسے نفرت کرتے ہیں کیکن کیمومیلا کا مریض اس سے مختلف ہے۔وہ صرف کان کوہوا سے بچانا جا ہتا ہے، چہرہ نہیں ڈھانیتا۔

گلے میں درد بشنج اور سوزش کے ساتھ طبیعت میں غصہ بھی ہوتو کیمومیلا بہترین دوا ہے۔ کیمومیلا میں بہت شدید پیاس ہوتی ہے۔کافی (Coffee) پینے کی وجہ سے نیندنہ آئے تو عموماً نکس وامیکا مفید ہے لیکن کافی کے بدا ثرات کوکلیٹا مٹانے کے لئے کیمومیلا زیادہ مؤثر ہے اور کیمومیلا کے بدا ثرات کافی سے دور کئے جاسکتے ہیں۔

اگرگندےانڈوں کی بودالی گیس پیدا ہو اورڈ کاربھی ایسی ہی بو کے ہوں تواس کے ازالہ کے لئے کیمومیلااچھی دوابتائی جاتی ہے۔

اکثر ایلو پیتھک ڈاکٹر درد کے احساس کو کم کرنے کے لئے مارفین استعمال کرتے ہیں۔ خصوصاً دل کے دوروں میں درد کی شدت کو کم کرنے کے لئے مارفین بہت کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے استعمال کے بعدر ڈمل کے طور پر بہت الٹیاں آتی ہیں۔ کیمومیلا ان الٹیوں کو بند کرنے میں بہت مفید دوا ہے۔

کیمومیلا کے پیٹ درد میں مریض تکلیف کی شدت سے دوہرا ہوجاتا ہے۔ یہ علامت کولوستھ میں بھی پائی جاتی ہے، در دنا قابل برداشت ہوتے ہیں، ناف اور جگر کے مقام پر درد ہوتا ہے۔ شدید غصہ کے دورہ کے بعد پیٹ میں تشنجی کیفیت پیدا ہوتی ہے، بد بودار ڈکار آتے ہیں، گرم اشیاء سے نفرت ہوجاتی ہے، زبان کارنگ زردی مائل اور منہ کا مزاکڑ وا ہوتا ہے۔ اگرقے آ ئے تو وہ بھی کڑوی ہوتی ہے، پیٹ میں بہت بوجھ محسوں ہوتا ہے۔ یہ سب کیمومیلا کی علامات ہیں۔

بعض عورتوں کو حیض کے خون میں چھچھڑے سے آتے ہیں۔ یوں محسوں ہوتا ہے کہ اندرونی جھلیوں کا ٹکڑا کٹ کرساتھ آیا ہو۔اس خاص نکلیف کا بھی کیمومیلا سے گہراتعلق ہے اور بیاس کا اچھاعلاج ہے۔

کیمومیلا میں دوران حمل اور وضع حمل کے وقت تشنج ہو جاتا ہے۔ بچ کی پیدائش کے بعد بہت خون بہنے لگے تو اس میں بھی کیمومیلا کو یا در کھنا چاہئے۔ بعض دفعہ

یہ اکیلی ہی اس جریان خون کے لئے مفید ہوتی ہے۔ جس کا بچے کی پیدائش سے تعلق ہو۔ بعض عورتوں کو بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے جسم کے سی حصہ میں شنج ہوجا تا ہے۔ اگر بیشنج بالخصوص ٹانگوں یا گردن میں ہوتو کیمومیلا کی ایک دوخورا کوں سے ہی فائدہ ہوگا بلکہ یہ دوا بچے کے لئے بھی مفید ہوگی۔ دودھ پلائے کچو دوادی ہوتواس کی ماں کودی جائے۔ جب وہ دودھ پلائے گی تو بچ کو بھی دوا بہنچ جائے گی لیکن بعض اوقات ایسا نہیں بھی ہوتا اس لئے براہ راست دوا دی جاسکے تو دینی چاہئے۔ اگر بچے کی بیاری کی علامتیں ایسی ہوں جو ماں کے عمومی مزاج کے مطابق ہوں یعنی ماں کوبھی ایسی بیاریاں ہوں تو پھر ماں کودوادینا ہی بہت کافی ہے۔

کیمومیلا کھانسی کے لئے بھی مفید دوا ہے۔ بچہ کوسوتے ہوئے یا غصہ آنے پر کھانسی شروع ہوجائے تو کیمومیلا اس شروع ہوجائے تو کیمومیلا اس کے خلاف دفاع کومضبوط کرتی ہے۔ اگر بچے کا مزاج غصے والا ہوتو کیمومیلا اور بھی اچھا کام کر بے گلاف دفاع کومضبوط کرتی ہے۔ اگر بچے کا مزاج غصے والا ہوتو کیمومیلا اور بھی اچھا کام کر بے گل کیکن اس کے بغیر بھی یہ بعض موسمی کھانسیوں میں کافی مفید ہے۔

دانت نکالنے کے زمانہ میں جب شیر خوار بچہ بہت ضدی، چڑچڑا اور بے چین ہو، اسہال آتے ہوں، تشنج بھی ہوجائے تواس کے لئے کیمومیلا بہت ضروری دواہے۔اگر بچہ نیند میں روئے اور اسے ڈراؤنے خواب آئیں تو بھی کیمومیلا دینی چاہئے۔

کیمومیلا کو کان کے درد میں بہت اونچا مقام حاصل ہے۔اس میں عموماً تین دوائیں روز مرہ کام آتی ہیں۔ اگر بچہ درد سے روئے لیکن اس کے رونے میں نرمی ہواور بیچارگی پائی جائے تو پلسٹیلا (Pulsatilla) اور اگر رونے کے ساتھ انتہائی غصہ ہوتو کیمومیلا اور مید دونوں علامتیں نمایاں نہ ہوں تو بسااوقات ایلیم سیبیا کام آتی ہے۔

ا ينٹی ڈوٹ: نکس داميکا ـ کافيا مد د گار دوائيں: بيلا ڈونا ـ ميگ کارب طاقت: 1000،30 يا بعض د فعہ CM

68 چیلی ٹروینیم CHELIDONIUM

چیلی ڈونیم جگر کی اکثر بیماریوں میں بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ کھانسی سے بھی اس کا گہراتعلق ہے۔ اس کی کھانسی کی جڑعمو ماً دائیں چھپھڑ ہے میں ہوتی ہے۔ گلے میں خراش کی وجہ سے بار بار کھانسی اٹھے اور کسی اور دواسے افاقہ نہ ہوتو چیلی ڈونیم دینے سے غیر معمولی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک مریض کئی سال سے ایسی کھانسی میں مبتلا تھا میں نے اسے چیلی ڈونیم کے ساتھ ریوئیکس (Rumex) ملا کر دی تو اللہ کے فضل سے بہت جلد نمایاں فرق پڑ گیا۔ ریوئیکس بھی برانی کھانسی میں مفید ثابت ہوتی ہے۔

چیلی ڈونیم کی کھانسی کی خاص علامت ہے ہے کہ ہروقت گلے میں خراش اور جلن رہتی ہے۔ جس سے مریض بے چین رہتا ہے اور اس کیفیت سے نگ آ جا تا ہے۔ چیلی ڈونیم اس کیفیت میں انہائی مفید اور مؤثر دوا ہے۔ کھانسی کی تیزی اور شدت کوختم کر کے اس میں نرمی پیدا کر دیتی ہے جس سے طبعاً مریض کا چڑ چڑ این اور غصہ بھی ختم ہوجا تا ہے۔ کھانسی کی دوسری دواؤں سے آ ہستہ آ ہستہ کمل شفا تو ضرور ہوجا تی ہے لیکن یوں ایک دم چین نہیں آتا۔ چیلی ڈونیم سے کھانسی نرم اور بے ضرر ہوجا تی ہے۔

اس کی کھانسی کی علامت ہے بھی ہے کہ ساتھ ہلکا ہلکا چیٹا ہوا بلغم رہتا ہے جو ٹکلتا نہیں۔اگر نکل بھی جائے تو گلاصاف نہیں ہوتا۔فوراً دوبارہ خراش شروع ہوجاتی ہے۔اس صورت میں اس کے ساتھ کا کس (Coccus) ملاکردینی جائے۔

چیلی ڈونیم برقان کی بڑی مؤثر دوا ہے، نمونیہ میں بھی بہت مفید ہے اور الیی پلورسی (Pleurisy) بھی جس میں پھیپھڑوں کی نجل سطح پر سوزش ہو جائے، اس کے

دائر ہاثر میں ہے۔

چیلی ڈونیم کے مریض کے پیشاب کارنگ زردہوتا ہے جس میں زہریلی ہی تیزی پائی جاتی ہے۔ اگر قبض ہوتو اجابت سخت گولیوں کی شکل میں ہوتی ہے جیسے بکری کی مینگنیاں ہوں۔ اسہال شروع ہوجا کیں تو ان کی رنگت بھوری مٹی کی طرح ہوتی ہے۔ قبض اور اسہال آپس میں اور لئے بدلتے رہتے ہیں۔ معدہ کا درد کر تک پھیل جاتا ہے۔ کھانا کھانے سے وقتی طور پر معدہ کی تکلیفوں میں آ رام محسوس ہوتا ہے۔ گرم خوراک اور گرم یانی مرغوب ہوتا ہے۔ خصوصاً گرم دودھ یینے کی خواہش ہوتی ہے۔

چیلی ڈوینم پنے کی پھری مفید ہے۔ اس کا درد پیچے کمری طرف پھیل جاتا ہے۔ چیلی ڈوینم کی برائیونیا ہے بھی مشابہت ہے۔ اس کی تکلیف بڑھتی ہے کی نظرف پھیلا ہے۔ چیلی ڈوینم کی برائیونیا ہے بھی مشابہت ہے۔ اس کی تکلیف بڑھتی ہے کیا فرق ہیہ اور حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے کیا فرق ہیہ کہ برائیونیا میں جس طرف تکلیف ہوم یض اسی کروٹ پر لیٹنا ہے۔ چیلی ڈوینم میں مریض اس کروٹ لیٹے تو تکلیف میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ چیلی ڈوینم کے مریض کو گری سے سردرد میں اضافہ ہوتا ہے۔ چیلی ڈوینم کے مریض کو گری سے سردرد میں اضافہ ہوتا ہے۔ کرم ملکوں میں بیدوا گری کی شدت سے پیدا ہونے والے سردرد میں مفید ثابت ہو گئی ہے۔ جونے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ آگے کی طرف گرنے کا رجحان ہوتا ہے۔ سردرد دائیں طرف کا احساس بھی ہوتا ہے۔ آگے کی طرف گرنے کا رجحان ہوتا ہے۔ سردرد دائیں طرف کان کے پیچھے کند ھے تک پھیل جاتا ہے۔ دائیں کند ھے اور سینہ کے دائیں طرف درد ہوتا ہے۔ کھانسی کے ساتھ بغم کے چھوٹے چھوٹے گئوے نکتے ہیں۔ ہھیلیاں اور کلائیاں وکھتی ہیں۔ کھانسی کے ساتھ بغم کے چھوٹے چھوٹے گئوے نکتے ہیں۔ ہھیلیاں اور کلائیاں وکھتی ہیں۔ انگلیوں کے کنارے برف کی طرح گئوٹے نکتے ہیں۔ ہھیلیاں اور کلائیاں وکھتی ہیں۔

آئھوں کے سفید پردے کا رنگ زردی مائل ہوجاتا ہے۔ اوپردیکھنے سے آنکھوں میں درد ہوتا ہے۔ آنکھوں کے سفید پردے کا رنگ زردی مائل ہوجاتا ہے۔ آنکھ کے اوپر اپنا میں درد ہوتا ہے۔ آنسو نکلتے رہتے ہیں۔ اعصافی درد ہوتا ہے۔ یہ زردی رخساروں اور ناک پر مقام بناتی ہیں۔ مریض کے چہرے کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ یہ زردی رخساروں اور ناک پر نمایاں ہوتی ہے۔ زبان پر بھی زردی چھائی رہتی نمایاں ہوتی ہے۔ جلد خشک اور زردی مائل ہوتی ہے۔ زبان پر بھی زردی چھائی رہتی

ہے اور زبان ڈھیلی ڈھالی ہوجاتی ہے۔ جگر کی خرابی کی وجہ سے قے آنے کا بھی رجحان ہوتا ہے۔ گردوں میں بھی جلن اور خراش ہوتی ہے اور پیشاب میں چھیچھڑے سے آنے لگتے ہیں۔جسم کو ہاتھ لگانے سے دکھن کا احساس ہوتا ہے۔ کو لہے اور رانوں میں در دہوتا ہے۔ پاؤں کی ایر لیول میں ناقابل برداشت در داور دواؤں کے علاوہ چیلی ڈونیم کی بھی علامت ہے۔

مددگاردوائيں: لائيكو پوڈيم ـ برائيونيا دافع اثر دوائيں: كيموميلا طاقت: 30 سے 1000 تك 69

چینو لوځ یم

CHENOPODIUM

(Jeros Oak)

چینو پوڈیم پروٹلم میں اگنے والے Oak سے بنائی جاتی ہے۔ بیکائی وسیع الاثر دوا ہے۔
اس کا اعصاب اور اعصاب کے فالج سے تعلق ہے۔ جہاں تک قوت ساعت کے آلات کے فالج کا تعلق ہے اکثر معالجین کے نزدیک اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر اعصاب واقعی مرچکے ہوں تو کہا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سے لیکن اب تحقیق سے دریافت ہوا ہے کہ مرے ہوئے اعصاب کی جگہ لینے کے لئے بعض دوسرے اعصاب کے سرے مردہ اعصاب کے ساتھ اپنی شاخیں بڑھانے لگتے ہیں۔ خصوصاً آئکھوں کے اعصابی ریثوں کے متعلق جدید سائنسی تحقیق اپنی شاخیں بڑھانے لگتے ہیں۔ خصوصاً آئکھوں کے اعصابی ریثوں کے متعلق جدید سائنسی تحقیق ضائع ہو جائے تو اس آئکھ کے ریشوں کی طرف صحت مند آئکھ کے ریشے بڑھ کران سے رابطہ کر فیم ایک ہوجائے تو اس آئکھ کے ریشوں کی طرف صحت مند آئکھ کے ریشے بڑھ کران سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ اگر چہ مردہ اعصاب زندہ نہیں ہوتے مگر دوسرے ایسے نیم مردہ ہوں تو چینو پوڈیم اعصاب ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اگر اعصاب کلیتاً مرے نہ ہوں بلکہ نیم مردہ ہوں تو چینو پوڈیم ایسے نیم مردہ اعصاب کودوبارہ زندگی بخشنے کی طاقت رکھتی ہے۔

چینو پوڈیم کے اکثر مریض بعض آ وازوں کو بآسانی سن لیتے ہیں اور بعض کو بالکل نہیں سن سکتے۔ مثلاً مردوں کی آ واز سنائی نہیں دیتی لیکن عور توں اور بچوں کی آ وازیس لیتے ہیں۔ کئی ہیں کیونکہ انہیں موٹی آ وازیں کم سنائی دیتی ہیں جبکہ باریک آ وازیں وہ سن سکتے ہیں۔ کئی ایسے مریض جو بہت کم سن سکتے تھے اس دواسے شفایاب ہو گئے اور بہت نمایاں فرق پڑا۔ بعض دفعہ کان کی خرابی کی وجہ سے چکر آتے ہیں۔ شنوائی میں کمی آ جاتی ہے۔

اور کانوں میں شور کی آواز آتی ہے۔ ایسی صورت میں بھی چکروں کے علاوہ چینو پوڈیم قوتِ شنوائی کے مسی عضلات یاریشوں کے امراض میں مفید ہے۔ اگر آواز اچپانک بند ہوجائے توبیہ اس عارضہ میں بھی فائدہ دیتی ہے۔

چینو پوڈیم دائیں طرف کے آدھے جسم کے فالجے کے لئے بھی مفید ہے۔ کندھے کے جوڑ کے درد کی دوا ہے لیکن چینو پوڈیم میں کندھے کے جوڑ کے درد کی دوا ہے لیکن چینو پوڈیم میں دونوں طرف درد ہوتا ہے۔ چینو پوڈیم کے مریض میں بھی اوپیم کی طرح Apoplexy ہو جانے کا رجحان ماتا ہے جو اوپیم میں بہت زیادہ ہے لیکن چینو پوڈیم کی طرح Apoplexy بھی اوپیم کے مشابہ ہوتی ہے ایسے مریض کا چہرہ اچا تک سرخ ہو جاتا ہے۔ چینو پوڈیم کی حریف کو چہرہ اچا تک سرخ ہو جاتا ہے۔ حینو پوڈیم کی مریض کو اچرہ کے ماریض کا جو پیدائش طور پراس کی خلقت میں عارضہ پایا جاتا ہے، وہ بھی چینو پوڈیم کی امراض میں شامل ہے۔ اس مرض کو Menier's Disease کہتے ہیں۔ اس میں بار بار سخت چکروں کے دور سے پڑتے ہیں جن کے ساتھ شدید تے بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص پرسستی طاری ہوجائے، بین جن کے ساتھ شدید تے بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص پرسستی طاری ہوجائیں تو بین جن کے ساتھ شدید تے بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص پرسستی طاری ہوجائیں تو بین بھی چینو پوڈیم کے دائر ہار میں آتی ہیں۔

چینو پوڈیم کے مریض کو کمر میں ریڑھ کی ہڈی کے قریب شدید درد ہوتا ہے جو شانوں کی ہڈیوں میں پیل جا تا ہے اور سینہ میں بھی جا تا ہے۔ بیشاب بہت زیادہ آنے لگتا ہے جو زردی مائل اور جھاگ دار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بیشا ب کی نالی میں سنسا ہٹ ہوتی ہے۔ زردی مائل مادے کی ایک تہہ ہی بیشاب کے برتن کی دیواروں پر جمنے لگتی ہے۔ یہی علامت چیلی ڈونیم میں بھی یائی جاتی ہے۔

اگرانتر یوں میں ملپ (Round Worm) پیدا ہونے لگ جائیں یا کدو دانوں (Hook Worm) پیدا ہونے لگ جائیں یا کدو دانوں کو (Hook Worm) کے آ ٹارملیں تو بعض ڈاکٹروں کے بیان کے مطابق ایسے مریض کو چینو بوڈیم کا تیل تھوڑا تھوڑا پلانے سے کچھ عرصہ کے اندر ان دونوں قتم کے کیڑوں سے

چينو پوڙيم 281

_____ نجات مل جاتی ہے۔ مجھےا پنے کسی مریض پراس کا تجربہ ہیں۔

طافت: چینو پوڈیم عموماً 3 طافت میں استعال کی جاتی ہے کیکن میں نے اسے 30 طافت میں بہت مفید پایا ہے۔ Worms کے لئے چینو پوڈیم کا تیل دس دس قطر ہے ہمر دوتین گھنٹے کے بعد پلایا جاتا ہے۔

70 چینینم آرس

CHININUM ARS

(Arsenite of Quinine)

چینینم آرس ان لوگوں کی دواہے جن کے خون کا نظام کمبی بیاریوں کی وجہ سے درہم برہ م ہو چکا ہو، جگر کے افعال ست پڑگئے ہوں اور ہڑیوں کے گودے میں نقص واقع ہو گیا ہو۔خون کی کمی کی وجہ سے چہرہ پر ورم اور بے رفقی ہو، جھریاں پڑنے لگیں، چہرہ بہت بوڑھا دکھائی دے اور مریض بالکل کھوکھلا اور بے جان سا ہو۔ چینینم آرس ایسے مریضوں کے لئے مثالی دواہے لیکن اس کے باوجود چینینم آرس کے بنیادی مزاج کو سمجھے بغیراس سے استفادہ نہیں کیا جاسکتا۔

چینینم آرس چائناورآرسینک کا مرکب ہے۔ یہ دواسکونابارک (Cinchona Bark) سے حاصل کی جاتی ہے جس سے پرانے زمانے میں کونین بنتی تھی جو ملیریا کی بہترین دواسمجھی جاتی تھی۔ بعد میں اور بہت ہی دوائیں ایجاد ہوئیں لیکن کونین کا اپناہی مقام ہے۔

ملیریا کے ختم ہونے کے بعد جو بدائرات جسم میں باتی رہ جاتے ہیں چینینم آرس ان کو دور کرنے کی اچھی دوا ہے۔ عموماً جگراور تلی بڑھ جاتے ہیں۔ جلد پر خشکی اور بے روفقی نظر آتی ہے، ساری جلد زرد پڑ جاتی ہے۔ سانس بہت چڑھتا ہے۔ بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے مریضوں کو چینینم آرس فوری فائدہ نہیں پہنچاتی۔ ہاں لمباعرصہ استعال کرنے سے ان کی کایا بلیٹ دیتی ہے۔

ٹھنڈی ہواسے چینینم آرس کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔جسم میں ہرونت <u>سردی کا ہلکا</u>

ملکا احساس رہتا ہے۔ مزمن اسہال یانی کی طرح پتلے اور متعفن ہوتے ہیں۔جسم میں جگہ جگہ ور میں پائی جاتی ہیں۔جسم میں جگہ جگہ ور میں پائی جاتی ہیں۔حرکت سے شخت نفرت ہوتی ہے اور مریض بے حس وحرکت پڑار ہنا پیند کرتا ہے۔ چینینم آرس میں عضلاتی دھڑکن بھی پائی جاتی ہے جوسار ہے جسم میں انگلیوں کے کناروں تک محسوس ہوتی ہے۔ نبض کمزوراور باریک دھا کے کی طرح بہت ہلکی چلتی ہے۔

چینینم آرس میں کیکیسس کی طرح سونے کے بعد تکلیفیں بڑھتی ہیں۔جسم میں بے چینی رہتی ہے جوشام کو بڑھ جاتی ہے۔بعض مریضوں کو بیاحساس رہتا ہے کہ وہ ایسے گناہ گار ہیں جو بخشے نہیں جائیں گے۔ چینینم آرس میں مریض بالکل معمولی چیزوں پراپنے آپ کو بہت گناہ گار جھنے لگتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہم میں مبتلا ہوکر خوف اور تو ہمات کا شکار ہو جاتا ہے۔ایسے مریض کو بعض دفعہ عجیب وغریب نظار سے بھی نظر آنے لگتے ہیں۔

چینینم آرس کے مریض کو بخار ہوتو وہ گھبرا کر بستر سے باہر نکلتا ہے۔ ہروقت بے چین رہتا ہے۔ آہستہ آہستہ زندگی سے مایوسی اور نفرت ہونے گئی ہے، شور نا قابل برداشت ہوجا تا ہے اور یا دداشت کمزور پڑجاتی ہے۔ ایسے مریض جنہوں نے اپنی زندگی اوباشی اور عیاشی میں گزاری ہوان میں چینینم آرس کی علامات کا پیدا ہونا زیادہ قرین قیاس ہے۔

چینینم آرس میں اعصابی کمزوری اورخون کی کی سے سوتے ہوئے جھٹکا لگتا ہے۔

پیملامت کئی دواؤں میں بار بارزیر بحث آ چی ہے۔ چینینم آرس میں بھی بیملامت پائی جاتی

ہے کہ اس میں اعصابی کمزوری اورخون کی کمی کی وجہ سے جھٹکا لگتا ہے۔ بھی درد کے احساس سے

آ نکھ کل جاتی ہے اور در دبیلی کے کوند ہے کی طرح جسم میں بھیل جاتا ہے۔ چینینیم آرس میں جو

تکلیف خون کا دباؤ کم ہونے سے ہوتی ہے وہی تکلیف آر نیکا، بیلا ڈونا وغیرہ میں خون کا دباؤ

زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوجاتی ہے۔ بازو، ٹانگیں اور ہاتھ پاؤں سخت ٹھنڈ ہے ہوجاتے ہیں

لیکن پھرخون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ چینینم آرس کی بیخاص علامت ہے۔

چینینم آرس میں دائیں پہلو میں زیادہ کمزوری ہوتی ہے مثلاً گردن کا دایاں حصہ اور دایاں بازومتاثر ہوتے ہیں۔ کمزوری بڑھے تو تشنج ہونے لگتا ہے۔ رات کے وقت سرمیں در دہوتا ہے۔ نزلے سے بھی سر در دشروع ہوجاتا ہے۔ عموماً جب نزلہ دب جائے تو در دمیں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سرمیں ہتھوڑے پڑنے کا حساس ہوتا ہے۔ بیاحساس عموماً خون کی کمی کی وجہ سے بیدا ہوتا ہے۔ بیعلامت نیٹرم میور میں بھی نمایاں ہوتی ہے کیونکہ بیبھی خون کی کمی کی بہترین دوا ہے۔اس میں خون میں یانی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ چینینم آرس میں خون کے سرخ ذرے کم ہونے کی وجہ سے خون کی کمی ہوتی ہے۔اس لئے اس کی ورمیں پھولی ہوئی اور کھوکھلی ہوتی ہیں۔سرکے باہر بھی عضلات میں در دہونے لگتا ہے،سر دی میں تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ چینینم آرس میں آئکھول کی علامتیں بھی پائی جاتی ہیں۔روشیٰ سے زود حسی اور گرم آنسو بہتے ہیں۔ نیٹرم میور میں بھی بیامت یائی جاتی ہے۔ جہاں تک آنکھوں کا تعلق ہے چینینم آرس میں زخم ایک آئکھ میں نہیں بلکہ دونوں آئکھوں میں پائے جاتے ہیں۔السراور ا نگزیما کی تکلیفیں بیک وقت دونوں طرف ہونے کار جحان چینینم آرس کےعلاوہ آرنیکا میں بھی ملتا ہے۔آرنیکا میں اگرایک آنکھ میں خارش ہوتو دوسری میں بھی ہوگی۔ بیک وقت دونوں طرف تکلیف ہوتی ہے۔ چینینم آرس میں بھی یہی علامت ہے لیکن آئکھول کےسامنے تارے اور چنگارے بائیں آنکھ میں دائیں آنکھ کے مقابل پر زیادہ نظر آتے ہیں۔ بائیں آنکھ سے یانی بہتا ہےاور درد کا احساس، کا نول میں شور اور آ وازیں سنائی دیتی ہیں۔قوت سامعہ غیر معمولی طور برتیز ہوجاتی ہے یامریض بہرہ ہونے گتاہے۔ یہ مضادعلامات چینینم آرس کا خاصہ ہے۔ ناک سے خون آمیز رطوبت اور بد بودار پیپ نکلتی ہے۔ ناک اندر سے گلنے لگتا ے۔ ہونٹوں اور ناک کے کنارے چھلنے لگتے ہیں۔ چہرہ کا رنگ پیلا اور مٹیالا سا ہوجا تا ہے اور چېره خمير کی طرح پھولا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ نیز ایک عجیب قسم کی چیک چېره کےایک حصہ پرنمایاں ہو جاتی ہے۔ جو خون کی کمی کی مزید نشاندہی کرتی ہے۔ منہ کی اندرونی جھلیوں

سے خون بہنے کا احتمال ہوتا ہے۔ زبان پر کلیریں ظاہر ہوتی ہیں۔ کالا، بھورا، سفید اور زردرنگ زبان پر پایا جاتا ہے۔ مسوڑ سے سوجے ہوئے، دانت مسوڑ ھوں کو چھوڑ نے لگتے ہیں، منہ کا مزہ خراب، اجھے سے اچھا کھانا بھی برا لگتا ہے، نہ ختم ہونے والی پیاس، رات کو دانتوں میں در داور دانت کٹکٹانے کو دل چاہتا ہے جس کی وجہ سے نیند بے چین ہوجاتی ہے۔ گلاخشک اور بعض دفعہ کلے سے شخت بد بوآتی ہے۔ یہ بہت خطرناک علامت ہے کیونکہ یہ زخموں کے بگڑ نے اور ناسور بننے کا رجحان ظاہر کرتی ہے۔ اگر ایسے مریض میں چینینم آرس کی علامات نمایاں نہ ہوں تو بلتا خیر آرسنک اونچی طافت میں دے دینی چاہئے۔ چینینم آرس کی علامات نمایاں نہ ہوں تو بلاتا خیر آرسنک اونچی طافت میں دے دینی چاہئے۔ چینینم آرس کی ایک علامت سے ہے کہ اگر کلانہ بھی خراب ہوتو پانی کا گونٹ یا لقمہ نگلتے ہوئے در دہوتا ہے۔ ہر وقت گلا کھنکار نے (صاف کرنے) کی حاجت محسوس ہوتی رہتی ہے۔

چینینم آرس میں بھی بھوک بالکل مٹ جاتی ہے اور طبیعت بدمزہ رہتی ہے لیکن بعض دفعہ شدید بھوک گئی ہے جوختم ہی نہیں ہوتی ۔ کھانا کھاتے ہی پیٹ بھول جاتا ہے۔ جلن اور تیزابیت پیدا ہوجاتے ہیں، اور کھانے کے تھوڑی دیر بعد ہی پھر بھوک لگ جاتی ہے ۔ چھلی اور انڈا ہضم نہیں ہوتے ۔ اگر انڈے سے الرجی ہوجائے تو انڈا ہضم نہیں ہوتے ۔ اگر انڈے سے الرجی ہوجائے تو اس میں کلکیریا کارب اونچی طافت میں ایک خوراک دینے سے ہی الرجی ٹھیک ہوسکتی ہے ۔ بھی نہیں بھی ہوتی گرا کڑ ہوجاتی ہے۔ بھی

چینینم آرس کے مریض کو مثلی ہوتو نینز نہیں آتی مثلی ختم ہوتے ہی نیند آ جاتی ہے مگر سونے کے جھاد پر دب گئے ہوئے کے اس سونے کے کچھ در کے بعدایک دم قے ہوجاتی ہے جس کا مطلب ہے کہ تلی وقتی طور پر دب گئے تھی لیکن اصل وجہ موجو در ہی۔

ملیریا کے بعد پیٹ میں جو بیاریاں پیدا ہوتی ہیں وہ سب چینینم آرس میں پائی جاتی ہیں۔ جگراور تلی ابھرے ہوئے مگر باقی سارا پیٹ سکڑ کر کمر کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ قبض میں سدے نکلتے ہیں۔ آرسنگ کے مریضوں کو بھی بعض بھلوں سے اسہال لگ جاتے ہیں۔

چینینم آرس میں بواسیر کے مسے بھی پائے جاتے ہیں جو پھولے ہوئے اور نیلگوں ہوتے ہیں۔ مارش بھی ہوتی ہے۔ پیشاب میں البیومن اورشوگر آتے ہیں۔ بید دوامر دانہ اور زنانہ جنسی کمزوریوں میں بھی مفید ہے۔ عورتوں میں جھیلنے والا، کیکوریا تکلیف دہ اورخون کی آمیزش کے ساتھ ہوتا ہے۔ حیض مقدار میں بہت زیادہ، کھلے، بد بودار، سیاہ یا زردی مائل، لمباعرصہ چلیں یا پھر بالکل بند ہوجائیں۔ اگر چینینم آرس کی مزاجی علامتیں پائی جائیں تو حیض کی سے سبت تکلیفیں خدا کے فضل سے دور ہوسکتی ہیں۔

چینینم آرس میں سانس کی ناتی میں شنج اور حصلنے کا احساس اور سانس کی گھٹن ہوتی ہے۔ ہے، گہرا سانس لینا مشکل ہوتا ہے کیونکہ سانس کی نالی میں اس سے خارش ہوتی ہے۔ دموی کھانسی کی علامات بھی یائی جاتی ہیں۔

دل میں درد، ننگی اور گھٹن کا احساس، تشنج، سوجن، کمزوری اور دھڑکن ، ہاتھ پاؤں ٹھنڈ ہے، پنڈلیول میں درد، صرف رات کے ٹھنڈ ہے، پنڈلیول میں درد، صرف رات کے آخری حصہ میں چین کی نیندآتی ہے۔

یہ امر پیشِ نظر رکھنا لا زمی ہے کہ مریض انتہائی کمی خون کا شکار ہوتو یہ دوا اوپر درج کر دہ سب تکلیفوں میں مفید ہے۔ برخون مریضوں میں بیدوا کا منہیں کرتی ۔الا ماشاءاللہ

طاقت: 30 سے 1000 تک

71 كولسٹرينم

CHOLESTERINUM

بید داصفراء سے بنائی جاتی ہے۔ جگراور بیتے کی بیار پول میں بہت مفید ہے۔ یہ ت کے درد کے لئے بہترین دواہے۔ میں نے اپنے تجربہ سے اسے جگر، پیتے، تلی اور لبلبہ کی امراض میں بہت مفیدیایا ہے۔ جگر کے کینسر میں بھی بہت فائدہ مند ہے۔جسم میں چربی جمنے کے ر جحان کو بھی دور کرتی ہے۔اگرخون میں چکنائی زیادہ ہوجائے یعنی کولیسٹرول (Cholesterol) کا تناسب بڑھ جائے تو اس کوٹھیک کرنے میں بھی کارآ مد ثابت ہوتی ہے۔امریکہ میں بعض مریضوں نے کولیسٹرول کم کرنے کے لئے جدیدترین طریقوں سے ایجاد کی گئی دوائیس استعمال کیں لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔جبکہ کولسٹرینم کےاستعال سے انہیں نمایاں فرق محسوس ہوا۔ کولسٹرینم پیتذاورلبلبہ کی سوزش اور پچھری کی روک تھام میں مفید ہے۔اگر آغاز میں ہی دے دی جائے تو مر یض کافی پیچید گیوں سے محفوظ ہوجا تا ہے۔اگر پیھریاں بن جائیں تواس دوا کے اثر سے زم ہوکر گھانے گئی ہیں اور دیکھتے دیکھتے غائب ہوجاتی ہیں۔ کولسٹرینم برقان کے لئے بھی اچھی دواہے۔ تلی بڑھ جائے تواجھااٹر دکھاتی ہے۔ اس کے مریض میں بے چینی اور بیزاری نمایاں ہوتی ہے۔مریض بے خوانی کا شکار بھی ہوجا تا ہے کیکن آ رسینک والی کیفیت نہیں ہوتی اور نہ ہی کیمومیلا کی طرح چڑ چڑا بین ظاہر ہوتا ہے۔سانس میں گھٹن کے لئے بھی مفید دواہے۔

مار فیااس دوا کے اثر کوزائل کردیتی ہے۔

72

سيكوٹا وروسا

CICUTA VIROSA

(Water Hemlock)

سیکوٹاوروسا تشنجات کی چوٹی کی دوا ہے۔ تشنج اور تشنجی جھکے اس کی خاص علامت بیس۔اگراعصابی ہے چینی ہو، زود حسی ہواور معمولی دباؤ سے بھی اعصاب جھنجھنا اٹھیں تو بعض مریضوں کوشنج شروع ہوجا تا ہے جوجہم کے مرکز سے کناروں کی طرف حرکت کرتا ہے۔ سیکوٹا کی بیملامت دوسری دواؤں کے بھس ہے کیونکہ شنجی کیفیت عموماً ہاتھ کی انگلیوں اور پاؤں کے تلووں بیملامت دوسری دواؤں کے بھس ہے کیونکہ شنجی کیفیت عموماً ہاتھ کی انگلیوں اور پاؤں کے تلووں سے شروع ہوتو وہ حرکت کرتا ہے۔ سیکوٹا میں اگر معدے سے شنج شروع ہوتو وہ حرکت کر کے باقی اعضاء میں چیل جاتا ہے۔ گردن میں اگر اواور شنج شروع ہوتو وہ جسم کے نچلے حصوں میں منتقل ہوجا تا ہے۔ مرکز سے کناروں کی طرف حرکت اس دوا کی خاص علامت ہے۔ مرکز سے کناروں کی طرف حرکت اس دوا کی خاص علامت ہے۔ اس دوا میں تشنج کا آغاز عموماً معدہ یا دل کے اردگر دسنسنا ہے سے ہوتا ہے۔ نازک اعصاب کو چوٹ لگ جائے یا کوئی کا ٹنا چجھ جائے تو اس کے نتیجہ میں بھی تکلیف عموم سے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ آگر اس سے تشنج ہو جائے تو بید دوا مفید ہے۔ آئر نیکا اور لیڈم بھی بہت موثر دوا کمیں ہیں۔ ان کے علاوہ ہائی بیر کمی سٹیلی سیکر یا اور روٹا بھی اعصاب کے زخمی ہونے اور اس کے نتیجہ میں بین مفید ہیں۔ آئر اس کے خلوں کی ہیں بہت مفید ہیں۔ آئر اس کے خلوں کی ہونے اور اس کے نتیجہ میں بین مفید ہیں۔ آئر اس کے نظری میں بہت مفید ہیں۔ آئر اس کے نظری میں بہت مفید ہیں۔ آئر اس کے نظری کی ہونے اور اس کے نتیجہ میں بیدا ہونے والی تکلیفوں میں بہت مفید ہیں۔

سیکوٹا وروسا کی بعض علامات Catalepsy سے بھی ملتی ہیں۔اس بیاری میں ذہن تشنج کے نتیجہ میں عارضی طور پرسن ہوجا تا ہے۔ مریض بھول جاتا ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے؟ دماغ میں ایک لہرسی اٹھتی ہے جس کے نتیجہ میں مریض گرد و پیش سے کلیٹا

تے تعلق ہوجا تا ہے۔اس بیاری میں بیددوا بہت اہم ہے۔

دوست کول کر بہت جیران ہوتا ہے کہ Apoplexy میں بیفرق ہے کہ Apoplexy میں مریض دماغ میں خون جمنے کے تیجہ میں بالکل بے سی وحرکت اور مفلوج سا ہوجا تا ہے۔ Catalepsy میں گو بظاہر غافل دکھائی دیتا ہے لیکن اس سے کوئی بات کی جائے تو اس کا درست جواب دیتا ہے۔ بعدازاں اسے بالکل یا ذہیں رہتا کہ کیا ہوا تھا۔ حال کے واقعات کو ماضی سے ملا دیتا ہے۔ برانے دوست کول کر بہت جیران ہوتا ہے کہ شائداس سے پہلے بھی بھی کھی مل چکا ہو۔

سیکوٹا وروسااس بیاری میں بہت مفید ہے جس میں سراور گردن کے عضلات تشنج کی وجہ سے پیچھے کی طرف ہنچ جاتے ہیں۔ سیکوٹا وروسا میں تشنج گردن کے پیچھے ہوتا ہے اور مریض بیچھے کی طرف کمان کی طرح اکڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دماغ کے ورم (Meningitis) سے پیچھے کی طرف کمان کی طرح اکڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دماغ کے دورہ میں اگر مریض غش کھا کر پیدا ہونے والی اینٹھن کے لئے بھی بہت مفید دوا ہے۔ مرگی کے دورہ میں اگر مریض غش کھا کر پیچھے کی طرف گرے تو اس میں بھی یہی دوا کا م آئے گی۔ گویا مرگی سے ملتی جلتی بیاریوں میں اور چوٹ کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی تکلیفوں میں اس کی مخصوص علامتوں کو پیش نظر رکھنا چا ہے ۔یاد جوٹ کے ایک مرکز سے باہر کی طرف حرکت کرتا ہے۔

سیکوٹا کی ذہنی علامات نیٹرم میور سے مثابہ ہیں۔ اگر بوڑھے آ دمیوں میں آرٹیرسکاروسس (Arteriosclerosis) کی وجہ سے شریا نیں نگ ہو جا ئیں اور دماغ میں خون کا دوران پوری طرح سے نہ ہوتو ایسے مریضوں کا معدہ خراب ہونے پر برین فیگ (Brainfag) (یعنی وقتی طور پر یا دداشت کا غائب ہو جانا) کے دور برین فیگ (یکتے ہیں۔ اس میں نکس وامیکا مفید ہے۔ سیکوٹا وروسا کی بیماریاں اعصاب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر معدے میں اعصا بی شنج ہوتو پھر بیدوا ہوگی ورنہ نہیں۔ سیکوٹا وروسا کے مریض کی ایک ذہنی علامت یہ ہے کہ بعض اوقات زیادہ گیا گذرا مریض کھانے پینے کے مریض کی ایک ذہنی علامت یہ ہے کہ بعض اوقات زیادہ گیا گذرا مریض کھانے پینے کی چیز وں کے مزہ میں فرق نہیں کرسکتا۔ مزہ چکھنے کے غدود متاثر ہوتے ہیں ، زودسی کی

بجائے بے سی پائی جاتی ہے۔ کچی اور کپی ہوئی چیزوں میں فرق نہیں کرسکتا، دونوں شوق سے کھالے گا۔ بعض بچے کوئلہ، مٹی، چونا اور کاغذ وغیرہ کھاتے ہیں۔ پیکیشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کا دماغی بیاری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

سیکوٹا کا مریض بچوں والی حرکتیں کرتا ہے۔ بستر پر چھلانگیں لگائے گا، عجیب وغریب
باتیں کرےگا، ناچے گا، گائے گا۔ وہ بچوں کی طرح چنتا ہے۔ بے وقو فانہ خیالات رکھتا ہے۔ اگر
مرگی کا دورہ کسی اچا نک خوف کے نتیجہ میں پڑے تو ایکونائٹ ایک ہزار فوری فائدہ تو پہنچاسکتی
ہے، مستقل فائدہ نہیں پہنچاتی۔ سیکوٹا وروسا ایسے خوف سے پیدا ہونے والے نشنج یا مرگی کی مستقل دوا ہے۔ جب دورہ کی شدت ختم ہوتو ایسے مریضوں کا خوف غم میں تبدیل ہوجا تا ہے اور اداسی چھا جاتی ہے۔ یہایک زائد علامت ہے جو سیکوٹا وروسا کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

یددواپرانی چوٹوں سے پیداشدہ تکالیف میں بھی مفید ہے۔خصوصاً سر پر چوٹ کے بدا ترات بعض اوقات فالجی بیار یوں پر فتج ہوجاتے ہیں۔عام طور پراس میں نیٹر مسلف اور آرنیکا کام آتے ہیں۔ان کے بعداو پیم اور پہم کا نمبر آتا ہے۔ ہاں اگر چوٹ سے شنج ہونے گئی یا مرگی کے دورے پڑنے لگیں تو سیکوٹا وروسا خدا کے فضل سے مفید ثابت ہوگی۔اگر چوٹ کے نتیجہ میں بھینگا بن پیدا ہوجائے تو اس کی بھی یہی دوا ہے۔اس سے پہلے آرنیکا اور نیٹر مسلف بھی ضرور دینی چاہئیں۔اگر خوف کے نتیجہ میں آتھ کھیں اوپر کو چڑھ جائیں، پتلیاں پھیل جائیں اور بھیگا بن پیدا ہوتو سیکوٹا وروسا سے بہتر اور کوئی دوانہیں۔

اس کی جلدی علامات کا بھی اعصاب سے تعلق ہے۔ مثلاً عجامت بنوانے کے بعد پیدا ہونے والی خارش کا بھی بیدا ہوجا تا ہیدا ہونے دالی خارش کا بھی بی علاج ہے کیونکہ استراچلنے سے اعصاب میں تناؤ پیدا ہوجا تا ہے اور بالوں کی جڑیں زود حس ہو جاتی ہیں۔ اعصابی تکلیفیں عموماً جلد کی طرف منتقل ہو جائیں تو علاج مشکل ہوجا تا ہے۔ سیکوٹا کی واضح علامات موجود ہوں تو بیدوا کام کرے گی۔ ہاتھوں اور چہرے پر مٹر کے دانوں کے برابر ابھار بن جاتے ہیں۔ ایکر بیما میں خارش

نہیں ہوتی بلکہ دانوں پر لیموں کے رنگ کاسخت کھرنڈ بن جاتا ہے۔

مجھلی کا کانٹا گلے میں پھنس جائے توسلیشیا فوراً اثر کرتی ہے لیکن اگر بعد میں گلے میں تشنج اور بے چینی باقی رہیں توسیکوٹا سے آرام آئے گا۔

سیکوٹا وروسا میں تمام اعضاء میں لرزہ ساطاری ہوجاتا ہے۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں کمزوری کا احساس، اچا تک جھٹکوں کے بعد شدید کمزوری، ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں اورجسم کا بوجھ برداشت نہیں کرسکتیں، چکر آتے ہیں، سوتے ہوئے سر پر پسینہ آتا ہے۔ سیکوٹا میں آنکھوں کی ایک علامت یہ ہے کہ پڑھتے ہوئے حروف نظر سے غائب ہوجاتے ہیں۔ چیزیں نزدیک آتی ہوئی اوردورہٹتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں قوت سامعہ بھی کمزور ہوجاتی ہے۔ نگلنے میں سخت دفت ہوتی ہیں مہوئی اور دورہٹتی ہوئی میں ایجارہ بھی سخت دفت ہوتی سیکورٹا وروسا کی علامات ہیں۔ صبح کے وقت اسہال اور پیشاب کی نہ ختم ہونے والی خواہش بھی موجود ہوتی ہے۔ سینہ میں تگی اور گھٹن کا احساس ہی سیکوٹا میں یائے جاتے ہیں۔

خواتین میں حیض کے ایام میں رحم اُورد مجی میں شدید تھینچنے والا در دہوتا ہے۔وضع حمل کے وقت اور بعد میں تشنجی دورے پڑتے ہیں۔

سیکورٹا وروسا میں چھونے سے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے، چوٹوں سے اور تمباکو کے دھوئیں سے بیاریاں بڑھ جاتی ہیں اور گرمی سے آرام آتا ہے۔

دا فع اثر دوا ئیں: او پیم اور آرنیکا طاقت: 6 سے 200 پولینسی تک سائكا 295

73

ساتنا

CINA

سائنا بچوں کی دوا ہے اور بیب کے کیڑوں کے لئے مشہور ہے۔ اس کے مزاج کی خصوصیت برمزاجی ہے۔ اس کے مراج کی خصوصیت برمزاجی ہے۔ اس کے مریض بچے چھوٹی چھوٹی بچھوٹی بین رسی ہوجاتے ہیں، کوئی چیز انہیں خوش نہیں کرسکتی، بہت حساس ہوتے ہیں۔ بیز ودحسی صرف مزاج کی ہی نہیں ہوتی بلکہ ان کی جلد بھی بہت زودحس ہوجاتی ہے۔ مریض نہ کسی کو چھونے دیتا ہے اور نہ ہی کسی کو چھونے دیتا ہے۔ اگر ذراسا بھی ہاتھ لگ جائے تو سخت برا منا تا ہے۔ کوئی اجنبی آ جائے تو اس سے بھی بہت گھبرا تا ہے۔ کیمومیلا کے مریض کی طرح پیطرح طرح کی فرمائشیں کرتا ہے لیکن جب فرمائش پوری کر دی جائے تو اپنی مائلی ہوئی چیز پرے بھینک دیتا ہے۔ اگر کوئی اسے کنگئی لگا کرد کھے تو نا راض ہوجا تا ہے۔

جومریض سائنا کا تقاضا کرتے ہیں وہ سوتے میں دانت پیستے ہیں۔ نیند میں جھکے گئے ہیں، آئھ بار بارکھلتی ہے۔ ڈر کراور گھبرا کراٹھ جاتے ہیں، کتوں، جنوں اور بھوتوں کی خوفناک خوابیں آتی ہیں۔ نیند میں چینیں مارتے ہیں اور کانپ کراٹھ جاتے ہیں۔ بچگٹنوں اور ہاتھوں کے بل سونا پیند کرتے ہیں۔

سائنا کے مریض کی آنکھوں میں شیشے کی طرح ہلکی ہی چمک آجاتی ہے۔ آنکھوں کے سامنے مختلف رنگ ناچتے ہیں جن میں زرد رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ پتلیاں پھیل جاتی ہیں اور آنکھوں کے آگے اندھیرا بھی چھا جاتا ہے۔ ناک میں ہر وقت خارش ہوتی ہے اور مریض ناک کورگڑتا رہتا ہے۔ کھجا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نھنوں کے کنارے سکڑ کراندر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ منہ کے اردگر داور ہونٹوں کے پاس زردی مائل یا نیلے گول گول داغ بن جاتے ہیں۔

سائنامیں تشنج بھی نمایاں ہوتا ہے۔اعضاء میں اینٹھن ہوتی ہے اور جھٹکے لگتے ہیں۔ اس کے نشنج میں سیکوٹا کی طرح گردن پیچھے کی طرف اکڑتی ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں اندر کی طرف مڑجاتی ہیں۔جسم میں کیکی اورلرزے کا احساس ہوتا ہے۔اگر ایسے مریض کو کمریتھیکی دیں تو اس کے سرمیں در دہونے لگتا ہے۔

سائنا کے مریض کی تکلیفیں کھانا کھانے سے بڑھ جاتی ہیں۔ مریض بہت بھوک محسوں کرتا ہے۔ بچہ کھٹا دودھ نکالتا ہے۔ اس کا مزاج کسی حد تک ایتھوزا (Aethusa) سے بھی ملتا ہے۔ گرمی کا اثر دماغ کے علاوہ معدے اور انترٹیوں پر بھی ہوتا ہے۔ لیکن ان علامات کا اظہار ایتھوزا سے قدرے مختلف ہوتا ہے۔ ایتھوزا میں بچہ دودھ پیتے ہی الٹ دیتا ہے اور قبض کا رجحان رکھتا ہے جبکہ سائنا میں اسہال لگ جاتے ہیں یا پیچیش ہوجاتی ہے جس میں سفیدی مائل آئے ہیں۔ آؤں آتی ہے۔ اگراففیکشن بہت گہری ہوجائے تو سنررنگ کے اسہال آتے ہیں۔

سائنامیں مریض کے مساور مزے کی حس بہت تیز ہوجاتی ہے یا بہت کم ۔ توازن نہیں رہتا۔ بساوقات کوئی چیز کھاتے ہوئے سی اور چیز کا مزہ آنے لگتا ہے۔ دودھ یا پانی پیتے ہوئے یا غذا نگلتے ہوئے گر گر اہٹ کی آواز آتی ہے۔ کیو پرم اور آرسینک میں بھی میں علامت ہے۔ کیو پرم پیٹے کے گیڑوں کے لئے بھی اچھی دواہے۔

سائنا کے اسہال سخت بد بودار ہوتے ہیں اورا یک دم زور سے نگلتے ہیں جو پوڈوفائیلم کی
یا ددلاتے ہیں۔سائنا کی ایک خاص علامت جواسے دوسری دواؤں سے ممتاز کرتی ہے ہیہ بچہ پیٹ کے بل لیٹے تو اسہال رک جاتے ہیں یعنی الٹالیٹ کر پیٹ دبانے سے افاقہ ہوتا ہے۔
اگر ملیریا کے حملہ کے بعد مرگی کے دور بے پڑنے لگیں تو سائنا کوفراموش نہیں کرنا چاہئے۔
سائنا میں شبح کے وقت زور دار کھانسی ہوتی ہے اور کھانستے کھانستے تشنجی کیفیت ہوجاتی
ہے، سینے میں در دہوتا ہے ،کالی کھانسی کے شدید دور بے پڑتے ہیں۔
بچم سینے میں در دہوتا ہے ،کالی کھانسی کے دوران غیر متوقع خوشی یاغم کی خبر ہنچے تو بعض تکلیفیں

را کا

مثلاً سر در دیا پیٹ در دشروع ہوجاتی ہیں اور ایسی خبر کے بعد بھی عرصہ تک جاری رہتی ہے۔ ایسی تکلیفوں میں سائنا بہت مفید ہے۔ اس کی تکلیفیں کھانا کھانے کے بعد، رات کواور موسم گر مامیں ہڑھ جاتی ہیں۔

دافع اثر دوائيں: کیمفر به کیپسیکم طاقت: 30 سے 200 تک **بيا** تا 299

74 سنگونا آفیشی نیلس (چائنا) CINCHONA OFFICINALIS

(China)

چائاسکونا کے درخت سے تیار کی جاتی ہے۔ اسی درخت کے چھکے سے کونین تیار کی جاتی ہے۔ ہومیو پیچھک کتب میں اس کا نام سکونا ہے لیکن چائنا کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بہت اچھی اور مفید دوا ہے۔ ملیریا بخار کے بعد ظاہر ہونے والے بدائر ات میں بہت مفید ہے۔ ملیریا کا شاکد ہی کوئی ایسا مریض ہوجس کا سکونا سے علاج نہ ہوا ہو۔ اس کی علامتیں بخار پر غالب آ جاتی ہیں اور ملیریا کو دبا دیتی ہیں۔ ملیریا کے اکثر مریضوں میں یہ یوئی حالت میں موجو درہتی ہیں ، ان کے لئے چائنا بہترین دوا ہے۔ اس پہلو سے ملیریا کے بدائر ات اور اس کی دبی ہوئی علامتیں چائنا کے دائر ہائر میں آتی ہیں۔ بھی بھی مفید ثابت ہوتی ہے۔ اگر اس کی یہ خاص علامت نمایاں ہو کہ مریض سردی میں بھی شدید پیاس محسوس کرے حالا تکہ عموماً سردی ہوتو پیاس بالکل کہ مریض سردی میں بھی شدید پیاس محسوس کرے حالا تکہ عموماً سردی ہوتو پیاس بالکل عائب ہو جاتی تو پھر دوبارہ سخت پیاس گئی ہے۔ یہ علامتیں موجود ہوں تو غالباً چائنا دوا ہوگی۔

جیسا کہ بار ہا تنبیہ گزری ہے کہ ملیریا میں کوئی دوا بھی چڑھتے ہوئے بخار میں نہیں دینی جائے۔دوا دینے کا بہترین وقت وہ ہے جب بخارا تر رہا ہویا ٹوٹ چکا ہوا ور بخار کا اگلاحملہ شروع ہوا ہو۔ملیریا کے جراثیم بخار کے دورہ کے بعد بھاگ کر جگر میں گھس جاتے ہیں۔ جب وہ خون سے جگر میں منتقل ہو رہے ہوں اس وقت جوا بی حملہ کرکے ہیں۔ جب وہ خون سے جگر میں منتقل ہو رہے ہوں اس وقت جوا بی حملہ کرکے

انہیں تہس نہس کیا جاسکتا ہے۔ اگر پچھزندہ فی گئے تو پھر نکلیں گے لیکن پہلے سے کمزور ہوں گے۔ دوسرے حملہ پر بخارختم ہونے گئے تو پھر جوانی حملہ کریں۔ اگر چہ بظاہر یہ فلسفیا نہیں بات ہے لیکن ہے بیا یک ٹھوس حقیقت جس کا میں بار ہا تجربہ کرچکا ہوں اور بہت سے دیگر ہومیو پیتھک معالجین بھی اس کی گواہی دیں گے۔

ملیر یا بخار کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی کمزوری اور دیگر علامات کو دور کرنے کے لئے بھی چائنا بہت مفید دوا ہے۔ اس کا مریض چھونے سے خت زود حس ہوجا تا ہے، حرکت شخت کا کیف دیتی ہوا تا قابل برداشت ہوتی ہے۔ تمام اعصاب زیادہ حساس ہوجاتے ہیں۔ دما فی اور جسمانی کمزوری چائنا کی خاص علامت ہے۔ مریض بے حد چڑچڑا، لا پرواہ، مایوس اور بدمزاج ہوجا تا ہے۔ خیالات میں یکسوئی نہیں رہتی۔ دوسروں سے بات چیت کرتے ہوئے سلسلہ کلام ٹوٹ جا تا ہے۔ سرمیں شدید درد کو جوگر دن تک پھیلتا ہے، دبانے سے اور کرم کمرے میں آ رام ملتا ہے۔ پیشانی میں دھڑکن محسوس ہوتی ہے۔ مریض ملکا دباؤ برداشت نہیں کرسکتا جبکہ بھر پورد باؤسے آ رام آتا ہے۔ کمس، ہوا کے جھونکوں اور کسی چیز کی دھمک سے درد میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ آ رام آتا ہے۔ کمس، ہوا کے جھونکوں اور کسی چیز کی دھمک سے درد میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ آ کھوں کے گردنیلگوں سیاہی مائل حلقے پڑجا تے ہیں۔ جگر کی خرابی کی وجہ میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ آ کھوں کے گردنیلگوں سیاہی مائل حلقے پڑجا تے ہیں۔ جگر کی خرابی کی وجہ سے تکھیں زرد ہوجاتی ہیں اور دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ نظر کمزور ہوجاتی ہے اور عارضی اندھا پن بھی پیرا ہوجاتا ہے۔

نظام ہضم ست پڑ جاتا ہے۔ پھل اور کھٹی چیزیں کھانے سے معدہ میں در دہوتا ہے۔
کھانا ہضم نہیں ہوتا، پیٹ پھول جاتا ہے۔ اگر جگراور تلی میں سوزش ہوادر برقان کی علامتیں ظاہر
ہونے لگیں نیز پیتہ میں در دہوتو ان سب علامتوں میں اگر چائنا مزاجی دوا ہوگی تو مفید ہوگی۔ ایسی صورت میں یہ 30 طافت میں کچھ عرصے تک مسلسل کھلانی چاہئے۔

چا ئنا کے مریض میں خون بہنے کا رجحان ہوتا ہے۔ گلے، ناک اور رحم سے خون جاری ہوجا تا ہے۔ جس کے ساتھ شنجی علامات بھی پائی جاتی ہیں۔ حیض وقت سے بہت پہلے

شروع ہوجاتا ہے۔ <u>لیکوریا</u> میں بھی خون کی آ میزش ہوتی ہے۔ وضع حمل کے وقت سیلان خون کی وجہ سے درد رک جائے اور شنخ ہوجائے تو جا ئناایک اہم دوا ہے بشر طیکہ مریضہ میں اس کی دیگر علامتیں بھی پائی جائیں ۔نفاس کا خون بھی لمباعرصہ جاری رہتا ہے جس میں سخت بد بوہوتی ہے۔

چانا کے مریض کے باز ووں اور ٹاگوں میں موج آنے کی طرح کا در دہوتا ہے اور جھکے لگتے ہیں۔ عضلات میں مرگی کی طرح کا تشنج اور فالجی کمزوری بھی چائا کی علامت ہے۔ خون کا دوران سرکی طرف ہوتا ہے، کا نول میں گفٹیاں بحتی ہیں اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاجا تا ہے۔ ہیجانی کیفیت میں مریض بے ہوش ہوجا تا ہے۔ جریان خون کے بعد کمزوری کی وجہ سے مریض بے چین رہتا ہے اور بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ورتوں میں سیلان خون اور بچوں کو دودھ پلانے کے تیجہ میں خون کی کی واقع ہو جاتا ہے۔ جاتی ہے۔ دات کے وقت بہت پسیند آتا ہے۔ جلد پر ٹھٹڈک کا احساس ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ ٹیل اور ایک گرم ۔ ہاتھ پاؤں کا نیخ ہیں، مسوڑ ھے سوج جاتے ہیں، دانت ہمنے کا میں میں اور چہاتے ہیں، دانت ہمنے کا خواب کی وجہ سے مریض مزہ کڑوا اور خوراک بھی کڑوی یا ضرورت سے زیادہ نمکین لگتی ہے جس کی وجہ سے مریض خوراک سے نفرت کرتا ہے۔ دودھ پینے سے بھی معدہ خراب ہوجا تا ہے۔ مزمن اسہال دن کے وقت شروع ہوتے ہیں۔ دات کو بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس پٹرولیم میں اسہال دن کے وقت شروع ہوتے ہیں۔ اور رات کو بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس پٹرولیم میں اسہال دن کے وقت شروع ہوتے ہیں۔ اور رات کو بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس پٹرولیم میں اسہال دن کے وقت شروع ہوتے ہیں۔ اور رات کو بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس پٹرولیم میں اسہال دن کے وقت شروع ہوتے ہیں۔ اور رات سے پہلختم ہوجاتے ہیں۔

حیا ئنا میں عمو ماً پہیٹ کی ہوا میں بد بونہیں ہوتی اور سارا پہیٹے ہوا سے تن جا تا ہے۔ اس کی بیعلامت ہومیو پیتھک کتب میں نمایاں طور پر بیان کی جاتی ہے۔

> مددگاردوائيں: فيرم فاس _ كلكيريا فاس دافع اثر دوائيں: آرنيكا _ آرسنك _ نئس واميكا _ اپي كاك طاقت: عموماً 30 ورند 200يا 1000

303

75

سسٹس کینا ڈینس

CISTUS CANADENSIS

(Rock Rose)

مسٹس بر فانی علاقوں میں اگنے والے پھولوں کے ایک بودے سے تیار کی حانے والی دواہے۔ بیددوا بہت سردمزاج ہے۔اس کی ہر بیاری میں ٹھنڈک کا احساس یا یا جاتا ہے۔ سسٹس بہت گہرا اثر کرنے والی اینٹی سورک (Antipsoric) دوا ہے لیعنی وہ دوا جس کاتعلق اصلاً جلدی بیاریوں سے ہے۔ایسی بیاریاں خواہ غدودوں (Glands) پرحملہ کریں یا لعانی جھلیوں پر بنیادی طور پر وہ سورک ہی کہلاتی ہیں۔ سٹس بھی ان دواؤں میں شامل ہے جوسورا (Psora) کو جڑ سے اکھیڑنے میں مدودیتی ہیں۔اس لحاظ سے یہ بہت اہم اور انتہائی خطرناک بیاریوں میں کارآ مدہے۔ لیوپس اور کینسرجھی اس کے دائر ہ کارسے باہرنہیں رہتے۔ بیہ کلکیر با کے مقابلہ میں قدر بے زم مزاج رکھتی ہے کیکن بعض بھاریوں میں کلکیر یا ہے بہتر کام کرتی ہے اور غدودوں پر زیادہ اچھااٹر ڈالتی ہے۔انتر یوں کی بیاریوں میں بہت مفید ہے۔اگر کسی کو اسہال لگ جائیں اورکسی دوا ہے آ رام نہ آئے، غدودوں میں بھی سوزش ہوتو سسٹس کونظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔اسی طرح برانے نزلے کے مریض جو سسٹس کی بعض دوسری علامات بھی رکھتے ہوں وہ کسی اور دواسے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ایسے مریض عمو ماَّ ڈھیلے ڈھالےجسم والے اورزردروہوتے ہیں، بہت جلدسانس چڑھتاہےاوراونجائی پرچڑھنے سے سانس پھولتاہے۔ سسٹس کی ایک خاص علامت بیہے کدروزہ رکھنے سے پہلے پیدا ہونے والے سر درد میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ لائیکو بوڈیم، برائیونیا، نکس وامیکا اور مجلسیمیم بھی کہنے فاقہ

عسٹس

ك نتيجه ميں پيدا مونے والے سر در دميں كام آسكتے ہيں۔

سسٹس میں بسااوقات جلد کےاویر خارش کی علامتیں نہیں ملتیں بلکہ جلد کےاندر دب جاتی ہیں۔اس لئے جلد میں بے چینی سی اور کچھ رینگنے اور چیونٹیاں چلنے کا احساس ہوتا ہے۔اس سے مریض کے دل کو بھی سخت گھبرا ہٹ ہوتی ہے اور وہ بار بار دل پر ہاتھ مارتا رہتا ہے۔ زیادہ خارش كرنے كے نتيجه ميں بيد با ہوامرض جلد يرا بھرآتا ہے اور چھالے بن جاتے ہيں جنہيں حصلنے سےخون بہنے لگتا ہے۔ایسے مریض کو مسٹس دینے سے آ رام آ جا تا ہے لیکن کچھ وقفہ سے دوبارہ دیے رہنا جائے کیونکہ اس کی خارش لمبےعلاج کا تقاضا کرتی ہے۔اینے اثرات کے لحاظ سے پیر اتنی گہری دوا ہے کہ اچھے متنداور قابل ڈاکٹروں نے بید دعویٰ کیا ہے کہ بیہ چہرے کے دق (Lupus) میں جو قریباً لاعلاج مرض سمجھا جاتا ہے، اکیلی کافی ثابت ہوئی ہے۔ نیلے ہونٹ کے کینسر کےعلاج میں بھی اسے بہت شہرت حاصل ہے بید وابہت گہراا تر رکھنے والی ہے۔ سٹس میں دانتوں اور مسوڑھوں کی علامات سلفرسے بہت ملتی جلتی ہیں کین سلفرمیں بہت جلن اور چھبن یائی جاتی ہےاور دانت گل جاتے ہیں۔ سٹس میں جبڑوں کے عضلات میں کمزوری واقع ہوجاتی ہےجس کی وجہ سے دانت ڈھلے ہونے لگتے ہیں لیکن ان میں جلن نہیں ہوتی ۔ سسٹس کے نزلے میں بھی جلن نہیں بلکہ ناک کے اندر ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے جس سے نزلہ کا آغاز ہوتا ہے۔اگر بروفت مسٹس دے دی جائے تو نزلہ وہیں رک جائے گااور آ گے نہیں بڑھے گا۔اگر نزلہ شروع ہوجائے ، ناک میں موادجم جائے اوراس کے ا کھڑنے کے بعد جلن پیدا ہوتی ہوتو سسٹس دیں۔آ رسنک میں مواد کی موجود گی میں بھی جلن رہتی ہے۔ سٹس میں مادہ باہر نکا لنے سے سکون آ جا تا ہے۔ سانس، زبان، حلق اور گلے میں مٹنڈلگتی ہے، خشک اور ٹھنڈی ہوا سے در دہونے لگتا ہے۔ گلاسوج کراس میں پیپ بن جاتی ہے اور گردن میں ورم کی وجہ سے سرایک طرف کومڑ جاتا ہے۔ مریض جسم کے مختلف حصوں میں سردی محسوس کرتا ہے۔ کھانا کھانے سے قبل اور بعد معدہ اور تمام پیٹ میں ٹھنڈک کا

احساس ہوتا ہے۔ پنیر کھانے کی بہت خواہش ہوتی ہے۔ پتلے اور زور دار دست لگ جاتے ہیں جوعموماً صبح کے وقت زیادہ آتے ہیں۔ مریض کا دل تیز مسالے دار چیزیں کھانے کو چاہتا ہے خصوصاً عور توں کا۔ سسٹس میں ہاتھوں کی جلد سخت، خشک اور موٹی ہو جاتی ہے، سخت خارش ہوتی ہے اور مریض بے چینی کی وجہ سے سونہیں سکتا۔

عورتوں کی چھا تیوں کے گلینڈز کی خرابی میں بھی بید دوا مفید ہے لیکن اس کی کوئی امتیازی علامت نہیں ہے۔ چھا تیوں امتیازی علامت نہیں ہے۔ شایداس دوا کی دیگر علامتوں کی وجہ سے پہچان ہو سکے۔ چھا تیوں کے غدودوں کا بڑھ جانا جو بعض دفعہ کینسر بن جاتے ہیں۔ان میں استعال ہونے والی دواؤں میں سسٹس بھی ہے۔ خناز رر اہجیریں) یعنی گلے کے باہر گلٹیوں کی زنجیرسی بن جائے اور گلینڈز سوج ہوئے ہوں تو یہ سسٹس کی خاص علامت ہے۔اگر گلے کی اندرونی اور بیرونی علامات میں گلینڈز ریکوئی اثر ظاہر نہ ہوتو پھر سسٹس دوانہیں ہے۔

کان کی تھجلی میں اگر خارش کرنے سے آرام نہ آئے ، چھیل چھیل کرزخم بن جائیں اور اور ان میں پیپ بینے گئے تو سسٹس کام آسکتی ہے۔ کھانسی میں بھی ایسی ہی خارش اور بے چینی پائی جاتی ہے۔ بیاری کی جڑیں نیچ تک جاتی ہیں اس کئے اوپر کی تھجلی سے فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک کہ اندر کا مرض ابھر کر اور باہر نکل کر جلد پر ظاہر نہ ہو جائے۔ایلو پیتھک سائنس کے مطابق جسم کے اندر جو بھی مرض ہووہ الگ مرض ہوتا ہے اور جلد کو لگنے والے امراض الگ ہوتے ہیں۔لیکن ہومیو پیتھک نظریہ کے مطابق یہ ایک ہی بنیادی کمزوری کے مختلف اظہار ہوتے ہیں۔ واندرونی جھلیوں اور غدودوں پر اور بیرونی جلد پر الگ الگ بیاریوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔

ناخنوں کی تکلیفوں میں بھی سسٹس اہم دوا ہے۔ اگر بعض امراض گہری اتر جا کیں تو وہ ناخنوں پر اثر دکھاتی ہیں۔ ناخنوں میں کیسریں بن جاتی ہیں، ناخن موٹے اور بھد سے ہوکر ٹیڑھے میڑھے ہونے لگتے ہیں اور ان کی شکل بدل جاتی ہے۔ بیاریوں سے ناخنوں کے اس تعلق میں سسٹس ایک نمایاں دوا ہے۔ بعض اور دوائیں بھی ناخنوں پر

عسٹس

اثر انداز ہوتی ہیں۔ سسٹس میں ناخنوں کی ہرفتم کی بدوضعی پائی جاتی ہے۔ اگر سسٹس کی دوسری علامات بھی نمایاں ہوں تو ناخنوں کی تکلیف کے لئے بھی یہ بہترین ثابت ہوگی۔اس کی تکالیف جھونے سے، حرکت سے، رات کو ٹھنڈی ہوا کے جھونے سے اور دماغی محنت سے زیادہ ہوجاتی ہیں۔ کھانا کھانے سے اور بلغم نکا لئے سے کم ہوجاتی ہیں۔

ماتی جلتی دوائیں: کو نیم رکار بووت کے کلکیریا اورار جنٹم نائیٹر کیم۔ اینٹی ڈوٹ: رسٹاکس سیپیا طاقت: عموماً 30 طاقت کام آتی ہے لیکن حسب ضرورت اونچی طاقت دی جاسکتی ہے۔ ليمثس 307

76 کلیمٹس امریکٹا

CLEMATIS ERECTA

(Virgin's Bower)

کلیمٹس ایک بہت گہری دواہے اوراس کا ہرسم کی جلدی امراض سے تعلق ہے۔اگر کسی کلیمٹس کا زہر دیا جائے تواس میں طرح کی جلدی امراض ظاہر ہوجاتی ہیں جن میں ہر فتم کے ایگز ہے، خارش، چھالے اور دانے وغیرہ شامل ہیں۔ اپنے جلدی اثر ات کے لحاظ سے کلیمٹس رسٹاکس سے مشابہت رکھتی ہے بلکہ اس سے زیادہ گہری دوا ہے۔ یہ کینسر کے دبحان اور خصوصاً جلد کے کینسر Epithelioma کے لئے مفید ہے۔ کیمٹس میں جلدی تکلیفیں ٹھنڈ سے بانی ، ٹھنڈ ہے موٹھوں کے در دمیں پنی مختد ہے۔ مسوڑھوں کے در دمیں ٹھنڈے ہے نگیف بڑھ جاتی ہے۔

کلیمٹس کے جھالوں میں عموماً زردی مائل پیپ پیدا ہونے کار جھان پایا جاتا ہے۔ داد
سے مشابہ بھاریاں اور ایگزیما کی مختلف قسمیں بھی اس دوا کے دائر ہ کار میں ہیں۔ جلد پر سرخ
دانے بن جاتے ہیں جن میں شدید جلن ہوتی ہے۔ بید دانے زیادہ تر سر، ہاتھوں اور چہرے پر
ہوتے ہیں۔ ایگزیما کے علاوہ جلد میں کسی چیز کے رینگنے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ عارضی طور پر
محجلانے سے آرام آتا ہے۔ کنپٹیوں میں در داور سرمیں پراگندگی کا احساس ہوتا ہے۔ کھلی ہوا میں
اس تکلیف کو افاقہ ہوتا ہے۔

بہت می مردانہ امراض میں کلیمٹس استعال ہوتی ہے۔خصوصاً دائیں نالی کی سوزش میں جس میں ماد وُ منویہ حرکت کرتا ہے۔ نیز اس طرف کے خصیے کی سوزش اور ورم میں بیاو نیچ درجے کی دوابتائی جاتی ہے۔ بیچض دائیں طرف کام کرتی ہے۔ اس کے مریض

کے پیشاب کی علامات سے ہیں کہ پیشاب کی نالی میں سرسراہٹ جو پیشاب کے بعد کچھ عرصہ تک جاری رہتی ہے۔ بار بارتھوڑ اتھوڑ اپیشاب آتا ہے جس کے آخر پر جلن بھی ہوتی ہے۔ پیشاب رکاوٹ سے آتا ہے۔ بعض دفعہ صرف قطرہ قطرہ اور پیشاب کے بعد بھی قطرہ قطرہ پیشاب آنے کار جحان ایک دو منٹ تک جاری رہتا ہے۔ دائیں طرف کے مثانے کے ورم میں بھی کار آمد ہے۔

سوزاک(Gonorrhoea) کے دب جانے کے نتیجہ میں جو بیاریاں پیدا ہوتی ہیں۔اس سے ملتی جلتی بیاریاں کلیمٹس میں یائی جاتی ہیں۔

کلیمٹس کے دانت کے درد رات کواور تمبا کو کی بوسے زیادہ ہوجاتے ہیں۔خصوصاً بستر کی گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے۔

کلیمٹس میں آنکھول میں سخت جلن اور ترارت محسوں ہوتی ہے جیسے آ گنگل رہی ہو۔ ہوا کا جھونکا بھی برداشت نہیں ہوتا، پانی بہتا ہے اور آئکھیں سوج جاتی ہیں خصوصاً بائیں آئکھ۔ مریض کے لئے آئکھیں کھولنا دشوار ہوتا ہے۔

کلیٹس کی ایک خاص علامت بیہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد سارے جسم میں کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور شریانوں میں تیکن اور دھڑکن پائی جاتی ہے۔ کھانا کھاتے ہی سیری کا احساس ہوتا ہے۔ <u>سینہ سے لے کر پیٹ</u> تک چھنے والا درد ہوتا ہے جوسانس لیتے ہوئے بڑھ جاتا ہے۔

کلیمٹس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کی تکلیفوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جاندگی تاریخ بڑھنے سے علامات بڑھتی اور جاند گھٹنے کے زمانے میں کم ہوجاتی ہیں۔نہانے کے بعد بھی تکلیفوں میں اضافہ ہوجاتا ہے۔

کلیمٹس کے متعلق یا در گیس کہ جن مریضوں کو بیدی جائے بسااوقات ان کا منہ خشک ہو جاتا ہے اور پیاس بہت لگتی ہے۔ یانی پینے کے باوجود منہ کی خشکی دور ہونے میں نہیں آتی۔اس حالت سے مریضوں کو پہلے ہی متنبہ کر دینا جا ہئے۔

دافع اثر دوائيں: برائيونيا - كيمفر طافت: 30 سے 200 تك كاكولس 309

77

كاكولس

COCCULUS

(Indian Cockle)

کاکوس چکروں کی مشہور دوا ہے۔ کانوں کے درمیانی حصہ میں موجود سیال مادہ کا توازن بگڑ جائے یا وہ اعصاب کمزور پڑ جائیں جو کان سے توازن کے احساس کو دماغ تک پہنچاتے ہیں تو یہ پیغام ذراسی تا خیر سے پہنچ لگتا ہے۔ جس کے نتیجہ میں انسان کو چکر آنے لگتے ہیں اور وہ اپنے توازن کو برقر ارنہیں رکھ سکتا۔ اگر مریض اپنا سرادھرادھر ہلائے تو د ماغ حرکت کے اس پیغام کوذراد ہر سے محسوس کرتا ہے۔

اعصائی نظام میں کمزوری پیدا ہونے کی وجہ ہے جسم اور دماغ کی چسی ختم ہوجاتی ہے۔ مریض کو تھکاوٹ اور کمزوری محسوں ہوتی ہے۔ بعد میں یہ کمزوری فالج میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ اس کیفیت میں عموماً وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جنہوں نے لمباعرصہ اپنے قریبی عزیزوں کی تیارداری کی ہو، رات دن مسلسل جا گنا پڑا ہواور فکر اور پریشانی دامنگیر رہی ہو۔ اس کے نتیجہ میں جو کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ کاکولس ہے۔

عام طور پر دائیوں اور نرسوں کوالی کمزوری لاحق نہیں ہوتی کیونکہ وہ تیار داری لطور پیشہ کرتی ہیں۔ مریض سے ان کا ذاتی قلبی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کی جسمانی تھکا وٹ اعصابی دباؤ میں تبدیل نہیں ہوتی۔ اگر ذہنی دباؤ کی وجہ سے جسمانی تھکا وٹ ہویا جسمانی تھکا وٹ ہویا جسمانی تھکا وٹ ہویا جسمانی تھکا وٹ کے ساتھ ذہنی دباؤ بھی ہوتو جسم میں بھی کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے۔ نینر نہیں آتی۔ ہر وقت فکر اور پریشانی لاحق رہتی ہے جس کی وجہ سے سر در دہوجاتا ہے۔ چکر ، متلی اور قے کار جمان ہوتا ہے۔ حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے۔ چلتے ہوئے جھٹکا لگ جائے اور قے کار جمانی ہوجاتی ہے۔ ایسے مریض کی علامات میں سفر کے دوران اضافہ ہوجاتا

ہے۔ اچا نک حرکت سے توازن بگڑ جائے تو کا کوس اول طور پر ذہن میں آئی چاہئے۔

کا کوس کے پرانے مریض کی جلد پر کیکی طاری ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز پکڑتے

ہوئے ہاتھ کا نیخے ہیں۔ اعضاء آپس میں ہم آ ہنگ نہیں ہو سکتے اوران میں عدم آوازن پایا جاتا ہے۔

ایسے مریض اچا تک مزنہیں سکتے۔ انہیں آ ہستہ آ ہستہ مڑنا پڑتا ہے ور نہ شدید چکر آتے ہیں۔

کا کوس کی بعض علامتیں بیلا ڈونا سے ملتی ہیں۔ بیلا ڈونا میں بھی چکر آتے ہیں جو
اچا تک حرکت سے بڑھ جاتے ہیں لیکن بیلا ڈونا میں خون کے دباؤ میں کی بیشی کی وجہ سے چکر
آتے ہیں۔ دونوں دواؤں میں معمولی ساشور اور جھٹکا بھی نا قابل برداشت ہوتا ہے۔ بے خوابی

اور دیگر ذبنی تناؤ بھی دونوں میں مشترک ہے۔ تا ہم یہ دونوں دوائیں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں

البتہ کا کوس میں بیلا ڈونا کے برعکس مریض کا چہرہ بالکل عام سے رنگ کا ہوتا ہے اور چہرے کی
طرف خون کا غیر معمولی رجحان دکھائی نہیں دیتا۔

کاکوس میں عضلات کی تختی اور اکڑن پائی جاتی ہے۔اعضاءکوسکیٹرنے یا پھیلانے سے شدید در دہوتا ہے۔

کاکولس میں پیٹ درد کا دورہ شدید ہوتا ہے۔ معدہ میں اینٹھن اور مروڑ اٹھتے ہیں۔ درد سے بعض اوقات سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔ کئ عورتیں تکلیف کی شدت سے بہوش ہوجاتی ہیں۔ کھانے سے نفرت ہوجاتی ہے اور بھوک کا احساس ختم ہوجاتا ہے۔

کاکونس میں جہاں پیغامات کے ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہونے میں آ ہستگی پائی جاتی ہے وہاں وقت کے تیزی سے گزرنے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ٹا گلوں میں بہت خطرناک فالجے کا حملہ ہوتا ہے جس سے دونوں ٹائکیں بے حس ہو جاتی ہیں۔اس فالج کے پس منظر میں کمبی فکر،رت جگا،مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔

کاکوس کا مریض ذہنی دباؤ اوراعصابی کمزوری کی وجہ سے ہرسوال کا جواب آ ہسگی سے دیتا ہے۔ تصورات کی دنیا میں غرق رہتا ہے۔ اسے شدید افسردگی کے دورے پڑتے

ہیں۔ د ماغ بوجھل رہتا ہے۔اس کے علاوہ بیلا ڈونا اور گلونائن کی طرح دھوپ میں کام کرنے سے پیدا ہونے والے سر درد میں بھی کا کولس مفید ہے۔

کاکولس میں بینائی دھندلا جاتی ہے کیکن یہ کیفیت مستقل نہیں ہوتی۔اعصابی کمزوری کی وجہ سے کچھ عرصہ کے لئے نظر دھندلا جاتی ہے۔ زہنی تھکان بھی عارضی ہوتی ہے۔ آئکھول میں درد کی وجہ سے خصوصاً رات کے وقت آئکھیں کھولنی مشکل ہوں، بیوٹے متورم ہول اور پتلیال سکڑ جائیں تو یہ بھی کاکولس کی علامت ہے۔

کاکوس میں منہ کا ذا گفتہ دھات کی طرح ہوجا تا ہے جس میں ہلکی ہی تیز ابیت پائی جاتی ہے۔ معدہ میں کھٹاس متلی اور قے کار جحان پایا جاتا ہے۔اس میں ملیریا کی ہی علامتیں بھی ہیں مگرسار ہے میں دردوں کی بجائے صرف ٹائلوں میں دردہوتا ہے۔اس علامت کے ساتھ چکر اور متلی کے ساتھ جو بخار شروع ہواس میں کا کولس مفید دوابتائی جاتی ہے۔

کاکوس کے مریض کے لئے کھانے کی بو نا قابل برداشت ہوتی ہے بلکہ اس ہے متلی شروع ہوجاتی ہے۔کولچیکم میں بھی بیعلامت ہے۔اگر کسی غدود میں سوزش ہوتو اس کے لئے کرئیوزوٹ (Kreosotum) اور بعض اور دوائیں اہم ہیں لیکن کا کولس میں بیہ تکلیف فالجی کیفیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔اسی طرح انتر یوں اور پیٹ کے عضلات کی فالجی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔اسی طرح انتر یوں اور پیٹ کے عضلات کی فالجی کمزوری کی وجہ سے بھوتی ہے۔اسی طرح انتر یوں اور پیٹ کے عضلات کی فالجی کمزوری کی وجہ سے بھوتی ہے۔اور فضلہ بہت مشکل سے خارج ہوتا ہے۔

حیض جلد یا بہت تا خیر سے آتے ہیں اور لمباعرصہ چلنے والے ہوتے ہیں لیکن سے معلامتیں اور بھی بہت ہی دواؤں میں پائی جاتی ہیں۔ کا کولس کی مزاجی علامتیں پیش نظر رکھنی چا ہئیں۔ اگر وہ موجود ہوں تو پھر کا کولس ہی دوا ہے۔ عمومی کمزوری، جزوی فالج، حرکت سے تکلیف اور اعصاب کی پیغام رسانی میں آ ہستگی کا کولس کی خاص علامتیں ہیں۔ دو حیضوں کے در میان سفید پانی کی طرح لیکوریا جاری ہونا اس کی خاص علامات میں داخل ہے جو بہت کمزور کرنے والا ہوتا ہے اتنا کہ عورت کے لئے بات کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ دایاں اور بایاں ہاتھ باری باری ٹھنڈے اور گرم ہوتے رہتے ہیں اور سن بھی

ہوجاتے ہیں نیزان پر مطندالسینہ بھی باری باری آتا ہے۔

کاکولس میں مریض ہوا کے جھو نکے برداشت نہیں کرسکتا۔ ٹھنڈی اور گرم دونوں ہواؤں سے زود حس ہوجا تا ہے۔ کھلی ہوا، دھوپ اور بستر کی گرمی میں تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں نیز رات کے وقت تکلیفوں میں اضافہ ہوجا تا ہے۔

روزمرہ استعال کے لئے 30 طاقت کافی ہے لیکن نچلے دھڑ کے فالج کے لئے دواایک لاکھ میں دینی پڑتی ہے جسے لمبے عرصہ کے بعد دہرانا پڑتا ہے۔ کاکولس کے اس خاص فالج کے ازالہ کے لئے اگر کوئی دوا کام آسکتی ہے تو کاکولس ہی ہے ور نہایسے مریض عموماً زندگی بھرلاعلاج رہتے ہیں۔

دا فع اثر دوا ئیں: کا فیا بیکس وامیکا طاقت: عموماً طاقت 30اور مخصوص فالج کے لئے ایک لا کھ طاقت كوكس 313

78

كوكس كيكطا في

COCCUS CACTI

(Cochineal)

کوئس کیٹائی کوعموماً روزمرہ کی سطحی اور عارضی بیاریوں میں استعال کیا جاتا ہے لیکن میہ ایک بہت گہرااثر کرنے والی دواہے اور جن دائروں میں بیکام کرتی ہے ان میں مزمن بیاریوں کو دورکرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔اس لئے اسے صرف عارضی دوانہیں سمجھنا چاہئے۔

کوکس کے تمام اخراجات لیس دار لمبے بٹے ہوئے دھا گہ کی طرح ہوتے ہیں۔اس کی پیپ کا دھا گہ سویٹر کی اون کی طرح ادھڑتا ہے۔اخراجات بل کھاتی ہوئی رسی کی طرح بٹے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔

کالی کھانسی میں بھی بیہ علامت کو کس کیکٹائی کی نشاندہی کرتی ہے۔اس پہلوسے بیہ کالی بائی کروم سے مشابہ ہے۔اس میں بھی اخراجات کالیس داراور دھا گے دار ہونا اور کالی کھانسی میں بہت مفید ہونا کوکس سے مشابہ ہے۔

کوس کے مریض عموماً سردیوں کے موسم میں بیارر ہتے ہیں۔ جب تک موسم گر ماشروع نہ ہو جائے ان کی تکلیفوں کو آ رام نہیں آتا اور نزلہ زکام پیچھانہیں چھوڑ تا۔ اگران کے اخراجات میں دھا گہ بننے کی علامت موجود ہوتو بے تکلف کو کس دیں جو بہت گہری ، فوری اور دیریا اثر کرنے والی دوا ہے۔

کھانسی اور نزلہ زکام گرم کمرے میں جانے سے بڑھ جا تا ہے اور ٹھنڈ سے اور ٹھنڈ ایانی پینے سے آ رام آتا ہے کین نیکنیفیں کچھ عرصہ کے بعد پھر عود کر آتی ہیں۔ ان تضادات کو ہمیشہ یا در کھنا چا ہئے۔ ورزش کے نتیجہ میں بیدا ہونے والی گرمی نقصان دہ ہے۔ بیرونی سردی لگنے سے بیاریاں جڑ پکڑتی ہیں

اور اندرونی گرمی کے نتیجہ میں علامتوں میں تیزی آ جاتی ہے مگر بعض دفعہ ہیرونی گرمی سے بھی بیاری میں اضافہ ہوتا ہے۔

کوکس میں اونچائی پرچڑھتے ہوئے سانس میں دفت اس لئے بیدا ہوتی ہے کہ سینہ میں بلغم بھری ہوتی ہے۔ دل کی کمزوری سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر بلغمی قے آ جائے تو چھاتی ایک دم ہلکی ہوجائے گی اور اونچائی پرچڑھنے میں دفت پیش نہیں آئے گی۔

کوس میں بلغم نکالنے کی کوشش سے کھانسی کا تعلق ہے جس کی وجہ سے گلے میں تشنج ہو جاتا ہے۔ کوکس کی بنیادی پہچان جلداور اندرونی جھلیوں کی زود حسی ہے جیسے چھوئی موئی کے بودے کے قریب جائیں تو وہ سکڑ جاتا ہے۔ یہ بھی بہت ہی چھوئی موئی دوا ہے۔ گلے میں زود حسی اس کی خاص علامت ہے۔ بعض اوقات نگلنے میں بھی دفت ہوتی ہے۔

کوکس کے مریض کے بیشاب کی علامتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ بیشاب کی سخت حاجت،اس میں پکی اینٹ کے ذرول کی طرح سرخ ذر ہے اور باریک پھریاں اور یورک ایسٹر (Uric Acid) کی ملاوٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے گردے سے مثانے تک کاٹنے والے دردول کی لہریں چلتی ہیں۔ بھی اچا تک بیشاب بند ہوجا تا ہے۔

عورتوں کی علامات میں ماہواری کازیادہ گاڑھا، سیاہی مائل اور لوتھڑ سے دار ہونا اس کی علامات میں شامل ہے جس کے ساتھ عموماً بیشاب رکنے کی بیاری بھی ہو جاتی ہے۔ ماہواری رک رک کرآتی ہے اور صرف رات کو جاری ہوتی ہے۔

بہنے والانزلہ خم ہونے کے بعد زر درنگ کی چیکنے والی رطوبت ناک میں جم جاتی ہے۔
ناک صاف کرنے کے بعد سطح پر جلن کا احساس ہوتا ہے۔اس میں بہت پیاس پائی جاتی ہے۔
ذہنی، پژمردگی، خاموثی، اداسی یا بہت باتیں کرنے کی علامات کیکیسس سے ملتی ہیں۔کوکس میں
نزلہ کا اثر معدہ،انتر یوں یا اندرونی جھلیوں پر بھی ہوتا ہے۔

طاقت: عموماً 30

كافيا 315

79

كافياكرودا

COFFEA CRUDA

(Unroasted Coffee)

کافی ایک مشروب ہے جسے دنیا کے اکثر ممالک میں شوق سے استعال کیا جاتا ہے۔ خصوصاً مغربی دنیا میں اس کا بہت رواج ہے۔ کافی پینے سے نینداڑ جاتی ہے، اعصاب میں زودسی پیدا ہو جاتی ہے، خیالات میں تیزی آ جاتی ہے اور دماغ چست ہو جاتا ہے۔ اس لئے باوجود سونے کی کوشش کے نینز نہیں آتی۔

ہومیو پیتھی میں کافی سے کافیا کروڈا دوائی بنائی گئی ہے۔اگر بہت ہو لنے اور ذہنی ہیجان کی وجہ سے نیندنہ آئے تو کافیا کی ایک دوخورا کیں ہی پرسکون نیند لے آتی ہیں۔انسان اتن جلدی سوتا ہے کہ نیندسے پہلے کی ہلکی سی مدہوثی بھی محسوس نہیں ہوتی۔کس وامریکا میں بھی بہی علامت ہے کہ یہ دواا چا نک نیندلا تی ہے۔نکس وامریکا اور بیلا ڈونا کی ایک علامت کافیا میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ شور سے طبیعت گھبراتی ہے اور آوازیں تکلیف دیتی ہیں لیکن کافیا اس لحاظ سے ان دونوں دواؤں سے الگ ہے کہ شور کے دوور کی تکلیف اعضاء کے کناروں پر دردوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے نیز شور سے ٹانگ یا گھٹے کا درد یکدم جاگ اٹھتا ہے۔شور کا بیا اثر کہ سوئے ہوئے دردوں کو جگا دے کا دائی کی خاص علامت ہے۔

کافیا کی علامات غم کی بجائے خوشی کے جذبات سے پیدا ہوتی ہے لینی اچا نک خوشی کی خبر ملنے سے جذبات میں جو ہیجان پیدا ہوتا ہے وہ کافیا کی علامت ہے۔ غم کے نتیجہ میں نینداڑ جائے تواس کے لئے بالکل اور نوعیت کی دوائیں ہیں۔

کافیا کا مریض شراب سے بہت زودحس ہوتا ہے۔جن ملکوں میں بکثرت شراب بی

جاتی ہے وہاں کا فیا مزاج کے مریض شراب کو ہاتھ لگانے سے بھی پر ہیز کرتے ہیں اور شرا بی عموماً شراب کا اثر زائل کرنے کے لئے کافی پیتے ہیں۔

کافیامیں جلدی زودسی نا قابل بیان ہے۔ عجیب سم کی سنسنا ہاور در دکی کیفیت ہوتی ہے۔ اس زود حسی کے قریب تر دوا زکم ٹیلیکم ہے۔

کافیا کے مریض کو قدموں کی چاپ سے سخت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اس کی جلد پراس گھبراہٹ سے خارش کے دانے ہیں جو گھبراہٹ سے خارش کے دانے ہیں خودار ہوجاتے ہیں۔ کافیامیں سرخ دانے بن جاتے ہیں جو اچا نک ظاہر ہوتے ہیں اور اچا نک ہی غائب ہوتے ہیں۔ وہ اعصا بی دباؤجس کی وجہ سے یہ دانے ظاہر ہوئے ، مستقل نہیں رہتا مگر معدے اور خون کی خرابی کی وجہ سے بیدا ہونے والی جلدی علامتیں لماعرصہ چلتی ہیں۔

کافیا آناً فاناً اثر کرنے والی دوا ہے۔ غیر معمولی ہیجان اور ذہنی تھکا وٹ کی وجہ سے نینداڑ جائے تو فوری اثر دکھاتی ہے۔ اسی طرح دوسری بیاریوں میں بھی بہت جلد فائدہ بہنچاتی ہے۔کافیا کے بعض مریضوں کو ہسٹریا ہوجا تا ہے۔جذبات کے غلبہ کے نتیجہ میں بے ہوشی طاری ہوتی ہے۔جذبات کی تحریک سے دندل پڑ جانا (بتیسی بند ہوجانا)،شدید سردرد، چرے کے اعصانی درد اوراسہال جاری ہوجانا بھی کافیا کی علامتیں ہیں۔

کافیا کے مریض بہت ذہین ہوتے ہیں۔بات سنتے ہی فوری رعمل دکھاتے ہیں۔احساس میں غیر معمولی تیزی آ جاتی ہے۔ دور کی آ وازیں سنائی میں غیر معمولی تیزی آ جاتی ہے۔ دور کی آ وازیں سنائی دینے گئی ہیں جوعام لوگوں کوسنائی نہیں دینیں۔سونے کے لئے کیٹیں تو نیندگی بجائے دور سے کتے بھو نکنے کی آ وازیا دوسر سے جا نوروں کی آ وازیں آ نے گئی ہیں۔ آ وازوں کی وجہ سے بھی بعض تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ایک اور دلچسپ علامت یہ ہے کہ بیتے ہوئے زمانے کے خوشگوار واقعات ذہن میں جاگ اٹھتے ہیں۔ ریانے بڑھے ہوئے اشعاریا د آ نے گئتے ہیں۔ دماغی قوی میں غیر معمولی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ دود سی واشعور کی طرف موجاتی ہے۔ دود سے واقعات یاد آنے گئتے ہیں۔ دور کی واقعات یاد آنے گئتے ہیں۔ دور کی

كافيا 317

آ وازیں سنائی دیتی ہیں۔ پرانے زمانوں کے مزے اور خوشبوئیں بھی یا دآ جاتی ہیں۔ کا فیا کی پیملامات مزے مزے کی علامتیں ہیں۔

کا فیا کا مریض سردی سے بھی زودحس ہوتا ہے۔ منہ اور دانتوں کے درد میں برف کا پانی منہ میں رکھنے سے آرام ملتا ہے۔ دانتوں کا درداعصا بی تکلیف کی وجہ سے ہوتا ہے۔اس میں کوئی معین قانون نہیں چلتا۔ کا فیا کے دانت در دکوٹھنڈ آرام دیتی ہے۔

کا فیا کے مریض کا چہرہ عموماً تمتمایا ہوا نہیں ہوتا لیکن بعض نکلیفوں میں سر کی طرف دوران خون ہڑھی جاتا ہے، چہرہ اور سرگرم ہو جاتے ہیں۔لیکن مریض ہوش مند اور باشعور رہتا ہے۔ بیلا ڈونا کی طرح اس پرغنو دگی طاری نہیں ہوتی۔

کا فیا کی ایک اور عجیب علامت یہ ہے کہ گدی کے پیچھے کسی چیز کے چٹننے کا احساس ہوتا ہے۔کا فیا میں ان آ وازوں کا مرکز گدی میں ہوتا ہے۔

کا فیا کے اثر ات کوزائل کرنے کے لئے نکس وامیکا سب سےموثر دواہے۔

کا فیا کی زنا نہ علامتوں میں اعضاء کی غیر معمولی خارش پائی جاتی ہے۔ دل تیزی سے دھڑ کتا ہے اور بیددھڑ کن بے قاعدہ بھی ہو جاتی ہے جوا جا تک کسی خوشی یاغم کی خبر کے متیجہ میں ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ا جا نگ خون کا دباؤ بہت بڑھ جاتا ہے اور پیشاب دب جاتا

- 4

مد د گار دوا: ایکونائٹ

طاقت: 30 سے 200 تک

كالچيكم ما

80 کاچیکم

COLCHICUM

(Meadow Saffron)

یددواگھاس کے سبزہ زاروں میں اگنے والے خودروزعفران کے پھولوں سے تیار کی جاتی ہے۔ اس کے نمایاں اثر ات میں شدید سم کا گاؤٹ اور گاؤٹ کے دردوں کا جگہ بدلنا، کھانے کی بو سے سخت متلی اور انتر یوں کا شدید شخص ملتے ہیں۔ اس کے مریض کو سخت بودار اسہال بھی لگ جاتے ہیں۔ تمام عوارض اخراجات کے رکنے سے بہت شدید ہوجاتے ہیں۔ ٹھنڈ نے نم دارموسم میں تکلیفیں بڑھتی ہیں۔ خصوصاً اگر گردوں پر اثر پڑے اور پیشاب کی مقدار کم ہوجائے۔ اسی طرح خارجی اثر ات سے پسینہ بند ہونے کا بھی عوارض پر بہت برااثر پڑتا ہے۔ نم دارسردی یابالکل خشک خارجی اثر ات سے پسینہ بند ہونے کا بھی عوارض پر بہت برااثر پڑتا ہے۔ نم دارسردی یابالکل خشک گرمی میں تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ آئکھوں میں بھی گاؤٹ کے آثار ملتے ہیں اور دانتوں میں بھی ، خصوصاً دانتوں میں گاؤٹ کے مادے اسکھے ہوجانے کی وجہ سے دانتوں کے اردگر دمسوڑھوں میں سخت درد شروع ہوجاتا ہے۔

ہیتو اس کاعمومی تعارف ہے۔اب بعض اعضاء کا نام لے کران سے تعلق رکھنے والی علامات بیان کی جاتی ہیں۔

چېرہ:۔ متورم اور جلد پر سنساہٹ پائی جاتی ہے۔ کلے بہت سرخ اور نسینے والے۔ مزاج کیمومیلا کی طرح سخت غصیلا۔

معدے کی تکلیفوں میں اکثر زبان جلتی ہے۔ دانتوں میں بھی درد ہوتا ہے۔ منہ خشک اور پیاس بہت لگتی ہے۔ کھانے کی بوسے خصوصاً مچھلی پکنے کی بوسے بعض دفعہ مثلی اتنی شدید ہوتی ہے کہ مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یا تو معدے میں سخت گرمی محسوس ہوتی

ہے یا شخت سردی۔

پیرٹ:۔ انتر یوں کے شنج کی وجہ سے پیٹے ہوا سے ایساتن جاتا ہے کہ کم ہی ایسا تناؤ دوسری دواؤں میں دکھائی دے گا۔ بیا نتڑیوں کاتشنج اوراس کے نتیجہ میں ہوا کا بڑھتا ہوا دبا وُعرف عام میں ایھارا کہلاتا ہے۔اس قسم کا ایھارا مویشیوں میں بھی ملتا ہے (اگر وہ ابیا چاره استعال کریں جس میں ہائیڈروسائینک ایسڈ (Hydrocyanic Acid) پیدا ہو چکا ہو) اس قتم کے ابھارے میں خواہ وہ گائے ، بھینس، بھیڑ بکری، گھوڑ ا کو ہو، اس سے ملتا حبتیا ایھارہ انسانوں میں بھی ملے تو کالچیکم کی چند گولیاں جادو کا سااثر دکھاتی ہیں۔ اس کا پیراٹر اتنا نمایاں اور بقینی ہے کہ کوئی ہومیو پیتھ اسے ہومیو پیتھک کے منکرین کو ہومیو بیتھی پریقین دلانے کے لئے اس کا مشاہدہ کراسکتا ہے۔ جانوروں کے جس ایھارہ کا ذ کر کیا گیا ہےاس میں اکثر زمیندار جراح کو بلا لیتے ہیں جوپسلی میں نشتر گھونپ کرایسے جانور کی ہوا با ہر نکالتا ہے لیکن اس صورت میں بسااوقات ایسے جانو رمرنے کے قریب ہو جاتے ہیں اور مرنے سے پہلے انہیں ذبح کر لیا جاتا ہے۔اگر کالچیکم دوسوطافت کی چند گولیاں میسر ہوں تو قیمتی جانوروں کا اس طرح ضیاع نہ ہو۔ دوسو طاقت میں اس کا یہ اثر ان سائنس دانوں کے لئے نا قابل فہم ہے جو جانتے ہیں کہ 200، 100 کا ہندسہ کس حسابی عدد کوظا ہر کرتا ہے۔ گویا ہومیو پیتھک دوامیں اصل کالچیکم کے مادے کا ایک ایٹم یا ایک ایٹم کا ارب واں حصہ بھی موجو دنہیں رہے گا پھر بھی بید واا تنا قطعیت کے ساتھ اپنااثر دکھاتی ہے۔ کمر:۔ کمر میں پیٹھ کے نیلے جھے میں در دجو دونو ں طرف کولہوں میں بھی محسوس ہوتا ہے۔ آرام کرنے اور دباؤسے افاقہ ہوتا ہے۔

جلد:- گلابی نشان جگہ جگہ پڑجاتے ہیں اور چھپا کی کار جھان ملتا ہے۔ پیٹ کی خرابی میں مٰدکورہ تشنجی ابھارے کے علاوہ معمولی مقدار میں جیلی کی طرح کی رطوبت خارج ہوتی رہتی ہے جس کے ساتھ در دبھی ہوتا ہے۔ایسے مریض کوعموماً خزاں کے موسم میں پیچش لگتی ہے جس کے ساتھ بڑی تعداد میں انترای کی جھلیوں کے ٹکڑے فضلے میں چھوٹے

چھوٹے فیتوں کی شکل میں نکلتے ہیں۔

بڑی آنت کا فالج ہوجاتا ہے جوعموماً مستقل نہیں بلکہ عارضی حیثیت کا ہوتا ہے۔ نیتجاً باوجوداس کے کہ اجابت کی حاجت محسوس ہوتی رہتی ہے فضلہ نکالنے کی طاقت نہیں ہوتی اوراییا مریض زورلگانے کے باوجودنا کا م رہتا ہے اور دوسرے ذرائع اختیار کرنے پڑتے ہیں۔

ہاتھ پاؤں بازواورٹائگیں بائی یا گنٹھیا کے دردوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں جن سے جوڑوں میں بختی پیدا ہوجاتے ہیں جن سے جوڑوں میں بختی پیدا ہوجاتی ہے۔ بائی کی دردیں جگہ بدلتی رہتی ہیں اور عموماً رات کو بڑھتی ہیں۔اس کے گاؤٹ یعنی گنٹھیا میں پاؤں کے انگوٹھے اور اس کے اردگرد کے عضلات متاثر ہوتے ہیں۔ جلد سرخ ، سخت متورم ، چیکیلی اور انتہائی زود حس ہوجاتی ہے۔ اتنی زیادہ کہ کپڑے کا کمس تک نا قابل برداشت ہوتا ہے۔ ایسے مریض اپنے بوٹوں کے چڑے کو انگوٹھے کے اردگردسے کٹوالیتے ہیں تا کہ اگر چل کر باہر جانا ہوتو در دبرداشت کے دائرے میں رہے۔

بیبیناب: - جب بھی بینیاب گہرے رنگ کا اور خون کی آمیزش والا یا نسواری، سیاہی مائل اور تھوڑ اہوگا تو ہائی کے دردیں اور گنٹھیا کی تمام علامتیں زیادہ شدید ہو جائیں گی۔

دل: - اگر تیز دواؤں سے اسہال دبا دیئے جائیں تو دل پر گنٹھیا کا حملہ ہوجا تا ہے اور شفس کی سخت نگلی بھی محسوس ہوتی ہے۔

طاقت: 30يا200

کیکن بعض ہومیو پیتھ 3 طاقت میں بھی استعال کرتے ہیں

كولوسنته

81

كولوسنتھ

COLOCYNTHIS

کولوسنتھ روز مرہ کی اچا تک پیدا ہونے والی بیاریوں مثلاً سخت پیٹ درد وغیرہ میں بہت مفید ہے۔ پیٹ کا دردا تنا شدید ہوتا ہے کہ مریض ایک لمحہ بھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا، درد کی شدت سے دہرا ہوتا ہے اور آ گے جھکتا ہے۔ چونکہ دباؤ سے آ رام آ تا ہے اس لئے مریض ماؤف حصہ کو دبا تا ہے اور آ گے جھکتا ہے۔ پونکہ دباؤ اور گرمی سے لئے مریض ماؤف حصہ کو دبا تا ہے اور آ گے جھکتے سے سکون محسوس کرتا ہے۔ دباؤاور گرمی سے کچھ آ رام ماتا ہے۔ میگنیشیافاس (Magnesia Phos) کا بھی یہی مزاج ہے اس لئے میں کولوسنتھ کومیگنیشیافاس سے ملاکر ہنگا می بیاریوں میں استعال کرتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے جلد آ رام آ جاتا ہے۔

کولوسنتھ چونکہ بنیا دی طور پر اعصابی تکلیف کی دواہے اس لئے اگر ہیرونی اعضاء
میں در دہوتو ساتھ ہی نز دیک کے اعصاب میں بھی بل پڑجاتے ہیں اور شکجہ سامحسوں ہوتا ہے۔
پیٹ کے در دمیں انتڑیوں میں بل پڑتے ہیں۔ کولوسنتھ کا اعصاب کے چھوٹے خلیوں سے
زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ انتڑیوں ، کمراور بازووغیرہ کے در داکٹر انہی اعضاء تک محدود رہتے
ہیں ، سارے جسم کے اعضاء پر حملہ نہیں کرتے ۔ Sciatica (عرق النساء) کے در دکمر سے
شروع ہوکر نیچٹانگوں میں اترتے ہیں۔ بازوکا در دیورے پہلومیں ہوتا ہے۔

کولوسنتھ میں درد دورے کی شکل میں آتا ہے۔ ہر دورہ پہلے دورہ سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ درد آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ کولوسنتھ دینے سے فوراً آرام آتا ہے۔ مردوں میں کاروبار میں ناکامی کی وجہ سے یا کوئی صدمہ پہنچنے سے بھی درد کا دورہ پڑجا تا ہے۔ عورتوں کے بیضۃ الرحم (Ovaries) میں درد کا احساس ورما چلنے

سے مشابہ ہوتا ہے جسے بڑھئی سوراخ کرنے کے لئے چلاتے ہیں اور عورت اس در دسے دہری ہو جاتی ہے۔ Ovaries میں چھوٹے چھوٹے ٹیومرز بھی یائے جاتے ہیں۔

اجابت کے دوران جب بیشاب آتا ہے تو بیشاب کی ساری نالی میں جلن محسوں ہوتی ہے اور بھی انڈے کی سفیدی کی طرح کامادہ بھی خارج ہوتا ہے جس میں سے سخت بدبوآتی ہے اور بیشاب نکلتے ہوئے خارش ہوتی ہے۔ بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے کرسلز بیشاب کے ساتھ نکلتے ہیں جو کموڈ کی سطح کے ساتھ چسٹ جاتے ہیں۔ بھی بیشاب کے ساتھ سارے بیٹ میں تشنجی درد شروع ہوجاتا ہے۔

کولوسنتھ کے مزاج اورجسمانی ساخت میں نزاکت یائی جاتی ہے۔

کولوسنتھ کا سردرد بھی بہت شدید ہوتا ہے اور آ نکھ میں حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے۔
چہرے کے اعصاب میں سخت در دہو جسے دبانے اور نکور کرنے سے آ رام آئے تواس میں کولوسنتھ غیر معمولی فائدہ مند دوا ہے اور بہت جلدا فاقہ ہوتا ہے۔ کولوسنتھ میں در دلہر درلہرا ٹھتے ہیں۔ ہراگلی لہر پہلی لہر سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے یہاں تک کہ مریض کی چینیں نکل جاتی ہیں اور ہسٹیر یا کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ کولوسنتھ کی چند گولیاں منہ میں رکھتے ہی سکون محسوس ہوتا ہے۔ ہومیو پیتھی میں یہ خوبی ہے کہ بیجلد آنے والی روز مرہ کی بیاری میں فوراً آرام پہنچاتی ہے۔ در د جس سرعت سے آتی ہے۔ کولوسنتھ ہومیو پیتھک پڑینسی میں دینے سے اسی سرعت سے فائب ہو جاتی ہے۔ یہولوسنتھ ہومیو پیتھک پڑینسی میں دینے سے اسی سرعت سے فائب ہو جاتی ہے۔ یہولوسنتھ کے در دول کے عمومی مزاج ہیں۔ ٹکورا ور دباؤ سے آرام ۔ ایسے در دجسم میں کہیں بھی واقع ہوں ہر جگہ بلاتو تف کولوسنتھ استعال کریں۔ جب یہ دوا اثر کرتی ہے تو فوری سکون کے نتیجہ میں مریض سوجا تا ہے۔

دا فع اثر دوا ئیں: نکس وامیکا۔نوبیکم طافت: عموماً 30لیکن بعض دفعہ ایک لا کھ بھی دین پڑتی ہے۔ كويتْم 325

82 كونيم ميكوليڻم

CONIUM MACULATUM

(Poison Hemlock)

کونیم کا زہر ایک پودے سے حاصل کیا جاتا ہے جسے اردو میں شکران اور لاطینی یا اگریزی میں ملات ہے۔ ہے پوداد نیا کے اکثر علاقوں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ کونیم کا لفظ یونانی لفظ Konas سے لیا گیا ہے۔ جس کا مطلب چکردینا ہے۔ اس کے زہر سے شدید چکر آتے ہیں۔ دسویں صدی میں اسی زہر کو بطور دوا بھی استعال کیا گیا خصوصاً غدودوں کی عاریوں میں مرگی اور کالی کھانسی کے لئے اس سے استفادہ کیا گیا لیکن اس کے شدید اور گہر نے زہر سیار اور کیا در کالی کھانسی کے لئے اس سے استفادہ کیا گیا لیکن اس کے شدید اور گہر نے زہر سیار ات کی وجہ سے آ ہستہ آ ہستہ آس کا استعال کم ہوتا گیا اور پھر بالکل متر وک ہوگیا۔ روم اور یونان کی سلطنوں میں اسے قانونی طور پر موت کی سزاد یے کے لئے استعال کیا جاتا تھا۔ یہی وہ زہر ہے جس کا پیالہ سقراط کو بیش کیا گیا تھا۔ یہن ہر جسم کو کمل طور پر مفلوج کر دیتا ہے اور فالح یاؤں سے شروع ہوکر اوپر کی طرف جاتا ہے۔ موت سے پہلے شدید چکر آتے ہیں ، شنج ہوتا ہے اور فیکی طاری ہوجاتی ہے۔

ہومیو پیتھک دوا کی صورت میں کو پنیم ان سب علامتوں کے ازالے کے لئے استعال ہوتی ہے۔ بعض اور ہومیو پیتھک ادو یہ مثلاً بیلا ڈونا، سیمیم اور کا کولس بھی چکروں کے لئے مشہور ہیں لیکن کو پنیم کا ان دواؤں سے اس لحاظ سے فرق ہے کہ اس میں اکثر لیٹے ہوئے چکر آتے ہیں، بستر گھوم جاتا ہے اور آئکھ کے ذراسی حرکت کرنے سے بھی چکر زیادہ ہوجاتے ہیں۔ نو جوان ہوائیں یا ایس جذباتی خواتین جن کی شادی نہ ہوسکے ان کے دیے ہوئے جذبات کے نتیجہ میں اگر دیگر تکالیف کے علاوہ چکروں کی مخصوص علامت کے دیے ہوئے وہ عرول کی خصوص علامت کے دیے ہوئے وہ عرائی شفا بخشنے کی طاقت

روينم 326

ر کھتی ہے۔

نظری کمزوری میں بھی کو پنیم مفید ہے۔ کو پنیم غدودوں کی تختی اور گانھوں کو تحلیل کرنے میں بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جب تک بیعلامتیں بڑھ کر کینسر میں تبدیل نہ ہوجا ئیں عموماً ان غدودوں میں در محسوس نہیں ہوتا۔ معدے کے کینسر میں کو پنیم گوغیر معمولی اہمیت کی دوا ہے گر وہاں بھی یہی مشکل پڑتی ہے کہ جب تک کینسر نہ بن جائے ، معدہ میں پیدا ہونے والا کوئی در دکو پنیم کی نشا ندہی نہیں کرتا۔ اگر دیر ہوجائے تو کو پنیم صرف وقتی آ رام دیتی ہے۔ اس کے دینے سے زندگی نسبتاً آ سان ہوجاتی ہے گراس وقت یہ کینسر کوجڑوں سے نہیں اکھیڑ سکتی۔ ہاں بعض دفعہ اتنا نمایاں فرق پڑتا ہے کہ لگتا ہے جیسے کینسر غائب ہوگیا ہولیکن وہ غائب نہیں ہوتا بلکہ پچھ دیر کے لئے نمایاں فرق پڑتا ہے کہ لگتا ہے جیسے کینسر غائب ہوگیا ہولیکن وہ غائب نہیں ہوتا بلکہ پچھ دیر کے لئے لیوا ثابت ہوتا ہے۔ اس کئے معدے کی علامتوں سے اس کی شناخت کی کوشش نہ کریں۔ ہاں کی مریض میں کو نیم کی موٹی علامتیں پائی جائیں مثلاً کو نیم سے مشابہ چکر ، تواسے بلاتا خیر شروع کر دینا جا ہے۔ اس کے تیموں کینسر کے ملہ کا کوئی خطرہ باتی نہیں رہتا۔

کوینم میں گھنڈ سے تکلیف بڑھتی ہے۔ جو غدودسوج جائے وہ و ہیں اسی حالت میں رہ جاتا ہے، واپس اپنی پہلی حالت کی طرف نہیں لوٹا۔ بعض دفعہ پیٹ میں ایسے درد کی اہریں دوڑتی ہیں جیسے چاتو سے کا ٹاجار ہا ہو۔ زخموں کے اردگرد چھالے بن جاتے ہیں۔ گردن کے دونوں طرف سوج ہوئے غدودوں کا سلسلہ پہلووں پر نیچے تک اثرتا جاتا ہے۔ ان میں ایسا مواد بیدا ہوتا ہے جو غدودوں کو سخت کر دیتا ہے اور بیاری بڑھتی رہتی ہے۔ اگر وہ ٹھیک بھی ہوجائے تو غدود پہلی حالت پر واپس نہیں آتے۔ بغلوں کے غدود بھی سوج جاتے ہیں اور ان میں زخم بننے کار جحان ہوتا ہے۔ عورتوں کے سینے میں بھی چھوٹی چھوٹی گاٹھیں اور ابھار سے بننے گئے ہیں۔ کو نیم میں ایک علامت برائیٹا کارب سے مشابہ بھی پائی جاتی ہے۔ برائیٹا کارب میں جلد کے اندر چربی کی گلٹیاں بنتی ہیں جو بڑی ہو کر بہت بھدی اور بدزیب دکھائی دیتی ہیں۔ اگر وہ برائیٹا کارب سے ٹھیک نہ ہوں تو

دوسری دواؤں کی طرف توجہ کرنی جا ہے جن میں سے ایک کونیم بھی ہے۔

کینسری گھلیاں جوجلد پر ظاہر ہوکر بھٹ جائیں ان کا بہترین مقامی علاج شہد کالیپ کرنا ہے۔شہد پر ہونے والی جدید تحقیق اس کی پرزورتائید کرتی ہے۔قرآن کریم میں شہد میں پائی جانے والی جس غیر معمولی شفا کا ذکر ہے، شہد پر ہونے والی نئ تحقیق اس کے نئے نئے مشاہدات پیش کررہی ہے۔

جسم پرلرزہ تشنجی جھکے، کمروری اور چکرکوئیم کی عام تصویر پیش کرتے ہیں۔ مثانہ کمرورہ و جاتا ہے اور جگر بڑھ جاتا ہے اور غدود پھول جاتے ہیں اگر بیشا ب خارج کرنے میں دفت ہواور پوری طرح فراغت نہ ہوتو بعید نہیں کہ بیہ بات پراسٹیٹ گلینڈ کی بیاری کی نشا ندہی کرتی ہو۔ الیم صورت میں کوئیم دینے میں کوئی تا خیر نہیں کرنی چاہئے کیونکہ اگر بیمریض کوئیم کا ہوا تو کوئیم بروقت شروع نہ کرانے کی صورت میں پراسٹیٹ گلینڈ میں کینسر بھی بن سکتا ہے۔ کسی مریض کواگر پراسٹیٹ کینسر بھی بن سکتا ہے۔ کسی مریض کواگر پراسٹیٹ کینسر بھوجائے تو میرے تجربہ میں اس کی بہترین دواسلیشیا ایک لاکھ ہے۔ پندرہ دن کے وقفہ سے ایک ایک خوراک دی جائے تو چندخوراکوں ہی سے خدا تعالی کے ضل سے اس کینسر کا قلع مجموسکتا ہے۔ مگر بیدوات میں میان بائی حاکیں۔ حاکیں میں بائی جائیں۔

کونیم کی دماغی علامتوں میں بادداشت کی کمزوری اورعمومی دماغی کمزوری جس سے مریض سوچ بچار نہیں کر سکتا بائی جاتی ہیں۔ یہی کمزوری بڑھ کر آرٹیر یوسکلروسس (Arteriosclerosis) میں بھی تبدیل ہوسکتی ہے۔

کونیم کا مریض چڑچڑااور بدمزاج ہوجا تا ہے۔ چپوٹی چپوٹی باتوں سے گھبرا جاتا ہے۔ اور بے چینی اورا کتابہ شے کا ظہار کرتا ہے۔

کوینم کے مریض کے لئے شراب اور الکحل وغیرہ نا قابل برداشت ہوتا ہے۔نشہ آور چیزوں سے لرزہ، د ماغی اور جسمانی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔سرمیں سخت دِرد ہوتا ہے۔

کوینم کی بہت می علامتیں کا کولس سے ملتی ہیں۔ دونوں میں چکر پائے جاتے ہیں کیکن دونوں کے چکروں میں یہ فرق ہے کہ کوینم میں لیٹے لیٹے چکر محسوں ہوتے ہیں اور سارا كوينم 328

بستر گھوم جا تا ہے جبکہ کا کولس میں چکرعمو ماً اٹھنے یا چلنے پر آتے ہیں۔ کونیم غم کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے اثر ات سے بھی تعلق رکھتی ہے۔اس دوا

میںغم کا پہلاا اثرِ ذہن پریا د داشتِ کی کمزوری کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔

جہاں کہیں بھی کو نیم کی تکلیفیں پائی جائیں گی وہاں جلد کے سونے کا احساس بھی ضرور پایا جائے گا۔ جلد زردی مائل ہو جاتی ہے۔ چھالے دار ابھار پیدا ہونے لگتے ہیں اور اخراجات میں سخت بدیو ہوتی ہے۔ سونے کے علاوہ محض آئکھیں بند کرنے پر ہی پسینہ آنے لگتا ہے۔ آئکھ کے پیوٹے کا فالج بھی کو نیم کا خاصہ ہے۔

آ نگھوں میں سوزش ہوتو روشن سے زودسی ہوجاتی ہے اور طبیعت گھبراتی ہے کیکن کو ٹیم میں اگر آ نکھ میں ورم اور سوزش کی کوئی علامت نہ پائی جائے پھر بھی روشنی سے طبیعت گھبراتی ہے اور آ نکھوں سے یانی بہتا ہے۔ بیکو ٹیم کی خاص علامت ہے۔

کونیم السراورزخمول کے رجمان کے لئے مفید ہے یہاں تک کہ کورنیا (آئکھ کی پہلی)
کے زخم میں بھی مکمل شفا بخشنے کی طاقت رکھتی ہے۔ کو نیم کا فالح آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ اگراسی
وقت کو نیم دے دی جائے تو بیاری مزید نہیں بڑھتی اور جلد شفا ہو جاتی ہے۔ اگر فالح ہو جائے تو
پھڑھیک ہونے میں وقت لگتا ہے۔

بعض دفعہ غذا کی نالی کے اعصابی چھلوں میں فالجی کمزوری واقع ہو جاتی ہے جس سے نگلنے میں دفت ہوتی ہے۔اس میں دیگر دواؤں کی طرح کو نیم بھی مفید ہے۔

بسااوقات عورتول میں رحم بنچ گرنے کا احساس ہوتا ہے آور بوجھل بن نمایاں ہوتا ہے۔ خاوند کی وفات یا علیحدگی کے غم کے نتیجہ میں رحم میں فالجی علامات پیدا ہوجا ئیں جوآ ہستہ آ ہستہ بڑھیں، جلد کے سن ہونے کا احساس بھی ہواور ہاتھ یاؤل کا سونا اور چکر بھی پائے جائیں تو کو نیم ضروری دوا ہے۔ اس کے نتیجہ میں رحم کے منہ پرسوزش ہوتو اس میں بھی کو نیم مؤثر ثابت ہوگی۔ اگرکو نیم دوانہ بھی ہوتو اس کے شروع کروانے سے، جبکہ دوسری دوائیں بھی دی جائیں تھی ۔ دی جائیں نقصان کوئی نہیں۔

کونیم عورتوں اور مردوں کی جنسی امراض میں بھی مفید ہے۔اگر حیض کے ابتدائی

كوينم كوينم

ایام میں خون کی مقدار کم ہوتور حم میں شنج ہوجاتا ہے۔ایسی صورت میں کو نیم سب سے پہلے ذہن میں آئی جائے ۔اور میں آئی جائے ۔کو نیم میں سینے اور سارے جسم میں گلٹیاں اور ابھار بننے کار جحان ہوتا ہے۔اور میں آئی چھوٹے بھوٹے ابھار آ ہستہ آ ہستہ بنتے رہتے ہیں اور بظاہران میں کینسر کا کوئی نشان نہیں ملتا۔

طاقت: عموماً 30 لیکن گهری بیاریوں میں جہاں بھی کینسر بننے کا خدشہ ہو ایک لا کھ طاقت سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔

83

کروٹیلس ہری ڈس

CROTALUS HORRIDUS

(Rattle Snake)

یددواایک بہت ہی زہر یلے اور خطرناک سانپ کے زہر سے تیار کی جاتی ہے جسے عرف عام میں Rattle Snake کہتے ہیں کیونکہ بیا ہے جسم کورگڑتار ہتا ہے جس سے کھڑ کھڑا ہٹ کی آور آواز پیدا ہوتی ہے۔ بیسانپ دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک میں پایا جاتا ہے خصوصاً ریکستانی اور پیقر یلے علاقوں میں جہاں نمک کی زیادتی ہوتی ہے۔اسے نم دار گیلی جگہیں پند ہیں، وہاں آرام سے سویار ہتا ہے۔ جب شکاراس پر قدم رکھے یااس کا ایک حصداس کے پاؤں کے پنچ آجائے تو اچا تک حملہ کرتا ہے۔اس کا زہر بہت جلداثر دکھاتا ہے، مریض کی شکل سخت بھیا تک اور خوفناک ہو جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مرجاتا ہے۔علاج کا وقت ہی نہیں ملتا۔ سندھ کے پنجا بی زمیندار کہتے ہیں کہ جب بیکاٹے تو ساتھ ہی کہتا ہے کہ' پر سے ہو کے ڈگ' بیعنی اے میر سے شکار مرکر مجھ پر ہی نہ آپٹی اے میر ا

ہوتہم کے سانپوں کے زہر کے اثرات عموماً مزمن ہوتے ہیں اور یہ بہار کے موسم میں اپنااثر دکھاتے ہیں، سانپ بھی اسی موسم میں جاگا ہے۔ سردیوں کے موسم میں آ رام کرنے کے بعد تازہ دم ہوکراٹھتا ہے تو بہت زہر یلا ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر اس کا کاٹا ہوا مریض نج جائے اور زہر پوری طرح اس میں سرایت نہ کرسکا ہوتو اسی موسم میں جس موسم میں اسے کاٹا گیا ہواس کا زہر پھر جاگ اٹھتا ہے اور بار بار ہرسال اپنااثر دکھا تا ہے۔ بہار کے موسم میں وہ پر انے زخم بھی ہرے ہوجاتے ہیں جہاں بھی سانپ نے کاٹا ہواوروہ بیاریاں جوسانپوں کے زہر سے تعلق رکھتی ہیں سراٹھانے گئی ہیں۔ بہار میں گئ

قتم کی الرجیاں پیدا ہوجاتی ہیں جس کے علاج کے لئے کیسس (Lachesis) جوسانپ کے زہر سے تیار کی جانے والی دوا ہے فائدہ مند ہوتی ہے۔ بیددوا ہرا یک مریض میں کیساں طور پر کام نہیں کرتی بلکہ بعض اور دواؤں کی ضرورت بھی پیش آتی ہے۔ الیومینا اور سباڈیلا کے علاوہ کروٹیلس بھی مفید ثابت ہوگئی ہے کیک کیکیسس اس اثر میں بہت نمایاں ہے۔

کروٹیلس کا اثر جگر پر بہت نمایاں ہوتا ہے۔ اگر برقان کی علامتیں تیزی سے بڑھ رہی ہوں تو یہ دوا اللہ کے فضل سے بہت جلد اثر دکھاتی ہے۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ مریض حدسے زیادہ نروس (Nervous) ہوجاتا ہے اور اس کا جسم کا نیتا ہے۔ زبان بھی باہر نکا لئے وقت کا پینے گئی ہے۔ معمولی حرکت سے تھکا وٹ ہوجاتی ہے، فالجی کمزوریاں نمایاں ہوجاتی ہیں، خون کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور ہراس جگہ سے نکلتا ہے جہاں ہیرونی جلد اور اندرونی جھلیوں کے جوڑ آپس میں ملتے ہیں۔ امراض اجیا نک بڑھ جاتی ہیں۔ مثلاً فالح کا حملہ اجیا نک ہوجانایا جسم کے سے حورت سے حول کا بہتے گئا سانپ کے زہر کی یا دولاتا ہے۔ خون سیاہی مائل اور مائع صورت کی میں ہوتا ہے، جمتانہیں ہے حالا نکہ جسم کے اندرخون کی رگوں میں خون پھٹ کر دبی کی چھٹیوں کی طرح ہوجاتا ہے۔ پس جوخون باہر نکلتا ہے وہ میلا کچیلاخون ملا پانی ہوتا ہے۔ دوسری صورت کی طرح ہوجاتا ہے۔ پس جوخون باہر نکلتا ہے وہ میلا کچیلاخون ملا پانی ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض سانیوں کا زہرخون جماتا نہیں بلکہ پتلا کر دیتا ہے۔ یہ زہرخون سے زیادہ اعصاب اور ترون سٹم (Nervous System) پر حملہ آور ہوتا ہے۔

کروٹیلس اس مریض میں مفید ہے جس کی ذہنی کیفیات عجیب وغریب ہوجاتی
ہیں۔ مذیان کینے اور بڑ بڑانے کار جحان ہوتا ہے، مزاح میں تیزی پائی جاتی ہے۔ اگر
اس سے کوئی بات شروع کریں تو وہ فوراً بات کاٹ دے گا، کسی کو بات نہیں کرنے دے گا
اور سب با تیں خود سنائے گا۔ برداشت نہیں کرسکتا کہ اس کی موجود گی میں کوئی اور بات
کرے۔ وہ اپنی طرف سے فرضی بات بنا لے گالیکن دوسرے کی بات ضرور کائے گا۔
بہت زیادہ بولنے کی عادت کیکیسس کے مریض میں بھی پائی جاتی ہے اور اس کی باتیں

بے تر تیب اور البھی ہوئی ہوتی ہیں۔ کر ٹیلس کا مریض بھی بہت تیزی سے بولتا ہے اور کہانیاں ہوتی بنا تا چلا جا تا ہے لیکن زبنی لحاظ سے زیادہ پر جوش نہیں ہوتا۔ اس میں سستی اور غنودگی نمایاں ہوتی ہے، موت کا خوف اور رونے کی طرف رجحان نیز ٹھنڈے پینے آتے ہیں۔ سر در داور چکر ادلتے بیں۔ بدلتے رہتے ہیں۔ اگر آ رام کرے تو سر میں در د ہونے لگتا ہے اور حرکت سے چکر آتے ہیں۔ سونے سے تکلیف میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ خصوصیت سے سر در د میں بہت شدت پیدا ہوجاتی ہے اور بعض اوقات سونے سے پہلے در دنہ بھی ہوتو بھی سونے کے چھ در یا بعد در دکی وجہ سے مریض کی آئے کھی سونے کے چھ در یا بعد در دکی اور بسے مریض کی حصہ سے آگے کی طرف آتی ہیں اور بہت کمزوری ہوتی ہے۔ حصہ سے آگے کی طرف آتی ہیں اور بہت کمزوری ہوتی ہے۔

جب بھی کسی خاص مرض کا حملہ ہوتو جسم پر موجود زخموں سے کا لے رنگ کا بد بودارخون بہنے لگتا ہے۔خاص طور پر بہار کے موسم میں یہ کیفیت پیدا ہوتو کروٹیلس ہی دوا ہوگی۔شوگر کی وجہ سے گردن اور کمر وغیرہ پر کاربنکل نکتے ہیں۔اگر وہ تیزی سے پھیل کر جڑوں والے پھوڑوں کی شکل اختیار کرلیں اور اردگر دورم ہوجائے تو کروٹیلس مفید ہے۔الیے کاربنکل میں آرسینک اورایا تھراسینم (Anthracinum) بھی مؤثر ہیں۔اگر عورتوں کو حمل کے دوران ٹائیفائیڈ ہو جائے جس کی وجہ سے حمل ضائع ہو جائے تو یہ دوا بعد میں پیدا ہونے والی پیمید گیوں میں مفید ہوتی ہے۔

کروٹیلس میں بعض اوقات یا تو بہت زیادہ نیندآ تی ہے یا پھر نیند بالکل اڑ جاتی ہے اور پیدونوں کیفیات آپس میں ادلتی برلتی رہتی ہیں۔ سخت غنودگی کی حالت میں اٹھانہیں جا تالیکن جب آئکھل جائے تو پھر نیندنہیں آتی۔

اس دوامیں اور دیگر سانپوں کے زہروں میں ایک بات مشترک ہے کہ مریض مختلف فتم کے شکوک وشبہات میں مبتلا رہتا ہے، کسی پر بھروسہ نہیں کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اسے زہر دے دے گا۔ مریض کو الکحل اور شراب پینے کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ عادی شرابیوں کی عادت چھڑوانے کے لئے سلیفورک ایسڈ بہترین دوا ہے۔ ایک قطرہ

گلاس بھر پانی میں ڈال کر دن میں تین دفعہ پلانے سے نمایاں فرق پڑتا ہے۔ اگر مریض بہت موٹا ہو، چربی کی تہیں چڑھی ہوں، اسے تیز مصالحوں والی چیز وں کا جنون ہواور شراب کی عادت بھی ہوتوا یسے مریضوں کی دوا کروٹیلس ہے۔

کروسیاہ حلقے پڑ
جاتے ہیں۔ آئکھوں کے مریض کی آئکھیں زرد ہوتی ہیں اور آئکھوں کے گردسیاہ حلقے پڑ
جاتے ہیں۔ آئکھوں میں ایسے جلن دار در دہوتے ہیں جیسے کسی نے چاقو سے زخمی کر دیا ہو۔خون
بہنے کار جمان بھی ہوتا ہے۔ نظر دھند لا جاتی ہے۔ بعض دفعہ شدید کمزوری سے بینائی جاتی رہتی
ہے۔ روشنی نا قابل بر داشت ہوتی ہے۔

کا نول سے بھی خون بہتا ہے، دایاں کان بند ہوجا تا ہے، اعصا بی کمزوری بہرے ین یر منتج ہو جاتی ہے۔ کان میں تکلیف کی وجہ سے چکر آتے ہیں، ملکا ملکا درد اور دھڑ کن کا احساس، آوازوں اور شور سے زود حسی بڑھ جاتی ہے۔ کرٹیلس میں ناک سے خون ملی ہوئی رطوبت کا اخراج ہوتا ہے۔ نکسیر بھی بہتی ہے،خون کا رنگ سیاہ اور دھاگے کی طرح بٹا ہوا ہوتا ہے۔ ہونٹ متورم اور بے^حس ہوجاتے ہیں۔ چ_{بر}ہ بھی زرداورمتورم ہوجاتا ہے۔زبان اور گلے می^{ں خشک}ی کی وجہ سے بولنا مشکل ہونا ہے۔ ٹھوس چیز نگلتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ زبان سرخ ، خشک اور سوجی ہوئی ہوتی ہے۔ایسے مریض کی زبان کا کینسر بسااوقات کروٹیلس کامطالبہ کرتا ہے۔ کروٹیلس کامریض معدہ کے گردکسی تشم کا کیڑا ہرداشت نہیں کرسکتا۔ کوئی چیزاس کے معدے میں نہیں گلتی بلکہ شدید قے آ جاتی ہے۔صفراوی مادے نکلتے ہیں۔خون کی قے بھی آتی ہے۔معدہ میں خالی بن کا احساس ہوتا ہے۔مریض کو یا تو قبض ہوگی یا دست شروع ہوجائیں گے۔ سیاہ، نیلی اور متعفن اجابت جس میں خون کی آ میزش بھی ہوتی ہے۔ سرخ یا زردی مائل بیشاب آتا ہے۔ گردے متورم ہوتے ہیں۔ جگر کے مقام پر درد ہوتا ہے۔ دل میں بھی کمزوری محسوں ہوتی ہے۔ دھڑکن تیز ہوجاتی ہے۔ نبض عموماً تیز ہوتی ہے یا بہت کمزور پڑ جاتی ہے۔ جوڑوں میں درد بھی کر ٹیلس کی علامت ہے۔غدودمتورم ہوجاتے ہیں، ہاتھ یاؤں

سوخ جاتے ہیں، پاؤں کی انگیوں میں ایکھن اور درد ہوتا ہے۔ کھلی ہوا میں سراور معدے کی تکلیفیں آ رام پاتی ہیں جبکہ کھانسی بڑھ جاتی ہے۔ تمام جسم میں لرزہ طاری ہوجاتا ہے۔ جلد بہت حساس ہوجاتی ہے اور اس میں زردی نمایاں ہوتی ہے اور پھوڑے نکلنے کا رجحان ہوتا ہے۔ چہرہ بے رنگ زردی مائل ہوتا ہے۔ ایک خاص علامت یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کو حیض کا خون جاری نمے ہو اور منہ دانوں سے بھر جائے تو کر ولیس اس کی خاص دوا ہے۔ یہ چیش کو دوبارہ جاری کرکے جبرے کی طرف خون کے دباؤ کو کم کردیتی ہے۔

کروٹیلس صرف عارضی اثر رکھنے والی دوانہیں ہے بلکہ مزمن بیاریوں کے اثرات میں بھی مفید ہے۔اگر تمام اعصا بی نظام بگڑنے کے نتیجہ میں جسم کمزور ہوجائے، ہاتھ پاؤل کا پینے لگیں،نسبتاً بڑی عمر کے مریضوں کو رعشہ ہوجائے تو اس میں کروٹیلس مفید ہے بلکہ لازم دوابن جاتی ہے۔

کروٹیلس میں دائیں طرف سونے سے تکلیفیں بڑھتی ہیں۔معدے اور پیٹ میں شدید ٹھنڈ کا احساس ہوتا ہے جیسے کسی نے برف رکھ دی ہو۔ بیاحساس انتز یوں یا معدے میں کینسر کے آغاز کی علامت بھی ہوسکتا ہے۔ اگر وقت پر کروٹیلس دی جائے تو شفا ہوسکتی ہے۔ ایسی علامتوں پرنظرر کھی جائے تو مزید پیچید گیاں پیدانہیں ہوں گی۔

کروٹیلس پیٹ کی ہوا اور معدے کے السر میں بھی مفید ہے۔ اگر رحم میں کینسر ہوا در شدید خون بہدر ہا ہوتو کروٹیلس سے مکمل شفا ممکن ہے۔ اینی مریضہ کے چہرے پر زردی چھا جاتی ہے اور وہ برقان کی مریضہ معلوم ہوتی ہے۔ یہ خاص علامت ہے جس سے کروٹیلس کی پہچان ممکن ہے۔ ول کی کمزوری بھی کروٹیلس کی خاص علامت ہے۔ یہ بات سانپ کے تقریباً سب زہروں میں پائی جاتی ہے۔خصوصاً حیض کے دنوں میں دل کا نتیا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ہاتھ بھی کا نیتے ہیں اور سوج جاتے ہیں۔ ٹائگیں سن ہو جاتی ہیں اور بائیں جانب فالج ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ حیض دریتک جاری رہتا ہے۔شدید درد جوٹا گلوں تک بھیلتا ہے۔ معدہ میں بھی نقابت کا احساس ہوتا ہے۔ بیے کی پیدائش کے بعد

كروليلس كروليلس

بد بودار خون کا اخراج اور رحم باہر نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ شدید تھیاؤ اور درد، مریضہ ٹائلوں کو بینی اور نکلیف کی وجہ سے مسلسل ہلاتی رہتی ہے۔

دافع اثر دوائیں: کیکیسس کیمفر طاقت: 30سے 200 تک كروشن 337

84 ڪروڻ ٿڪڪيم

CROTONTIGLIUM

(Croton Oil Seed)

کروٹن یعنی جمال گوٹا بہت مشہور دست آور دواہے۔اس کے مریض کو یکا کیک دست شروع ہوجاتے ہیں۔ پیٹے میں در داور مسلسل حاجت ہوتی ہے جس کے بعد شدید کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ کروٹن کی جلدی علامات رسٹاکس سے ملتی جلتی ہیں۔ رطوبت سے بھرے ہوئے چھالے نکلتے ہیں، خارش کے ساتھ جلن ہوتی ہے۔ کروٹن اور رسٹاکس میں ایک فرق یہ ہے کہ رسٹاکس میں جب ایک جگہ سے ایگزیماختم ہوجائے تو وہاں صحت مند جلدنکل آتی ہے۔اگلی دفعہ ایگزیما ہونے والے دوبارہ وہاں جھالے نہیں بنتے۔ بعدازاں کسی وقت ایگزیما کا نیا حملہ ہوتو سابقہ ماؤف جگہ پر بھی ہوسکتا ہے لیکن کروٹن میں اسی جگہ جہاں جلد صحت یاب ہو چکی ہودوبارہ حیالے نکل آتے ہیں اور بہت ضدی اور چھٹ جانے والا ایگزیما بن جاتا ہے۔

رسٹاکس اور کروٹن میں انترا یوں پراثر مشترک ہے۔ پر انی پیچین اور اسہال میں کروٹن بہت مفید ہے۔ اس کے اسہال کی ایک خاص پیچان جواسے رسٹاکس اور اسہال کی دوسری ادویہ سے متازکرتی ہے یہ ہے کہ کروٹن کے اسہال اچا نک بہت زور سے شروع ہوتے ہیں۔ مثلاً بچوں کو دودھ پیتے ہی زور کے اسہال آنے لگیں تو غالبًا کروٹن ہی دوا ہوگی۔ کروٹن کی متلی اپی کاک سے مشابہ ہوتی ہے۔ اپی کاک میں صرف متلی ہوتی ہے، قے نہیں آتی۔ کروٹن میں بھی متلی ہوتی ہے۔ اپی کاک میں صرف متلی ہوتی ہے، قے نہیں آتی۔ کروٹن میں بھی متلی ہوتی ہے لیکن قے نہیں آتی بلکہ اس کی بجائے اسہال شروع ہوجاتے ہیں۔

کروٹن میں پیٹ میں ہوا بھی ہوتی ہے اور انترایوں سے گر گڑ اہٹ کی آ واز بھی آتی

ہے۔ یوں محسوں ہوتا ہے جیسے اندر پانی بھرا ہوا ہو۔ معدہ میں بھوک اور خالی پن کا احساس ہوتا ہے۔ کروٹن میں جلداور پیٹ کی علامتیں ایک دوسر ہے ہے۔ ادلتی بدلتی رہتی ہیں۔

اس میں آئھوں کی بھی ہوشم کی تکلیفیں پائی جاتی ہیں۔ آئھوں کی سرخی اور زخم، پیوٹوں پر دانے اور آ بلے بن جائیں اور سوزش ہوتو کروٹن مفید دوا ہے۔ آئھ کی یہ تکلیفیں دوسری بیوٹوں پر دانے اور آ بلے بن جائیں اور سوزش ہھونا کروٹن مفید دوا ہے۔ آئھ کی یہ تکلیفیں دوسری دوا واک میں بھی پائی جاتی ہیں اگر ان کے ساتھ انتر ویوں کی سوزش بھی نمایاں ہوتو کروٹن کے دوا ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ کروٹن میں آئھوں بیچھے کی طرف تھنچنے کی علامت بھی پائی جاتی ہے۔ ہوتا کی ساتھ انترا یوں کے دائر ہے ہے تعلق رکھی ہے بہاں تک کہ عورتوں کو سینے کی بیار یوں میں اندر دھا گے سے تھنچنے کا احساس ہوتا ہے اور شدید در دہوتا ہے جس سے رات کو سونا دشوار ہو جاتا ہے۔ کروٹن اور Paris میں یہ فرق ہے کہ شدید در دہوتا ہے جس سے رات کو سونا دشوار ہو جاتا ہے۔ کروٹن اور Paris میں یہ فرق ہے کہ شدید در دہوتا ہے جس سے رات کو سونا دشوار ہو جاتا ہے۔ کروٹن اور Paris میں یہ فرق ہے کہ شدید کی خلال کی علامت عموماً پائی جاتی ہے اور ناف کے پیچھے تھیاؤ کا احساس ہوتا ہے جیسے رہی سے اندر کی طرف تھینچا جار ہا ہو۔ یہ احساس پلیمم میں بھی بایا جاتا ہے۔

' بچوں کے <u>ایگزیما</u> خصوصاً سر کے ایگزیما میں کروٹن کی سیپیا سے بہت مشابہت ہے۔ مگر کروٹن کی دیگر واضح علامتیں اسے سیپیا سے جدا کرتی ہیں۔

بعض دوائیں ایسی ہیں جن کا آلاتِ تناسل کے ایکزیموں سے تعلق ہوتا ہے۔
کروٹن ان میں سرفہرست شار ہونی چاہئے۔رسٹاکس،ایٹا گیلس اور گریفائٹس بھی اس مرض کے
علاج میں شہرت رکھتی ہیں۔ کروٹن کے چھالے رسٹاکس سے چھوٹے ہوتے ہیں اور پانی بھی
رسٹاکس کے مقابلہ میں کم بہتا ہے۔ کروٹن اور رسٹاکس ایک دوسرے کے اثر کو زائل
(Antidote) کرتی ہیں۔رسٹاکس میں اسہال کی علامتیں نہیں ماتیں۔

کروٹن لیعنی جمال گوٹا کھانے کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے خطرناک اسہال کا تریاق پوڈوفائیلم (Podophyllum) ہے۔ پوڈوفائیلم میں بھی پچکاری کی طرح زور دار اسہال آتے ہیں۔اسہال کےمقابل پر کروٹن کی خارش کا تریاق رسٹاکس ہے۔

ہتھیلیوں کی خارش میں اینا گیلس (Anagallis) کو بہت شہرت حاصل ہے۔

رسائس کی خارش اور ایگزیما عموماً ہاتھ کی پشت پر ہوتے ہیں۔اینا گیلس ہتھیلیوں کی دوا

ہے۔جلن کے اعتبار سے اینا گیلس میں جلن کم اور رسٹاکس میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اینا گیلس کاا کیزیماماؤف جگہ پر دوبارہ انجر آنے کے اعتبار سے کروٹن کے مشابہ ہوتا ہے۔

کروٹن کی تکلیفیں گرمی کے موسم میں بڑھ جاتی ہیں۔ مریض بےسکون، پریشان اور عمرین ہیں۔ مریض بےسکون، پریشان اور عمر عمکین رہتا ہے۔ پبیشانی میں شدید دباؤاور در دہوجا تا ہے، سر بوجھل ہوجا تا ہے اور چکر آتے ہیں۔ کھانسی کے ساتھ دمیے کا دورہ بھی ہوجا تا ہے، مریض کے تکیہ پر سرر کھتے ہی کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ مریض لیٹ نہیں سکتا اور گہرا سانس لینا ناممکن ہوجا تا ہے۔

اگر کان بہتے ہوں اور شدید خارش ہوتو کروٹن کوفراموش نہیں کرنا چاہئے۔غذا کی نالی میں جلن بھی کروٹن کی خاص علامت ہے۔معدے میں کمزوری کا حساس ہوتا ہے۔

کروٹن میں رات کے وقت جھاگ دار اور نارنجی رنگ کا پیپیٹا بِ آتا ہے جو کھڑا رہے تو اس کی سطیر چکنے ذرات آجاتے ہیں۔ دن میں بھی پیٹاب زردی مائل ہوتا ہے اور اس میں سفید ذرات یائے جاتے ہیں۔

کروٹن میں ذراس چیز کھانے سے یا ماؤف جگہ پرلمس سے نیز رات کے وقت تکلیفوں میں اضافہ ہوجا تا ہے۔

> دافع ارژ دوائیں: اینٹی مونیم ٹارٹ، رسٹاکس، پوڈوفائیلم طاقت: 30سے 1000، 200 تک

گوړم) 341

85 کیویرم کیویرم

CUPRUM METALLICUM

تانباسر فی مائل بھورے رنگ کی دھات ہے جس سے مختلف قتم کے اوز ار، ہتھیار اور بجلی کی تاریں وغیرہ بنائی جاتی ہیں۔ یہ بہت زم دھات ہے اس لئے اسے دوسری مختلف دھاتوں سے ملاکر بہت میں ملی جلی دھا تیں تیار کی جاتی ہیں جواپئی صفات کے لحاظ سے تا بنے سے مختلف اور صنعت میں نہایت کارآ مد ثابت ہوئی ہیں۔ جولوگ تا بنے کا کام کرتے ہیں ان میں اس کے زہر لیلے اثر ات آ ہت آ ہت خطاہر ہوتے ہیں۔ شدید پیٹ درد، ہیضہ، کھانی اور آئے اس کی نمایاں علامات ہیں۔ تا بنے کے سفوف سے جوہومیو پیٹھی دوا تیار کی جاتی ہے اسے کیوپرم کہتے ہیں۔

کیوپرم میں تشخیاتی کیفیات بہت نمایاں ہوتی ہیں اور کیوپرم کا تصوران کیفیات کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ یہ تی خوجم کے تمام عضلات پر حاوی بغیر ممکن ہی نہیں۔ یہ تی اور اپنٹھن پائے جاتے ہیں جوجم کے تمام عضلات پر حاوی کے دور م کی ہر بیاری میں شدید نے اور نیلا ہے خاتے ہیں جوجم کے تمام عضلات پر حاوی ہوجاتے ہیں۔ مرگی اور ہیضہ میں اگر شنج اور نیلا ہے خاتے ہیں جوجم کے تمام عضلات ہوگی۔ جوجاتے ہیں۔ مرگی اور ہیضہ میں اگر شنج اور نیلا ہے خاتے ہیں جوجم کے تمام عضلات ہوگی۔ جب شنج کی دورہ ہوتو ہا تھوں کی مٹھیاں نہایت شدت کے ساتھ نے جاتی ہیں۔ اس طرح پاؤں کے جب شنج کی دورہ ہوتو ہا تھوں کی مٹھیاں نہایت شدت کے ساتھ نے جاتی ہیں۔ اس طرح پاؤں کے بڑھوں اور پاؤں کی انگیوں سے آگے ہڑھ سے بخوجھی شنج کی وجہ سے مڑنے گئے ہیں۔ یہ ایک شعب یا تھوں اور پاؤں کی انگیوں سے آگے ہڑھ کی کرٹا نگوں اور باز دوؤں میں پہنچتی ہے اور تمام جسم اگر جاتا ہے۔

بعض دفعہ دماغ کے خون کی شریانوں میں تشنجی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں جن کے متبعہ میں مریض بے سرو پا باتیں کرتا ہے، حافظہ بالکل جواب دے جاتا ہے، ہذیان کے علاوہ بے ہوشی بھی ہوتی ہے، عضلات میں جھٹکے لگتے ہیں اور شنج ہوتا ہے، پٹھے پھڑ کتے ہیں،

مریض جس کروٹ لیٹنا ہے اس کے مخالف سمت جھکے لگنے لگتے ہیں۔ سیمی سی فیوجا میں جس کروٹ لیٹنا ہے اس کے مخالف سمت جھکے لگنے گئے ہیں۔ سیمی سی فیوجا میں جس کروٹ لیٹا جائے وہی پہلو پھڑ کنے لگتا ہے۔ اگر بے ہوتی کے ساتھ سارا جسم تن جائے جسیا کہ مرگ کے دوروں میں ہوتا ہے تو یہ کیوپرم کی خاص علامت ہے لیکن اگر عمومی بے ہوتی ہواور جسم کا صرف ایک حصہ پھڑک رہا ہواور دوسرا بالکل ٹھیک ہواور سارے جسم میں تناؤ کی کیفیت نہ ہوتو وہ کیوپرم کا مریض نہیں ہے۔

کیورم کالی کھانسی اور دمہ میں بھی بہت مفید ہے۔ میرے نزدیک کیورم کو کالی کھانسی اور دمہ کے انتہائی تشنج میں ضرور استعال کرنا چاہئے۔ گرمی کے موسم میں تکلیف ہواور سانس کی نالی میں تشنج ظاہر ہواور ٹھنڈی چیزیا برف کی گورسے فائدہ ہوتو کیو پرم فوری طور پر فائدہ پہنچاتی ہے۔ سینہ کے اطراف میں اور نچلے حصہ میں تشنجی کیفیت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے اور مریض ہمجھتا ہے کہ وہ اس تکلیف سے مرہی جائے گا۔ سینہ سے لے کر پیٹھتک چاقو کی طرح چیر نے والے درد کا احساس بھی ہوتا ہے۔ دراصل میعلامت تشنج سے پیدا ہوتی ہے اور اس میں کیو پرم جادو کی طرح اثر کرتی ہے۔ اس پہلوسے کیو پرم پیتہ کے شدید درد وارتشنج میں بھی کام آتی ہے۔

اگر کوئی بوڑھا آ دمی جو لمب عرصہ سے تج دکی زندگی گزار رہا ہوشادی کر لے تو اسے بعض کی طرح اثر کرتی ہوجاتے ہیں جو میاں ہوی کے ملاپ کے بعدا کثر پاؤں یا پنڈ لیوں سے چل کراو پر کمرتک تھیل جاتے ہیں۔ کیویرم اس کی بہترین دوا ہے۔

اگر دوران حیض تشنجی کیفیتیں پیدا ہوجا ئیں اور سب سے پہلے انگلیاں متاثر ہوں تو بھی کیو پرم ہی اصل دوا ہے۔ بیشنج انگلیوں سے شروع ہوکر تمام جسم میں پھیل جاتا ہے اور جسم اکر جاتا ہے۔ اگر بے ہوئی ہوجائے اور مزیانی کیفیت ہوا در آئکھیں او پر چڑھ جائیں تو فوری طور پر کیو پرم استعال کرنی جائے۔ مرگی کے دوروں سے قبل گدی سے سر درد شروع ہوکر آگ پیشانی میں آتا ہوا ور مرگی میں شنج بھی نمایاں علامت ہو، انگلیوں میں جھکے لگتے ہوں اور تکلیف سے مریض کی چین نکل جاتی ہوں نیز دورے کے وقت پیشا ب اور پا خانہ خطا ہوجا تا ہوتو کیو پرم اس کا بہترین علاج ہے۔

کیویرم اعضاء کے سکڑنے اور کھلنے والے عضلات پریکسال اثر ظاہر کرتی ہے۔ جب تشنج بیدا کرے تو در دہوتا ہے اور جب عضلات کوڈ ھیلا کر دے تو شعوری طوریران کوسنجالانہیں جاسکتا۔ کیویرم کے مرگی کے مریض کوا کثر دورے کے بعد شدید ہر در دہوتا ہے۔ بعض دفعہ وضع حمل کے وقت مریضہ عارضی طور پر بینائی کھوٹیٹھتی ہے۔بعض دفعہ ل کے دوران یا وضع حمل کے وقت خون کا دباؤ بڑھ جانے سے دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے بینائی مستقل ضائع ہوجاتی ہے کین کیویرم میں عموماً قتی اندھاین ملتا ہے کیونکہ اس کا تعلق خون کی رگ بھٹنے یا خون کا لوٹھڑا جمنے سے نہیں ہوتا صرف عارضی شنج سے ہوتا ہے۔اگر وضع حمل کے وقت عارضی اندھاین پیدا ہو جائے اور کیو ہرم کی دیگر علامتیں موجود ہوں تو کیو ہرم سے بفضلہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا اور کیویرم وضع حمل کے دوران بہت سہولت پیدا کردے گی۔ کیویرم کی بعض زہنی علامات بہت نمایاں ہیں۔اس کا مریض اینے خیالات اور رجحانات میں تبدیلی پیدانہیں کرتا ، ممکین رہتا ہے، زبان سے ایسے الفاظ ادا کرتا ہے جن کومملی جامہ پیہنا نے کاارادہ نہیں ہوتا۔سر میں خالی بین کااحساس ہوتا ہے، د ماغ میں در دہوتا ہے،سریر سرخی مائل نیلا ہٹ اورسوزش یائی جاتی ہے۔ یوںمحسوس ہوتا ہے کہ گویا سریر گرم یانی ڈالا جارہا ہو۔ بہت چکرآتے ہیں اور سرآ کے کی طرف گرتا ہوامحسوس ہوتا ہے۔ بیشانی ، کنبیٹیوں اور گدی میں شدید درد ہوتا ہے جس میں دبانے سے اضافہ ہو جاتا ہے۔مریض کے چہرہ پر نیلگوں پیلا ہٹ آ جاتی ہے اور وہ کسی گہری فکر اور سوچ میں ڈوبا رہتا ہے۔ ہونٹوں پر نیلا ہٹ ہوتی ہےاور بے ہوشی طاری ہونے برمریض کے جبڑے تختی سے بند ہوجاتے ہیں اور منہ سے حِھاگ نکلتی ہے۔ناک میں خون کے شدید دباؤ کا احساس ہوتا ہے،قوت شامہ جاتی رہتی ہے۔ منه میں دھات کا مزہ محسوس ہوتا ہے اور بہت تھوک بہتا ہے۔زبان مفلوج ہو جاتی ہے اور لکنت کے آثارظا ہر ہوجاتے ہیں۔زبان سانے کی زبان کی طرح یا ہر کلتی اور سکڑتی ہے۔

روزمرہ ہینے میں استعال ہونے والی تین بہترین دواؤں میں سے ایک کیو پرم ہے۔
اس کی امتیازی علامتیں بالکل واضح اور آسانی سے شناخت ہونے والی ہیں۔ ہینے میں شنج کا آغاز
پیٹ سے ہوتا ہے جو بہت شدید ہوتا ہے اسہال کھل کرنہیں آتے بلکہ رک رک کرتھوڑ ہے تھوڑ ہے
آتے ہیں۔اگرچہ ہاتھ پاؤں بھی مڑتے ہیں مگر پنڈلی کا شنج پیٹ کے شنج کے بعد ہر دوسر کے شنج
سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ان شنجی علامات کے ساتھ کیو پرم کی عمومی نیلا ہے اس کے مریض
کی شناخت کا مزید پختہ کردیتی ہے۔دوسری دودوائیں کیمفر اوروریٹرم البم ہیں۔

نوجوان بچیوں کو حیض کے دوران کمراور پیٹ میں تشنج ہوتا ہے لیکن اگر یہ تشنج پڑلیوں میں متلی اور اسہال بھی پڑلیوں میں متلی اور اسہال بھی ہوتے ہیں۔اگریض کے دوران مرگی کے دورے پڑنے لگیس تو یہ بھی کیو پرم کی علامت ہے۔ البتہ نئے جاند کے نکلنے سے اگریہ تکلیف ہوتواس میں سیلیشیا مفید ہے۔

مددگاردوائیں: کلکیریا کارب دافع اثر دوائیں: کیمفر بیلاڈونا بہیپر سلف سٹفی سیگریا کو ٹیم طاقت: 30سے 200 تک ىائىكلىمن 345

86 سائيڪليمن پوروپيم CYCLAMEN EUROPAEUM

سائیکلیمن ایک بودے کی جڑ سے تیار کی جانے والی دوا ہے جس کے بارے میں عجیب وغریب روایات مشہور ہیں۔

سائیکلیمن بہت سے تضادات پر مشمل دوا ہے۔ اس کی علامات رکھنے والے مریض کا حرکت کرنے کو بالکل دل نہیں چا ہتا۔ اگر چہ حرکت سے تکلیف میں کمی آ جاتی ہے۔ مریض کھی ہوا میں گھرا ہے محسوس کرتا ہے، لیکن بھاری کوافاقہ ہوتا ہے خصوصاً نزلہ زکام اور کھانی کو کھی ہوا سے میں گھبرا ہے۔ مریض جسمانی کمزوری کی وجہ سے حرکت کرنے اور چلنے پھر نے سے گھبرا تا ہے۔ شدید اسہال اور قے ، نظام ہضم بری طرح متاثر ، اس کے ساتھ لعاب د ، من کا ذا گفتہ کمین ہو جاتا ہے۔ سائیکلیمن میں عور توں کا ما ہانہ نظام متاثر ہوتا ہے اور بے قاعد گی پیدا ہوجاتی ہے۔ حیض بہت جلد جلد ، مقدار میں زیادہ ، خون کا لا اور نجمد ، حرکت سے خون میں کمی ، یہسب سائیکلیمن کی علامات ہیں۔ حیض کی خرابی کی وجہ سے خون کی کمی ہوجائے اور یہ بیاری بڑھتی جائے تو اس میں سائیکلیمن بہت اہمیت رکھتی ہے۔ عور توں کی طرح مردوں کے اعضاء میں بھی بیشا ب کی میں سائیکلیمن بہت اہمیت رکھتی ہے۔ عور توں کی طرح مردوں کے اعضاء میں بھی بیشا ب کی میں سائیکلیمن بہت اہمیت رکھتی ہے۔

س^{ائیکلی}من کامریض رات کو بہت بے چین ہوتا ہے۔ سائیکلیمن میں <u>چلنے سے کمز وری</u> بڑھتی ہے کیکن دردوں اور تکلیفوں میں کچھ کی آ جاتی ہے۔

سائیکلیمن میں مریض کی ذہنی کیفیات بھی ادلتی بدلتی رہتی ہیں۔ایک دم خوشی کے احساسات کی وجہ سے ہیجانی کیفیت ہوگی یا پھرایک دم تھک کرگر جائے گا۔ د ماغ بالکل خالی ہو جاتا ہے اور بولنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ تمام قتم کے کاموں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ چڑچڑا پن پیدا ہوجاتا ہے۔

سائیکلیمن کی مریضہ بھتی ہے کہ وہ دنیا میں اکبلی ہے اور ہرکوئی اس کے بارے میں بری باتیں کرتا ہے۔ اکثر نوجوان بچیوں میں یہ کیفیت ہوتی ہے۔ کئی بارالیم بچیوں کوسلفراور سٹرامونیم دی لیکن کوئی غیر معمولی فائدہ نہیں ہوا۔ ہوسکتا ہے سائیکلیمن دی جاتی تو فائدہ ہوجا تا۔

سائیکلیمن میں سرور درجہ شدید ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ سرپھٹ جائے گا۔

صبح کے وقت سرور درشروع ہوتا ہے۔ آئھوں کے سامنے ستارے ناچیج ہیں نظر دھندلا جاتی ہے۔

ابیبا بھینگا بین جس میں آئکھ کا ڈیلا اندر کی طرف سکڑتا ہے اس میں سائیکلیمن بہت مفید دوا ہے۔ آٹھوں میں صدت اور گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ ایک کی بجائے دودونظر آئے ہیں۔ نظر کی مختلف تکلیفیس بسااوقات معدہ کی خرابی سے تعلق رکھتی ہے۔ آئکھوں کے ہوتا ہے۔ آئکھوں کے ہا منے دھے آتے ہیں جو مختلف رگوں کے ہوتے ہیں۔

نظر غائب ہوجاتی ہے۔ آئکھوں کے سامنے دھے آتے ہیں جو مختلف رگوں کے ہوتے ہیں۔

نظر غائب ہوجاتی ہے۔ آئکھوں کیں دائیں کان کے اندر تھنچنے والا درد ہوتا ہے۔ کانوں میں گھن گرج کی آوازیں آئی ہیں۔ آئو تی ہیں۔ وقت شنوائی متاثر ہوجاتی ہے۔

سائیکلیمن میں گلے میں جلن، خشکی اور کھر چن کا احساس ہوتا ہے۔ اس دوا میں عموماً
پیاس نہیں ہوتی لیکن بخار کے دوران شام کے وقت مریض کی پیاس بہت بڑھ جاتی ہے۔

معدے کی تمام تکالیف پلسٹیلا سے ملتی جلتی ہیں۔ چربی والے کھانے سے
نفرت، گرمی، جلن کا احساس اور کافی پینے کے بعد تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ کافی کا ایک
خاص اثر سائیکلیمن کے مریض پر بیہ پڑتا ہے کہ جتنی دفعہ کافی پیئے گا اتنی دفعہ اسہال آئیں
گے۔معدے کی تکلیفوں میں بچکی کا آناسائیکلیمن کی بھی خاص علامت ہے۔ سائیکلیمن منہ
کی خشکی ، یہاس کی کی یا پیشاب کی زیادتی میں جلسیمیم سے مشابہ ہے۔ عام طور پر پسینہ بھی کم

ہوتا ہے لیکن کمزوری ہوتو مریض پیدنہ سے تربتر ہوجاتا ہے۔ پیشاب مقدار میں بہت زیادہ، پانی کی طرح بالکل بے رنگ، بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔

سائیکلیمن کی بلغم میں سفیدی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جراثیم کا حملہ بہت شدیز ہیں ہے اور زیادہ افلیکشن نہیں ہوئی۔ ہا گلیمن میں دم گھٹے والی کھانسی بھی ہوتی ہے۔

ان حصوں میں جہاں ہڑیاں جلد کے بالکل نزدیک ہوں، درد ہوتا ہے۔ وائیں ہاتھ میں انگو تھے اور تشہد کی انگلی میں تشنج ہونے لگتا ہے جو لکھتے ہوئے کچھ بڑھ جاتا ہے۔ پاؤں کی ایر پیوں میں پھوڑے کا سا درد ہوتا ہے۔ بعض اوقات بیددد ہڈی کے بڑھ جانے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اس کا زیادہ گہرا علاج کرنا پڑتا ہے، جس سے ہڈی مزید بڑھنا بند ہوجاتی ہے۔

لیکن جہاں ہڑیاں بہت بڑھ گئی ہوں وہاں اپریشن کروانا پڑتا ہے۔ جو دوائیں اس تکلیف کو کم کرنے میں میں ہوتی ہیں ان میں آرنیکا، لیڈم، روٹا، کلکیریا فلور اور رسٹا کس شامل ہیں اور کلکیریا

سائیکلیمن میں خارش کو تھجلانے سے سکون ملتا ہے۔عورتوں میں حیض کا خون جاری ہونے پر خارش کوآ رام آ جا تاہے۔

طاقت: 30سے 200 تک

ۇ يىخىلىس ۋىلىس

87 طروم طبیلیس

DIGITALIS

ڈیجی ٹیلس دل کے امراض میں بکثرت استعال ہونے والی مشہور دوا ہے۔ ایلو بیتھی طریق علاج میں بیدل کی تیز، بے قابودھڑ کنوں کو قابو میں لانے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ یہ نبض اور دل کے غیر معمولی جوش اور دھڑ کن کی تیزی کوایک ضابطهاعتدال میں لے آتی ہے کیکن بہ بہت کمبے عرصہ تک بڑھتی ہوئی مقدار میں استعال کرنی بڑتی ہے اوراس کا بظاہر خوشکن اثر پھر بھی عارضی ثابت ہوتا ہے کیونکہ دن بدن اسے پہلے سے زیادہ مقدار میں دیناپڑتا ہے۔ بالآخر بیمقدار اتنی بڑھ جاتی ہے کہ براہ راست زہر کا ساکام کرتی ہے۔اس موقع پرتمام ایلو پیتھ اطباء مجبور ہوجاتے ہیں کہاسے بند کردیں اور جونہی یہ بند کی جاتی ہے تو دل کی دھڑ کن انتہائی تیز رفتار ہو کر بعض اوقات محض ایک تھرتھراہٹ میں بدل جاتی ہے جس کے بعد دل احیا نک کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ دراصل دل کی حرکت کو کم کرنے کا جواثر اس کے استعال سے عارضی طور پر دکھائی دیتا ہے۔وہ ایک جبری اثر ہوتا ہے جودل کے عضلات کی بیاری تو دور نہیں کرسکتا مگران کوایک محدود حرکت کے دائرے میں جکڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بالآخر بیعضلات کلیتا جواب دے جاتے ہیں۔اس کے اثر سے مرض کے آخری ایام میں مریض کے چھیچھ وں میں یانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ دل کے والوز (Valves) خون آ گے رگوں میں بھیجنے کی طاقت نہیں رکھتے اور خون چھیچھڑوں میں جمع ہو کر چھیچھ وں کوخون اوریانی سے بھردیتا ہے بہاں تک کہ سانس لینے کی جگہ بھی باقی نہیں رہتی۔ اس کا ہومیو پیتھی طریق استعال مذکورہ نقصانات سے خالی ہوتا ہے۔ ہومیو پیتھک طریق استعال میں بہایک بہت مفیداورطاقت بخش دوا ثابت ہوتی ہے۔

دل کا ہر وہ مرض جس میں جگری خرابی بقینی طور پر موجود ہواور آغاز میں بیش ہلکی اور دبی ہوئی ہوا لیے مرض کی ہرشکل میں ڈیجی ٹیلس بہترین کا م کرتی ہے۔ یہ جگر، تلی اور پھیپے طوں پر بھی بہت مثبت اثر ڈالتی ہے۔ محض اس خطرہ ہے ڈیجی ٹیلس کونظر انداز کرنا کہ ایلو پیتھی میں اس کا غلط استعال ہوا ہے درست نہیں ہے۔ اسے دل کی بیماریوں میں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہئے۔ تاہم بعض چوٹی کے ہومیو پیتھک ڈاکٹر مثلاً ڈاکٹر کینٹ جولمبا عرصہ ایلو پیتھک ڈاکٹر رہے ہیں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ڈیجی ٹیلس کے غلط استعال سے موت کے سامان زیادہ ہوئے ہیں اور زندگیاں کم بیائی گئی ہیں کیونکہ میصرف وقتی فائدہ دیتی ہے اور دل کے عضلات کی طاقت ختم کر دیتی ہے اور نہیں بیا تا کئی ہومیو پیتھ ڈاکٹر کینٹ کے اس تجسرے کونہ ہجھنے کی وجہ سے اس دوا کے استعال سے خائف رہتے ہیں حالانکہ ان کا حملہ اس کے ایلو پیتھک طریق استعال پر ہے نہ کہ ہومیو پیتھک طریق استعال پر ہو نہ کہ ہومیو پیتھک

کی دواؤں سے پچھآ رامنہیں آتا۔

اگر کھانا کھانے سے آرام نہ آئے بلکہ کھانے سے معدے پر بوجھ پڑ جائے اور دوران خون بڑھ جائے تو بیدل کی تکلیف کی علامت ہے اور ڈیجی ٹیلس کی ایک پہچان ہے۔

ڈیکیٹیس میں مریض سوتے ہوئے بہت بے چینی محسوں کرتا ہے۔ بہت خوفناک خواہیں آتی ہیں۔خوفناک نظارے، نیچ گرنے کا احساس اور بھا گئے کی خواہش پائی جاتی ہے اور بلندی سے گرنے کی خواہیں آتی ہیں۔ دراصل دل کے ڈو بنے کا احساس خواب میں جسم کے گرنے بلندی سے گرنے کی خواہیں آتی ہیں۔ دراصل دل کے ڈو بنے کا حساس خواب میں جسم کے گرنے کے احساس میں تبدیل ہوجا تا ہے۔ سوتے ہوئے جھٹکے بھی لگتے ہیں۔ یہا عصاب اور دل کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آئکھ لگتے ہی زور دار جھٹکے سے آئکھ کل جاتی ہے۔ یہ علامت گرائینڈ ملیا سے مشابہ ہے۔

ڈیجیٹیلس میں چہرہ پر نیلا ہٹ آ جاتی ہے۔ یہ خون کی گردش میں خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بھی نیلی ہو جاتی ہیں جبکہ گرائینڈ ملیا میں یہ علامتیں نہیں ملتیں ہاں کیو پرم میں یہ نیلا ہٹ کی علامتیں پائی جاتی ہیں مگر دل کی تکلیف کی وجہ سے نہیں بلکہ دوسر سے عوارض کے باعث۔

ڈیکی ٹیلس میں بیاریوں کے آغاز میں نبض آہستہ ہوتی ہے لیکن بعد میں تیز ہوجاتی ہے۔ اگر بنیادی علامتیں ڈیکی ٹیلس سے مشابہ ہوں تو پھر نبض خواہ کتنی تیز بھی ہوڈیکی ٹیلس ہی کام آئے گی۔ نبض تیز ہونے کی وجہ سے اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ عموماً اس کی نبض میں بہت کمزوری پائی جاتی ہے۔ اگر نبض کی رفتار تیز بھی ہو پھر بھی کمزور ہوگی۔ آرسنک میں نبض تیلی مگر تیز ہوتی ہے اور اس میں تناؤ ماتا ہے۔

غم کے نتیجہ میں دل کا حملہ ہوتو اس میں بھی ڈیجی ٹیلس مفید ہے۔ دل پھڑ پھڑا تا ہے یا اچانک چلتے ہوئے بند ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ بے انتہا بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ دل کے رکنے کا احساس ڈیجی ٹیلس کی خاص علامت ہے۔ اگر دل کی تکلیف کی وجہ سے کھانسی (Cardiac Cough) ہوتو ڈیجی ٹیلس سے فائدہ ہوسکتا ہے۔ پھیپھڑوں

سے تعلق رکھنے والی کھانسی سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ بسااوقات بغیر کسی جھکے کے سانس بند ہونے

گ تکلیف سے آنکھ کھنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نظام شفس متاثر ہوا ہے جوخود کارطریقے
سے سانس جاری رکھتا ہے۔ سونے پر سانس کی رفتار میں مسلسل کی آنی شروع ہوجائے تو مجبوراً
ایسے مریض کو بھی بھی جگاتے رہنا چاہئے ورنہ وہ سوتے سوتے ہی ختم ہوسکتا ہے۔ سوتے سوتے
سانس کی رفتار تدریحاً کم ہونے کی علامت معدہ کے مریضوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ڈایا فرام
سانس کی رفتار تدریحاً کم ہونے کی علامت معدہ کے مریضوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ڈایا فرام
کی حالت میں یہ فرق ہے کہ دل کے مریض کی یہ حالت مستقل ہوتی ہے اور معدہ کے مریضوں
میں بھی بھی معدہ خراب ہونے پر ایبا ہوتا ہے۔ سانس بند ہونے کی علامتیں لیکیسس ، فاسفورس
میں بھی بھی معدہ خراب ہونے پر ایبا ہوتا ہے۔ سانس بند ہونے کی علامتیں لیکیسس ، فاسفورس میں بھی یائی جاتی ہیں۔

ڈیکی ٹیلس کو عموماً دل کی تکیفوں سے باندھ دیا گیا ہے اس لئے اکثر معالجین دیگر بیاریوں میں اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں جبکہ عمر کے ساتھ بڑھنے والی بیاسٹیٹ گلینڈز (Prostat Glands) کی کمزور یوں میں اگر دیگر علامتیں مشابہ ہوں تو ڈیکی ٹیلس ایک بہت طاقت وراورموثر دوا ثابت ہوتی ہے۔ ہرعمر میں پیدا ہونے والی پراسٹیٹ کی تکیفوں میں عموماً سیبل سیر ولیٹا (Sabal Serrulata) اور چیما فیلا (Chimaphila) کے مرتئی ملاکر دینا بہت مفید ثابت ہوا ہے مگر مدر ٹیکیر میں ان دونوں کے مرکب کا استعال لمبے عرصہ تک کرنا چاہئے۔ اس کے علاوہ بیلا ڈونا، آرسنگ اور تھوجااو نجی طاقت میں ملاکر دینا بھی مفید ہے لیکن پراسٹیٹ کی جو بیاری دل کی بیاری کے ساتھ ساتھ شروع ہوئی ہواس میں ڈیکی ٹیلس کو اولیت دینی پراسٹیٹ کی جو بیاری دل کی بیاری کے ساتھ ساتھ شروع ہوئی ہواس میں ڈیکی ٹیلس کو اولیت دینی جائے۔ اس سے پراسٹیٹ گلینڈ آ ہستہ آ ہستہ والیس سکڑ کر واپس اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہے۔ بہت کم دواوں میں میطاقت میں مناسب دواوں میں موجھوٹی طاقت میں لمبے عرصہ تک استعال کرنا چاہئے۔ تمیں طاقت میں مناسب لیے ڈیکی ٹیلس کو چھوٹی طاقت میں لیے عرصہ تک استعال کرنا چاہئے۔ تمیں طاقت میں مناسب سے آ ہستہ بڑھنے والی بیار یوں کو زیادہ او نجی طاقت سے فائدہ نہیں بہنچے گا ان میں مناسب سے آ ہستہ بڑھنے والی بیار یوں کو زیادہ او نجی طاقت سے فائدہ نہیں بہنچے گا ان میں مناسب سے آ ہستہ بڑھنے والی بیار یوں کو زیادہ او نجی طاقت سے فائدہ نہیں بہنچے گا ان میں

عموماً بیاصول اپنالینا چاہئے کہ چھوٹی طاقت میں لمبے عرصہ تک دوائیں دیتے رہیں۔اور پھر پچھ عرصہ کے بعد طاقت بڑھاتے رہیں۔ میں نے ڈیجیٹیلس کوعموماً تمیں طاقت میں ہی استعال کرایا ہے۔اس سے زیادہ بڑی پڑینسی کے استعال کی ضرورت پیش نہیں آئی لیکن اگر کسی مرض میں پچھ فائدہ کے بعد افاقہ رک جائے تو پھر طاقت بڑھا کردیکھنا جاہئے۔

و یکی ٹیلس میں بھوک کا فقدان اور پیاس کا برط صحبانا پایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ کا کچیکم کی طرح کھانے کی خوشبو اشتہا پیدا کرنے کی بجائے بھوک کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ لیکن و یکی طرح کھانے کی خوشبو اشتہا پیدا کرنے آئے اور بے ہوش ہوجانے کار جحان نہیں ماتا۔ پیاس میں کا کچیکم کی طرح شدید نے آنے اور بہوش ہوجانے کار جحان نہیں ماتا۔ پیاس بھڑک اٹھتی ہے اور بھوک آ ہستہ آ ہستہ بالکل مٹ جاتی ہے۔ جگر کی بیاریوں اور برقان میں بی علامت عام ہے۔ اگر مزاجی علامتیں بھی پائی جاتی ہوں تو ڈیجی ٹیلس ان تمام علامتوں میں اکیلی بی شافی ثابت ہو سکتی ہے۔

ڈیکیٹیس کی بے چینی آرسنگ کی نسبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آرسنگ کی بے چینی لیٹنے کے بعد یا ایک حالت میں گھہر نے پر بڑھتی ہے جبکہ ڈیکیٹیس کی بے چینی ہرحال میں محسوس ہوتی ہے نہ لیٹنے سے کم ہوتی ہے نہ جسمانی حرکت سے۔ ایسے بے چین مریض کوڈیکیٹیس ہی دینی حوال ہے کہ چاہئے کیونکہ بید دل کے عضلات کی تدریجی کمزوری سے تعلق رکھتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایلو پیتھک طریق پر ڈیکیٹیلس کی عمرورت سے زیادہ استعال سے بیدا ہونے والی دل کی خرابیوں میں ڈیکیٹیلس کی بہت اونچی طاقت مثلاً ایک لاکھ فائدہ مند ثابت ہوسکتی ہے لین بھی خود میں نے اپنے کسی مریض پر اس کا تجربہ ہیں کیا۔ اس لئے اگر کوئی ہومیو پیتھ بیتج بہ کرنا چاہت و نہیا سے سے جاجازت لے لینی جا ہے۔

ڈیجی ٹیلس میں خارش بھی ملتی ہے۔ کمر پر سرخ دانے نکلتے ہیں۔ اکر وں بیٹھنے سے، کھانے کے بعداور موسیقی سے تکلیف میں اضافیہ ہوجاتا ہے جبکہ کھلی ہوا میں اور خالی پیٹ رہنے سے مرض کی شدت میں کمی آجاتی ہے۔ کیمفر ڈیجی ٹیلس کی مصلح دوا ہے۔ چائنا سے اس کی موافقت نہیں ہے۔ لہذا انہیں ایک دوسرے کے بعد استعال کرنے میں احتیاط کرنی چاہئے۔ مددگار دواؤں میں کریٹیگس بہت اہمیت رکھتی ہے۔

طاقت: 30

88

ڈ انسکو ریا ولوسا

DIOSCOREA VILLOSA (Wild Yam)

ڈائیاسکوریا جنگلی یام (Yam) سے بنائی جانے والی دوا ہے جوایک بودے کی جڑکو کہتے ہیں جو بہت موٹی ہوتی ہے۔ یہ پوداافریقہ میں بکثرت ملتا ہے۔ یہ ایک روز مرہ کام آنے والی بہت اہم دوا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ اثر پتہ پر ہوتا ہے۔ پتہ کی پچھری سے پیدا ہونے والے شنج کودور کرنے کے لئے (اگراس کی مخصوص علامتیں ملتی ہوں) بہت کار آمد ثابت ہوتی ہے۔

اس کی مخصوص علامت ہے ہے کہ تنتی خواہ ہے میں ہویا پیٹ کے کسی اور جھے میں ہواس میں ہمیشہ دباؤ سے نقصان پہنچتا ہے اور انگلزائی لے کر ماؤف جگہ پر دباؤ کم کرنے سے آ رام ماتا ہے۔ پیچش میں قولنج کے درد بہت ہوتے ہیں۔ اس کے مریض کو آ ہستہ ٹہلنے سے آ رام آ تا ہے کیونکہ اس سے بھی ہوا کا دباؤ کم ہوجا تا ہے۔ کمر اور کندھوں کی طرف درد کی اہریں جاتی ہوئی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، ڈائسکو ریا میں درد کی اہریں ہمیشہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقال ہوتی ہیں۔ پیچ میں شخ ہوتو درد کی اہر سینے سے ہوتی ہوئی کندھوں کی طرف بڑھتی ہے اور بازووں میں منتقال ہو سے میں شخل ہو کہ اس کے مرد کی اہر سینے سے ہوتی ہوئی کندھوں کی طرف حرکت کرتا ہے۔ اس طرح بواسیر کے مسوں کا درد بھی جگر ہی کی جانب جا تا ہوامحسوس ہوتا ہے۔ معدہ کے شنج کا درد دل کی جانب جا تا ہوامحسوس ہوتا ہے۔ معدہ کے شنج کا درد دل کی جانب باتا ہوامحسوس ہوتا ہے۔ معدہ کے شنج کا درد دل کی جانب جا تا ہوامحسوس ہوتا ہے۔ معدہ کے شنج کا درد دل کی جانب جا تا ہوامحسوس ہوتا ہے۔ معدہ کے شنج کا درد دل کی جانب باتا ہوامحسوس ہوتا ہے۔ معدہ کے شنج کی درد کے فور کی علاج کے لئے (جبکہ کسی ایک دواکی واضح علامتیں نہلیس) جو مرکب میں شخط میں شور گائیا سکوریا اس کا لاز می جز وہوتا ہے۔

ڈائیاسکوریا بہت زیادہ جائے پینے سے پیدا ہونے والے بدائرات کا بھی تریاق ہے۔ ڈائیاسکوریا کے مریض کے پیٹے کی ہوا میں بہت بد بوہوتی ہے۔ شبح کے وقت منہ کا ذا گقہ کر واہوتا ہے اور زبان پر سفیدموٹی تہہ جم جاتی ہے۔ یہ پبیٹ کے اعصا بی در دوں کے لئے بھی بہت مفید دوا ہے۔ اس کا مریض چیزوں کے نام غلط یا در کھتا ہے اور وہی پکارتا ہے۔ دونوں کنپٹیوں میں بلکا بلکا در در ہتا ہے جو ملکے دباؤسے کم ہوتا ہے۔

ڈائیاسکوریا میں خونی بواسیر بھی ملتی ہے۔ مسے سرخ انگور کے پھوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اسہال بھی آتے ہیں جوضج کے وقت شدت اختیار کرجاتے ہیں۔ جلن کا حساس ہوتا ہے۔ ڈائیاسکوریا کا مریض سارے سینے میں گھٹن اور تناؤ محسوس کرتا ہے۔ سانس لینے پرسینہ پوری طرح بھیا تہیں ہے اس لئے مریض چھوٹے چھوٹے سانس لیتا ہے۔ ہاتھوں کے ناخن جلدٹو شتے ہیں اور بہت خستہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی تکلیفیں شام کے وقت نیز الٹا لیٹنے اور آگے جھکنے سے بڑھتی ہیں۔ سیدھا کھڑے ہونے، آہستہ آہتہ طبلنے اور ملکے دباؤسے کم ہوجاتی ہیں۔ کیمومیلا اور کیمفر اس کے ان کوزائل کرنے والی دوائیں ہیں۔

طاقت: 30 تک

وقته مينم 357

89

وفتهيرينم

DIPHTHERINUM

ڈفتھرینم خناق (Diphtheria) کے زہر سے تیار کی جاتی ہے۔ایسی سب دوائیں جو بیاریوں کے فاسد مادے سے تیار کی جائیں انہیں نوزوڈ (Nosode) کہا جاتا ہے۔عموماً کسی نوزوڈ کواس بیاری کے حملے میں نہیں دیتے جس کے فاسد مادے سے وہ تیار کی گئی ہو۔ ہاں اس سے ملتے جلتے امراض میں استعال کیا جاتا ہے لیکن خناق کے دوران ڈفتھیرینم دینے سے نمایاں فائدہ ہوتا ہے۔ اس پہلو سے یہ دوا خناق میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ علاوہ ازیں خناق (ڈفتھیریا) کے حملے کی روک تھام کے لئے اس سے زیادہ مؤثر اور کوئی دواابھی تک دریافت نہیں ہوئی۔حفظ ما تقدم کاروایتی ایلوپیتھک ٹیکہاٹر میں اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ یہ بہت لمبے عرصہ تک اثر کرنے والی دوا ہے۔اگر خناق کی وہا کے دوران 200 طاقت میں دو چارخورا کیس دے دیں تو خناق کا خطرہ نہ صرف فوری طور پرٹل جاتا ہے بلکہ ایک مختاط اندازے کے مطابق آٹے سال تک اس کی تکرار کی ضرورت نہیں بڑتی جبکہ روایتی مدافعتی ٹیکے کے اثر کی مدت زیادہ سے زیادہ تین سال بتائی جاتی ہے۔ چندخوراکیس 200 طاقت میں دے کر چند ماہ کے وقفہ کے بعد ڈفتھیرینم CM میں ایک خوراک دے دیں تو پوری زندگی کے لئے ڈفتھیریاسے بچاؤ ہوسکتا ہے۔ بعض بچوں براس دوا کاایلوپیتھکٹیکوں سے موازنہ کیا گیا ہے جن بچوں کوڈفتھیریا کاروایتی ٹیکہ لگوایا گیا تھا۔اس کے باوجودان میں سے کئی ڈفتھیریا کا شکار ہو گئے یا نہیں ٹیکے کے رقمل کے طور پر بعض دوسرى بياريان لاحق ہوگئيں مگرجن كو فتھيرينم دى گئى تھى ان ميں سے ايك بيچے كوبھى نہ فتھيريا ہوا نەدىگر ملتے حلتے عوارض۔

اسے انفلوئنزا کی مدافعت میں بھی مفید پایا گیا ہے۔ کئی دفعہ تجربہ میں آیا ہے کہ

انفلوئنزا کی وبا کے دوران اگرانفلوئنزم اور بیسیلینم کے ساتھ ڈفتھیرینم بھی ملادیں توروک تھام کی ایک بہت طاقتور دوابن جاتی ہے۔ نگلنے کے عضلات کی کمزوری اوران کے فالجی اثرات کے علاج میں بھی ڈفتھیرینم اچھا اثر دکھاتی ہے۔ اگر انفلوئنزا کے بداثرات سے دل متاثر ہوتو اس صورت میں ڈفتھیرینم دینے سے بہت فائدہ ہوگا۔

ڈفتھیرینم ان تمام دوسری امراض میں بھی مفید ہے جن کی علامات ڈفتھیریا سے مشابہ ہوں۔غدود پھول کے سخت ہوجائیں، زبان سرخ اورموٹی ہو، ہرفتم کے اخراجات میں شدید بدبو ہو، تگلنے میں دفت ہو۔خوراک اور پانی ناک کے راستے باہر آئیں توان سب تکلیفوں کورفع کرنے میں بیشبت اثر دکھاتی ہے۔

طانت: CMr30

ڈروسرا

90

ڈروسراروٹنڈ یفولیا

DROSERA ROTUNDIFOLIA

(Sundew)

ڈروسراایک ایبالپوداہے جو گوشت خورہے اور کیڑے مکوڑے کھا تاہے۔اس کے پتول کی سطے پرسرخی مائل بال ہوتے ہیں جن سے رطوبت خارج ہوتی ہے جو کیڑے مکوڑ ول کو قابو کرنے اور انہیں ہضم کرنے میں ممد ثابت ہوتی ہے۔ بیر طوبت سورج کی روشنی میں شبنم کے قطروں کی طرح چمکتی ہے۔ اس کے پتے زمین پر پھیلے ہوتے ہیں۔ جو نہی کوئی کیڑ اقریب آتا ہے بیپ فوراً بند ہوجاتے ہیں اور وہ کیڑا ان کی غذا بن جاتا ہے۔

سولہویں صدی میں ڈروسرا کوتپ دق کے علاج کے سلسلہ میں بہت شہرت ملی کیکن اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ جن مریضوں نے اس کواستعال کیا وہ ان مریضوں کی نسبت جلد مر گئے جنہوں نے اسے استعال نہیں کیا۔ تپ دق کے علاوہ اسے دانت درد، پاگل بین اور وضع حمل کی تکلیفوں کو کم کرنے کے لئے بھی استعال کیا گیا۔

ہومیوبیتھی طریقہ علاج میں اس پودے کے عرق سے دواتیار کی جاتی ہے۔ جے عموماً کھانسی میں استعال کیا جاتا ہے۔ چائجہ اس دواکوزیادہ ترکالی کھانسی سے ہی مخصوص کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ اسے دراصل شنج سے خصوص کرنا چاہئے تھا کیونکہ تشنجی علامات میں اس کا دائر ممل زیادہ وسیع ہے۔ صرف کھانسی میں ہی نہیں بلکہ بعض دوسری بیاریوں میں بھی ڈروسرا شنج دورکرنے کے کام آتا ہے۔ اسی طرح یہ مرگی میں بھی مفید ہے۔ شنج کے نتیجہ میں بے ہوشی کے دورے کے بعد ڈروسرا کا مریض بہت فکر منداور بے چین رہتا ہے۔ اس پریشانی کو دورکرنے میں ڈروسرا ایک بلندیا بیدوا ہے خواہ بیشنج مرگی فکر منداور بے چین رہتا ہے۔ اس پریشانی کو دورکرنے میں ڈروسرا ایک بلندیا بیدوا ہے خواہ بیشنج مرگ

ڈروسرا

کانہ بھی ہو۔

ڈروسرا کوعورتوں کے حیض ختم ہونے کے زمانے میں پیدا ہونے والی علامتوں میں بھیدا ہونے والی علامتوں میں بھی استعمال کرنا جا ہے کیونکہ اس دور کی بیاریوں کی علامتیں ڈروسراسے بہت ملتی ہیں۔ چہرہ کی تمتما ہے،خون کے دوران کا کسی خاص عضو کی طرف ہوجانا اور بے چینی وغیرہ ڈروسرا میں یائی جاتی ہیں۔ یائی جاتی ہیں۔

بر میں است کا مریض اکیلا رہنے سے گھبراتا ہے اور شکی مزاج ہوجاتا ہے۔ اپنے قریبی دوستوں پر بھی اعتبار نہیں کرتا۔ سانپ کے زہر سے تیار کی جانے والی آکٹر دواؤں میں بھی الیی علامت یائی جاتی ہے۔ ا

ڈرونسرا کا مزاجی مریض تو ہمات کا شکار ہوتا ہے۔ بے چینی اور پست ہمتی کے علاوہ ہمیشہ ذندگی کے تاریک پہلوؤں پر نظر رکھتا ہے۔ بے حدچڑ چڑا ہوجاتا ہے۔ سرخصوصاً پیشانی میں درد ہوتا ہے اور رخسار کی ہڈیوں کے رستے باہر کی طرف پھیلتا ہے۔ کھلی ہوا میں چلنے سے چکر آتے ہیں اور بائیں طرف گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بائیں طرف آ دھے چہرے پر شدید سردی کے ساتھ ڈنک دار دردوں کا احساس اور دا ہے آ دھے چہرے پر خشکی اور گرمی کا احساس ہمی ڈروسراکی امتیازی علامت ہے۔

اگر کھانے کے بعد صنجرے میں سرسراہٹ ہواور کھانسی شروع ہوجائے تو ڈروسراسے فائدہ ہوسکتا ہے۔

دین کیر کے درخت پر جب پھلیاں آتی ہیں تو اس موسم میں کھانسی کی وبا بہت پھلیاں آتی ہیں تو اس موسم میں کھانسی کی وبا بہت پھلیاں آتی ہیں ڈروسرا میں سانس کی نالی میں تنگی اورسکڑن کا احساس ہوتا ہے۔ ایسی کھانسی جس میں گلے میں بے چینی کا مستقل احساس رہاور کھانسے سے بھی آرام نہ آئے ،اس میں ڈروسرا بہت کار آمد ہے۔ آدھی رات کے بعد شروع ہونے والی کھانسی اور وہ کھانسی جو بولنے سے بڑھ جائے ،اس میں بھی ڈروسرا مفید ہے۔ بچوں میں کالی کھانسی تکھے پر سرر کھتے ہی شروع ہوجاتی ہاور ساور کھانسی کھانس کو دورہ دوتین گھنٹے تک چلاتا ہے۔ بچیکھانس کھانس کرنڈ ھال ہوجا تا ہے لیکن سکون بھراس کا دورہ دوتین گھنٹے تک چلاتا ہے۔ بچیکھانس کھانس کرنڈ ھال ہوجا تا ہے لیکن سکون

ڈروسرا

__ کاایک لمحهٔ ہیں ملتا۔

اگر مریض کو بخار ہوتو وہ جسم میں شدید سردی محسوس کرتا ہے اور کا نیتا ہے، چہرہ گرم اور ہاتھ مٹنڈ سے ہوجاتے ہیں اور پیاس بالکل غائب ہوجاتی ہے۔ڈروسراکی کھانسی لیٹنے سے، ہننے سے، گانے سے اور بسترکی گرمی سے بڑھتی ہے۔

> دافع اثر دوائیں: کیمفر طاقت: 6یا200سے 200 تک

ۇلكامارا 363

91

و لكامارا

DULCAMARA

(Bitter Sweet)

ڈ لکا مارا ایک ایسے بود ہے سے تیار کی جانے والی دوا ہے جو بور پ اور امریکہ میں بکثر ت پایا جاتا ہے۔ اس درخت کی شاخیں بڑی بڑی اور پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور اسے کاسنی رنگ کے پھول لگتے ہیں۔ اس کے تنے اور جڑ کو چبایا جائے تو پہلے مزہ کڑ وامحسوس ہوتا ہے پھر میٹھا۔ اسی وجہ سے اسے Bitter Sweet کہا جاتا ہے۔ تازہ بودے کے عرق سے جو دوا تیار کی جاتی ہے اسے ڈ لکا مارا کہتے ہیں۔

ڈ لکا مارانزلاتی جھلیوں کی بہت اہم دواہے۔اس میں بہ بات نمایاں طور پر پائی جاتی ہے کہ موسم میں کوئی بھی تبدیلی ہو، خواہ گرمی سردی میں بدلے یا سردی گرمی میں -نمی خشکی میں تبدیل ہویا خشکی نمی میں، بہتبدیلی نزلاتی جھلیوں پر اثر انداز ہوتی ہے خصوصاً اگر یہ یکا کی واقع ہوتو عین ممکن ہے کہ ڈ لکا مارا دوا ہو۔ موسم کی تبدیلی کے دنوں میں نزلہ زکام بہت کثرت سے بھیلتا ہے۔اگر مریض کی دیگر علامتیں واضح نہ ہوں لیکن ہر موسم کی تبدیلی پر بھار بڑ جائے تو اس کے لئے ڈ لکا مارا مفید ہے۔

وہ کھلاڑی جو کھیل کے بعد، جبکہ ابھی جسم گرم ہو، کپڑے جلدا تاردیں تو آئییں نزلاتی تکلیفیں شروع ہوجاتی ہیں۔ اسی طرح سردی سے اچا تک باہر گرمی میں نکل جانے سے بھی نزلہ ہوجا تا ہے۔ رات کے وقت اور آ رام کرنے سے تکلیف ہڑھتی ہے۔ گردے، انتر یوں اور معدے پر بھی نزلاتی اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور بار بار بیشاب آتا ہے یا اسہال شروع ہوجاتے ہیں۔ اسہال کی یہ تکلیف انتر یوں، معدے یا گردوں کی نزلاتی تکلیف سے ہوتی ہے۔ نم دارجگہوں پر رہنے سے اور نم دارموسم میں تکلیف

بره ه جاتی ہیں۔

گرمیوں کے موسم میں پہاڑوں پر جانے یا وہاں سے واپس آنے پر نزلاتی تکلیفیں ہو جائیں تو ان میں بھی ڈ لکا مارا دوا ہے۔ بعض لوگوں کو سردی لگنے سے اسہال کی بجائے بیچیش شروع ہو جاتی ہے۔ ڈ لکا مارا او ٹجی طاقت میں دی جائے تو وہ اس تیمیش کی دوا بھی ڈ لکا مارا ہے۔ ڈ لکا مارا او ٹجی طاقت میں دی جائے تو وہ اس قتم کی کمزور یوں کا حفظ ما نقدم ہے اوراس دواکی او ٹجی طاقت کے استعال کے بعدا کثر مریض موسم کی تبدیلیوں سے اس قدر متاثر نہیں ہوتے۔

اگر پسینہ آیا ہواور ٹھنڈی جگہ میں آنے سے دب جائے تو اس سے پیدا ہونے والی تکلیفوں میں بھی ڈ لکا مارامفید ہے۔

ڈلکامارا کا نزلہ ناک سے شروع ہوتا ہے لیکن آنکھوں میں اپنامستقل قیام کر لیتا ہے،
آنکھیں بوجھل ہوجاتی ہیں اور زردرنگ کی گاڑھی رطوبت نکلتی ہے۔ یہ رطوبت پانی کی طرح
تیلی بھی ہوتی ہے۔ آنکھوں کے پوٹے متورم ہوجاتے ہیں۔ اگر ڈلکامارا نہ دیا جائے تو نزلاتی
تکلیفیں مزمن ہوجاتی ہیں۔ ڈلکامارامیں خشک زکام ہوتا ہے اور ناک مکمل طور پر بند ہوجا تا ہے۔
گاڑھی زردرطوبت ناک میں جم جاتی ہے۔ ذراسی سردی بھی لگ جائے تو نزلہ عود کر آتا ہے اور
ناک سے خون بھی نکتا ہے۔

ڈ لکامارا اندرونی جھلیوں اور ہیرونی جلد میں ناسور پیدا ہونے کا بھی علاج ہے۔ چہرے کی جلد پر انگزیمے کی قسم کے زخم بن جاتے ہیں جو تیزی سے پھیل جاتے ہیں اور زردرنگ کے کھر نڈ بنتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوالے کچھوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں جو بہت جلد پھیلتے ہیں۔ بیعلامت آرسنگ میں بھی بہت نمایاں ہے لیکن دونوں کے مریض بالکل الگ مزاج رکھتے ہیں۔ آرسنگ میں گینگرین بین بیدا کرنے کار جحان ہے جبکہ ڈ لکامارامیں زخم گینگرین میں تبدیل نہیں ہوتے۔ ڈلکامارا وہاں زخم پیدا کرتی ہے جہاں جلد کی تہ ہڈی پر بہت بیلی ہو۔ آرسنگ اور ڈلکامارا میں زخموں کی نوعیت کے لحاظ سے ایک فرق ہے جہاں جلد کی تہ ہڈی پر بہت بیلی ہو۔ آرسنگ اور ڈلکامارا میں زخموں کی نوعیت کے لحاظ سے ایک فرق ہے ہے کہ آرسنگ میں طاعون کی قسم کی گلٹیاں بنتی ہیں۔ بغلوں کے غدود سوخ جاتے ہیں اور ان میں پیپ بنتی ہے۔ ڈلکامارا میں غدودوں میں پیپ نہیں بنتی صرف شخق غدود سوخ جاتے ہیں اور ان میں پیپ بنتی ہے۔ ڈلکامارا میں غدودوں میں پیپ نہیں بنتی صرف شخق

پیداہوجاتی ہے۔

ڈ لکا مارا میں سر پر کھرنڈ بن جاتے ہیں جن سے رطوبت بہتی ہے۔ یہ علامت میز پریم (Mezereum) میں بھی پائی جاتی ہے لیکن میز پریم میں ایگزیما کے اوپر جھلی ہی بن جاتی ہے جس میں پیپ اور شدید بو پائی جاتی ہے۔ ڈ لکا مارا میں بیعلامات زیادہ شدید نہیں ہوتیں۔

ڈ لکامارا کے ایگزیما سے ملتی جلتی علامتیں رکھنے والی دوائیں سیبیا، آرسینک،
گریفائیٹس، پٹرولیم، سلفر، کلکیریا کے نمکیات اور رسٹائس ہیں۔ان سب کواپنی اپنی علامتوں
کے لحاظ سے یاد رکھنا چاہئے۔ کروٹن، ایناگیلس اور اینا کارڈیم بھی بہت مفید دوائیں ہیں۔
ایناگیلس، کروٹن اور رسٹائس کا ایگزیمابدن کے نچلے حصہ پراور رانوں کے اردگر دہوتا ہے۔
ایناکارڈیم میں ایگزیماسارے بدن پر پھیلتا ہے۔

ڈ لکا مارا میں سرورو کی علامت سردی اور مرطوب موسم میں بڑھ جاتی ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سرمیں بھاری بن اور کنیٹیوں میں درد ہوتا ہے۔ کانوں میں درد اور بھنجنا ہٹ کی آ وازیں آتی ہیں جن سے قوتِ سامعہ متاثر ہوتی ہے۔ کانوں کے اردگرد کے غدودوں میں سوزش ہو جاتی ہے۔ گالوں میں شدید درد ہوتا ہے جو کان ، آنکھ اور جبڑوں تک بھیل جاتا ہے۔ زبان خشک اور کھر دری ہو جاتی ہے۔ زبان کا فالح بھی نمایاں ہے۔ چبڑے کی اعصا بی درد سردی گئنے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔

مریض کھانے سے نفرت کرتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کی نہ بجھنے والی پیاس، جلن، متلی اور قع کار جھان جس میں سفیدلیس دار رطوبت نکتی ہے۔ قع کے دوران سردی لگتی ہے۔ سردی کی وجہ سے مثانے میں سوزش اور بار بار پیشاب آتا ہے۔ مسلسل پیشاب کرنے کی حاجت رہتی ہے۔ قطرہ قطرہ پیشاب آتار ہتا ہے۔

بیار یوں کی علامت کروٹ پر لیٹنے سے کم ہوتی ہے اور کمر کے بل لیٹنے اور جھکنے سے بڑھتی ہیں۔ موسم سے بڑھتی ہیں۔ موسم کی ہوتی ہے۔ شام کے وقت اور رات کو بڑھ جاتی ہیں۔ موسم کی تبدیلی سے، مرطوب موسم میں بھیگ جانے اور ٹھنڈی چیزیں استعال کرنے سے بھی

مردگاردوائيں: برائيٹا کارب دافع اثر دوائيں: کیمفر - کیوپرم طاقت: 30سے 200 تک

92 الیکٹر نسی ٹاس ELECTRICITAS

قدرتی یا مصنوی طریق سے پیدا کردہ بجلی کی لہروں سے تیار کردہ ہومیو پیتھی دوا کا نام الکیٹر لیمی ٹاس ہے۔اس دوا کا تعلق ایسے مریضوں سے ہے جو باول کے گر جنے اور بجلی حجیکنے سے متاثر ہوتے ہیں۔طوفان کے آنے سے پیشتر یا طوفان کی آمد پرمریض پر دمیے کا حملہ ہوجا تا ہے یا نزلاتی تکلیفیں شروع ہوجاتی ہیں۔عمومی ڈیپریشن، بے چینی، مایوسی ،نبض کی تیزی اور سردرد وغیرہ طوفان کے نتیجہ میں شروع ہوجا کیں تو یہ دوا مفید بنائی جاتی ہے لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ یہ دوا بھی بھی ایسے مریضوں کونہیں دینی چاہئے جوطوفان آنے کے آثار اور اس کی آمدسے قبل ہی نزلہ، زکام کا شکار ہو چکے ہوں۔وہ ڈاکٹر جنہوں نے اسے استعال کیا ہے ایسی صورت میں وہ اسے خطرنا ک بتاتے ہیں۔

اگر موسم کی تبدیلی سے جسم میں درد شروع ہوجائے، تمام جسم کانپے، بہت کمزوری اور تھکن محسوں ہو، مریض بے خوابی کا شکار ہوجائے، بخار ہواور بہت پسینہ آئے تو الیکٹر لیسی ٹاس مفید دوا تبائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بیددوا مرکزی کے بدائر کو بھی زائل کرتی ہے۔

یہان نوا بجا د دواؤں میں سے ہے جن کوبعض ہومیو پیتے بہت اہمیت دیتے ہیں مگر ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ان علامتوں میں جو دوسری ہومیو پیتھی دوائیں بیسیوں سال سے زیر تجربہ ہیں ،ان کوزیا دہ تر استعال کر کے ان پر عبور بڑھانا چاہئے لیکن اگر کوئی نئے تجارب سے بھی فائدہ اٹھانا چاہے تو ان کے علم کی خاطرا سے بھی درج کر دیا گیا ہے۔اگر اچھے اور قابل اعتماد ڈ اکٹر جو ہومیو پیتھک اورایلو پیتھک دونوں کا تجربہ رکھتے ہوں ، ایسی

دواؤں پر کامیاب تجربوں کے بعد پورے دنوق کے ساتھ اپنے تجارب مرکزی ہومیو پیتھک بورڈ کوبھی بھجواتے رہا کریں تو ہوسکتا ہے کہ دوسروں کے فائدے کا موجب بنے۔ بہت سے عطائی نوآ موزڈاکٹر ایسی دواؤں کے متعلق بڑے بڑے بلند بانگ دعاوی کرتے رہتے ہیں اور مجھے بھی خط لکھتے رہتے ہیں مگر بسااوقات بیان کی خوش فہیاں ہوتی ہیں اور میں بھی بھی پورے اعتماد کے ساتھ ان کی رپورٹوں کو قبول نہیں کرسکتا۔

طاقت: 200يا على استعال كياجاتا ہے۔

93 الیکٹری سٹی ELECTRICITY

یہ دوابھی برقی شعاعوں سے تیار کی جاتی ہے مگراس کی اورالیکٹر لیسی ٹاس کی تیاری کے طریق میں فرق ہے اس لئے اثر میں بھی فرق بتایا جاتا ہے۔ اسے دل کی دھڑکن تیز ہونے اور بازووُل کے فالح میں مفید بتایا جاتا ہے۔ یہ عموماً ایسے مریضوں کو دی جاتی ہے جو پلسٹیلا کی طرح ممگین رہتے ہوں اور رونے اور آئیں بھرنے کا رجحان رکھتے ہوں۔ خوفز دہ ہوں اور اداس رہتے ہوں۔ طوفان کی آمد پر ڈر جاتے ہوں اور ان کی تکلیفوں میں اضافہ ہوجاتا ہو۔ یا گلول کی طرح بے اختیار ہنسی جو رکنے کا نام نہ لے وہ بھی اس کی ایک علامت بتائی جاتی ہے۔ اس طرح رات کو نظر کا کمز ور ہونا ، سوتے ہوئے بستر میں بینی اب کا خطا ہونا اور دے کا عارضہ مبینہ طور پراس کے دائرہ کا رمیں آتے ہیں۔ اس دوائے تعلق میں الیکٹر یسی ٹاس کا بھی بغور مطالعہ کر لیں۔ پراس کے دائرہ کا رمیں آتے ہیں۔ اس دوائے تعلق میں الیکٹر یسی ٹاس کا بھی بغور مطالعہ کر لیں۔

طاقت: 30سے 200

94

بوپیٹوریم م

EUPATORIUM PERFOLIATUM (Thorough Wort)

اسے عرف عام میں المجازی ہڑی جوڑ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہڈیوں کی دھن کی بہترین دوائیوں میں لمجازی ہے استعال ہورہی ہے۔ امریکہ کی مشرقی ریاستوں میں اسے گھر کی بہترین دوائیوں میں لمجاز ہونا ہو غیرہ میں گھریلو چائے کے طور پر استعال کرتی رہی ہیں۔ انفلوئنز المیریا اور وہ بخار جس میں جسم کی سب ہڈیوں میں شخت دکھن کا حساس ہو،ان میں یہ بہت مفید ہے۔ نیز ایک چھوٹا سا مجھر کی قتم کا کیڑا جسے کتری کہا جاتا ہے اور عموماً خشک میں یہ بہت مفید ہے۔ اس کے کاشنے سے جو بخار ہواسے ڈیگو فیور (Dango Fever) یا کہاڑی علاقوں میں ماتا ہے۔ اس کے کاشنے سے جو بخار ہواسے ڈیگو فیور (ہوتا ہے جونا قابل بیان کی دوا ہے۔ اس کی خاص علامت یہ ہے کہ ہڈیوں اور کم میں شخت درد ہوتا ہے جونا قابل بیان اور نا قابل بر داشت ہوتا ہے۔ یو پٹیوریم اس بخار کی تکلیف میں بہت کی پیدا کر دیتا ہے مگر کممل شفا اور نا قابل بر داشت ہوتا ہے۔ یو پٹیوریم اس بخار کی تکلیف میں بہت کی پیدا کر دیتا ہے مگر کممل شفا نہونے کی صورت میں ابنا سات دن کا چکر پورا کر کے رہتا ہے۔ اس کے بعد شفا ہونے کی صورت میں بہت کا اندرونی دفاع اس کے خلاف کممل طور پر بیدار ہو چکا ہوتا ہے اور شفا ہونے کی صورت میں بہت کی ڈیگو فیونہیں ہوتا۔

یے دوا انفلوئنز اس کی بہترین دواؤں میں شار کی جاتی ہے اور عام نزلہ زکام میں بھی مفید ہوتی ہے۔خصوصا سر دیوں کے موسم میں ہونے والانزلہ جس کے ساتھ جسم کی در دیں بھی نمایاں ہوں اور نزلہ کے آغاز میں سر در دبھی ضرور ہوتو یو پٹیور یم ضرور استعال کرنا جا ہے

کیونکہ یہ مریض کو مزید پیچیدگیوں سے بچاتا ہے۔ یو پٹیوریم میں ہڑیوں کے درد کے ساتھ سردی کا احساس ضرور پایا جاتا ہے۔ یہ علامت ملیریا کی بھی نشاندہی کرتی ہے اس لئے یو پٹیوریم ملیریا کی بھی نشاندہی کرتی ہے اس لئے یو پٹیوریم ملیریا کی بھی ایک مفید دوا ہے۔ اس کی سردی ضبح چھ بجے سے لے کرنو بجے تک زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ یو پٹیوریم کی علامتیں سورج چڑھنے کے ساتھ ہی شروع ہوجاتی ہیں جبکہ نیٹر م میور کی علامتیں اشراق کے وقت صبح نو بجے کے بعد بڑھتی ہیں۔

اگروہائی صورت میں ملیر یا ظاہر ہواور یو پٹیور یم چندمریضوں کے لئے فا کدہ مند ثابت ہوتواس وہا کے اکثر مریضوں میں یو پٹیور یم ہی کام آئے گی۔سب سے پہلے تواس میں شدید پیاس ملتی ہے۔سردیوں میں بھی ٹھنڈا پانی پینے کودل چاہتا ہے جس سے جسم پرلرزہ طاری ہوجاتا ہے۔لیکن پیاس محتے میں نہیں آئی۔مریض اپنے آپ کوخوب لییٹ کرر کھتا ہے۔ جب سردی ختم ہو اور بخار چڑھ جائے توقے شروع ہوجاتی ہے اور کھلا پسینہ بھی آتا ہے لیکن اس پسینہ سے بخار ہڑھ خائجیں اثر تا۔قے میں صفراء بہت آتا ہے۔شروع میں جتنی زیادہ سردی گئی ہے بخار چڑھنے کے بعداتی اثر تا۔قے میں صفراء بہت آتا ہے۔ شروع میں جتنی زیادہ سردی گئی ہے بخار چڑھ نے کے بعداتی میں گری اور حدت کا احساس ہوتا ہے۔اگر درجہ حرارت 103 ہوتو مریض 106 درجہ حرارت محسول کرتا ہے یعنی گری اور سردی دونوں کے احساس کی شدت یکساں ہوتی ہے۔ بخار جب پوری طرح جڑھ جائے تو پسینہ آتا ہے جس کے ساتھ بخار ٹوٹے تا ہے جس کے ساتھ بخار ٹوٹے تو اس وقت پھر پسینہ آتا ہے جس کے ساتھ بخار ٹوٹے تو بخار کے بیاد شور نے دو الے سردرد کو بھی آرام آیا کرتا ہے۔ یہ طرفہ تماشہ یو پیٹور یم میں ہی ملے گا کہ بخار تو طرف دوران ہونے والے سردرد کو بھی آرام آیا کرتا ہے۔ یہ طرفہ تماشہ یو پیٹور یم میں ہی ملے گا کہ بخار توٹے دوران ہونے والے سردرد کو بھی آرام آیا کرتا ہے۔ یہ طرفہ تماشہ یو پیٹور یم میں ہی ملے گا کہ بخار توٹے دوران ہونے والے سردرد کو بھی آرام آیا کرتا ہے۔ یہ طرفہ تماشہ یو پیٹور یم میں ہی ملے گا کہ بخار توٹے دوران ہونے دالے سردرد کو بھی آرام آیا کرتا ہے۔ یہ طرفہ تماشہ یو پیٹور کی میں ہی ملے گا کہ بخار توٹے دوران ہونے دالے سردرد کو بھی آرام آیا کرتا ہے۔ یہ طرفہ تماشہ یو پیٹور کی میں ہی ملے گا کہ بخار توٹے دوران ہونے دالے سردرد کو بھی آرام آیا کرتا ہے۔ یہ میں ہی ملے گا کہ بخار

معالجین کو ہار ہاملیریا کے ذکر میں یہ تنبیہ کی جاچکی ہے اور اب پھراسے دہرایا جاتا ہے کہ خصوصاً ملیریا میں چڑھتے بخار میں اس وقت تک دوانہیں دینی چاہئے جب تک بخار تو ٹنا نہ شروع ہوجائے۔ دوا دینے کا سب سے اچھا وقت تو وہ ہوتا ہے جب ملیریا بخار کے دوحملوں کے درمیان وقفہ پڑتا ہے۔ اس وقت اگر صحیح دوا دی گئی ہوتویا تو بخار کا اگلا

دورہ شروع ہی نہیں ہوگایا پہلے دورے سے کم شدید ہوگا۔ دوتین دن ایسا ہوتا رہے گا اور ہرآنے والا بخاریہلے سے کم ہوگا یہاں تک کہ مریض کوکمل شفا ہوجائے۔

بائی کے در دوں (Rheumatism) میں بھی یو پٹیوریم کا میابی سے استعال ہوتی ہے۔ یو پٹیوریم کے مریضوں کے جوڑوں پر گانھیں انجر آتی ہیں اور سب اعصاب میں بھی در دہوتا ہے۔ نقرس (Gout) کا در د زیادہ تر پاؤں کے انگوشے میں ملتا ہے۔ بائی کے مریضوں کو اکثر سردر در ہتا ہے۔ متلی ہوتی ہے اور ضبح کے وقت چکر آتے ہیں جبکہ شام کو کم ہوجاتے ہیں۔

یو پٹیوریم کے مریض کی آنکھ کے ڈیلوں میں بھی درد ہوتا ہے۔آنکھوں کے درد میں جسسیمیم اور برائیونیا، یو پٹیوریم کی مددگار دوائیں ہیں۔اسہال آئیں تو بہت کھے،سبزی مائل اور پانی کی طرح ہوتے ہیں،مروڑ بھی اٹھتے ہیں۔بعض دفعہ تھوڑ نے تھوڑ سے اسہال آنے کے بعد کیدم بہت کھل کرآتے ہیں جس سے بہت کمزوری واقع ہوجاتی ہے اوراس کے معاً بعد کچھ بھن ہو جاتی ہے جو کئی دن تک مسلسل چلتی ہے۔

یو پٹیوریم میں کھانسی بہت نکلیف دہ ہوتی ہے۔ سینے میں در دہوتا ہے۔ سارے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ سردی سے زود حسی پائی جاتی ہے چونکہ بینزلہ کی دوا ہے اس کئے چھیچھ ول ریکھی اثر انداز ہوتی ہے۔

یو پٹیوریم کے مریضوں کی طبیعت میں اداسی پائی جاتی ہے۔ یو پٹیوریم کے مریض کے جسم پر درم بھی ہوجاتی ہے۔اگر ایسے درم انفلوئنز ایا ملیریا کے دوران پائے جائیں تو ذہن یو پٹیوریم کی طرف نتقل ہونا جاہئے۔

یویٹیوریم کی امراض اکیس دن کے بعد دوبارہ اپنا زور دکھاتی ہیں۔ بات چیت میں مصروف رہنے سے یویٹیوریم کے مریضوں کوافا قدمحسوں ہوتا ہے۔ یویٹیوریم معدہ، جگراور ہوا کی نالیوں کی اندرونی جھلیوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ عموماً مرطوب علاقوں میں پیدا ہونے والی بیار یوں میں مفید ہے گرسخت خشک موسم میں بھی اس کا عارضہ ملتا ہے جیسے ڈینگو بخار۔

یماریوں میں مفید ہے گرسخت خشک موسم میں بھی اس کا عارضہ ملتا ہے جیسے ڈینگو بخار۔
طاقت: 200 سے 200 سے

95

بوفريزيا

EUPHRASIA

(Eyebright)

الیفریزیا پودوں کی ایک جنس ہے جس میں سے ایک قسم کوعرف عام میں ایک جنس کے ایک قسم کوعرف عام میں استعمال ہونے والا پوفریزیا اسی قسم سے تعلق رکھتا ہے جبیہا کہ اس کے دوسر نے نام Eyebright سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ نزلے کی ان قسموں میں کام آتا ہے جن کا حملہ خصوصاً آتا کھ پرزیا دہ ہواور اس کے حملے سے آتک میں غیر معمولی طور پر سرخ ہوجا کیں۔

اورا سے مزمن اثرات کی دواؤں میں شامل نہیں کیا جاتا۔

نزلہ کی وہ کیفیات جو قتی طور پر جوش دکھا ئیں اور گزر جائیں ان میں یوفریزیا مفید ہوتی ہے بشرطیکہ نزلہ کااثر آئکھوں پر زور دکھائے۔ ہر وہ نزلہ جوآ غاز سے ہی آئکھوں پر حملہ کرے اور اس کا پانی آئکھوں میں جلن اور سرخی پیدا کر دے اس نزلہ میں یوفریزیا مفید ہے۔ دن بھر جب تک آئکھوں سے پانی بہتار ہتا ہے اور آئکھیں سرخ رہتی ہیں اس وقت تک کھانی نہیں ہوتی لیکن جب مریض رات کو بستر پر لیٹتا ہے تو آئکھوں سے بہنے والا پانی گلے میں اندر گرنے گتا ہے اور اس کی وجہ سے سانس کی نالی زخمی ہو جاتی ہے اور پھر کھانسی شروع ہوجاتی ہے۔ آغاز میں میکھانسی محمود رہتی ہے جاتی ہے اور کھانسی بھر وط ہوجاتی ہے۔ آغاز میں میکھانسی محمود در ہتی ہے جاتی ہی محدود رہتی ہے جاتی ہے ور کھانسی بھر وقی ہوتی ہے ہے۔ آغاز میں سے کھانسی بھر وط ہوجاتی ہیں اور کھانسی بھر وط ہوجاتی ہے۔ آغاز میں سے کھانسی محمود در ہتی ہے ہاتی ہی والا باتی کہی ہوتا ہے۔ آئکھوں میں کے میں در در کا حملہ بھی ہوتا ہے۔ آئکھوں میں ہوتی رہتی ہے۔ زلہ کے ساتھ سر در دکا حملہ بھی ہوتا ہے۔ آئکھوں میں سے اور دن کے وقت بھی ہوتی رہتی ہے۔ زلہ کے ساتھ سر در دکا حملہ بھی ہوتا ہے۔ آئکھوں میں

دباؤ کا احساس ہوتا ہے جیسے کسی نے پٹی سے کس کر باندھ دیا ہو۔ آئکھ کے کورنیا کے پردے میں زخم اور پھنسیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ چونکہ آئکھ سے جلن پیدا کرنے والا تیزانی مادہ بہتا ہے اس کے نتیجہ میں جو بدا ثرات باقی رہ جاتے ہیں وہ کافی عرصہ تک آئکھوں کو متاثر رکھتے ہیں اوران سے نظر دھندلا جاتی ہے۔

یوفریزیا کی ایک خاص علامت بیہ ہے کہ آئکھ سے تعلق رکھنے والے اعصاب پر فالح کا حملہ بھی ہو جاتا ہے۔ پس اگر چہ بیرایک حاد (Acute) دوا ہے مگر اس سے پیدا ہونے والی بیہ تکلیف مزمن (Chronic) بھی ہوسکتی ہے۔اس کا فالج Third Nerve کومتا ترکرتا ہے۔ یوفریزیا کو جرمن خسرہ (German Measles) کے علاج میں ایک امتیازی مقام حاصل ہے۔ عام خسرہ میں تو اکثر پلسٹیلا استعال ہوتی ہے لیکن جرمن میزلز میں یوفریزیا ایک لازمی دواہے۔اس میں بیاری کا آغاز آئھوں پر بیاری کے حملہ سے ہوتا ہے اور آئکھیں بہت سرخ ہوجاتی ہیں۔ یہ بیاری ویسے تو خطرنا کنہیں لیکن حاملہ عورتوں اور ہونے والے بچوں کے لئے بعض دفعہ انتہائی خطرناک ثابت ہوسکتی ہے کیونکہ اگر پہلے تین مہینوں میں اس بیاری کاحملہ ہو جائے تو جنین کے اعضاء کی نشو ونما جہاں تک پینچی ہواسی مقام پر رک جاتی ہے اور بچہ بڑھتا نہیں ہے۔اس بیاری کی وبا کے دنوں میں حاملہ عور توں کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہئے کیونکہ یہ بہت خطرنا ک بیاری ہے۔ابتدائی تین مہینوں میں اگریہ بیاری ہوتویا تو بچوں کی آئکھیں ہی نہیں بنتیں یا دل کے بعض حصے خام رہ جاتے ہیں۔اسی طرح شنوائی پربھی گہرااثر پڑتا ہےاور بعض دفعہ بالکل اندھے اور بالکل بہرے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ بسااوقات ایسے بچے چندمہینے کے اندر ہی مرجاتے ہیں اور اسے رحمت شار کرنا جا ہے ورنہ جو بچے نی جائیں وہ ماں باپ کے لئے عمر بھر کا روگ بن جاتے ہیں۔مزید احتیاط کا تقاضا ہے کہ اگر حاملہ عورت کو ابتدائی تین مہینوں میں خسرہ ہوجائے تواسے ضرورا چھے کلینک میں داخل کروا کریتی کی کیا ہے کہ کہیں یہ جرمن میزلز (German Measles) تو نہیں تھی جس کا اثر جنین یر بڑا ہو۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر مشورہ دیں گے کہ زچہ اور بچہ دونوں کا مفاد تقاضا کرتا ہے کہ ایساحمل ضرور گرا دیاجائے۔

یوفریزیامیں روشنی سے زود حسی یائی جاتی ہے۔خسرے میں بھی بیاس کی خاص پہیان بن جاتی ہے۔ یوفریزیا کی تکلیفیں شام کے وقت اور گرمی سے اور روشنی سے بڑھ جاتی ہیں۔

دافع اثر دوائيں: کیمفر پلسٹیلا۔ کاسٹیکم 30

96 فيرم فيرم

FERRUM METALLICUM (لوبا)

ہومیو پیچے معالجین نے یہ تجربہ کیا ہے کہ اگر کسی کو زیادہ مقدار میں فولاد (آئرن) دیا جائے تو مریض کارنگ پیلایا سبزی مائل ہوجا تا ہے اوراس پرالیسی چکنا ہٹ نظر آتی ہے جیسے اس پر موم رگڑ دی گئی ہو۔ سارے جسم پریہی کیفیت ہوتی ہے۔خون بہنے کار جحان ہوتا ہے جس میں پتلا اور پانی ملا ہوا کچلہوا ساخون بہتا ہے۔خون کے لوٹھڑ ہے بھی بنتے ہیں۔ اس کے خون کے لوٹھڑ ہے سرخی مائل ہی ہوتے ہیں اگر چہ اکثر زہر جوخون جماتے ہیں ان کے لوٹھڑ ہے سیاہی مائل ہوتے ہیں۔ ان علامتوں کے علاج بالمثل کے لئے جو ہومیو پیچھک دوا بنائی جاتی ہے اسے فیرم میٹیلیکم کہد دیا جا تا ہے۔

فیرم میٹ کی ایک علامت ہے ہے جہ جسم کے تمام اعضاء کمزوری کا شکار ہوجاتے ہیں۔

یہ کوئی الیسی کمزوری نہیں ہوتی جودائی ہواور ہر وقت محسوس ہو بلکہ تھوڑ ہے کام سے جلدتھ کا وٹ ہو
جاتی ہے۔ایسڈ فاس میں ہر وقت جسم نڈھال رہتا ہے لیکن فیرم میٹ میں تھوڑ ہے سے کام سے
ایک دم طاقت ختم ہوجاتی ہے جیسے ٹارج میں پراناسیل ہوتو وہ ایک شعلہ دکھا کر یکدم بجھ جاتا
ہے۔مریض جب تک حرکت نہ کرے اسے اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہوتا۔خواہ مریض آ ہستہ
ہی چلے ، پچھ دہر چلتے رہنے سے کمزوری ضرور محسوس ہوتی ہے لیکن اگر مریض بغیر حرکت کے لیٹا
یا جیٹھار ہے تو اس سے بھی اس کو تکلیف پہنچتی ہے کیونکہ سلسل حرکت نہ کرنے سے جسم کی خوابیدہ
دردیں جاگ اٹھتی ہیں۔اگر مریض پچھ دہریتیز چلے تو دونوں تکلیفیں بیک وقت ظاہر ہوتی ہیں۔

کمزوری بھی نمایاں ہوجاتی ہے اور در دیں بھی محض حرکت سے ہی نہیں پچھ دیر مسلسل ہولئے سے بھی کمزوری کا احساس ہونے لگتا ہے۔

باوجوداس کے کہ مریض میں خون کی نمایاں کی پائی جاتی ہے گر چہرے پر معمولی جذباتی بیجان سے بھی خون کی چے دکھائی دیتے جس کوہومیو بیتے فالس پلیتھورا (Fale Plethora) بعنی خون کا جعلی عکس کہتے ہیں۔ مریض کے دونوں کلے تمتمانے لگتے ہیں اور عور توں میں خصوصاً بیتی خون کا جعلی عکس کہتے ہیں۔ مریض کے دونوں کلے تمتماہٹ سے ملتی ہے۔ چیض بعض دفعہ بہت بیت متماہٹ اچا نک شرما جانے سے بیدا ہونے والی تمتماہٹ سے ملتی ہے۔ چیض بیس پورا لمبے چلتے ہیں صرف ایک دودن تھوڑ اسار کے اور پھر جاری ہو گئے لیکن اس قتم کے چیض میں پورا خون نہیں نکلتا بلکہ پھیکا پر چیکا پر کی خون جاری رہتا ہے اور بعض دفعہ رحم کی جھلی کے پچھ گئڑ ہے بھی کٹ کٹ کرچیض کے ساتھ باہر نکلتے ہیں۔ لیکن عجیب بات سے ہے کہ چہرے پر وہی پرخون ہونے کی حجہ سے موجانے کی وجہ پرخون ہونے کی حجہ اس ہوجانے کی وجہ پرخون ہونے کی حجو ٹی علامتیں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح اندام نہائی سے رحم کے اندرونی حصول کی بھر کا بچھ باہر نکل آنا بھی بعیر نہیں۔

فیرم میٹ کی چا ئناسے اس پہلوسے مشابہت ہے کہ بیسرخ ذرات کو کم کرتی ہے۔جودوا بھی خون کے سرخ ذرات کو کم کرتی ہے۔جودوا بھی خون کے سرخ ذرات کو کم کرے اس کی چا ئناسے مشابہت ضرور ہوگی۔ چہرہ بغیرخون کے دباؤ کے تمتما جاتا ہے اور چہرہ پر باری باری سرخی اور زردی آتی ہے۔ اسی طرح بخار چڑھتے ہوئے سردی کا احساس بھی نمایاں طور پریایا جاتا ہے۔

معدے کی علامتوں میں بعض دفعہ جوع البقر ہے طرح نہ مٹنے والی بھوک ملتی ہے اور بعض دفعہ بھوک کا کلیٹا فقدان ۔ کھٹی چیزوں سے شخت نفرت ۔ کھٹی چیزیں کھانے کی کوشش کریں تو اسہال لگ جائیں گے ۔ کھانے کے تھوڑی دیر بعد بغیر کسی مثلی کے غیر ہضم شدہ کھانے کا کچھ حصہ ابکا ئیوں کے ساتھ منہ کی طرف آتا رہتا ہے اور بعض دفعہ باقاعدہ مثلی کے ساتھ قے بھی ہوتی ہے ۔ ایسی قے بعض دفعہ کھانا کھاتے ہی آجاتی ہے اور بعض دفعہ آدھی رات کے بعد آتی ہے۔ یہ عموماً ہوا سے تن جاتا ہے۔ انڈا کھانا پہند بھی ہو

فيرم ميك

تو ہرگز موافق نہیں آتا۔ رات کے وقت اکثر غیر ہضم شدہ غذا کی اجابت ہوتی ہے کین اگر دن کو الیں اجابت ہوتی ہے لیکن اگر دن کو الیں اجابت ہوتو کھانے کے جلدی بعد ہوگی مگر ساتھ در دنہیں ہوتا۔ بعض دفعہ اجابت سخت بھی ہوتی ہے اور الیں صورت میں کمراور مقعد میں تشنجی در دیائے جاتے ہیں اور مقعد کے کچھ باہر نکل آنے کا رجحان بھی ملتا ہے۔ بعض مریضوں میں بے اختیار پیشاب خطا ہونے کا رجحان پایا جاتا ہے جودن کے وقت زیادہ ہوتا ہے۔

پھیپھڑوں کی علامت میں چھاتی پر دباؤ اور سانس لینے میں مشکل محسوں ہوتی ہے۔ آواز بیٹھ جاتی ہے کھانسی خشک اور دورہ دار اور بعض دفعہ ساتھ سرخ خون کا اخراج۔ کندھوں میں وجع المفاصل کی دردیں اور کمر درد، اسی طرح کو لہے میں یا پنڈلی میں یا پاؤں کے تلووں میں درد ملتے ہیں۔ان سب کوہلکی حرکت سے پچھآ رام آتا ہے۔

> مددگاردوائیں: چائنا۔الیومن۔ہمامیلس دافع اثر دوائیں: آرسنک۔ہیپرسلف طاقت: 30سے 200 تک

فيرم فاس

97

فيرم فاس

FERRUM PHOSPORICUM

(Phosphate of Iron)

فاسفورس اور لوہے کے مرکب کو فیرم فاس کہتے ہیں۔خون کے سرخ ذرات میں فیرم فاس ایک طبعی جزو کے طور پرشامل ہوتا ہے۔اگر فیرم فاس کی کمی ہوتو عموماً کہاجا تا ہے کہ خون میں لوہے کی مقدار کم ہوگئی ہے۔یہ سرخ خون کی کمی کے لئے بہترین دواہے۔

فیرم فاس کے مریض کو کھی ہوا تکلیف دیتی ہے۔اس لحاظ سے اس کا مزاج ٹھنڈا ہے گر
فاسفورس کے عضر کی شمولیت کی وجہ سے اس کی پچھ علامتیں فاسفورس سے بھی ملتی ہیں۔ مریض
کے ذہن میں کوئی معین خوف تو نہیں ہوتا مگر و بسے ہی دل بے چین اور بیز ارر ہتا ہے اور عموی طور پر
پریشانی ذہن پر فبضہ کئے رکھتی ہے۔ کمزوری بہت ہوتی ہے۔ ہومیو پیتھک پڑینسی میں فیرم فاس
خون کی کمی اور کمزوری کو دور کرنے کی بہترین دواؤں میں سے ہے۔سردی لگنے سے زلاتی
تکلیفیں ہوں تو چہرہ تمتما اٹھتا ہے اور بخار کی طرح تمازت محسوس ہوتی ہے۔ عموماً گوشت اور دودھ
ناپیند ہوتے ہیں اور ایسی چیزیں کھانے کو دل چاہتا ہے جن سے مصنوعی طور پر بھوک چیکے۔ ایسے
مریض کو عموماً کھٹے ڈکار آتے ہیں۔ مقعد میں بواسیری مسے ملتے ہیں اور اجابت بعض دفعہ خون
مریض کو عموماً کھٹے ڈکار آتے ہیں۔ مقعد میں بواسیری مسے ملتے ہیں اور اجابت بعض دفعہ خون
مریض کو عموماً کو لئی والی ہوتی ہے۔اگر پچیش ہوتو خون بہت نکلتا ہے۔کھانسی ہوتو کھانسی کے ساتھ
طے ہوئے یانی والی ہوتی ہے۔اگر پچیش ہوتو خون بہت نکلتا ہے۔کھانسی ہوتو کھانسی کے ساتھ طرہ قطرہ قبیثا ہے بھی نکلتا رہتا ہے۔

فاسفورس کے مرکبات ان مریضوں میں مفید ثابت ہوتے ہیں جن کا خون بتلا ہواور

بہت جلد بہنے کا رجحان رکھتا ہو۔ ہیموفیلیا (Haemophilia) کے مریضوں میں بھی بیتیوں مفید ہیں بعنی فاسفورس، ایسٹر فاس اور فیرم فاس۔ فاسفورس ہومیو پیتھک دوا کی شکل میں خون کو گا ٹر معاکر نے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن اگر بیخون کو بہت گاڑھا کر دیو مضرنتا نئے بھی ظاہر ہو سکتے ہیں اور دل کے حملہ کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اس لئے فاسفورس کو لمبے عرصہ تک آئمیں بند کر کے استعمال کرتے رہنا مناسب نہیں۔ فاسفورس، ایسٹر فاس اور فیرم فاس استعمال کرنے والوں کا دوتین ماہ کے بعد خون کا ٹمیسٹ ہونا چاہئے ۔خون صرف اس حد تک گاڑھا ہونا چاہئے جو جو بیان خون کے رجحان کوختم کر دے ،اس کے بعد ان دواؤں کا استعمال روک دینا چاہئے ۔ دوبارہ خون بینا ہونے کار بچان ہوتو بھر شروع کرواد س۔

فیرم فاس کے مریضوں کے عضلات بعض دفعہ بوجھ اٹھانے کی کوشش سے کھنچے جاتے ہیں اور ایسے مریضوں کو پھر تھوڑ اسا بوجھ اٹھانے سے بھی ان عضلات میں ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے۔ ملی فولیم میں بھی بیر بحان پایا جاتا ہے۔ بید دونوں دوا ئیں جریان خون کی بھی بہترین دوا ئیں ہریان خون کی بھی بہترین دوا ئیں ہیں۔ جن مریضوں میں خون کی کمی ہوان میں جلد غصہ آنے کا رجحان بھی پایا جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کا پسینہ پھوٹ پڑتا ہے اور ساراجسم کا پنے لگتا ہے اور ان کا سارا غصہ اپنی ذات پر ہی ٹوٹن ہوجا تا ہے، بھی خوش ہوتا ہے اور بھی ہزیان بکتا ہے۔ یہ فیرم فاس کی علامت ہے جو فاسفورس اور آئرن کے ملنے سے بیدا ہوتی ہے۔

فیرم فاس کامریض تنہار ہنا پیند کرتا ہے، دوسر بےلوگوں کی موجودگی میں گھبرا تا ہے۔ شور بھی اس کے لئے نا قابل برداشت ہوتا ہے۔ بھی بھی جوش میں آ کر بہت بولتا ہے لیکن بیاس کا دائمی مزاج نہیں ہے۔ فیرم فاس کے مریض عموماً کم بولنے والے اور تنہائی پیند ہوتے ہیں۔ سر در د میں مھنڈی ہوا سے فائدہ ہوتا ہے۔ سیر هیاں چڑ ھنے سے سر در د شدت اختیار کر جاتا ہے اور بعض دفعہ نظر آ نا بھی بند ہوجاتا ہے۔ دراصل یہ بھی خون کی کمی

انیمیا (Anaemia) کی نشانی ہے۔خون کی تھی ہوتو ایک دم اٹھنے سے اور سیڑھیاں چڑھنے سے خون نیجی کی طرف آتا ہے اور سرکو پوری طرح خون نہیں پہنچا۔ اگر سرمیں در دہوتو اس صورت میں اس میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ آئکھوں کے اوپر، گدی میں، کنیٹیوں پر اور آدھے سرمیں پھاڑنے والے در دہوتے ہیں، نظر بھی (عارضی طور پر) غائب ہوجاتی ہے۔ پرخون دواؤں کی فہرست میں حلسیمیم میں بھی یہ علامت ملتی ہے کہ سر در دکے دورے کے ساتھ اچا تک نظر غائب ہوجاتی ہے۔خون کا دباؤزیا دہ ہوجائے تو بیلا ڈونا میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے گرفیرم فاس میں خون کی کی کی وجہ سے اور سرمیں خون نہ پہنچنے کے نتیجہ میں وہی اثر ظاہر ہوتا ہے جو پرخون دواؤں میں خون کون کا دباؤ برط حالے ہے ہوتا ہے اور نظر غائب ہوجاتی ہے۔

فیرم فاس میں کان کی نالیوں کا نزلہ ہوتا ہے اور نزلاتی اخراجات میں خون کی آئر میرش بھی ملتی ہے کیونکہ اس دوا میں جریان خون کا رجحان ہوتا ہے۔ بچوں میں عموماً نکسیر کا عارضہ ملتا ہے۔

فیرم فاس کے مریضوں کے منہ کی جھلیوں اور مسور وں سے اگرخون بہے تو اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور یہی بات ملی فولیم میں بھی پائی جاتی ہے۔ گلے کے غدود پھول جاتے ہیں، خراش، خون بہنا، جلن، سوزش اور نگلنے میں دفت فیرم فاس کی علامتیں ہیں، یہ علامتیں بہت سی دواؤں میں نمایاں ہیں۔ محض ان کی وجہ سے فیرم فاس کو پہچاننا مشکل ہے۔ مریض برعمومی نظر ڈال کر اندازہ ہوسکتا ہے کہ فیرم فاس کا مریض ہے یا نہیں۔ اس میں خون کی کی کا نشان اس کی پہچان میں مددد سے ساتا ہے کہ فیرم فاس کا مریض ہے یا نہیں۔ اس میں خون کی کی کا نشان اس کی پہچان میں مددد سے ساتا ہے گر پرخون لوگوں میں بھی فیرم فاس کئی عوارض میں کا م آتی ہے۔

فیرم فاس حمل کے دوران عورتوں کوٹا نک کے طور پراستعال کروانی چاہئے۔
اس غرض کے لئے فیرم فاس، کلکیریا فاس اور کالی فاس کا مرکب بہت مفید ہے۔ شروع کے مہینوں میں دینے سے حمل ضائع ہونے کا رجحان رک جاتا ہے اور آخری دوتین مہینوں میں بچہ کی نشوونما کے لئے بہت مفید ہے۔ اسے مسلسل استعال نہیں کرنا چاہئے، پچھ

عرصہ کھلانے کے بعد وقفہ ڈال کر دوبارہ شروع کرانا چاہئے۔ اس طریق سے کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ فاکدہ ہی پہنچتا ہے۔ فیرم فاس میں بھوک بھی کم ہو جاتی ہے اور بھی بے حد زیادہ جومٹی ہی نہیں۔ یہ دونوں انہا ئیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ یا حد سے زیادہ بھوک یا بھوک کا فقد ان۔ اس کے علاوہ وہ چیزیں جو نقصان پہنچاتی ہیں ان کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے اور جو چیزیں موافق آتی ہیں۔ ان کی خواہش مٹ جاتی ہے۔ گوشت وغیرہ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں بیں۔ ان کی خواہش مٹ جاتی ہے۔ گوشت وغیرہ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں ہوتی ہے۔ گوا نے کے بعد متلی ہوتی ہے متلی اگر حمل کے زمانے میں ہوتو فیرم فاس دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد متلی ہوتی ہے متلی اگر حمل کے زمانے میں ہوتو سے شاذ کے طور پر ہی فائدہ ہوتا ہے۔ متلی کی اور بہت سی دوائیں ہیں جوخصوصیت سے حمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان سب پرعبور ہونا چاہئے۔ متلی میں اب تک جتنی دوائیں استعال کی گئی ہیں ان میں ایک بی دوائیں استعال کی گئی ہیں ان میں ایک بی دوائیں گئی ہے۔ یہ کوں کی میں ایک بی دوائیں میں ایک بی جوں کی میں ایک بی دورکر نے میں مفید نابت ہوئی ہے۔ یہ کوں کی سے بین گئی ہے۔ یہ کو کی ہوتا ہے۔ یہ کی میں ایک بی دوائیں ہوئی ہے۔ یہ کا کہ ہوتا ہے۔ یہ کی ہوتا ہے۔ یہ کی ہوتا ہے۔ یہ کی ہوتا ہے۔ یہ کہ کی ہوتا ہے۔ یہ کہ کی ہوتا ہے۔ یہ کہ کی ہوتا ہے۔ یہ کہ کی ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ یہ کی ہوتا ہے۔ یہ ہوتا

حمل کی متلی کے بارے میں میرایہ نظریہ ہے کہ یہ بعض دفعہ الرجی سے پیدا ہوتی ہے۔
بعض عورتوں کو بچے سے الرجی ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں متلی بہت شخت اور لمبا چلتی ہے۔ امریکہ
میں بھی یہ تحقیق ہوئی ہے کہ جن عورتوں کا حمل گر جاتا ہے یا حمل گھہرتا ہی نہیں ان میں سے چالیس
میں بھی یہ تحقیق ہوئی ہے کہ جن عورتوں کا حمل گر جاتا ہے یا حمل کھہرتا ہی نہیں ان میں سے چالیس
فیصد عورتیں الیسی ہیں جن میں اپنے بچے کے خلاف ایک قسم کی الرجی ہوجاتی ہے جس کے نتیجہ میں
جسم کی دفاعی طاقتیں جنین (Embryo) پر حملہ کر دیتی ہیں۔ مزید خقیق سے یہ حقیقت منکشف
ہوئی کہ دراصل ہرعورت کوخود اپنے ہی حمل کے خلاف الرجی ہوتی ہے اور جسم کی دفاعی طاقتیں
حرکت میں آ کر رحم پر حملہ آ ور ہوجاتی ہیں۔ لیکن جنین کے اردگر دتین قسم کے خول سے ہوئے
ہیں یعنی پلیسٹا، رحم کی اپنی دیوار اور اس دیوار کے باہر کی جملی ۔ ان کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ
جسم کے اندر موجود دفاعی طاقت کے حملے کورو کئے کے لئے بذات خود ایک دفاعی طاقت رکھے
ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کسی بھی جنین کا قرار پکڑنا ناممکن ہو جاتا۔ غالبًا بہی وجہ ہے

کہ جنین کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اسے ہم نے قرار مکین میں رکھا ہے۔ نیز فرمایا ہے کہ اسے ہم نے قرار مکین میں رکھا ہے۔ اگر کسی وجہ سے جنین کے گردگی دفاعی طاقت اس پر حملہ آور طاقت سے کمزور ہوتوالیا حمل لازماً گرجائے گا۔

بعض اداروں کے سائنس دانوں نے کچھ ایسے ذرائع دریافت کئے ہیں جن سے
اندرونی اور بیرونی دفاعی توازن کودرست کیا جاسکتا ہے کین سردست بیعلاج بہت مہنگا ہے۔ تاہم
جن عورتوں کو بیعلاج کرانے کی توفق ملی ہے ان میں سے بھاری اکثریت کے بچے ہوگئے ہیں۔
یپلی (Pipli) کو چونکہ میں نے حمل کی متلی میں کافی مفید پایا ہے اس لئے اسے ایک
اور طرح بھی وسیع بیانے پر استعمال کرائے دیکھنا چاہئے۔ بعید نہیں کہ بیالرجی کی وجہ سے حمل
گرنے کے عارضہ کو بھی درست کر دے لیکن بیتو اس کتاب کو پڑھنے والے ساری دنیا میں بھیلے
ہوئے ہومیو پیتھ ڈاکٹر ہی تج نے کے بعد بتا سکتے ہیں۔

اس ضمن میں اس کو مختلف طاقتوں میں استعال کرے آ زمانا چاہئے۔ نیز بید کھنا بھی ضروری ہے کہ اگر بید دوااثر کرتی ہے تو کون سے مزاج والوں پر اثر کرتی ہے اور کون سے مزاج والوں پر نہیں کرتی۔ ہومیو پیتھس سے میری درخواست ہے کہ جو بھی اس کا تجربہ کریں۔ وہ اس کے نتائج سے احمد یہ سلم سنٹرل ہومیو بورڈ کو بھی حسب ذیل پیتہ پر مطلع فرما کیں۔

16-Gressen Hall Road London S.W.18. 5QL. U.K

فیرم فاس کی علامات جھونے ، جھٹکا لگنے ،حرکت کرنے سے شدت اختیار کرتی ہیں جبکہ ٹھنڈی ٹکورسے افاقہ ہوتا ہے۔

> طاقت: بائيوكيمك كى 3x تا 12x يا هوميو پيت كى 30اوراونچى طاقتيں

98

فلوريم ايسثر

FLUORICUM ACIDUM

(Hydrofluoric Acid)

فلورک ایسٹر ایس بیاریوں میں بہت مفید، وسیع الاثر اور گہرااثر کرنے والی دوا ہے جو
رفتہ رفتہ جزوبدن ہوچی ہوں اورجہم کی گہرائی میں چلی جا ئیں اور زندگی کا حصہ بن جا ئیں، مگریہ
آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ اثر کرتی ہے۔ آ بافا نا اور فوری اثر ات ظاہر نہیں کرتی فلورک ایسٹر ایک پہلو سے سلفر
سے مشابہ ہے اور ایک پہلو سے نیٹر م میور سے۔ بہت سے ایسے مریض ہیں جوسلفر اور نیٹر م میور
کے مریض سمجھے جاتے ہیں لیکن انہیں ان دونوں دواؤں سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ دراصل وہ
فلورک ایسٹر کے مریض ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ بہت دلچیپ دوا ہے۔ نیٹر م میور میں نا خنوں
کی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ ناخن بدنما، اکھڑے اکھڑے اور بہت تیزی سے بڑھتے ہیں۔
کی خرابیاں پائی جاتی ہیں اور ان کی نوکیس بھٹ کردو نیم ہوجاتی ہیں۔ اس طرح بال بے رونق، کم وراور
کی طرف دھیان جاتا ہے جبکہ ہاتھ پاؤں میں گرمی، جلن اور پیدنہ کی علامات سے عموماً نیٹر م میور
کی طرف دھیان جاتا ہے جبکہ ہاتھ پاؤں میں گرمی، جلن اور پیدنہ کی علامات سے عموماً نیٹر م میور
کی طرف دھیان جاتا ہے جبکہ ہاتھ پاؤں میں گرمی، جلن اور پیدنہ کی علامات سے عموماً نیٹر م میور
کی طرف دھیان جاتا ہے جبکہ ہاتھ پاؤں میں گرمی، جلن اور پیدنہ کی علامات سے سلفر کا خیال آ تا
کے بدوروں دواکونظرا نداز کردیں تو بہت گہرا انتصان پہنچتا ہے۔

ایسے مریض جن کی بیاریاں ہڑھتے ہڑھتے ایسی حالت کو پہنچے جائیں جہاں دوسری دوائیں کام نہ کریں وہاں لاز ماً بہت گہری دوائیں تلاش کرنی پڑتی ہے۔فلورک ایسٹر ان میں سے ایک ہے۔وہ تمام گہری بیاریاں جونسل درنسل انسانی صحت پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں مثلاً سفلس ،سوزاک اورکوڑھ۔اکثر ہومیو پیتھ معالجین نے ان تین بنیادی

بیار یوں میں تمام مریضوں کو قشیم کر دیا ہے۔فلورک ایسٹر میں ان نتیوں بنیا دی بیار یوں کی علامات پائی جاتی ہیں۔اسی طرح چھپھڑوں میں سلی مادے بھی نسل درنسل انسانی جسم میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔اس کا بیار یوں کی چوتھی قشم مجھ کرا لگ علاج ہونا جا ہے۔

فلورک ایسٹر میں سردی اور گرمی کی علامتیں ادلتی بدلتی رہتی ہیں۔ رات کے وقت بستر میں تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ تپش محسوں ہوتی ہے، نیتجاً مریض ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتا ہے۔
سلفر میں گرمی کے احساس کے با وجود مریض پانی سے متنفر ہوتا ہے کیکن فلورک ایسٹر والے مریض مسلفر میں گرمی کے احساس کے با وجود مریض پانی سے متنافر ہوتا ہے۔ پاؤں جلتے ہیں اور مریض بستر کو ٹھنڈ ایانی پسند ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے بیا گسٹیلا سے مشابہ ہے۔ پاؤں جلتے ہیں اور مریض بستر سے پاؤں باہر نکالتا ہے۔ ہاتھ پاؤں دونوں کپینے سے شرابور ہوجاتے ہیں۔ پسینہ میں جلن ہوتی ہے۔ انگیوں کے درمیان پسینہ آنے کی وجہ سے انگلیاں گل جاتی ہیں۔ اس میں فلورک ایسٹر بہت مفید دوا ہے۔

فلورک ایسڈ کی ایک علامت اسے نیٹرم میور اور سلفر سے متناز کر دیتی ہے یعنی فلورک ایسڈ کے مریض چائے اور کافی سے بہت جلدا ثر قبول کرتے ہیں اور یہ شروب ان کے مزاج کے موافق ثابت نہیں ہوتے۔ان سے نینداڑ جاتی ہے یا دوسری تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ نیٹرم میوراورسلفر میں یہ علامت نہیں ملتی۔

فاورک ایسڈ کے مریض کی جلد پر پھنسیاں بھی بن جاتی ہیں اور ٹھیک نہیں ہوتیں۔
بسااوقات چہرے پر پھوڑ انکلتا ہے جو پکتا نہیں ہے اور کمیے رصہ تک تکلیف دیتا ہے۔ عام حالات
میں ایسے پھوڑ وں میں سلیشیا مفید ثابت ہوتی ہے لیکن سلیشیا سب پھوڑ وں پراثر انداز نہیں ہوتی۔
ایسے پھوڑ وں میں اگر سلیشیا کے بعد فلورک ایسڈ دی جائے تو وہ زیادہ زوداثر ثابت ہوتی ہے۔ جس طرح پلسٹیلا کے بعد سلیشیا کام کرتی ہے اسی طرح اگر سلیشیا کے بعد پلسٹیلا کی بجائے فلورک ایسڈ دی جائے تو مریض میں ایک فیصلہ کن صورت حال ظاہر ہوجاتی ہے یعنی یا تو مریض شفایا جائے گایا ایسی واضح علامات ظاہر ہوجا کیس گی جوکسی ٹی دوا کے انتخاب میں مددگار ہوں گی۔
ایسی واضح علامات ظاہر ہوجا کیس گی جوکسی ٹی دوا کے انتخاب میں مددگار ہوں گی۔

اگر سلیشیا کا غلط استعمال ہو جائے تو فلورک ایسڈ اس کے بدا ٹرات کوزائل کر دیتا

ہےاوراس کے مثبت اثر ات پراٹر انداز نہیں ہوتا۔

فلورک ایسٹر میں بال بہت کمزور اور بے جان ہوجاتے ہیں اور کناروں سے پھٹ جاتے ہیں۔ نیٹرم میور میں تمام سر پراٹر پڑتا ہے کیکن فلورک ایسٹر میں سر پر کہیں کہیں بال کمزور ہوتے ہیں اور کہیں بالکل صحت مند نظر آتے ہیں یہ پہچان فلورک ایسٹر کو واضح طور پر دوسری ملتی جلتی دواؤں سے ممتاز کردیتی ہے۔ اس لئے ایسی باتوں پر نظر رکھنی چاہئے کیونکہ بعض دفعہ ایسی علامات کی وجہ سے ایک ایسی دوا کی قطعی شناخت ہوجاتی ہے جودوسری ملتی جلتی علامت میں دوا کے قطعی شناخت ہوجاتی ہے جودوسری ملتی جلتی علامت میں دوا کی قطعی شنان دہی کردے پھر باقی تمام بیاریوں کووہ خودہی سنجال لیتی ہے، کمی چوڑی تفتیش کی فطعی نشان دہی کردے پھر باقی تمام بیاریوں کووہ خودہی سنجال لیتی ہے، کمی چوڑی تفتیش کی ضرورت نہیں بڑتی۔

فلورک ایسڈ میں ایک علامت ایسی ہے جو غالباً کسی اور دوا میں نہیں ملتی یعنی اگر پیشاب کی حاجت محسوس ہواور مریض پیشاب روک لے تو سر میں در دہونے لگتا ہے۔ ایسے سر در دمیں گرمی اور پیش بھی محسوس ہوتی ہے اور پیشاب کرنے پر سر در دکوآ رام آجا تا ہے۔

فلورک ایسڈ ایسے لوگوں کے لئے بھی بہترین دواہے جو جنسی بےراہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل بے کاراور ناکارہ کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بدنظری سے باز نہیں آتے اور نظر بازی کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے فلورک ایسڈ، پکرک ایسڈ، لائیکو پوڈیم اور سیبیا اپنے اپنے مزاج کے مریضوں میں بہترین ثابت ہوتی ہیں۔ اگر مریض پلسٹیلا کا ہواور اس کا اثر رک جائے تو اس کے بعد سلیشیا یا فلورک ایسڈ کام آتے ہیں۔

فلورک ایسٹر نیلی رگوں کے جالے (Vericose Veins) دور کرنے اور اس کے زخموں کوٹھیک کرنے کی بہترین دوا ہے۔ بسااوقات ویری کوزونیز دوسری دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوتیں ۔ عورتوں میں بار بار بچوں کی پیدائش سے جو بوجھ پڑتے ہیں اس سے ٹانگوں میں نیلی رگیں ابھر آتی ہیں اور جالے بن جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ان سے خون ٹانگوں میں نیلی رگیں ابھر آتی ہیں اور جالے بن جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ان سے خون

بھی نکلتا ہےاور بہت نکلیف دہ صورت حال پیدا ہو جاتی ہے۔اس نکلیف میں کوئی معین دوا کام نہیں کرتی کہاہے دستور کی دواسمجھ لیاجائے اور ہمیشہ وہی کام کرے مگر جودوا بھی علامتوں کے مطابق درست ہو وہ فوری فائدہ دیتی ہے۔اس بہاری کے لئے چوٹی کی دواؤں میں آرنیکا، ایسکولس، لىكىيىسس ،سلفيورك ايسدُّ اورنا ئىترگ ايسدُ بېير -اس فېرست ميں فلورك ايسدُ بھى لكھ لير _ وری کوزونیز کے حوالے سے کوئی دوا یاد نہ آئے تو بہتر طریقۂ علاج بیہ کمریض کے مزاج کی تشخیص کریں اس طرح بسااوقات مزاجی دواہی وریی کوزونیز میں بھی فائدہ پہنچادیتی ہے۔ بعض لوگوں کے سرکی جلدس ہوجاتی ہے۔حس ختم ہوجاتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ سر کا بچھلا حصہ لکڑی سے بنا ہوا ہے۔اس تکلیف میں فلورک ایسڈ بہترین دوا ہے۔ ہاتھ یا و ک سن ہونے کا رجحان بھی فلورک ایسڈ میں ملتاہے۔اس میں عموماً جسم تلے دبا ہوا حصہ س نہیں ہوتا بلکہ دوسرا حصہ من ہوجا تا ہے۔ریڑھ کی مڈی میں بھی من ہونے کا احساس ہوتو فلورک ایسڈ مفید ہے۔اسے فوراً اور بروقت استعال کرنا جاہئے کیونکہ سن ہونے کا احساس کسی وقت اجائک فالج میں تبدیل ہوسکتا ہے۔ چونکہ فلورک ایسڈ آ ہستہ آ ہستہ اثر کرتا ہے اس کئے ایسے مریضوں کوفلورک ایسٹر دے کر جلدیہ دوا تبدیل نہیں کرنی جاہئے۔اگر مریض کی حالت مزید خراب ہونے سے رک جائے اور گھر جائے اور کچھ کچھفرق پڑنے گلے تواس دوا کو جوآ ہستہ آ ہستہ الرُ كرنے والی ہواسے لمبے عرصہ تک الر دکھانے كا موقع دینا جاہئے كيونكہ صبر سے دوتین مہينے تک استعال کرنے سے بہت خوشگوارعلامتیں ظاہر ہوجاتی ہیں۔صرف پیرخیال رکھنا ضروری ہے کہاس دوا کے استعمال کے دوران مریض کی حالت مزید بگڑ نے ہیں بلکہ بہتری کی طرف ماکل رہے۔ شیرخوار بچوں کے سرکےا گیزیمامیں بھی فلورک ایسڈ بہت مفید ہے۔ بڑوں میں پیہ علامت نمایاں ہوتی ہے کہ سر کے بالوں والے حصہ میں خارش نہیں ہوتی بلکہ جو ھے

بالوں سے خالی ہو گئے ہوں وہاں بہت خارش محسوس ہوتی ہے۔

فلورک ایسڈ میں ایک ایسی عجیب علامت ملتی ہے جو عام طور پر دوسری دواؤں میں نہیں ملتی یعنی بعض بچوں کا سر بائیں طرف سے قدرے چھوٹا رہ جاتا ہے اور پوری طرح سے نشو ونما نہیں یا تا۔ بائیں آئی جھی نسبتاً دبی ہوئی اور چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ فلورک ایسڈی نشانی ہے۔ چونکہ یہ ہڈی کی تغییر میں بہت مفید دوا ہے اس لئے یہاس قتم کی کمزوری میں کام کرتی ہے۔ اکثر مریضوں پر تجربہ سے اس دوا کی یہ خوبی معلوم ہوئی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو طریقہ آزمائش مریضوں پر تجربہ سے اس دوا کی یہ خوبی معلوم ہوئی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو طریقہ آزمائش (Proving) سے معلوم نہیں کی گئی۔

فلورک ایسڈ میں بہت ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش کے ساتھ کھانا کھانے کی بھی خواہش ہو جایا کرتی ہے کیکن فلورک ایسڈ میں ہوتی ہے۔ عام طور پر بیاس کی علامت کے ساتھ بھوک ختم ہو جایا کرتی ہے کیکن فلورک ایسڈ میں بدونوں علامتیں ساتھ ساتھ ملتی ہیں۔

گلے کے پرانے زخموں میں بھی فلورک ایسڈ مفید ہے۔ اس بارہ میں بیسلیشیا اور مرکری دونوں کے ساتھ موافقت رکھتی ہے جبکہ سلیشیا اور مرکری آپس میں ایک دوسرے کی مخالف دوائیں ہیں، ان کو اکٹھا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ درمیان میں ہیپر سلف کوشامل کرنا پڑتا ہے لیکن فلورک ایسڈ ان دونوں دواؤں کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ مرکری کے استعمال کے بعد سلیشیا صرف اس صورت میں اونچی طاقت میں دی جا سکتی ہے جب خود مرکری ہی کے غلط استعمال سے معز اثر ات فاہر ہوئے ہوں۔ سلیشیا ان اثر ات کوزائل کردیتی ہے۔

سلفر میں صبح کے وقت اسہال کی علامت ملتی ہے۔ فلورک ایسٹر میں بھی صبح کے اسہال کی علامت ملتی ہونے میں نہ آئیں اور کی علامت ملتی ہے علاوہ ازیں ایسے اسہال جو مزمن ہوجائیں اورٹھیک ہونے میں نہ آئیں اور مریض کو بہت کمز ورکر دیں اس میں بھی فلورک ایسٹر بہت مفید ہے۔

حکر کی خرابی کے نتیجہ میں جسم پر پیدا ہونے والی سوزش میں بھی فلورک ایسڈ مفید دوا ہے۔ اس سوزش اور ورم کے ساتھ گرمی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اسہال میں صفر ابھی شامل ہوتا ہے۔ اور پیٹ ہواسے تن جاتا ہے۔

فلورک ایسٹر میں گرمی سے، گرم مشروبات سے اور شیج کے وقت تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ سردی میں آرام محسوس ہوتا ہے۔

مددگاردوا: سلیثیا طاقت: 30یاحسب ضرورت اونچی طاقتیں عبسيم

99

جلسيميم

GELSEMIUM (زردچنیلی)

حبسیم زرد چنیلی سے بنائی جاتی ہے۔ ہومیو پیتی میں اس کا استعال بہت کثرت سے ہوا ہے۔ یہ صدتک ایکونائٹ اور بیلا ڈونا سے مشابہ ہے لیکن ان کی نسبت اس میں بیاری بڑھنے کی رفتار قدرے کم ہوتی ہے۔ سرکی طرف دوران خون اور درد، منہ کا خشک ہو جانا الی علامتیں ہیں جوا یکونائٹ، بیلا ڈونا اور حبسیمیم میں مشترک ہیں لیکن ایکونائٹ میں پیش اور تمتماہ ٹی بی جوا یکونائٹ، بیلا ڈونا اور حبسیمیم میں پش نہیں ہوتی۔ یہ مزاج کے لحاظ سے شنڈی دوا ہے۔ متماہ ٹی بی بی جاند ہو جائی ہوتی ہے جبکہ حبسیمیم میں پش نہیں ہوتی۔ یہ مزاج کے لحاظ سے شنڈی دوا ہے۔ اس میں منہ کی فشکی کے باوجود پیاس نہیں ہوتی۔ سردی لگتے ہی فوراً بیاری کے اثرات ظاہر نہیں ہوتی۔ سردی لگتے ہی فوراً بیاری کے اثرات ظاہر نہیں ہوتی ہیں۔ اگر بیچ کوسردی لگنے سے بچھ عرصہ کے بعد ہوتے بلکہ دو تین دن کے بعد مطاہر ہوتی ہیں۔ اگر بیچ کوسردی لگنے ہی براحال ہوجائے توا یکونائٹ اور بیلا ڈونا مطاکر دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔

ڈاکٹر کینٹ کے مطابق اس کے مریض کوسر دی لگ جانے کے گئ دن بعد نزلہ ہوتا ہے۔
چونکہ جلسیمیم ٹھنڈے مزاج کی دوا ہے اس لئے یہ خیال آتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں اس کا اثر
نمایاں ہوگا۔اسی طرح ایکونائٹ میں چونکہ جوش اور گرمی پائی جاتی ہے اس لئے اس کو گرمیوں میں کام آتا
چاہئے کیکن حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے۔ایکونائٹ سردی کے موسم کی دوا ہے اور جلسیمیم اکثر
گرمیوں میں کام آتی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں سردی لگ جائے تواس میں جلسیمیم زیادہ مفید ہے لہذا
ہے گرم اور خشک موسم کی دوا ہے۔ لیکن گرمیوں کے خشک موسم میں خونی پیچیش ہوجائے توا کونائٹ چوٹی

کی دواہے جوخشک گرمی اورخشک سردی دونوں میں کام کرتی ہے۔

تجلسیمیم کومموماً سردرداورنزلاتی بیاریوں میں استعال کیاجا تاہے مگراسہال وغیرہ میں استعال نہیں ہوتی حالانکہ اگرجسم ٹھنڈا ہواور سرمیں بوجھ محسوس ہو، منہ خشک ہونے کے باوجود پیاس نہ ہوتو وہ اسہال جولمباعرصہ بیجھانہ چھوڑیں، ان میں جلسیمیم بہترین کام کرتی ہے۔ اس لئے بیاسہال کی بھی دواہے۔

جلسیمیم میں بیاری کااثر آ ہتہ ہونے کے باوجوداسے مزمن بیاریوں میں شاذ کے طور پر ہی استعال کیا جاتا ہے۔ نبیتا ورمیانی عرصہ پرمحدود بیاریوں میں استعال ہوتی ہے۔ جلسیمیم میں چہرے اور سرکی طرف خون کا دباؤ ہوتا ہے۔ چہرہ گرم اور ہاتھ پاؤں شخنڈ ہے ہوتے ہیں بیعلامت آرنیکا میں بھی پائی جاتی ہے۔ بعض دفعہ پنڈلیاں بھی شخنڈی اور تُخشد ہوجاتی ہیں۔ بیعلامت آرنیکا میں بھی ملتی ہیں مگر جلسیمیم اور گلونائن میں فرق بیہ کہ جلسیمیم میں ہاتھ پاؤں شخنڈے ہوتے ہیں لیکن پسینہ بالکل نہیں آتا جبکہ گلونائن میں ہاتھ پاؤں شخنڈے ہوتے ہیں لیکن پسینہ بالکل نہیں آتا جبکہ گلونائن میں ہاتھ پاؤں شخنڈے ہوتے ہیں اور پسینہ بھی آتا ہے۔ کمر کے عضلات میں کھیاؤ اور تناؤکی وجہ سے کم درد کندھوں تک بھیل جاتا ہے اور سرکے پیچھے تک بھی محسوس ہوتا ہے۔ گردن اکڑ جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے گردن میں بل پڑ جائے تو جلسیمیم کے ساتھ بیلا ڈونا ملا کردیۓ سے فائدہ ہوتا ہے۔ سوتے ہوئی کردن میں بل پڑ جائے تو جلسیمیم کے ساتھ بیلا ڈونا ملا کردیۓ سے فائدہ ہوتا ہے۔ سوتے ہوں تُن گردن میں ہوتی ہاتھ یا واں شنڈے ہوتے ہیں، شنج اور اگڑاؤ ہوتا ہے جس میں طورت میں کمرشنڈی نہیں ہوتی، ہاتھ یا واں شنڈے ہوتے ہیں، شنج اور اگڑاؤ ہوتا ہے جس میں خاتیں بھونا چا ہے۔

حبلسیمیم میں سونے سے پہلے بے چینی سی ہوتی ہے اور مریض کو بیخطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اسے ٹھیک سے نیندنہیں آئے گی ، سریجھ تکلیف محسوس کرتا ہے حالا نکہ ابھی در د واضح نہیں ہوا ہوتا مگر سونے کے بعد وہ در دبڑھ جاتا ہے اور کیکیسس سے بظاہر مشابہت ہوجاتی ہے لیکن بیہ حبلسیمیم ہی کا مریض ہوتا ہے۔ نیندآ رام سے نہیں آتی۔انسان جب

صبح اٹھتا ہے تو در دبڑھا ہوا ہوتا ہے۔ بیعلامت گلونائن میں بھی ہے۔ فرق بیہے کہ حکسیمیم کا در دصرف سرتک محدود نہیں رہتا بلکہ کندھوں کے اعصاب میں نیچے کندھے کی ہڈی تک اتر آتا ہے اور زیادہ ترید در دبائیں طرف اٹھتا ہے۔

گلونائن کا تریاق (Antidote) حبلسیمیم ہے۔اگر حبلسیمیم اور نیٹرم میورملا کردیں تو یہ بطور تریاق بہت جلد کام کرتا ہے۔

جلسیمیم عورتوں کے لئے بھی بہت کام کی دوا ہے۔ رحم کے منہ کی اینتظن میں بہت مفید ہے۔ وضع حمل کے وقت در دِزہ کے کوندے نیچے سے اوپر کمرتک جاتے ہوں تو ایسے موقع پر بہت تیزی سے کام کرتی ہے اور اس کے استعمال سے کمر کے عضلات کا کھچاؤ ختم ہوجا تا ہے اور بھی آسانی سے بیدا ہوجا تا ہے۔

۔ حیض کے دنوں میں بھی کمر اور کولہوں میں درد ہو جاتا ہے۔سر دی بھی بہت لگتی ہے۔ انفیکشن کی وجہ سے مسلسل بخارر ہتا ہے جوٹو ٹیانہیں۔

اگر ملیریا کا بخار ہو اور روز چڑھتا اترتا ہو اور عموماً دو پہر کے بعد او نچا ہونے کا رجحان ہوتوالی علامات میں جلسیمیم بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ جلسیمیم کی تکلیفیں شام کے وقت بڑھتی ہیں اور آرسنک کی تکلیفیں دن اور رات بارہ بج کے بعد نمایاں طور پر بڑھتی ہیں۔ تین بج کے قریب کالی کارب کی تکلیفوں کا وقت شروع ہوتا ہے۔ چار پانچ بجے سے چھسات بج تک جلسیمیم کی تکلیفوں میں شدت پیدا ہوتی ہے۔

مریض ہلکی رفتار سے چلتار ہوتی ہے۔ اس میں ایک بیعلامت ہے کہ مریض ہلکی رفتار سے چلتار ہے تو سمجھتا ہے کہ دل دھڑ کتار ہے گا جب ٹھم جائے تو محسوں ہوتا ہے کہ دل کی دھڑ کن بند ہوجائے گی۔ گویا جسم کی حرکت دل کو طاقت دے رہی ہے اور اسے متحرک رکھر ہی ہے۔ دل میں ایک خلاکا احساس ہوتا ہے اور کمزوری بھی۔ لگتا ہے کہ حرکت سے دل ٹھیک ہوجائے گا ورنہ بیٹھے بیٹھے دل بیٹھ ہی جائے گا۔ ہلکی حرکت کے ساتھ ساتھ دل کی طاقت بڑھتی جاتی جاتی ایسے مریض کے لئے دل بیٹس کمزوری ہو تو تیز حرکت نقصان دہ ہوتی ہے کیونکہ جلسیمیم کے مریض کے دل میں کمزوری ہو تو

اچا نک حرکت سے وہ بے ہوش ہوسکتا ہے یا مربھی سکتا ہے۔جسم کی حرکت سے دل میں رفتہ رفتہ تو ان کی پیدا ہوتی ہے۔ تو ان کی پیدا ہوتی ہے۔

جلسیمیم میں معدہ میں کمزوری اور خالی بن کا احساس بھی ماتا ہے۔جذباتی ہیجان

سے پیدا ہونے والے اسہال میں بھی جلسیمیم مفید ہے۔ دل کی اعصابی بیار یوں کے ساتھ

معدے پر بھی اثر پڑتا ہے۔خوف، دباؤیا بری خبر سے معدہ خراب ہوجاتا ہے۔ بیعلامت

ارجنٹم نا ئیٹر کیم میں بھی ملتی ہے۔لیکن دونوں کی دوسری علامتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

حکسیمیم کی نیٹرم میورہے بھی مشابہت ہے۔نیٹرم میور کے *سر درد میں سارے سر*پر

ہتھوڑے برسنے کا احساس ہوتا ہے جبکہ حبلسیمیم کا سردردعموماً گدی سے تعلق رکھتا ہے۔

گدی کے جھے میں درد کی چوٹیں پڑنے کا حساس ہوتا ہے۔ بائیں طرف کا سر در د جوگدی میں آئر پڑھ میں مار

تھہر جائے یا گردن میں جائے اس میں جلسیمیم بہت موثر ہے۔اس کے علاوہ اونا سموڈ یم

(Onosmodium) بھی بہت مفید ہے۔ دونوں کو ملا کر میگرین لیعنی در دِشقیقہ میں استعال

کیا جا سکتا ہے۔بعض دفعہ سردرد کا گرمی ہے تعلق ہوتا ہے کیکن اس کا خیال نہیں آتا اس کئے

علامات کا غور سے جائزہ لینا چاہئے۔ بیاری اور دوا کے مزاج سے واقفیت ضروری ہے۔

ہومیو پیتھک دواضحے ہوتو مریض کو یا بہت نیندآئے گی یا کھلا بیشاب آئے گا۔ حبلسیمیم میں کھلے

بیبتاب کی علامت ملتی ہے جو یانی کی طرح بالکل صاف اور کھلا ہوتا ہے۔اس کے ساتھ بیاری کی

علامتوں میں کمی آئے تو یہ جلسیمیم کی علامت ہے۔ جلسیمیم میں بسااوقات جذباتی ہیجان

اورفکرسے جسمانی بیاریاں بھی لاحق ہوجاتی ہیں۔

حبلسیم میں آئکھوں کی تکلیفیں بھی پائی جاتی ہیں۔ وقتی اندھا پن بھی ہو جاتا ہے۔ یہ علامت اور دواؤں میں بھی ملتی ہے۔ لیکن جلسیمیم میں بہت نمایاں ہے۔ اگرایک طرف کی نظر متاثر ہوتور سٹاکس کام آئے گی۔ بعض صور توں میں کیکیسس بھی مفید ثابت ہوتی ہے۔ جلسیمیم میں پیوٹوں یر فالجی اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور انہیں کھولنا مشکل ہوتا ہے۔

الی تکلیف مزمن ہوجائے تو جلسیمیم زیادہ فائدہ نہیں دیتی، تازہ تکلیف میں زیادہ مفید ہے۔
نظر میں دھندلا ہٹ، ایک نیلی پھیلی ہوئی اور ایک سکڑی ہوئی اور آئھ کی سوزش جلسیمیم کی بھی
علامت ہے۔ آئھوں کے سامنے دھنداور جالا سا آجا تا ہے۔ آئھ کے اعصاب کی کمزوری میں
مفید ہے۔ ہاتھ پاؤں میں نیم فالجی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ اعضاء میں لرزہ طاری ہوجاتا ہے اور
کھیاؤمحسوس ہوتا ہے۔ کمزوری کے باعث حرکت کرنے کودل نہیں جا ہتا۔

نزلاتی تکلیفول میں جلسیمیم کی علامات نیٹرم میور سے ملتی ہیں لیکن نیٹرم میور میں پیاس مرائی تکلیفول میں جلسیمیم میں پیاس بالکل غائب ہوجاتی ہے۔ جلسیمیم میں چینکیں بہت آتی ہیں۔ ناک کی نوک بے حس ہوجاتی ہے۔ بعض دفعہ کا نول میں بھی سن ہونے کا احساس پایا جا تا ہے اور سن ہونے کا یہ احساس صرف جلد تک محدود ہوتا ہے۔ جلد گرم اور خشک ہوتی ہے اور خارش ہوتی ہے۔ خارش ہوتی ہے۔ خارش ہوتی ہے۔ جلسیمیم اس تکلیف میں فوری طور پر فائدہ دیتی ہے۔

چہرنے اور سرکی جلد پر پھنسیاں نکاتی ہیں۔ اعصاب کے کناروں پر نکلنے والے چھالے انتہائی خطرناک اور تکلیف دہ ہوتے ہیں، انہیں شنگل (Shingle) کہتے ہیں۔ اس تکلیف میں بھی حبسیمیم مفید ہے۔ عموماً میں لیڈم، آرنیکا اور آرسنک ملاکر دیتا ہوں۔ نیٹرم میور بھی مفید ہے گرمئیں بیک وقت کوئی ہی بھی تین مناسب دواؤں کو ملا کر نسخہ بناتا ہوں جو بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ یعنی آرنیکا، لیڈیم اور آرسنک میں سے کوئی ایک دواکم کر کے اس کی بجائے حسب علامات نیٹرم میوریا جبسیمیم داخل کر دیتا ہوں۔ ان پانچ دواؤں کے دائرہ میں ہی اللہ کے فضل سے شنگل کی اکثر صور تیں قابو میں آ جاتی ہیں۔

بعض د فعہ معدے کی خرابی کی وجہ سے مرگی کی طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سر ہے۔ معدے سے ایک شعلہ سا نکلتا ہے جوسریا دل کی طرف جاتا ہوامحسوس ہوتا ہے۔ سر پر دباؤ کی وجہ سے مریض بعض د فعہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا اسے چکر آتے ہیں اور جسم کا تو از ن بر قرار نہیں رہتا۔ یہ علامت جلسیمیم میں یائی جاتی ہے۔ یہ علامتیں معدے کی

تیزابیت سے پیدا ہوتی ہیں۔اگر کسی کھلاڑی کے معدے میں تیزابیت ہوتواس میں الیمی علامتیں پیدا ہونا زیادہ قرین قیاس ہے، ایسی صورت میں جلسیمیم سے فائدہ ہوتا ہے۔لیکن میہ بیاری مرگی نہیں ہوتی۔

جلسیمیم میں مرطوب موسم اور جذباتی ہیجان سے بیاریاں بڑھ جاتی ہیں۔ کھل کر بیشاب آنے سے اور کھلی ہوا میں متواتر ہلکی حرکت سے آرام آتا ہے۔

> دافع اثر دوائيں: چائنا۔ کافیا۔ ڈیجیٹیلیس طاقت: 30سے 200 تک

100

401

گلونائن

GLONOINE

(Nitro Glycerine)

گلونائن بھی ان دواؤں میں سے ہے جسے ڈروسرا کی طرح صرف چند بیار یوں تک محدود سمجھا گیا ہے حالانکہ اس سے بہت زیادہ استفادہ کیا جا سکتا ہے۔گلونائن ٹرائن نا ئیٹروگلیسرین (Trinitroglycerin) ہے جس میں ہائیڈروجن اور آئسیجن کا عضر بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ بہت زور سے بھٹنے والا آئش گیر مادہ ہے۔ اس فارمولا کوسب سے پہلے نوبیل (Nobel) نامی سائنس دان نے ایجاد کیا تھا اور اس زمانے میں اس ایجاد نے ایک انقلاب ہر پاکر دیا تھا۔اگر چہ بعد میں پلاسٹک بم اور نیوکلیئر بم وغیرہ ایجاد ہوئے ہیں لیکن نائٹر وگلیسرین کے فارمولا کوکلیٹا ترک نہیں کیا گیا بلکہ اسے روزمرہ استعال میں لایاجا تا ہے۔

نائٹروگلیسرین طب میں بھی استعال ہوتی ہے۔اسے براہ راست یا کسی اور شکل میں انجا نیا (Angina) کی تکلیف کو دور کرنے کے لئے استعال کیاجا تا ہے۔گلونائن انسانی مزاح پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ دھوپ سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے نائٹروگلیسرین گرمی کو برداشت نہیں کر تناز ہوتی ہے۔ دھوپ سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے نائٹروگلیسرین گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا۔اس کے نتیجہ میں درد سے سر برداشت نہیں کر تا ہی طرح مریض بھی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا۔اس کے نتیجہ میں درد سے سر بھٹے لگتا ہے، جگہ جگہ چوٹیں پڑتی ہیں اور دھا کے ہوتے ہیں جیسے کوئی سرکوہ تصور وں سے کوٹ رہا ہو۔ گلونائن لو لگنے سے بیخ کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔خون کا دباؤ زیادہ ہونے پر بھی کام آتی ہے۔ لیکن صرف اس صورت میں جب اس کی دیگر علامتیں مریض میں موجود ہوں۔ اکثر ہومیو پیتھک معالجین اسے لو لگنے میں اور بلڈ پر یشر کے لئے استعال کرتے ہیں۔

میں نے لو لگنے سے بچنے کے لئے ایک نسخم بنایا ہوا ہے۔ گلونائن، نیٹرم میوراور آرسنک ملا کر 30 طاقت میں گھر سے نکلنے سے پہلے ایک خوراک استعمال کر لی جائے تواللہ کے فضل سے سارا دن سر در ذہیں ہوگا۔ ورندا گر سر در دایک دفعہ شروع ہوجائے تو پھر علاج مشکل ہو جاتا ہے۔

گلونائن کی ایک علامت میہ ہے کہ تکیہ پرسرر کھتے ہی سر پھٹنے لگتا ہے۔ دل پر بھی دباؤ محسوس ہوتا ہے،خون کا دورہ دیکا کیے سریا دل کی طرف ہوجا تا ہے اور کوئی سیال چیز اندر سے گزرتی ہوئی محسوس ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ سرکی طرف خون کا رجحان ہوتو اس کا ماخذ دل یا معدہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ معدے یا دل سے خون سرکی جانب دوڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

جلسیمیم کی بھی کچھ علامات گلونائن میں بھی پائی جاتی ہیں۔ جلسیمیم میں مریض سونے سے قبل ایک مبہم سی تکلیف محسوں کرتا ہے جس کا مرکز سرمیں ہوتا ہے حالا نکہ ابھی درد واضح نہیں ہوا ہوتا۔ سونے کے بعد در دنمایاں طور پر ابھر آتا ہے جوشیج تک بہت شدت اختیار کر جاتا ہے۔ گلونائن کی بھی بہی علامت ہے کیکن فرق ہے ہے کہ جلسیمیم کا در دمخض سرتک محدوز نہیں رہتا بلکہ کندھے کے پھوں اور نیچ کمر تک اثر جاتا ہے۔ عموماً بائیں طرف در دہوتا ہے جبکہ گلونائن میں بورا سرمتاثر ہوتا ہے اور یہ در دصرف سراور آئکھوں تک ہی محدور ہتا ہے۔ اس درد کا دیگر اعصاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

گلونائن میں دھڑکن بہت نمایاں ہوتی ہے۔ساراجسم دھڑ کنے گتا ہے۔انگیوں کے پوروں سے لے کرپاؤں کے پنجوں تک بیدھڑکن مجسوں ہوتی ہے جو شخت بے چین کرتی ہے۔ تکمیہ پر سرر کھتے ہی دھڑکن محسوں ہوتی ہے جو شخت بے چین کرتی ہے۔ تکمیہ پر سرر کھتے ہی دھڑکن محسوں ہوتی ہے جس کی وجہ سے نینز ہیں آتی اور یہ دھڑکن سار بے جسم میں پھیل جاتی ہے۔گلونائن کی ایک ہی خوراک اس تکلیف کوختم کر سکتی ہے اور مریض پرسکون نیند سوجا تا ہے۔ ہومیو بیستی میں گلونائن طریقہ آزمائش یعنی بروونگ (Proving) کے لئے بہت زود اثر دوا ہے اس لئے اسے بار بار

نہیں دہرانا جا ہے ۔اگر کوئی صحت مند آ دمی چھوٹی طاقت میں پانچ پانچ دس دس منٹ کے وقفہ سے گلونائن استعمال کر بے تو چندخورا کول کے بعد ہی شخت درد سے اس کاسر پھٹنے لگتا ہے اور گلونائن کی سب علامتیں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ ہومیو بیتھی کے منکرین کو قائل کرنے کے لئے یہ بہترین طریقہ ہے۔

ب خیلسیمیم سے گلونائن کی ایک اور مشابہت یہ ہے کہ دونوں میں مریض کے ہاتھ پاؤں سخت ٹھنڈ ہے ہوتے ہیں۔فرق یہ ہے کہ خیلسیمیم میں بالکل پسینہ نہیں آتا جبکہ گلونائن میں ہاتھ یاؤں ٹھنڈ ہے ہونے کے باوجود پسینہ آتا ہے۔

گلونائن کے مریض کی زبان سرخی مائل ہوتی ہے اور منہ خشک لیکن پیاس زیادہ نہیں ہوتی۔ تیز بخار کے باوجود پیاس غائب ہوجاتی ہے۔ گرم موسم، دھوپ اور آگ کے سامنے تکلیفوں میں اضافہ ہوجاتا ہے اور دھوپ اور گرمی کا احساس صرف سرتک ہی محدوز نہیں رہتا بلکہ ساراجسم متاثر ہوتا ہے۔ دھڑکن، سانس میں گھٹن، متلی اور قے پائی جاتی ہیں۔ دبانے سے سر درد کو آرام محسوس ہوتا ہے۔ پڑھنے سے سر درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ لفظ چھوٹے محسوس ہوتے ہیں۔ ہرچیز آدھی روشن اور آدھی تاریک نظر آتی ہے۔

گلونائن میں آنکھول کے سامنے بیلی سی اہراتی ہے اور ستارے سے جیکتے ہیں۔ نیچے جھکنے سے آنکھول کے سامنے سیاہ نشان آتے ہیں۔ آنکھول میں در داور دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ آنکھول میں خون کا اجتماع بڑھ جاتا ہے۔ گلونائن کے مریض کی آنکھیں اندر دھنسی ہوئی ہوتی ہیں اور آنکھول کی رنگت زردی مائل ہوتی ہے۔ روشنی سے زودحسی ہوتی ہے۔ وقتی اندھا پن بھی پیدا ہوتا ہے۔ ایک خاص علامت یہ ہے کہ بخار میں مریض کا چہرہ سرخ نہیں ہوتا بلکہ زرد ہوجاتا ہے۔

بچوں کے گردن تو ڑبخار میں جوخصوصاً گرمیوں میں ہوگاونا ئن مفید ہے۔اس میں گردن پیچھے کومڑ جاتی ہے۔ چہرہ پرشدت کی گرمی اور چبک ہوتی ہے۔ آئکھیں بھنچ کر اوپر کو چڑھ جاتی ہیں۔ سراور اوپر کا دھڑ سخت گرم اور نجلا دھڑ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بہت پیینہ آتا ہے۔ ورم الدماغ (Meningitis) ہوجاتا ہے۔ اگر ملیریا کے جراثیم ریڑھ کی ہڈی میں چلے جائیں تو اس سے بھی ورم الدماغ ہوجاتا ہے۔ اگر اس بیاری کا گرمیوں سے تعلق ہوتو اس میں گلونائن مفید دواہے۔

بسااوقات راستہ چلتے ہوئے دوران خون سر کی طرف ہوجاتا ہے۔ چہرہ تمتمانے لگتا ہے۔ گلا گھٹنے کا احساس ہوتا ہے جیسے سارا خون منہ اور سر میں جمع ہو گیا ہو۔ شدید کمزوری کے احساس کے ساتھ جسم ٹھنڈ ااور پسینہ سے تربتر ہوجاتا ہے اورغشی طاری ہوجاتی ہے جسے انگریزی طبی اصطلاح میں Apoplexy کہاجاتا ہے۔ اس قسم کی غشی کے دورے دماغ میں خون کا لوتھڑا جمنے کی وجہ سے بھی ہوسکتے ہیں لیکن گلونائن کے مریضوں میں تشنج کے نتیجہ میں بھی بیعلامات عارضی طور پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اگرا یسے مریض کا گلونائن سے بروقت علاج نہ کیا جائے اور بار بار دورے پڑنے لگیں تو بسااوقات مستقل نقصان پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے۔

گلونائن کا مریض بعض اوقات دیکھے بھالے راستوں کو بھول جاتا ہے اوراسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہے اور کدھر جانا ہے۔ رستے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ یہ علامات کیکیسس (Lachesis) میں بھی پائی جاتی ہے۔

گلونائن کوعموماً خون کا دباؤ کم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اوپیم بھی اس حالت میں مفید دوا ہے بلکہ گلونائن کے مقابل پر بلڈ پر یشر ٹھیک کرنے کے لئے زیادہ مفید ہے اور نسبتاً گہرا اثر کرتی ہے۔ ڈاکٹر کینٹ کہتے ہیں کہ ایسی امراض کے علاج میں اوپیم کو گلونائن پرتر جیح دینی جاہئے کیونکہ گلونائن کے اکثر اثر ات عارضی ہوتے ہیں اور اوپیم بہت لمبااثر دکھانے والی دوا ہے۔

سردی لگنے کے نتیجہ میں یا خوف کی وجہ سے حیض بند ہوجائے اور د ماغی علامات ظاہر ہو جا ئیں تو گلونائن مفید ہے۔ سیمی سی فیوجا اور برائیو نیا بھی مفید دوائیں ہیں۔اگر پاگل بین کے اثرات نمایاں ہوں تو ایتھوزا بھی کام آسکتی ہے۔عموماً معدہ کی تکلیفیں سر میں منتقل ہوجائیں تو ایتھوزا (Aethusa) دوا ہوتی ہے۔اسی طرح حیض رکنے کا اثر فرنہن پر ہونے کے ازالے کے لئے ایتھوزا کام آسکتی ہے۔ گلونائن کے مریض کے کانوں میں دھڑکن کا احساس ہوتا ہے اور دل کی دھڑکن سنائی دیتی ہے۔

معدے اور انتر یوں میں گرگر اہٹ ہوتی ہے۔ لو لگنے کی وجہ سے شدید متلی اور قے ایک طبعی امر ہے۔ معدہ میں کمزوری کا حساس ہوتا ہے۔ نبض کمزوراور آ ہستہ ہوجاتی ہے۔
لیکن اگر مریض چل پھرر ہا ہوتو نبض میں تیزی آ جاتی ہے۔ دل کی دھڑکن بھی زیادہ ہوجاتی ہے۔
تمام جسم میں تیش اور جلن کا احساس ہوتا ہے۔ مریض اچا تک غش کھا کر گر جا تا ہے۔ سانس گھٹتا ہے اور منہ سے جھاگ بھی نکلنے گئی ہے۔ مگر یہ مریض مشقلاً مرگی کا مریض نہیں ہوتا ، میمض ایک عارضی مشابہت ہے۔

گلونائن میں خارش بھی پائی جاتی ہے۔تمام اعضاء میں خصوصاً بازووں اور ٹائلوں میں سے مختیخ والے درد ہوتے ہیں۔ بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں درد گلونائن کی بھی علامت ہے۔ صبح چھ بجے سے بارہ بجے تک تکیفیں بڑھتی ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں سردردسورج کے ساتھ ساتھ بڑھتا گٹتا ہے۔ ملکے سے جھٹکے سے بھی درد میں اضافہ ہوجاتا ہے۔

دافع اثر دوا: ایکونائٹ

طاقت: 30سے 200 تک

گریفائش 407

101

گریفانٹس

GRAPHITES

(Black Lead)

گریفائٹس کے بارے میں عموماً کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ بھاری بھرکم اور مضبوط سٹرول بدن کی موٹی عورتوں کی دوا ہے۔ مجھے تواس علامت سے وئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ میں نے اس کی مختلف طاقتیں استعال کر کے دیکھی ہیں مگر کسی موٹی عورت کواس سے بتلا ہوتے نہیں دیکھا۔ ممکن ہے مجھے اس کے استعال کا صحیح طریقہ معلوم نہ ہو۔ گریفائٹس کے تابع جن دوسری بیاریوں کا ذکر ملتا ہے ان میں یقیناً یہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ میں اسے ہمیشہ 200 یا ونجی طاقت میں استعال کراتا رہا ہوں۔ بھی 30 طاقت میں استعال نہیں گی۔ جہاں تک موٹا ہے کا تعلق ہے تو اس کے لئے میں نے حسب ذمل تین دواؤں کو زیادہ مفید پایا ہے۔ موٹا ہے کا تعلق ہے تو اس کے لئے میں نے حسب ذمل تین دواؤں کو زیادہ مفید پایا ہے۔ (Fucus)۔

گریفائٹس کی علامات رکھنے والی عورتوں میں حیض عموماً کم ہوتا ہے اور صرف دو تین دن خون جاری رہتا ہے۔خون کی مقدار بھی کم ہوتی ہے۔اسی وجہ سے ایسی خوا تین کاجسم فربہی کی طرف مائل ہوجا تا ہے۔ غالبًا اسی وجہ سے گریفائٹس کا تعلق موٹا پے سے باندھا جاتا ہے۔اگر ماہانہ نظام ٹھیک ہوجائے تواس کے نتیجہ میں موٹا پا کم ہونے کی توقع کی جاسکتی ہے۔

گریفائٹس کے مریض میں اخراجات عموماً چپکنے والے ہوتے ہیں۔اس کا ایگزیما بھی اسی علامت سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ ایگزیما عموماً کا نوں کے پیچچے،سر کے بعض حصوں میں،
کہنیوں اور ہاتھوں کے جوڑوں پر ظاہر ہوتا ہے اوراس میں سے چپکنے والا مادہ ضرور نکلتا ہے اور پہنچوں اور ہاتھوں کے جوڑوں پر خاہر ہوتا ہے اور اس میں سے چپکنے والے ہوتے پھر سخت ساکھ نڈ بن جاتا ہے۔میزیریم (Mezereum) کے اخراجات بھی چپکنے والے ہوتے ہیں جو سرکے اوپر ایک خول سا بنا دیتے ہیں۔ بعض چچوٹے بچوں کو بہت شدید قسم کا ایگزیما

ہوتا ہےاوروہ خارش کر کے جسم کولہولہان کر لیتے ہیںاور بہت نکلیف دہ صورت حال ہوجاتی ہے۔ ان کے ایکزیما کی علامتیں گریفائٹس کے علاوہ سورائینم (Psorinum) سے بھی ملتی ہیں۔ان کے اندرا کثر کسی گہری بیاری کا فاسد مادہ موجود ہوتا ہے۔ میں نے جب بھی ایسے بچوں کو جو علامات کے لحاظ سے سلیشیا طلب کرتے تھے، سلیشیا دینی شروع کی توبلاا ستناءان کے اندر سے بھوٹ کرمواد نکلا۔سلیشیا کا بیار مسلم ہے۔سلیشیا سے فاسد مادے باہرنکل آئیں اورسلیشیا ہی کے اثر سے ٹھیک نہ ہوں تو لا زماً کسی اور بالمثل مناسب دوا کی تلاش ضروری ہے۔سلیشیا کے بعد عموماً سورائینم کام آتی ہے یا پھر گریفائٹس۔سورائینم اکثر ایگزیما کوخشک کر دیتی ہے لیکن بعض د فعه مرض کا کلیتًا صفایانہیں ہوتا اور خشک جلد برخارش باقی رہ جاتی ہے تا ہم ایک نسبتی تسکین ضرور مل جاتی ہےاور بچدرات کو کچھ عرصہ تک سکون سے سونے لگتا ہے لیکن کچھ عرصہ کے بعدا یگزیما کے اخراجات دوبارہ بہنے لگتے ہیں۔ایسی صورت میں گریفائٹس کو بھی ایک مددگار دوا کے طوریر استعال کیا جاتا ہےاور یہ کچھنہ کچھاٹر ضرور دکھاتی ہے۔لہذا ایگزیماجیسی ضدی بیاریوں میں بہتر یہی ہے کہ بعض ملتی جلتی دواؤں کوایک دوسرے کے مددگار کے طور پر استعمال کیا جائے۔اگر بچوں میں خارش سے بے چینی بہت بڑھ جائے تو آرسنک 1000 بھی بہت مفید ہے اور خشک الگیزیما کے لئے خاص طور یرمؤثر ہے۔آ رسنک میں بے چینی کاعنصرا تنانمایاں ہے کہا گریوری علامتیں نہ بھی ہوں تو بھی ہے کچھ نہ کچھ کا م کرتی ہے مگراس صورت میں بیعارضی فائدہ دیتی ہے۔ آرسنک کا صحیح استعال و ہیں ہوگا جہاں مریض کی اکثر علامات کی تصویراس دواسے مشابہ ہو۔

یہ بات ہمیشہ یا در کھنی چاہئے کہ جو دوا دواؤں کے مزاج کو پہچان کر دی جائے وہی اصل علاج ہے اور یہ خیال کر لینا کہ جو مرض ایک دواسے ٹھیک ہواسی دواسے ویسا ہر مرض ٹھیک ہو گا، محض خوش فہمی ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر مرض کا مؤثر علاج دریا فت ہو چکا ہویا کسی ڈاکٹر کے ہرمرض کے لئے مناسب دوا کاعلم ہو۔اس لئے جو مریض کسی ڈاکٹر سے ٹھیک نہ ہواسے خواہ مخواہ اپنے ہاتھوں میں رکھ کر کمبی تکلیف نہیں دین چاہئے اور یہ بمجھ لینا چاہئے کہ ہوسکتا ہے کہ کسی اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں اس کا بہتر علاج

ہو۔اس لئے اپنی شکست تسلیم کر لینی جا ہئے تا کہ وہ کسی اور جگہ اپناعلاج کرا سکے۔

گریفائٹس اپنے مخصوص ایگزیما میں بہت مفید ہے۔ اگر مریض میں اس کی دیگر مزاجی علامتیں بھی پائی جائیں توبیا کیلی ہی کافی ہے ورنہ ملے جلے ایگزیموں میں جہاں انفیکشن وغیرہ بھی ہووہاں گریفائٹس محض مددگار دوا کے طور پر استعال ہوتی ہے۔ جلد میں کچاپن اور سرخی آجائے جیسے سورائسس کی ابتدائی علامتوں میں ہوتا ہے تو گریفائٹس دینی چاہئے۔ جلد کی بیعلامت سلیشیا میں بھی پائی جاتی ہے گرگریفائٹس کی بہچان ہے کہ جلد سے چیج بھی رطوبت نکاتی ہے۔

گریفائٹس کینس میں بھی مفید دواہے۔کینسرکار جمان ہرکار بن میں پایا جاتا ہے۔ بعض زخم مندمل ہونے کے بعد دوبارہ تازہ ہوتے رہتے ہیں اور بالآخر کینسر میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ اگران کا آپریشن کیا جائے تو مجھ عرصہ آرام کے بعد کینسر دوبارہ پھوٹ پڑتا ہے۔اس صورت میں گریفائٹس کونہیں بھولنا چاہئے۔200یا 1000 کی طاقت میں دی جائے۔جب تک اثر ظاہر میں ہودا ہے دہراتے رہیں۔

گریفائٹس عضلاتی نظام پرجھی اثر انداز ہوتی ہے۔ ٹائلوں کے پچھلے حصے خصوصاً رانوں کے پیچھے اس کا اثر نمایاں ہوتا ہے جو مریض کھڑے ہونے یا بیٹھنے سے نکلیف محسوں کرتے ہیں وہ دوقتم کے ہوتے ہیں۔ایک وہ جن کو کمر کی تکلیف کی وجہ سے حرکت دشوار ہوجاتی ہے اور فالجی علامتیں ان کی حرکات میں مخل ہونے گئی ہیں۔ گریفائٹس کا ایسے مریضوں سے تعلق نہیں ہے۔ دوسرے وہ مریض جن کے عضلات میں کھیا و اور تنا و پیدا ہوجیسے وہ چھوٹے ہوگئے ہوں اور انہیں پوری طرح کھولنے اور دوبارہ سکیڑنے میں دفت محسوں ہو۔ ران کے پیچھے بھی تناو ہو۔ یہ گریفائٹس کا دائرہ کا رہے اور ایسے مریضوں میں خواہ دیگر علامات گریفائٹس کی نہ بھی ہوں، گریفائٹس کو دائرہ کا رہے اور ایسے مریضوں میں خواہ دیگر علامات گریفائٹس کی نہ بھی ہوں، گریفائٹس کو آزمانا چاہئے۔ بعض اوقات جزوی علاج کی ضرورت بھی پیش آتی ہے۔
گریفائٹس کو آزمانا چاہئے۔ بعض اوقات جزوی علاج کی ضرورت بھی پیش آتی ہے۔
گریفائٹس میں شخت قبض یائی جاتی ہے اور فضلہ انتر یوں کے نچلے حصہ میں بڑے ہوں سوزش

بھی ہوتو بعض دفعہ ایسے مریض کو برائیونیا سے صرف عارضی فائدہ ہوتا ہے۔ فرق میہ ہے کہ برائیونیا میں فضلہ شخت میں فضلہ شخت ہوتا ہے کیکن پھر کچھ زم ہوتا جا تا ہے جبکہ گریفائٹس میں فضلہ شخت اور بہت خشک ہوتا ہے اور آخر تک شخت ہی رہتا ہے۔ کئی کئی دن شخت قبض رہتی ہے۔ اگر اسہال شروع ہوجائیں تو بہت پتلے اور سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں جن میں غیر منہضم غذا نکلتی ہے۔

ہر پیز (Herpes) بعنی وہ بیاری جس میں اعصاب کے ریشوں پر چھالے سے بن جاتے ہیں، جلد کچی کچی ہو جاتی ہے اور شدید جلن، بے چینی اور در دہوتا ہے۔اس کی دوشمیں ہیں۔ایک Herpes Zoster لینی شنگل جواعصابی کمزوری سے بیدا ہوتی ہے اور اعصابی ریشوں کے اوپر جلد ہر وائرس سے متعفن چھالے بن جاتے ہیں جن کے بھٹنے سے اُور چھالے بن جاتے ہیں۔ دوسری Genital Herpes لین جنسی بے راہ روی کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی،بار بارہونے والی ہرپیزجس کااعضائے تناسل سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ بیاری ہے جوایک دفعہ ہوجائے تو ساری عمر پیجیانہیں چھوڑتی ۔ گریفائٹس کوایس ہر پیز کے علاج میں بھی ایک مقام حاصل ہے۔لیکن صرف گریفائٹس ہی کافی نہیں ہوتی بلکہ اور دوائیں بھی دینی پڑتی ہیں۔میں نے جو کسالی کانسخہ بنایا ہوا ہے وہ ہر شم کی ہر پیز میں مفید ہوتا ہے۔اس میں آرنیکا، لیڈم اور آ رسنک شامل ہیں۔ بیسخہ سانب کے کاٹے کا بھی علاج ہے۔ جب سانب کے ڈسنے کے بعد زخم میں در دشروع ہوجائے اور گرمی اور جلن کے احساس کے ساتھ اعصاب براثر ہونے لگے تو یہی نسخہ بہت مفید ہوتا ہے۔ ہر پیز میں بھی ان دواؤں سے بہت جلد شفا ہو جاتی ہے۔ Gential Herpes یا جنسی اعضاء سے تعلق رکھنے والی ہر پیز چونکہ بہت ضدی ہوتی ہے اور لمبے عرصہ تک اس کے واپس آنے کا خطرہ رہتاہے اس لئے ایسی ہرپیز میں وقیاً فو قیاً ہفتہ دس دن کا ناغه ڈال کریہ علاج کم از کم چھ مہینے تک جاری رکھنا جا ہئے۔

گریفائٹس کا مریض سورائینم اور سلیٹیا کے مریض کی طرح سردمزاج ہوتا ہے۔اگر

ہم مزاجی دوائیں جوایک دوسرے سے مطابقت رکھتی ہوں باری باری استعال کروائیں تو یہ ایک دوسرے کے اثر کو کم نہیں کرتیں بلکہ ایک دوسرے کی مدد گاربن جاتی ہیں۔

گریفائٹس کا مریض کھلی ہوا کو پہند نہیں کرتا لیکن کھڑکیاں کھلی رکھنا جا ہتا ہے۔جسم ٹھنڈا ہونے کے باوجود چہرے پر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے برے محسوس نہیں ہوتے جبکہا کثر بیاروں کے لئے ہوا کا جھونکا نا قابل برداشت ہوتا ہے۔ گریفائٹس کا مریض ٹھنڈک کو پہند نہیں کرتا۔اسے گرمی فائدہ پہنچاتی ہے لیکن جسم کی اندرونی گرمی جوورزش کرنے یا دوڑنے اور چلنے کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے اس کی تکیف کو بڑھا دیتی ہے۔

ریفائٹس میں فالج کی علامتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ کاسٹیکم کی طرح اس کا فالج بعض اعضاء کو متاثر کرتا ہے خصوصاً نجلے دھڑ پر فالج کا حملہ ہوتا ہے۔ بالخصوص ٹانگوں کے فالج میں گریفائٹس بعض اور دواؤں کی طرح بہت مؤثر ہے۔ بیمرگی کے مرض میں بھی بہت مفید ہے۔ مرگی عموماً کسی گہری اندرونی بیاری کے متیجہ میں پیدا ہوتی ہے اس لئے اس کا علاج بھی مزاج سے ہم آ ہنگ کسی گہری دواسے ہی کرنا چا ہئے۔ گریفائٹس بھی ان دواؤں میں سے ایک ہے۔

گریفائٹس چونکہ خالص کاربن ہے اس لئے کاربووت کے سے بھی اس کی مما ثلت ہے۔ ہر
کاربن میں شنج کی علامت پائی جاتی ہے۔ کاربووت کے بیٹر لی کے نہایت تکلیف دہ شنج کے لئے بہترین
دوا ہے۔ اگر بیشنج بڑھ کرمرگی کے دوروں میں تبدیل ہوجا ئیں تو گریفائٹس کام کرتی ہے لیکن اس کی
دیگر مزاجی علامات کی موجودگی ضروری ہے کیونکہ مرگی میں دوااس وقت کام کرتی ہے جب مریض
کے مزاج سے مشابہ ہو۔ گریفائٹس میں بیخوبی ہے کہ اگر بیکام کر بے قوجہت گہر بے نتائج پیدا کرتی
ہے۔ عین ممکن ہے کہ بیاری جڑ سے اکھڑ جائے یا اتنی معمولی باقی رہ جائے تو شاذ کے طور پر ہی
کبھی دورہ پڑے۔ گریفائٹس وہنی پڑ مردگی کی بھی ایک اعلیٰ دوا ہے لیکن صرف اسی علامت
سے مرض کی بہچان بہت مشکل ہے کیونکہ ذہنی پڑ مردگی اتن عام چیز ہے کہ ہرکس ونا کس اس میں
مبتلا ہوتا رہتا ہے۔ گریفائٹس کا مریض ہر وقت شفکر نظر آتا ہے۔ ممکین اور مالویں ہوتا ہے۔

ذہن پر غبارسا چھایا رہتا ہے۔ سوچنے سجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت مفقو دہوجاتی ہے۔ صبح الطفنے پر چکر آتے ہیں اور ذہن س سامحسوس ہوتا ہے۔ روشی نا قابل برداشت ہوتی ہے۔ آت کھوں میں جلن ہوتی ہے اور سرخی کے ساتھ پانی آتا ہے۔ قوتِ شامہ بہت تیز ہوجاتی ہے۔ مریض پھولوں کی خوشبو برداشت نہیں کرسکتا۔ ناک میں در دہوتا ہے۔ بے حد خشکی ہوجاتی ہے اور مواد جم کرچھلکوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ چہرے پر کڑی کے جالے کا احساس ہوتا ہے۔ دانے نکلتے ہیں جن میں خارش ہوتی ہے۔ منہ اور ٹھوڑی کے گردا یکڑی میا ہوجا تا ہے۔ منہ سے سڑی ہوئی بد ہوآتی ہے اور زبان پر جلن دار چھالے بن جاتے ہیں۔

کریفائٹس کا مریض عموماً گوشت سے نفرت کرتا ہے۔ میٹھی چیز وں سے متلی ہونے گئی ہے۔ ہر کھانے کے بعد متلی اور قے کار جحان ہوتا ہے۔ عورتوں کوچیس کے دوران سج کے وقت متلی ہوتی ہے۔ معدہ پر دباؤ اور جلن کا احساس ہوتا ہے جس سے بھوک گئی ہے۔ گریفائٹس میں گردن ، کندھوں ، کمر اور بازوؤں میں شد بددرد ہوتا ہے۔ کمر میں درد کے ساتھ بہت کمزوری ہوجاتی ہے۔ اور بازوجھی متاثر ہوتا ہے۔ انگلیوں کے ناخن موٹے ، کا لے اور بھدے ہوجاتے ہیں۔ پاؤں کی انگلیوں میں شختی اور چیجین کا احساس ہوتا ہے اور ناخن موٹے ناخن موٹے وار میں موجاتے ہیں۔ پاؤں کی انگلیوں میں شخت دردہوتا ہے۔

گریفائنٹس کی تکلیفیں گرمی میں، رات کے وقت اور حیض کے دوران اور اس کے بعد بڑھ جاتی ہیں۔اندھیرے میں اور کپڑے لپیٹنے سے تکالیف میں کمی کا احساس ہوتا ہے۔

مددگاردوائیں: ارجنٹم نائٹر کیم۔ کاسٹیکم ۔ ہیپرسلف۔لائیکو پوڈیم۔ آرسنک۔ٹیوبر کیولائینم دافع اثر دوائیں: نکس وامیکا۔ا یکونائٹ طاقت: 30سے 1000 تک

گریشولا

102

413

گريشولا

GRATIOLA

گریشولا اگرچہ بہت کم استعمال ہونے والی دوا ہے لیکن بعض بیاریوں میں یا در کھنے کے قابل ہے۔اس میں اعصابی ، ذہنی اور جسمانی کمزوری بہت نمایاں ہوتی ہے۔اگر اعصاب میں نقابہت محسوس ہواورمریض ذہنی اور جسمانی طور پرتھکا ہوا ہوتو وہ بہی کیے گا کہ بہت کمزوری _____ ہے۔اگر گریشولا کاان دوسری بیاریوں سے بھی تعلق ہوجواس کی خاص کمزوری کے ساتھ مریض کو لاحق ہوں توبیتمام تکالیف کوفی الفور دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گریشولا کی ایک علامت یہ ہے کہ آنکھول میں بے چینی اور چیجن ہوتی ہے۔ آ تکھوں کے سامنے دھنداور جالاسا آ جاتا ہے۔اس میں نظر کی خرابی کی ایک خاص علامت بہہے کہ اس میں سب رنگوں کا اندھاین تو نہیں ہوتا صرف سبزرنگ سفیدنظر آنے لگتا ہے اور آئکھوں میں ایسی بے چینی محسوں ہوتی ہے جیسے ریت پڑگئی ہو گریشولا ایسی چیمن اور بے چینی کا اچھاعلاج ہے۔ ا گرعورتوں میں مالیخو لیا (Melancholia) یا یا جائے تو گریشو لا کا اس ہے بھی تعلق ہے۔ گریشولا میں پیر عجیب تضادیایا جاتا ہے کہ عورتیں بیرونی طور پراعصابی کمزوری محسوس کرتی ہیں لیکن اندرونی اعصاب جن کا رحم وغیرہ سے تعلق ہوتا ہے بہت زیادہ پر جوش ہو جاتے ہیں۔اگرلڑ کیوں میں ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو ان میں بے شرمی کا بہت زیادہ رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ان کے اعصاب کوٹھنڈا کرنے کے لئے اور جذبات کوضبط میں لانے کے لئے دوائیں دینایر تی ہیں۔بعض ایسی دوائیں ہیں جن کی علامات بہت وسیع ہیں اور ان کی پیچان بھی بہت نمایاں نہیں ہے لیکن اگر یہ علامت زیادہ علامتوں میں کیٹی

ہوئی نہ ہوبلکہ بہت نمایاں ہوتو گریشولا سے علاج شروع کرنا جاہئے۔

گریشولاکا مزاج گرمی اور سردی کے لحاظ سے پلسٹیلا سے ملتا ہے۔ نیز یہ بائیں طرف کی بیماریوں کی دوا ہے۔ اس لحاظ سے لیکیسس سے مشابہ ہے۔ اس میں جنسی اعضاء کا بیجان اگر چہڑ ینٹولا سے ملتا جلتا ہے مگرٹرینٹولا کی تکلیفیں دائیں طرف زور دکھاتی ہیں اور گریشولا کی بائیں طرف سے دائیں طرف حرکت نہیں بائیں طرف حرکت نہیں کہ طرح بائیں سے دائیں طرف حرکت نہیں کرتیں۔

گریشولابعض قتم کے نزلہ زکام میں بھی بہت کارآ مددوا ہے۔اس کا نزلہ اگر معدہ پر گرے تو ساتھ ہی شنج ہوجا تا ہے۔اچا تک بل پڑنے اور سکڑنے کا احساس ہوتا ہے۔اس کے علاوہ یہ معدہ کی عام خرابی کی بھی دوا ہے۔ گریشولا کے مریض کے معدہ کی خرابی میں اوپر کا ہونٹ سوج جاتا ہے۔ یہ علامت پلسٹیلا میں بھی یائی جاتی ہے۔

گریشولابعض اوقات کافیا کااثر زائل کردیتی ہے۔اسی طرح کافیا بھی اس کا اثر زائل کردیتی ہے۔اسی طرح کافیا بھی اس کا اثر زائل کرتی ہے۔ان دونوں دواؤں کی علامتیں ملتی ہیں۔اگرچہ کافیا کی اعصابی کمزوری میں وہ جوش نہیں پایا جاتا جو گریشو لا کا خاص نشان ہے کیکن اس کے باوجودیہ کہا جاتا ہے کہ گریشو لا کافیا سے مشابہ دوا ہے۔ایک بات واضح ہے کہ اگر رات کے پہلے حصہ میں نیند نہ آئے اور کافیا کی دوسری علامتیں موجود نہ ہوں تو یہ گریشو لا کی علامت ہے۔

گریشولامیں گلے کے درد میں نگلنے سے آرام محسوس ہوتا ہے۔ بعض ایسی دوائیں ہیں جن میں گلے کے در دمیں نگلنے سے اضافہ ہوجاتا ہے کیکن گریشولامیں نگلنے سے قدر سے افاقہ ہوتا ہے۔ اس لئے ایسام یض باربار گھونٹ بھرتا ہے کہ در دمیں کمی ہو۔

گریشولامیں چکربھی آتے ہیں جن کاعموماً کھانے سے تعلق ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے چکر آتے ہیں اور کھانے کے بعد چکر زیادہ ہوجاتے ہیں۔اس کے علاوہ آئکھیں بند کرنے سے ، پڑھنے سے اور بیٹھ کراٹھنے سے بھی چکر آتے ہیں۔ان علامتوں سے یہ بھی ظاہر ہوتا

ہے کہ مریض میں خون کی کمی ہے یااس کے خون کا دباؤ کم ہے۔

معدہ کی ایک عام بیاری متلی اور پیٹ میں ہوا کا اکھا ہوجانا ہے۔ گریثولا کی ایک خاص پہچان سے ہے کہ کھانا کھانے کے ساتھ ہی متلی ختم ہوجاتی ہے۔ اگر متلی ہوتو عمو ما اس میں کھانا کھانے ہود لنہیں چا ہتا لیکن گریشو لا میں سے بجیب علامت ہے کہ متلی کا علاج ہی کھانا کھانا ہے۔ اگر معدہ میں تیز ابیت ہوتو وقی طور پر کھانا کھانے سے فائدہ ہوتا ہے مگر پچھ دیر کے بعد تکلیف بڑھ جاتی ہے کہ جاتی ہوتو اس کا میہ مطلب نہیں ہے کہ جاتی ہو۔ یہ بائیڈ روکلورک ایسڈ (Hydrochloric Acid) کی زیادتی ہوگئ ہو۔ بسااوقات اس ضرور ہی ہائیڈ روکلورک ایسٹر (Hydrochloric Acid) کی زیادتی ہوگئ ہو۔ بسااوقات اس تیز اب کی کی کی وجہ سے بھی کھانا ہضم نہیں ہوتا جوگل سڑ کر دوسر نظامت می کی وجہ ہو۔ ڈکار یا ہلکی سے تیز اب کی زیادتی کی صورت میں تیز ابیت عموماً اس وقت محسوس ہوتی ہے جب ڈکار یا ہلکی سی ابکائی کے ساتھ تیز اب ابھر کر اوپر پہنچتا ہے، گلے کے قریب پہنچ جائے تو وہاں کھٹاس محسوس ہوتی ہے جبکہ معدہ میں کھٹاس کا اور تیز ابیت کا کوئی احساس نہیں ہوتا اور معدہ میں جلن کی بجائے دل میں جائن اور سکڑن کا احساس ہوتا ہے جیسے بعض نالیاں بند ہوگئ ہوں۔ یہ عموماً تیز ابیت کی علامت ہوتی ہے نہ کہ دل کی خرابی گی۔

گریشولا میں جلن کا احساس ہر جگہ محسوں ہوتا ہے۔بعض دفعہ اندرونی جلن اورسوزش الیی خواہشات کو ابھار دیتی ہیں جوغیر طبعی ہوتی ہیں۔مریض خواہ مرد ہویا عورت دونوں کا علاج گریشولا سے ممکن ہے۔

گریشولا کے مریض میں خصوصاً اجابت کے بعد دل کی دھڑکن تیز ہوجاتی ہے۔ یہ گریشولا
کی خاص نشانی ہے۔ ہومیو پیتھک ڈاکٹر ول کوچا ہئے کہ سب ملتی جلتی علامتیں رکھنے والی دواؤں کو دماغ
میں اکٹھا محفوظ رکھنے کا گرسیکھیں تا کہ ضرورت کے وقت یاد آ جا ئیں۔ پھران سب کی علامات کا گہرائی
میں جائزہ لے کرایک دوسرے سے تفریق کرنی سیکھیں۔ اگرینہیں کریں گے و ذہن میں ہروقت الجھن
میں جائزہ لے کرایک دوسرے سے تفریق کیکن کچھیا ذہیں آئے گا، پھر تک بازی سے کام لینا پڑے گا۔ اس

لئے دماغ میں تمام دواؤں کی لائبریری بنائیں۔ یہ ہومیو پیتے معالجین کے لئے بہت ضروری ہے کہ ان کے دماغ میں ایک مکمل اور ترتیب وار لائبریری ہو۔ایک علامت کا پیتہ کر کے اس حصہ میں پہنچ جائیں، پھراس کے ذیلی حصہ میں پہنچ جائیں، چہراں علامتوں کے نمبر لگے ہوں۔اس نظام کو ذہن نشین کرنا بہت اہم ہے۔ایک ہومیو پیتے کے لئے اپنی یا دداشت کو مرتب کرنے میں ہی اس کی کامیا بی کاراز ہے۔ورنہ کی کاعلاج کرنا مصیبت بن جائے گا۔دوسروں کے سردردکودورکرنے کی کوشش میں این میں دردہونے لگے گا۔

طاقت: 30 سے 200 تک

103



GUAIACUM

گائیکم بہت گہرااثر کرنے والی اور بہت طاقتور دوا ہے لیکن ہومیو پیتے بالعموم اسے بہت کم استعال کرتے ہیں۔ بھی بھار بہت ماہر ڈاکٹر ول نے اسے استعال کیا ہے ور نہ عمو ما بینظروں سے ہٹی رہتی ہے۔ یہ بائی کی در دول اور گنٹھیا (Gout) میں کام آتی ہے۔ اگر موروثی سل کے مادول کی علامت پائی جائے تو بھی گائیکم پرنظر رکھنی چاہئے۔ اس میں اسہال کار جحان پایا جاتا ہے۔ Tendon یعنی وہ سفید ڈورے جوعضلات کو ہڈی سے ملاتے ہیں سکڑ جاتے ہیں اور ان میں تناؤ پیدا ہوجاتا ہے جس کی وجہ سے ٹائکیں اور باز وپوری طرح سے کھلتے نہیں اور دردمحسوں ہوتا ہے۔ اس میں تاؤ پیدا ہوجا تا ہے جس کی وجہ سے ٹائکیں اور باز وپوری طرح سے کھلتے نہیں اور دردمحسوں ہوتا ہے۔ اس تکیف میں گائیکم مفید ہے۔

گائیم کی تکلیفیں گرمی سے بڑھتی ہیں اور ٹھنڈ سے آرام آتا ہے۔اس لحاظ سے بیلیڈم، پلسٹیلا، لیک کنیائینم اور آیوڈم سے مشابہ ہے لیکن ان سب میں باہم فرق کرنے والی علامتیں ہیں جن کی شناخت ہوجائے تو آسانی سے اصل دواذ ہن میں آجائے گی۔

گائیکم کے مریض وجع المفاصل کی وجہ ہے عموماً جھک کر چلنے لگتے ہیں۔ان کے گھنے جواب دے جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں اکڑ جاتے ہیں، اور بعض اوقات بالکل معذور ہوجاتے ہیں۔ان کے معلامت یا کہ معدور ہوجاتے ہیں۔ ان کے معلامت کے علامت میں گائیکم کے علاوہ کولچیکم بھی مفید دواہے جس کی اہم علامت یہ ہے کہ تکلیف پاؤں کے انگو سے سے شروع ہوتی ہے۔ گائیکم کی نمایاں علامت سے کہ ماؤف حصہ شخت زود حس ہوتا ہے اور کسی قتم کا کمس برداشت نہیں ہوتا گرمی پہنچانے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ جوڑوں پر وجع المفاصل کا اثر ہوتو ناسور اور پھوڑے بھی بننے لگتے ہیں۔ گائیکم کا ہڑیوں سے بھی گہراتعلق ہے۔ ہڑیاں نرم ہو کر

ٹیڑھی ہونے گئی ہیں اورا شخنج کی طرح ہوجاتی ہیں۔ یہ تکلیف عموماً کلکیریا کارب کی یا دولاتی ہے۔ کیکن اگر وجع المفاصل کا بھی رجان ہوتو گائیکم بہت مفید دوا ہے۔ گائیکم کی ایک اور علامت یہ ہے کہ مریض شخت تھکا و محسوس کرتا ہے۔ ہلکی سی حرکت سے بھی جسمانی کمزوری کا احساس ہوتا ہے جو بڑھتے بڑھتے اعصاب پر اثر انداز ہونے گئی ہے اور پھراس کمزوری کا احساس بدنی کمزوری برنتج ہوتا ہے اور جسم سو کھنے گئا ہے۔

گائیکم سل کے ابتدائی مراحل میں بہت مؤثر دواہے۔اگرخون میں بلی مادے موجود ہوں اور وجع المفاصل کے ساتھ پھوڑے پھنسیاں نکلنے کا رجحان بھی ہواور جسم میں دردیں ہوں تو گائیکم بہت مفید دواہے۔

گائیکم اینٹی سورک (Antipsoric) دوابھی ہے یعنی ایسی جلدی امراض میں جو سورائسسس (Psoriasis) اور کوڑھ وغیرہ سے تعلق رکھتی ہیں ان میں مفید ہے۔ سلفراور سورائینم کھی چوٹی کی اینٹی سورک دوائیں ہیں۔ سلفر کا مزاج گرم ہوتا ہے جبکہ سورائینم کا مریض ٹھٹڈا ہوتا ہے۔ لیکن محض سلفراور سورائینم ''سورا'' کی بیاریوں کی ہرقتم کوٹھیک نہیں کر سکتیں۔ جب بیز لاتی جھلیوں پر جملی ور ہوں تو بہت ہی اور دواؤں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر بیا گیٹکل میں ظاہر ہوں تو اس کی قسموں کے مطابق تلاش کرنی پڑتی ہے۔ اگر ''سورا'' کی وجہ سے کوئی مرض ظاہر ہواور اس کی دوا بظاہر پہچان کی جائے لیکن تھوڑے سے فائدہ کے بعد شفایا بی رک جائے تو اس صورت میں لازماً ونچی طافت میں کوئی اینٹی سورک دوائیں دینی پڑیں گی۔ اگر براہ راست ان کی علامتیں موجود ہوں تو پھر یوٹر فائدہ دیں گی مگر بسااوقات ان کی براہ راست علامتیں نہیں ملتیں۔ ایسی صورت میں ہے ''سورا'' کے عمومی تریا تی کے طور پر کام آئیں گی اور مرض سے ملتی جلتی ملتیں۔ ایسی صورت میں ہے ''سورا'' کے عمومی تریا تی کے طور پر کام آئیں گی اور مرض سے ملتی جلتی ملتیں۔ ایسی صورت میں ہے ''سورا'' کے عمومی تریا تی کے طور پر کام آئیں گی اور مرض سے ملتی جلتی ملتیں۔ ایسی صورت میں ہے ۔ اگر کوتازہ کر دیں گی۔ دوسری دواؤں کے اثر کوتازہ کر دیں گی۔

جلدی بیاریوں کی الیمی بہت سی قشمیں ہیں جو مزاجی دوا طلب کرتی ہیں۔ اگر وہ دوا کیس جوغور وخوض کے بعد چنی جائیں فائدہ نہ دیں تو پھر اینٹی سورک دواؤں کی لازماً ضرورت پڑتی ہے۔ وہ بیاری کے مزاج کو نرم کرکے اثر قبول کرنے کے قابل بنا دیتی

ہیں۔ایسی دواؤں میں سلفر اور سورائینم کے علاوہ مرک سال، ٹیوبر کولینم اور سیفلینیم بھی شامل ہیں۔اسی طرح گائیکم بھی ایک اینٹی سورک دواہے۔

چہرے کے اعصابی دردوں سے بھی اس کا تعلق ہے۔ گائیم میں چہرے کے ایک طرف اعصابی درد ہوتا ہے۔ سپائی جیلیا چرک گئی ہو۔ یہ درد بہت نکلیف دہ ہوتا ہے۔ سپائی جیلیا چہرے کے بائیں طرف کے اعصابی دردوں میں اور سلیٹیا اور میگ فاس دائیں طرف کے دردوں میں بہت مفید دوائیں ہیں۔

گائیم میں آ تکھیں متورم ہوجاتی ہیں۔ پتلیاں پھیلی ہوئی اور پپوٹے سکڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ آ تکھے اردگرد پھنسیاں نکلی ہیں، بھی بھی کان میں بھی درد کے دورے پڑتے ہیں۔ بید ردکسی افلیشن اور وہائی مرض کے نتیجہ میں نہیں ہوتا۔ ظاہری طور پر کسی ورم اور سرخی کا نشان بھی نہیں ہوتا۔ جب بیدردختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو سرمیں بھی سوئی کی ہی چیجن محسوں ہوتی ہے۔ اگر کسی مریض کو شدید بہنے والا نزلد ہوجس کے ساتھ ناک کی ہڈیوں میں درد ہوتو اسے گائیکم سے افاقہ ہوسکتا ہے۔ اس میں نزلد کے ساتھ دانتوں کی ہڈیوں میں بھی درد ہوتا ہے۔ یو پیٹوریم پرف (Eupatorium perfol) ہڈیول کے دردوں کے لئے نمایاں شہرت رکھتی ہے لیکن اس کا دائر وعمل محدود ہے۔ عموماً انفاؤ نزاوغیرہ کے بخار میں فائدہ دیتی ہے۔ ایک چھوٹا سا اڑنے والا کیڑا جے عرف عام میں'' کتری'' کہتے ہیں خشک علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے کا نئے سے بہت شخت جلن اور سوزش ہوتی ہے اور ہڈی تو ٹر بخار ہوجا تا ہے۔ اس کے کا نئے سے بہت شخت جلن اور سوزش ہوتی ہے اور ہڈی تو ٹر بخار ہوجا تا ہے۔ ایو پیٹوریم پرف اس

گائیکم کے دردوقت کے بہت پابند ہیں۔ ہڈیوں کے دردخصوصاً دانتوں کے پنچے ہڈی میں دردا کثر رات کو بڑھتا ہے۔ اگر 6 بجے شام کو شروع ہواور صبح 4 بجے تک جاری رہے تو گائیکم کو نہ بھولیں۔ دیگر علامتیں بھی مل جائیں تو یہ بہت زود اثر دوا ہے۔ اگر وجع المفاصل اور گنٹھیا کی تکلیف ہوتو گلاخراب ہونے کا رجحان بھی ہوتا ہے۔ گلاخراب ہوتو سارے جسم میں اعصابی اور جوڑوں کے درد ہونے گئتے ہیں۔ دانتوں میں دردکی

وجہ سے بھی جسم میں شدید دردیں ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر عموماً مشورہ دیتے ہیں کہ دانت یا ٹانسلز (Tonsils) نکلوا دیں لیکن نکلیف پھر بھی باقی رہتی ہے۔اگر وقت پر گائیکم دے دی جائے تو اپریشن کی نوبت نہیں آتی۔

گائیکم میں بیشاب کی بار بار حاجت محسوس ہوتی ہے کین آتانہیں ہے۔ بےسود کوشش سے بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد سوئی کی ہی تیز چیم محسوں ہوتی ہے۔ وجع المفاصل کی مریض عورتوں کو بیضة الرحم میں مستقل سوزش ہو جاتی ہے۔ بندش حیض اور رحم کی بعض دوسری تکالیف لاحق ہو جاتی ہیں۔بسااو قات حیماتی میں کسی چیز کی سرسراہٹ محسوس ہوتی ہےاورجلد سکڑ جاتی ہےاوراس پر حچھوٹے حچھوٹے دانے نمودار ہوجاتے ہیں۔ گائیکم میں دل کی دھڑکن نیز ہونے کی علامت بھی یائی جاتی ہے۔خشک کھانسی کے ساتھ بخار ہو جا تا ہے۔بعض دفعہ ح<u>ھاتی کے ع</u>ضلات میں بائی کی دردیں ہوتی ہیں جن میں سردیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دل میں بھی اکثر دردمحسوس ہوتا ہے۔اگرجسم میں جوڑوں کے درد ہوں اورکسی تیز دوا سے وقتی طور پر انہیں آ رام آ جائے تو فاسد مادےخون میں گھل کردل کے والوز (V olves) کو کمز ورکر دیتے ہیں اور دل میں ایبا در دہوتا ہے جیسا وجع المفاصل کا ہوتا ہے۔اسے دل کی ریخی در دیں کہتے ہیں۔اگرفلو (Flue) کا فاسد مادہ دبا دیا جائے اور دل پر اثر ظاہر ہوتو اس کے لئے سائی جیلیا اولین دوا ہے۔ گاؤٹ (Gout) کے مادے دبانے سے جواثرات ظاہر ہوں ان میں بھی سائی جیلیا ہی کام آتی ہے گر گائیکم اس تکلیف اور دل کی ریخی در دوں میں زیادہ مفید ہے۔ بیدر دیں گردن کے پچھلے حصہ میں ہوں ، اعصاب جکڑے ہوئے محسوس ہوں اور گر دن کوحر کت دینا بھی مشکل ہوتو گائیکم کونہیں بھولنا جا ہے ۔ بیہ باز وؤں کے اوپر والےحصوں میں ، رانوں میں اور انگلیوں کے جوڑوں میں بھی دردوں کے لئے مفید دواہے۔ گائیکم میں گردے کی تکلیفیں بھی ملتی ہیں۔عموماً ایسے مریضوں کو بہت پسینہ آتا ہے

جومفید ہوتا ہے کیونکہ جب تک پسینہ آتا رہے گردوں کی کوئی تکلیف اور علامت ظاہر نہیں ہوتی۔
اگر پسینہ بند ہوجائے تواچا نگ گردے کی تکلیف کا حساس شروع ہوجائے گا۔اگرا یسے مریض کو
سردیوں کے موسم میں اچا نگ گردے کی تکلیف ہوا وراسے گرمی پہنچا کر پسینہ کے ممل کو بحال کر دیا
جائے تو تکلیف کم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پسینہ کے ذریعہ جلد سے جو زہر یلے
مادے خارج ہوتے ہیں ویسے ہی مادے گردوں کے پیشاب میں بھی خارج ہوتے ہیں۔
گردوں اور جلد سے نکلنے والے مشترک مادے اس بیاری کے ذمہ دار ہیں۔گائیکم ان مادوں اور
نمکیات وغیرہ کا توازن بحال کر کے شفادیتی ہے۔

گائیکم کی تکلیفیں حرکت سے، گرمی سے، دباؤ اور چھونے سے بڑھ جاتی ہیں۔ بیرونی دباؤسےان میں کمی ہوتی ہے۔

> دافع اثر دوائيں: نکس واميكا۔سيپيا طاقت: 30 يا بعض دفعه اونچی طاقتيں

104 ہیماٹوکسی لون HAEMATOXYLON

بنیادی طور پرید انجائل کی دوا ہے۔ اس میں سکڑن اور نگی کا ایک خاص احساس پایا جاتا ہے۔ یول محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے سینے پر پھر کی سل رکھ دی ہو۔ جسم کے دوسر بے حصول میں بھی سکڑن کا احساس پایا جاتا ہے۔ معدے میں ہوا، در داور کھر چن کا احساس اٹھتا ہے جو گلے تک پہنچتا ہے اور دل کے مقام پر در داور تشنج پیدا کرتا ہے۔ چھونے سے تکلیف ہڑھ جاتی ہے۔ ہی ہوجس کر ہتا ہے۔ ہیما ٹوکسی لون کا اثر کیمفر سے ذائل ہوجاتا ہے۔

طاقت: 30

105

<u>ہیڈی او ما</u>

HEDEOMA

سرمیں صبح کے وقت بھاری بن یا ایسا در دجیسے کسی نے زخم لگا دیا ہو۔ کمزوری زیادہ جسے لیٹے رہنے سے آ رام آتا ہے۔معدہ میں سوزش اور زود حسی، ہر چیز کھانے یا پینے سے معدہ میں درد، زبان پر سفیدی، متلی اور ہواؤں سے پیٹ چھولا ہوااور دکھتا ہوا۔

پیشاب کی علامتوں میں بدایک غیر معمولی اثر دکھانے والی دوا ہے۔ جب پیشاب مثان درمائے کی درمنٹ سے زیادہ اس کاروکنا محال ہوجا تا ہے۔ پیشاب کی نالی اور مثانے کی گردن میں جلن اور بے چینی ، بائیں گردے کے مقام پر درد کا عمومی احساس اور گردے کے مقام سے مثانہ میں درد اثر تا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس دوا کا پیشاب کے عوارض سے ایسا گہر اتعلق ہمقام سے مثانہ میں درد اثر تا ہوا محسوس ہون تو پیشاب کی تکالیف دور کرنے میں بینمایاں اثر رکھتی ہے۔ ہے کہ باقی علامتیں موجود نہ بھی ہوں تو پیشاب کی تکالیف دور کرنے میں بینمایاں اثر رکھتی ہے۔ وہ عور تیں جن کے رحم میں دردیں بنچے کی طرف اثر تی ہوئی محسوس ہوں اور بیضہ دائی وہ تو تو توں ہوں تو بیدواان کی بہترین مددگار ثابت ہوتی ہے۔ لیکوریا جلن والا اور خارش پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ عورتوں کی بہترین مددگار ثابت ہوتی ہے۔ لیکوریا جلن والا اور خارش پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ عورتوں کے رحم کے کینسر میں بھی اس دواکواور پوکس اری ٹینس (Pulex Irritans) کو میں نے بہت مفید پایا ہے۔ رحم کی اندرونی جھلیوں کو صحت بخشنے میں یہ دونوں دوائیں بہت اچھا کام کرتی بین حالانکہ کتابوں میں ان کی اس نہایت اہم خولی بہت اچھا کام کرتی بین حالانکہ کتابوں میں ان کی اس نہایت اہم خولی بہت اچھا کام کرتی بین حالانکہ کتابوں میں ان کی اس نہایت اہم خولی بہت اچھا کام کرتی بین حالانکہ کتابوں میں ان کی اس نہایت اہم خولی

کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ مجھے بیہ بات مریضوں پر تجربہ سے معلوم ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس کا تجربہ کرے گاید دوائیں اسے مایوس نہیں کریں گے۔

طاقت: نمبر 1 طاقت با دوسری حچھوٹی طاقتیں

106 ميڪل لاوا HEKLALAVA

Mount Hecla ایک پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ سے نکلنے والے لاوے سے ایک دواہنائی اس میں سے دواہنائی کئے ہے جو ہمیں کلا لاوا کہلاتی ہے۔ میرے خیال میں صرف یہی ایک لاوا ہے جس سے دواہنائی گئی ہو۔ گئی ہے۔ کسی اور لاوے کے بارے میں مجھے علم نہیں کہ اس سے کوئی ہومیو پیتھی دواہنائی گئی ہو۔ گئی ہے۔ کسی اور لاوے کے بارے میں مجھے علم نہیں کہ اس سے کوئی ہومیو پیتھی دواہنائی گئی ہو۔ ان سب لاووں کا مادہ تو قریباً ایک جسیا ہی ہوگا لیکن ہرزمین میں موجود مادہ کا اثر ایک دوسرے سے کسی حد تک مختلف بھی ہوسکتا ہے اس لئے دوسرے پہاڑوں کے لاوے پر بھی تجربہ کرنا چاہئے۔

ہمیکلا لا وا کااثر خاص طور پر ہڈیوں پر ہوتا ہے، خصوصاً چہرے اور جبڑے کی ہڈیوں پر ہوتا ہے، خصوصاً چہرے اور جبڑے کی دواسے پر بعض دفعہ دانت خراب اور بوسیدہ ہونے کی وجہ سے بہت تکلیف دیتے ہیں اور کسی دواسے ٹھیک نہیں ہوتے تو ہمیکلا لا وا کام آتا ہے۔ ہمیکلا لا وا کی زیادہ ترشہت تو چہرے اور جبڑے کی ہڈیوں میں مفید ہونے کی وجہ سے ہے گریہ تمام جسم کی ہڈیوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ بعض دفعہ جبڑا سوج کر بہت موٹا ہو جاتا ہے۔ سب علامتیں عموماً ہمیکلا لا واسے ملتی ہیں لیکن اس کے با وجو داس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ اس سلسلہ میں سب سے اہم اور مؤثر دواسلفر ہے جو ایسی خطر ناک علامتوں میں بھی کام کرتی ہے جن کے بارے عام معالجین کا بیے خیال ہوتا ہے کہ بینا قابل علاج ہو چکی ہیں۔ مثلاً جبڑے کی ہڈی کا کینسر ہوتا ہو جہ بہت بڑھ چکا ہو۔ اس کے نتیجہ میں شدید تکلیف ہوتی ہے، اس سے کان بھی متاثر ہوتا ہے۔ میں نے بار باا یسے مریضوں کا سلفر کے ذریعہ کا میاب علاج کیا ہے۔ ایک مریضہ اس

ہیں کا لاوا یقیناً مفید دوا ہو گی لیکن ذاتی طور پر مجھے اس کی افادیت کا کوئی تجربہ ہیں۔ تا ہم بعض ہومیو پیتھاس کی بہت تعریف کرتے ہیں۔

ہیں کلا لاوا کی خاص علامت بیر بتائی جاتی ہے کہ جبڑوں کی ہڈی میں درد ہوتا ہے۔ جبڑوں کے اردگر دسوزش نمایاں ہوتی ہے اور جبڑے کی ہڈی بڑھ جاتی ہے۔

مڈیوں کی گہری بیار یوں میں مئیں نے سلفر کے علاوہ کلکیر یا کارب کوبھی ہمیکلالاوا سے بہت زیادہ مفید پایا ہے۔ میں نے اسے ہڈیوں کے کینسر کے ایسے مریضوں کوجن کا کینسر کلینیکل لیبارٹریز کے تجزیہ سے قطعی طور پر ثابت ہو چکا تھا۔ او نچی طاقت میں دے کردیکھا ہے۔ اللہ تعالی کے فضل سے چند مہینے کے علاج کے بعد بیاری بہت حد تک قابو میں آگئی۔ ایسے مریضوں کا لمباعرصہ احتیاط سے علاج کرنا پڑتا ہے اور صرف کلکیر یا کارب پر ہی اکتفانہیں کی جاتی بلکہ اگر مریض کی علامتوں پر گہری نظر رکھی جائے تو بعض دفعہ مرض کی علامتیں بعض دوسری امدادی دواؤں کی نشاند ہی کرتی ہیں۔ پس مرکزی دواتو کلکیر یا کارب ہی رہے گی کیکن اور بہت ہی امدادی دواؤں کی نشاند ہی کردگار ثابت ہو سکتی ہیں۔

کلکیر یا کارب خاص طور بر کمیاشیم کی تمی سے پیدا ہونے والی ہڈی کی تکلیفوں میں مفید

ہے۔سلفر کا بھی اس سے تعلق ہے اور بیسلفر کی مزمن دواہے۔ٹانگوں کے نیچلے حصہ کی ہڑیوں میں سلفر کی بجائے عموماً کلکیر یا کارب زیادہ کام کرتی ہے۔ ہاتھوں کے ٹیومر پر بھی بیاثر انداز ہوتی ہے۔

میں ہیں کا لاواسے زیادہ استفادہ نہیں کرسکا۔ ہوسکتا ہے کہ مجھے اس کی علامتوں پر پورا عبور نہ ہو۔ اس کئے میں باقی ہومیو پیتھس کوہیں کلا لاوا سے کلیتاً بدول نہیں کرنا جا ہتا۔ وہ ہیں کا لاوا پر مختلف ڈاکٹروں کی تحریریں پڑھ کراگراس کے مزاج کواچھی طرح سمجھ لیں اور پھر مختلف طاقتوں میں اس کا مریضوں پر تجربہ کریں تو ہوسکتا ہے کہ میری ناکامی کے باوجودوہ کا میاب ہوجائیں۔

جن دنوں بچوں کے دودھ کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں اس وقت دانتوں کے نکلنے میں آسانی پیدا کرنے کے لئے بعض ڈاکٹر ہیں کلا لاوا کو بہت مفید بتاتے ہیں۔اس کا بھی مجھے کوئی ذاتی تجربہ نہیں لیکن اس کی بجائے میں بائیوکیمک کا جومر کب نسخہ استعمال کرتا ہوں وہ بلاشبہ غیر معمولی طور پر فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور وہ ہیہ ہے۔

كالى فاس+ فيرم فاس+سليشيا+ كلكير يافاس+ كلكير يافلور_

مزید براں بینسخہ ہڈیوں کے کینسر کی بعض قسموں میں اور ہڈی کی ہیرونی جھلیوں کی تکالیف میں بھی اچھااثر دکھا تا ہے۔

جہاں تک ہومیو پیتھک کتب کا تعلق ہے وہ ہیں کلا لا واکوکان کے پیچے ہڈی میں گانھوں، ہڈی کے غلاف کی سوزش، ناک کی ہڈی کے زخم، چہرے کے اعصا بی در دجو دانت نکلوانے کے بعد یا دانت میں کیڑا لگنے کی وجہ سے پیدا ہوں اور گردن کے غدود بڑھ کرسکڑ جائیں تو ان سب میں مفید بتاتی ہیں۔مرطوب موسم میں اس کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔

> دافع اثر دوائيں: کیمفر۔ چائنا طاقت: 30 اوراس سے اونچی طاقتیں

107

ہیلی بورس نائیگر

HELLEBORUS NIGER

(Snow Rose)

ہیلی بورس نائیگر پھولوں کے ایک پودے سے تیار کی جانے والی دوا ہے جسے برفانی گلاب کہاجا تا ہے۔اس پودے کی جڑوں کو پیس کریددوا تیار کی جاتی ہے۔

ہیں بورس کی سب سے نمایاں علامت و ماغ کا معطل اور ماؤف ہوجانا ہے جس کی وجہ سے جسمانی افعال میں بے تہیں پیدا ہوجاتی ہے۔ دماغ اور ریڑھ کی ہڑ کی کی جھلیوں میں سوزش ہونے کی وجہ سے اعصابی نظام متاثر ہوتا ہے اور پاگل بین کی علامتیں بھی پیدا ہوجاتی ہیں۔ ہیلی بورس ایسی دوا ہے جوخدا کے فضل سے ان سب علامتوں کو دور کر کے مریض کو وہنی لحاظ ہیں۔ ہیلی بورس ایسی دوا ہے جوخدا کے فضل سے ان سب علامتوں کو دور کر کے مریض کو وہنی لحاظ سے بالکل تندرست کر دیتی ہے۔ ہیلی بورس میں اعضاء اور عضلات کے نظام پر کنٹر ول نہیں رہتا اور وہ دماغ کے پیغام کو دریہ سے قبول کرتے ہیں۔ دماغ حکم تو جاری کر دیتا ہے لیکن عضلات حکم کی اور وہ دماغ کے پیغام کو کئی ہنیا دی اعصابی نظام متاثر ہوتا ہے۔ ہیلی بورس کے مریض کو پچھ کہا جائے تو شروع میں وہ بالکل کوئی رؤمل نہیں دکھاتا۔ اسے بات سمجھانے کے لئے جمجھوڑ نا پڑتا ہے۔ اس کے خیالات مجتمع نہیں ہوتے اور اسے کوئی کام کرنے کے لئے حد درجہ توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ وہ پچھ بھی نہیں کرسکتا۔ اس میں خاص قسم کی غنودگی اور بے حسی پائی جاتی ہے اور رہے کیفیت بعض اوقات بے ہوشی تک پہنچ جاتی ہے۔

بعض اوقات ہیلی بورس کے مریض کو برغم خود شیطان اور بدروحیس دکھائی دینے گئی ہیں اور وہ اس خوف میں مبتلا ہوجا تا ہے کہ وہ کوئی ایسا گناہ کر ببیٹھا ہے جس کی بخشش ناممکن ہے۔آ رم کیکییسس اور سٹرامو نیم میں بھی ایسی بھیا نک سوچیں پائی جاتی ہیں۔

اگر سرمیں پانی جمع ہونے لگے اور اس اندرونی دباؤ سے سر بڑا ہونے لگے تو اس

یماری میں جے ہائیڈروکیفیلس (Hydrocephalus) کہتے ہیں گئی دوائیں کام آتی ہیں۔ سب سے مؤثر دواسلیشیا ہے۔ ہیلی بورس بھی اس مرض میں مفید بتائی جاتی ہے۔ جب بچہ کا سر بڑا ہوجائے اور آئکھیں سکڑ جائیں تو بچہ اچا تک دل ہلا دینے والی چینیں مارتا ہے۔ یہ علامت نمایاں طور پر ایپس اور آئکھیں سکڑ جائیں تو بچہ اچا تک دل ہلا دینے والی چینیں مارتا ہے۔ یہ علامت نمایاں طور پر ایپس (Apis) میں یائی جاتی ہے۔ ایپس میں چونکہ ڈک والے در دجسیا احساس پایا جاتا ہے اس لئے سر کے اندر پانی کے دباؤکی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے اس میں بھی ڈنک لگنے کا سا در دہوتو ایپس دینے دکھاتی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس سلیشیا جلدتر اثر سے بچوں کو افاقہ ہوتا ہے۔ لیکن ایپس کا اثر بچھ آ ہستہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس سلیشیا جلدتر اثر دکھاتی ہے۔ ہائیڈروکیفیلس کے دوران دماغ کی بیرونی جھلی کی سوزش سے نکلنے والی رطوبت کو میں میں بڑنے والے سلسل دیاؤکو کم کر دیتی ہے۔ اگر بیکمل شفانہ بھی دیتو بچھنہ بچھ فائدہ ضرور پہنچاتی ہے۔

مرگی نے ایسے دوروں میں جن میں مریض ہوش وحواس نہیں کھونا اور آئکھیں کھی رہتی ہیں ہیلی بورس بہت مفید دوا ہے۔ جب ایسی مرگی کا دورہ ختم ہو جائے تو مریض پر اچا تک سخت تھ کا وٹ اور غنودگی طاری ہو جاتی ہے۔

ہیلی بورس میں سر کا درد اندر سے باہر کی جانب حرکت کرتا ہے۔ پیشانی اور آئھوں پر
سخت دباؤ ہوتا ہے۔ آئکھیں او پر چڑھ جاتی ہیں۔ درد کے اثر سے آئکھیں جینگی ہو جاتی ہیں۔
روشنی سے بہت زود حسی ہوتی ہے۔ سرمیں بھاری پن اور اندر گہرائی میں گرمی کا حساس ہوتا ہے۔
مریض درد کی شدت سے کراہتا ہے۔ بھوک پیاس ہونے کے باوجود کچھ کھا پی نہیں سکتا۔ غذا کی
نالی میں جلن ہوتی ہے۔ بیب میں ہوا اور گڑ گڑ اہٹ معدہ کے مقام پر دباؤ اور چلتے ہوئے یا
کھانستے ہوئے معدہ میں درد ہوتا ہے۔

ہیلی بورس میں عمومی کمزوری بہت نمایاں ہوتی ہے جوبعض اوقات فالج کا باعث بن جاتی ہے۔ خصوصاً بچوں میں اگر پیشاب گہرے رنگ کا آئے۔ حاجت بہت ہوگر بچہ پیشاب نہ کر سکے اور مثانے پر دباؤ ہڑھتا چلا جائے تواس مرض میں ہیلی بورس بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔

ایک طرف کے باز واور ٹانگ کی مسلسل خود بخو د ہونے والی حرکت میں بھی ہیلی بورس مشہور دواہے۔ انگوٹھا مڑ کر ہتھیلی میں دھنس جا تا ہے۔ ایسے مریض کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان چھالے بھی نکل آتے ہیں۔ یہ ساری علامتیں ہیلی بورس کا فوری تقاضا کرتی ہیں۔ ہائیڈرویفیلس سے اس دوا کے تعلق کا ذکر گزر چکا ہے۔ ایسے بچے کی سوتے میں چینیں ایپس (Apis) کے بچے کی چینوں سے ملتی ہیں مگر ایپس کے مریض میں جسم کے ایک طرف کے باز وؤں اور ٹاگوں کا لرزتے رہنا نہیں پایا جاتا۔

ہیلی بورس کے مریض کی جلد پر چھلپھلی ورمیں بھی پائی جاتی ہیں اور نیلگوں داغ بھی ملتے ہیں۔سرکے بالوں اور ناخنوں کا حجھڑنا بھی اس کی علامات کے دائر ہمیں ہے۔

> دافع الردوائين: كيمفريسنكونا (جإئنا) طاقت: 30سے 1000 تك

ہلونیس 435

108

ہلونیس

HELONIAS

ہیلونیس ایک بہت اہم دوا ہے جوخصوصاً عورتوں کی بیاریوں سے تعلق رکھتی ہے۔اس کا رحم کی گردن کے کینسر سے گہراتعلق ہے۔کار بوائیسیلس بھی اس کینسر میں مفید ثابت ہوسکتی ہے بشرطیکہ دیگراعضاء سے تعلق والی علامتیں بھی موجود ہوں جبکہ ہیلونیس کا تعلق براہ راست رحم کے کینسر سے ہے اور بیضر ور کچھ نہ کچھ کام دکھاتی ہے۔رحم کی گردن میں سوزش اور سرخی ظاہر ہواور اسی مرحلہ پر ہیلونیس دے دی جائے تو بہت مؤثر ثابت ہوگی۔اگر ہیلونیس سے کممل شفانہ ہوتو اس کے بعد کار بوائیسیلس دینی جا ہے۔ امید ہے کہ انشاء اللہ ان دونوں دواؤں کے استعمال کے نتیے میں کممل شفاہو جائے گی۔

اگرکسی عورت کاهمل ساقط ہوجائے اور رحم بھی ڈھلک جائے نیز سامنے اور بیچھے سے دباؤ محسوں ہو، چلتے ہوئے تکلیف بڑھے یارتم اپنی جگہ چھوڑ کر دائیں یا بائیں طرف چلا جائے تو ہیلونیس رحم کے اعصاب کوطاقت دے کراسے واپس اپنی اصل حالت کی طرف لوٹا دیتی ہے۔ رحم کے دائیں یا بائیں منتقل ہونے کی علامت سے مجھے خیال آیا کہ وہ جنین جو پیٹ میں صحیح پوزیشن میں نہیں ہوتے بلکہ ٹیڑھی حالت میں رہتے ہیں ان کوسی پوزیشن میں لانے کے لئے بھی بید دوااستعال کرنی چاہئے۔ امید ہوگا۔ اگر جنین الٹی حالت میں ہوتو پلسٹیلا 30 یا 30 یہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ وہ غریب ممالک جہاں فوری اپریشن کی سہولت مہیا نہ ہو وہاں ایسی حاملہ عورتیں بہت تکلیف اٹھاتی ہیں اور بعض اپنی جان سے بھی ہاتھ دھوبیٹھتی ہیں۔ ان ممالک میں ایسی حالت میں کام آنے والی دوائیں ایک ہومیو پیچے کواز بر ہونی چاہئیں۔ مثلاً پلسٹیلا ،کولوفائیلم ،ہیلونیس۔ نیز

وضع حمل کے وقت حکسیمیم ،کالی کارب اور آرنیکا بہت مفیداور ضروری ہیں اور وضع حمل کے بعد کی پیچید گیوں مثلاً برسوتی بخار وغیرہ کے خلاف حفظ ما تقدم کا کام دیتی ہیں۔اگر برسوتی بخاریعنی وضع حمل کے دوران یا بعد تعفن پیدا ہونے سے بخار ہو بھی جائے تو سلفر اور پائیر وجینم دونوں کو 200 طاقت میں ملا کر حسب ضرورت بخار ٹوٹنے تک دن میں تین بار اور بخار ٹوٹنے کے بعد چند دن روز اندا یک بار دیتے رہیں تو یہ بہترین علاج ہے۔

ہیلونیس ذیابیطس میں بھی بہت مفید ہے۔ اگر عورتوں کو رحم کی تکلیفوں کے ساتھ ذیابیطس بھی ہوتو یہ دونوں تکلیفوں کو دور کرسکتی ہے۔ کم سے کم ایک ماہ تک مسلسل استعال کروانی چاہئے۔ اگر ذیا بیطس کم ہونے گئے تو بیا کیلی دوا ہی کافی ہوگی ورنہ ذیا بیطس کی دوسری دوائیں تلاش کریں۔

ہیلونیس کی ایک اور علامت ہے ہے کہ حیض جلدی جلدی ہوتا ہے یا پھر کئی گئی ماہ کے لئے بند ہوجا تا ہے۔ سخت افسر دگی کے دور سے پڑتے ہیں اور مریضہ بہت ست ہوجاتی ہے۔ شدید لیکوریا آتا ہے جس کے ساتھ خارش بھی ہوتی ہے۔

ہیلونیس کا گردول سے بھی تعلق ہے۔ گردول میں خون کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ دونوں طرف شدید جلن محسوس ہوتی ہے جو ہیرونی جلد پر بھی محسوس کی جاسکتی ہے۔ مریض ہیرونی طور پر دردکی لکیروں کا خاکہ اپنی انگل سے صینچ سکتا ہے۔ ایسے مریضوں کے بیشاب میں بعض دفعہ البیومن بھی خارج ہوتی ہے۔ اگر حمل کے دوران میہ ہوتو ہیلونیس کونہیں بھولنا چاہئے۔

ہیلونیس کی مریضہ اپنی توجہ بیاری سے ہٹائے تو بہتر محسوں کرتی ہے۔ حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے۔

طاقت: 30سے 200 تک

همير سلف 437

109

ہیپر سلفیورس کلکیر یم

HEPAR SULPHURIS CALCAREUM

(Calcium Sulphide)

ہمیرسلف کیلشیم سلفائیڈ کو کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ہانیمن نے اسے ایک سمندری جانور آؤلیٹر (Oyster) کے خول سے تیار کیا تھا اور اس پر مختلف قسم کے تجربے کئے تھے۔ یہ دواکلکیریا کارب اور سلفر کی مرکب ہے اور اس میں ان دونوں کی بعض خصوصیات پائی جاتی ہیں لیکن اپنی اکثر علامتوں میں یہ دونوں سے مختلف ہے۔ پہلے زمانہ میں کیلشیم سلفائیڈ کو خارش، وجع المفاصل، گنٹھیا اور دق کی سوزش وغیرہ میں ہیرونی طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دمہ اور پھیپھڑوں کی سال میں بھی مفید جمجی جاتی تھی۔

ہمیرسلف بکٹرت روزمرہ کام آنے والی دوا ہے۔سلیٹیا کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جہاں سلیٹیا اثر دکھانا چھوڑ دے وہاں بھی ہمیرسلف مفید ثابت ہوسکتی ہے۔ روزمرہ کی عام چھوت کی بیماریوں میں بھی ہمیرسلف بہت اچھا کام کرتی ہے۔اگر کسی وجہ سے سلیٹیا استعال نہ کروائی جاسکے تو ہمیرسلف بغیر کسی خوف و خطر کے دی جاسکتی ہے۔ ہمیرسلف مرکری اورسلیٹیا کے درمیان اس لئے دی جاتی ہے کہ مرکری کے بعد براہ راست سلیٹیا دینا مناسب ہمیں ہے کونکہ اس سے کئی قسم کے نقصانات پہنچنے کا اختمال ہوتا ہے۔مرکری سلیٹیا دینا مناسب ہمیں سے کیونکہ اس سے کئی قسم کے نقصانات پہنچنے کا اختمال ہوتا ہے۔مرکری دینا ہوتو بھی ہمیرسلف درمیان میں دے کرسلیٹیا اورمرکری کے تصادم کا از الدکیا جاسکتا ہے۔ مہیرسلف دونمرہ کے گئے کی خرابیوں میں بہت مفید ہے۔ گلے میں بلغم چپک جائے اور اسے باہر نکالنا بہت مشکل ہو اور کھانسی کے باوجود بلغم کو اکھیڑنا دشوار ہو تو ہمیرسلف اور اسے باہر نکالنا بہت مشکل ہو اور کھانسی کے باوجود بلغم کو اکھیڑنا دشوار ہو تو ہمیرسلف

بہت نمایاں کام کرتی ہے۔ ہیپر سلف میں <u>کھانسی</u> عموماً صبح کے وقت زیادہ ہوتی ہے اور سردی سے کھانسی میں اضافہ ہوجا تا ہے اور کھانسی میں اکثر در دیایا جا تا ہے۔

اس کی ایک اور علامت گلے میں پھانس کا احساس ہونا ہے جیسے کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو اور کوشش کے باوجود نکتی نہ ہو۔اگر واقعتاً کوئی چیز پھنسی ہوئی ہوتو ہیپر سلف کی بجائے سلیشیا سے باہر نکتی ہے۔ایسی صورت میں سلیشیا لاجواب کا م کرتی ہے۔جسم کے اندر کوئی چیز کہیں پھنس گئی ہو توسلیشیا اسے بہت جلد زکال باہر کرتی ہے۔لین ہیپر سلف میں واقعتاً کوئی چیز پھنسی ہوئی نہیں ہوتی محض بھانس اس گلنے کا احساس ہوتا ہے جو بہت بے چین کرتا ہے۔

ہیپر سلف کا مریض ضرورت سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ ماحول سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ اور ہرقتم کے درد کو نمایاں طور پر محسوس کرتا ہے۔ اس کے مزاح میں تندی اور غصہ پائے جاتے ہیں۔ مریض عام طور پر خواہ کتنا ہی رحم دل ہو بیاری کے دوران ایک دم جوش میں آجا تا ہے جی کہ اپنے قریبی دوست کو بھی قتل کرسکتا ہے۔ گومیر نے ملم میں آج تک بھی کوئی اس قتم کا مریض نہیں آیا۔ پاگل مریضوں میں تو ایسا ہونا ممکن ہے کین کتابوں میں بیاعام مریضوں کی علامت بتائی جاتی ہے جو بچھ مبالغہ معلوم ہوتا ہے۔

غدودول کاسخت ہونا اورسوج جانا بہت ہی دواؤں میں پایا جاتا ہے۔ یہ ہیپر سلف کی بھی علامت ہے۔ اگر سختی اور سوزش مستقل کھہر جائیں تواس کا علاج حسب حالات مختلف دواؤں سے کیا جاتا ہے لیکن اگران کے اندر پیپ پیدا ہونے گئے تواس صورت میں ہیپر سلف دینے میں تامل نہیں کرنا جائے۔ کلکیریا سلف بھی بہت اچھی دواہے۔

بعض بچول میں ناخن کھانے کی عادت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ناخنوں کے کناروں پر گوشت اکھڑنے لگتا ہے اور بے چینی پیدا کرتا ہے۔ اگر ذرا بھی ہاتھ لگ جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بچہ اس گوشت کو چبانے لگتا ہے اور آ ہستہ آ ہستہ دانتوں سے نو چتا ہے پھر اس کی بیرعادت پختہ ہو جاتی ہے۔ نیٹر م میور کے علاوہ اس بیاری میں

ہیپر سلف بھی مفید ہے۔

بعض دفعہ ناخن میں پیپ پڑجاتی ہے، پوراناخن اکھڑجاتا ہے پھر نیا آجاتا ہے۔ اس
کی اولین دوا ہیپر سلف ہے۔ اگر ناخن میں سیاہی اور خطرناک گہرا رنگ نمایاں ہو جائے اور
ناخن کی شکل بگڑنے گئے تو اس میں سب سے پہلے سورائینم دینی چاہئے۔ اگر آ رام نہ آئے تو
دوسری دواوُں کے بارے میں سوچیں۔ اینٹی مونیم کروڈ میں بھی ناخنوں کی خرابی ایک نمایاں علامت
ہے۔ مسے پھٹ جائیں اور ان سے خون بہنے گئے تو ہیپر سلف مفید ہے۔ اگر ان میں لائیں سی پڑجائیں جو برشکل اور گوبھی کے پھول کی طرح ہوں تو اس کے لئے نائیٹرک ایسٹر بہترین دوا ہے۔
جائیں جو برشکل اور گوبھی کے پھول کی طرح ہوں تو اس کے لئے نائیٹرک ایسٹر بہترین دوا ہے۔
ہیپر سلف کے بیچ نہلا نے دھلانے کے باوجود صاف نظر نہیں آئے۔ ان کی جلد میلی میلی سی دکھائی دیتی ہے۔ ہیپر سلف کے استعال سے جلد صاف سخری ہوجاتی ہے اور چہرے پر نظر
میلی سی دکھائی دیتی ہے۔ ہیپر سلف کے استعال سے جلد صاف سخری ہوجاتی ہے اور چہرے پر نظر

نزلے میں ناک اور گلے کے اندر بلغم سا چیار ہے اور اس وجہ سے چینکیں آئیں تو ہمیں سلف ہی دینی چاہئے۔ سردی کی وجہ سے چینکیں آنا بھی ہی سلف کی علامت ہے۔ اگر سر موسم میں گرم کمرے میں آنے سے چینکیں شروع ہوجا ئیں تو اس کی دواپلسٹیلا ہے۔ اگر گرمی سے سرد ماحول میں داخل ہونے سے چینکیں آنے سیسی تو سباڈ بلا ، سلیشیا اور نئیر میور اور ہی سلف کا خیال آنا چاہئے۔ اگر سوتے ہوئے ہاتھ یا پاؤں لحاف سے باہر رہ جائیں اور باہر کے ماحول میں خینڈ ہواور چینکوں کا سلسلہ شروع ہوجائے تو یہ ہی سلف کی خاص علامت ہے۔ ہی سلف کا مریض سرد ہوا کا ذرا سا جھونکا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ شوروغل بھی اس کے لئے نا قابل مریش سرد ہوا کا ذرا سا جھونکا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ شوروغل بھی اس کے لئے نا قابل مریش سرد ہوتا ہوتے۔

کان کی تکلیف میں اکثر کیمومیلا، پلسٹیلا، بیلاڈونا اور ایلیم سیبا کام آتی ہیں۔ میپر سلف بھی کان کے درد کی دوا ہو سکتی ہے۔

آ تکھوں کی بیار یوں سے بھی ہیپر سلف کا تعلق ہے۔ لیکن اگر نزلہ کی وجہ سے آ تکھوں میں بہت سرخی ہوتو یوفریزیا زیادہ مفید ہے۔ آ تکھوں میں روز مرہ پیدا ہونے والی تکلیفوں

مثلاً پانی بہنے اور آئکھیں چیک جانے میں ہیپر سلف بہت کام آتی ہے۔

روزمرہ کی <u>کھانسی</u> کے لئے بیلاڈونا، آرسنک، ہیپرسلف اور اپی کاک مفید ہیں۔ اپی کاک اور ہیپر سلف میں بیامتیازیا در کھیں کہا پی کاک کی بلغم قدر بے زم ہوتی ہے اور بآسانی نکل جاتی ہے۔اگر بلغم پھنسی ہوئی ہواور چیکنے والی ہوتو ہیپر سلف، کالی بائیکروم یا کوکس (Coccus) مفید ہول گی۔

ہیپرسلف بہت گہری دوا ہے۔اگراچا تک شدید بیاری کا حملہ ہوتو اونچی طاقت میں دینا بھی نقصان دہ نہیں۔ایک ہزار طاقت میں دینا بھی نقصان دہ نہیں۔ایک ہزار طاقت میں بیاری کی شدت توڑنے کے لئے ایک دن میں دوبار بھی دی جاستی ہے لیکن جب مرض قابو میں آ جائے تو پھر وقفہ بڑھانا لازم ہے۔ دواکی طاقت کے استعال کے بارے میں اپنے تجربہ میں آ جائے تو پھر وقفہ بڑھانا لازم ہے۔ دواکی طاقت کے استعال کا سلقہ آ جا تا ہے۔اگر بیاری طویل ہو جائے تو ایسی مزمن حالت میں بیتو قع نہیں رکھنی چاہئے کہ مریض اونچی طاقت سے آ با فانا ٹھیک جو سکتا ہے۔ پرانے مرض میں سارے جسم کے نظام میں گہری تبدیلیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو فوری طور پر پیدانہیں ہوسکتیں۔اگرجسم کا دفاعی نظام مرور ہو چکا ہواور مریض میں مقابلہ کی طاقت بہت کمزور ہو چکی ہوتو اونچی طاقت میں دواد سے سے شدیدرڈمل کا خطرہ ہوتا ہے جو جان لیوا بھی بہت کمزور ہو چکی ہوتو اونچی طاقت میں دواد سے سے شدیدرڈمل کا خطرہ ہوتا ہے جو جان لیوا بھی بیت ہوسکتا ہے۔

چونکہ ہیپر سلف میں سلفر کا عضر موجود ہوتا ہے اس لئے سلفر سے بھی اس کی مشابہت ہے۔ اگر مریض کے بچھپھڑ وں میں تپ دق کے پرانے داغ ہوں۔ جراثیم چھوٹی چھوٹی گھٹیوں کی صورت میں بھیپھڑ وں میں جگہ بنالیں تو سلفران کوختم کرنے میں مدددیتی ہے۔ اگیں صورت میں سلیشیا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلفران جراثیم کو کمزور کر کے بلغم کے ذریعے باہر نکال دیتی ہے۔ لیکن ایک بات پیشِ نظر رکھنی چاہئے کہ تپ دق میں سلفراونچی طاقت میں نہیں دینی چاہئے جب تک بہت کی تی نے کرلی جائے کہ چھپھڑ وں میں شریا نوں کے قریب جراثیم کی بڑی بڑی گلٹیاں موجود نہیں۔ تپ دق کے مریض جن کے بھیپھڑ سے قریب جراثیم کی بڑی بڑی گلٹیاں موجود نہیں۔ تپ دق کے مریض جن کے بھیپھڑ سے

سلی گلٹیوں سے بھر ہے ہوئے ہوں،ان میں سلفر کی اونچی طاقت میں سلیثیا کا سائمل دکھاتی ہے اوران گلٹیوں کو بچھلا کر باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے جن کے ساتھ جڑی ہوئی خون کی شریا نیں بھی بچٹ جاتی ہیں۔ایسے مریضوں کا بہتر علاج ہے ہے کہ بچھ عرصہ درمیانی طاقت میں سلفر دے کر کلکیریا کارب پر ڈال دیں کیونکہ کلکیریا کارب کے اثر سے کی مادے کے اردگر دانڈوں کی طرح خول سے بن جاتے ہیں جن کے اندر جراثیم مقید ہوجاتے ہیں۔

ہیپر سلف بھیپھڑوں،انتڑیوں یا کسی اور جگہ دق کے ظاہر ہونے والے اثرات میں بھی مفید دواہے۔ دق کی علامات جا ہے جسم کے کسی حصہ پر ظاہر ہوں یا اندرونی نظام پراٹر کریں، ہمیر سلف دونوں جگہ کام کرے گی۔

ہیپر سلف میں کلکیر یا اور سلفر دونوں عناصر پائے جاتے ہیں لیکن سلفر کا اثر زیادہ غالب ہوتا ہے اور سلفر کو جومشا بہت سلیشیا سے ہے وہ اسے بھی ہے۔

ہیپر سلف جلد پر ظاہر ہونے والے ہر شم کے زخمول کے لئے مفید ہے۔ زخمول سے
پیپ اورخون بہتا ہوا ور وہ متعفن ہوجائیں اوران کے گرددانے سے بن جائیں، نہ پکنے والے
پیوڑ نے اور وہ زخم جومشکل سے مندمل ہوں، سب ہیپر سلف کے دائر نے میں آتے ہیں۔لیکن
ہیپر سلف اور نائیٹرک ایسڈ دونوں اس لحاظ سے ہم مزاج ہیں کہ ان میں چھوٹے چھوٹے زخم علیحدہ
علیحدہ بھی پائے جاتے ہیں اور کچھوں کی صورت میں بھی جوایک طرف سے شروع ہوکر پھلنے لگتے
ہیں۔ یہ دونوں دوائیں انتر یوں کے السر میں بھی مفید ہوسکتی ہیں۔ مرکزی بھی انتر یوں کے اس

میپرسلف برانے مسول میں جوٹھیک نہ ہوں مفید ہے۔جلد پر خارش ہوتی ہے اورجسم پر دانے بن جاتے ہیں۔ جلد پر خوارش موتی ہے اورجسم پر دانے بن جاتے ہیں۔ جلد پر چھکے اور کھر نڈ بننے لگتے ہیں جواکٹر ایگزیموں میں ملتے ہیں۔ اگر یہ کھر نڈکان کے پیچھے اور گلے کے اردگر دہوں اور ان سے گوند کی طرح کا چیکنے والا موادر سنے لگے تو گریفائٹس سے آرام آتا ہے۔ اس قسم کے کھر نڈ جو کسی دواسے ٹھیک نہ ہوں ان میں میپر سلف کو آزمانا نہ جو لیں۔

هيپرسلف 442

دافع اثر دوائيں: بيلا ڈونا كيموميلا - سليشيا طاقت: 30 سے 1000 تك يا بعض دفعه CM

110 ہورابرازیل

HURABRAZILIENSIS

یددوا کوڑھ یعنی جذام میں اس وقت کام آتی ہے جب بیاصاس ہو کہ جلد بہت موٹی ہوگئی ہے اورسکڑ گئی ہے۔ الہذا یہ لیولیس میں بھی مفید ہے۔ بورا میں جلد پر تناو آجا تا ہے اوروہ کھنچی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ بورا اور ہائیڈروکوٹائل کے علاوہ میڈورا (Madura) بھی جذام اور لیولیس کی قسم کی بیار یوں میں کام آنے والی دوا ہے۔ بورا میں انگیوں کے نیچے پھانس ہونے کا احساس مخض بیاری کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے ور نہ حقیقتاً وہاں پچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس میں ہڈی کے ابھاروں پر خارش ہوتی ہے۔ گردن اینٹی ہوئی اور کمر میں درد کی علامت بھی ملتی ہے۔ اگر چہ ہومیو پیتھک معالجین اسے 6 کی طاقت میں استعال کرتے ہیں لیکن میرا تج بہ ہے کہ جودوا 6 کی طاقت میں مفید پایا ہو کیونکہ بعض امراض ایسے ہیں جن میں دوا کی معالجین نے اسے 6 طاقت میں ہی مفید پایا ہو کیونکہ بعض امراض ایسے ہیں جن میں دوا کی طاقت کی دوازیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔

طاقت: 6اور30سے 200 تک

111 ہائیڈر۔ پنجیا

HYDRANGEA

ید دواایک درخت Seven Barks سے تیار کی جاتی ہے۔ اس کا تعلق گردوں کی بھاریوں سے ہے کین عموماً سے زیادہ استعال نہیں کیا جاتا۔ اس کی ایک علامت بہت نمایاں ہے وہ یہ کہ نمکیات کی زیادتی کی وجہ سے پیشاب میں تلجھٹ ہوتی ہے اور سفید رنگ کی تہہ نیچ جم جاتی ہے۔ اس علامت کے ساتھ گردوں کی اکثر تکلیفوں میں مثلاً پیشاب میں خون، چھوٹی چھوٹی بھریاں یاریت کے ذرے آنے لگیں جو مثانے کی نالی کو زخمی کردیں اور شدید جانی ہوتو یہ دوا کام آتی ہے۔ پیشاب میں سرخی، جانی اور ربت کی مانند ذروں کی علامت لائیکو پوڈیم میں بھی پائی جاتی ہے۔ پیشاب میں سرخی، جانی اور ربت کی مانند ذروں کی علامت لائیکو پوڈیم میں بھی پائی جاتی ہے۔ پراسٹیٹ گلینڈ برط ھا ہواور پیشاب میں نمکیات جمنے کی علامت پائی جائے تو پھر یہ دوا استعال براسٹیٹ گلینڈ برط ھا ہواور پیشاب میں نمکیات جمنے کی علامت پائی جائے تو پھر یہ دوا استعال کریں۔

طاقت: 30 تک

112

م*ائیڈراسٹس*

HYDRASTIS

(Golden Seal)

ہائیڈراسٹس نارنگی کے پودے کی جڑسے تیار کی جانے والی دواہے۔ یہ جگر کی بیار پول میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس کا جلد اورا ندرونی جھلیوں سے بھی تعلق ہے۔ اس کی سطحی علامتوں میں جلد کے ناسور بہت نمایاں ہیں۔ اگر یہ بڑھ کر کینسر کی شکل اختیار کرلیں اور کوئی دوااثر نہ کریں کیونکہ اللہ کے فضل سے اس سے ایسے خطرناک اور بڑھنے والے ناسور بھی قابو آجاتے ہیں۔

کینسر کے گہرے پھوڑوں اور آئکھ کے ناسوروں میں ہائیڈ راسٹس بہت اچھا کام
کرتی ہے۔ایسے ناسوروں کے مقامی علاج کے طور پر بہترین دوا خالص شہد ہے۔روزانہ دوتین
بار خالص شہد کی سلائی لگائی جائے تو پہلے بچھ عرصہ تک بہت پانی نکلتا رہتا ہے پھر ناسور مندمل
ہونے لگتے ہیں۔نئ تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کینسر کے ایسے زخم جو کسی اور دوا کا اثر
قبول نہیں کرر ہے تھ شہدلگانے سے ٹھک ہو گئے۔

ہائیڈراسٹس چونکہ جگر کی بیاریوں سے گہراتعلق رکھتی ہے اس لئے بھوک پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ایک عجیب میں علامت میہ ہے کہ معدہ میں بھوک کی گہری کھر چن اور نقابت کا احساس ہوتا ہے کین ساتھ ہی کھانے سے سخت نفرت ہوجاتی ہے حالا نکہ تلی نہیں ہوتی ۔بعض اور دواؤں میں بھی بیعلامت ذرامختلف صورت میں ملتی ہے۔

ہائیڈراسٹس کے نزلے میں لیس دار اور زردی مائل گاڑھا موادیناک میں مستقل موجودر ہتا ہے جوسخت ہوجاتا ہے۔ بچے اسے نوچتے ہیں تو زخم بن جاتے ہیں اور

خون بھی رسے لگتا ہے۔ ناک کے ایسے زخموں کے لئے ہائیڈ راسٹس بہترین دواہے۔ ہائیڈ راسٹس کی تکلیفوں میں آ رام کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ بیاری بڑھنے سے چہرے پر برقان کے اثر ات ظاہر ہوجاتے ہیں۔ زردی چھاجاتی ہے۔ آئکھول کے بپوٹے موٹے ہوجاتے ہیں اوران پر زخم بن جاتے ہیں۔ کانوں میں بد بودار گاڑھا مواد بنتا ہے جس کے نتیجہ میں بہرہ پن شروع ہوجا تا ہے۔

اگرنزلہ کا مریض کمرے میں رہے تو ناک بہنارک جاتا ہے۔ باہر کھلی ہوا میں جانے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ ہائیڈراسٹس کے مریض کی کھانے سے نفرت جب بڑھ جائے تواسے دودھ پر ہی گزارہ کرنا پڑتا ہے جسے وہ شوق سے پیتا اور آسانی سے ہضم کرسکتا ہے۔اعصاب میں تشنج اورا پنٹھن یائے جاتے ہیں۔

بواسیر جولمباعرصہ چلے اور مزمن ہوجائے اس میں بھی یہ مفید ہے۔ پیٹ میں بہت ہوا بنتی ہے۔ پیشاب بہت کم اور بد بوار ہوتا ہے۔ عورتوں کے لئے کیکوریا میں بھی بد بواس کی علامت ہے۔ سانس کی نالی میں خراش ہوتی ہے اور کھانسی اٹھتی ہے۔ ہائیڈراسٹس میں بھی فاسفورس کی طرح ذراسا میننے سے بری طرح کھانسی چھڑ جاتی ہے۔

ہائیڈراسٹس کے مریض کے جسم میں اور ٹانگوں میں دردوں کے ساتھ آ ہستہ آ ہستہ بڑھتی ہوئی کمزوری کی علامات ملتی ہیں جنہیں ہلکی حرکت سے بچھ آ رام ملتا ہے۔ اس پہلو سے بیرسٹاکس سے ملتی ہے۔ اگر چہ اس میں آ رام کرنے سے مریض کوعموماً افاقہ ہوتا ہے کین دردول میں آ ہستہ کا جستہ چلنے سے آ رام آتا ہے۔ ایسے مریض کے پاؤں بھی سوج جاتے ہیں۔ جگر کی ورم اکثر چہرے اور پیٹ پر ظاہر ہوتی ہے اور پھر یاؤں پر اثر پڑتا ہے۔

ہائیڈراسٹس عموماً بوڑھے، نجیف اور جلد تھکنے والے لوگوں کی بیاریوں میں نمایاں اثر کرنے والی دواہے۔ اس کا مریض پژمردہ رہتا ہے۔اسے اپنی جلدموت کا یقین سا ہو جاتا ہے بلکہ مرنے کی تمنا بھی رکھتا ہے۔ ست رواور پست ہمت ہوتا ہے۔ بیشانی میں درد بھی ایک نمایاں علامت ہے جو اکثر قبض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کھو پڑی اور

گردن کے پھوں میں درد ہوتا ہے۔ بیشانی پر بالوں کے ساتھ ساتھ الگزیماایک لائن کی شکل میں ابھرتا ہے۔

مریض قبض کاشکاررہتا ہے۔ پیٹ کے نیلے حصہ میں در دہوتا ہے جور فع حاجت کے بعد زیادہ ہوجا تا ہے۔ معدہ میں دکھن کا احساس ہوتا ہے۔ نظام ہضم بہت کمزور پڑجا تا ہے۔ منہ کا مزہ کڑ وااور زبان سفید ہوجاتی ہے۔ عور تول کے سینے میں گلٹیاں بننے کا بھی رجحان ہوتا ہے جولمبا عرصہ رہیں تو کینسر میں بھی تبدیل ہوسکتی ہیں۔ایام حیض کے بعد سیلان الرحم شدت ہو اختیار کرجا تا ہے جس کی وجہ سے رحم کی گردن پر زخم بن جاتے ہیں اور شدید خارش ہوتی ہے۔ ہائیڈ راسٹس چیک میں بھی مفید دوا ہے۔ یہ علامات کونرم کردیت ہے، مرض کی مدت میں کمی کرتی ہے۔ مرض کی مدت میں کمی کرتی ہے۔ اور بعد میں بیدا ہونے والے بدائر ات کوبھی کم کرتی ہے۔

113 ہائیڈروکوٹائل HYDROCOTYLE

ہائیڈروکوٹائل ایک ایسی دواہے جو کوڑھ کے لئے بہت مؤثر ہے اور بہت ہی دوسری جلدی بیاریاں بھی اس سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ کوڑھ ایک ایسا مرض ہے جو آ ہستہ آ ہستہ ہڑھتا ہے۔ یہ فوری گئے والا مرض نہیں ہے بلکہ خون میں اس کا مادہ آ ہستہ آ ہستہ نشو ونما پا تا ہے اور کسی کوڑھی کے ساتھ بہت لمیے عرصہ تک مسلسل کمس کرتے رہنے کے نتیجہ میں یہ نقل بھی ہوسکتا ہے۔ اگر جلد پر کوڑھ کے ابتدائی آ فار ظاہر ہونے گئیں تو فوراً ہائیڈروکوٹائل دینی چاہئے ورنہ آخر کار جب کوڑھ میں جابجا زخم اور ناسور بن گئے ہوں تو پھر یہ کام نہیں آتی۔ میں نے کئی مریضوں میں ہائیڈروکوٹائل استعال کی ہے۔ خدا کے نصل سے ہمیشہ بی اسے بہت مفید پایا ہے۔ بعض دفعہ تو مکمل شفا ہوگئی اور بعض دفعہ تو کہ معمولی رہ گئی۔

کوڑھ کے علاوہ لیوپس (Lupus) بھی ایک ایسی جلدی بیاری ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیدلا علاج ہے۔ یہ بی قسم کی شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ آبلہ داردانے ، زخم اور غارش کے علاوہ اس میں جلد کھنچ کر سکڑنے گئی ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہائیڈروکوٹائل اس مرض میں بھی بہت مفید ہے۔ عمومی خارش جو بغیر کسی جلدی ابھار، دانوں یا زخم کے ہواس کے لئے بھی ہائیڈروکوٹائل کوفائدہ مند پایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور دوا ڈولی کوس (Dolichos) بھی خشک ضدی خارش میں بہت مفید ہے۔

جلد موٹی ہو جائے اور مچھلی کی جلد کی طرح کے چھلکے اتر نے لگیں تو یہ سورائسس (Psoriasis) کی علامت ہے۔ اسے کوڑھ نہیں سمجھنا جاہئے بلکہ سورائسس کا علاج ہونا چاہئے جو بہت کمی توجہ اور گہری دواؤں کے استعال کامختاج ہوتا ہے۔ لیوپس (Lupus) کی قسم کی ایک اور جلدی بیاری ہے جس میں سارے جسم پر مجھلی کی طرح چاتے بننے لگتے ہیں، اس میں سورائینم ایک ہزاریا آ رسنگ ایک ہزارطاقت میں دینی چاہئے۔ سورائینم اور آ رسنگ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ سورائینم کے مریض کے اخراجات میں شدید بد بوپائی جاتی ہوتو نمایاں ہوتی ہے۔ اگر کسی معین بیاری کے بغیر ہی منہ، بغلول یا یاؤں سے سخت بو آتی ہوتو رس گلابرا کا طاقت میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ میں نے اسے ہومیو بیتھک 6 پڑینسی میں بھی استعال کرا کے دیکھا ہے اور بہت مفیدیایا ہے۔

ہائیڈروکوٹائل <u>سورائٹسس</u> میں بھی مفید ہے۔اگرسورائٹس ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے ملوؤں پرنمایاں ہوتواس میں بھی ہائیڈروکوٹائل کواستعال کرنا چاہئے ۔ ملوؤں اور ہتھیلیوں میں سورائٹس کے بغیر بھی خارش ہوتو بیددوامفید ہے۔

ایک اور بہت خطرناک بیاری فم رخم کا کینسر ہے اس کا تفصیلی ذکر ہیلونیس اور کار بولیس اور کار بولیس اور کار بولیس کے ابواب میں موجود ہے۔ کینسر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ رخم نکا لنے کے بعد بھی تکلیف باقی رہتی ہے۔ ہائیڈروکوٹائل اس کینسر میں دردیں کم کرنے کے لئے چوٹی کی دوا ہے کیکن اس وقت یہ کمل شفانہیں دیتی۔ بہرحال رخم میں زخم اور رحم کی گردن پر سرخی اور سوزش ہوتو اس مرحلہ پر ہائیڈروکوٹائل کونظر انداز نہیں کرنا چا ہئے۔

طاقت: 30سے 200 تک

114

مائيڈ روسائينک ايسڈ

HYDROCYANIC ACID

یہ بہت خطرناک تشنج پیدا کرنے والا تیزاب ہے جو خشک سالی کی وجہ سے کڑوے باداموں اور مویشیوں کے حیارے میں پیدا ہوجا تا ہے۔اسے ملکا سا چکھنے سے بھی انترا یوں میں شدیدشنج پیدا ہوجا تا ہےاور چکھتے وقت ذراسی بھی بےاحتیاطی کی جائے تو سانس کی نالی کے شنج کی وجہ سے فوری موت واقع ہوسکتی ہے۔ کڑو ہے باداموں اور حیارے میں اس زہر کا جوعضریایا جاتا ہے وہ بہت خفیف ہوتا ہے اس لئے کڑوے بادام کھانے والوں کو نہ تو لاز ماً انتر یوں میں شنج ہوگا اور نہ سانس کی نالیوں میں ۔لیکن تشنج کا کچھا حمّال بہر حال باقی رہتا ہے۔ حیارے میں اس کی مقدارنسبتاً زیادہ یا کی جاتی ہے۔اس لئے ایسا جارہ کھانے والے جانوروں کولاز ماً انتر میوں کاتشنج ہو جا تا ہےاور بسااوقات ان کا جانبر ہونامشکل ہوجا تا ہے۔ پبیٹے کے شنج میں اس کے اثر کوزائل کرنے کے لئے کالچیکم بہترین دواہے جو 200 طاقت میں بہت اچھا کا م کرتی ہے۔ اکثر طبیبوں نے ہائیڈروسائینک ایسڈ کوا پیارے اور پیٹ کے نشخ تک ہی محدود رکھا ہے حالانکہ یہ دمہ، مرگی اور کالی کھانسی کے نشنج کے لئے بھی بہترین دواہے۔اگر دمہ یا کالی کھانسی کی وجه سے سانس بند ہوجائے اور مریض بے ہوش جائے تو فوراً ہائیڈروسائینک ایسڈ دینے سے مریض کی فتم كے خطرات سے بي جاتا ہے ورند شخ كے نتيجہ ميں دماغ كوآ تسيجن نه ملنے كى وجہ سے بعض اوقات وہ مستقل ذہنی مریض بن جاتا ہے یا بعض دفعہ نے گئتی کی دجہ سے اس کی فوری موت واقع ہوجاتی ہے۔ الیں صورت میں ہائیڈروسائینک ایسڈ چوٹی کی کام آنے والی دواہے۔اسے ہائیڈروفو بینم کے ساتھ ملا کر 200 طاقت میں دیا جائے تو بہترین ایلو پیتھک ان ہیلر (Inhaler) سے بھی بہتر

کام کرتی ہے اور اس کے استعال سے ان ہیلر (Inhaler) والے نقصانات بھی نہیں ہوتے۔

اگر کسی عورت کو ہسٹیر یا کے دورے پڑتے ہوں اور مرگی بھی ہوجائے تو اس کے لئے بھی ہہت ہی مؤثر دواہے۔ اگر تشنج کی وجہ سے دماغ میں خون رک جائے تو چہرہ سرخ ہوجا تا ہے اور مریض ہے ہو تا ہے یا اس کی یا دداشت ختم ہوجاتی ہے جو آ ہستہ آ ہستہ واپس آتی ہے یا مستقل طور پر ضائع ہوجاتی ہے۔ اس بیاری کو کیٹے لیپسی (Catalepsy) کہا جاتا ہے۔ اس میں ہائیڈر وسائینک ایسڈ مفید ثابت ہوتی ہے۔

بعض مریضوں کو کھانا کھاتے ہی پیٹ میں در دشروع ہوجاتا ہے اور بعض کو کھانا کھانے سے پہلے در دہوتا ہے۔ ہائیڈروسائینک ایسڈ کے دائر نے میں وہ مریض آتے ہیں جن کو خالی پیٹ رہنے سے پیٹ میں شخی در دہوتا ہے۔ معدے میں شدید کمزوری کا احساس ہوتا ہے جیسے معدہ ڈوب رہا ہو۔ کھانا کھانے سے معدہ میں گڑ گڑا ہٹ کی آواز آتی ہے۔ دل کی دھڑ کن بہت تیز ہو جاتی ہے۔ نبض کمزوراور بے قاعدہ اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوجاتے ہیں۔ سخت شنج کی حالت میں جڑ نے جنج جاتے ہیں۔ منہ سے جھاگ نکتی ہے اور ہونٹ نیلے ہوجاتے ہیں۔ سینے میں گھٹن اور جڑے جاتے ہیں۔ منہ سے جھاگ نکتی ہے اور ہونٹ نیلے ہوجاتے ہیں۔ سینے میں گھٹن اور در کا احساس ہوتا ہے۔ بہتمام علامتیں بالخصوص ہائیڈروسائینک ایسڈ کا تقاضا کرتی ہیں۔

دافع الردوائين: اموينم كيمفر اوپيم طاقت: 30 سے 200 تك

115 مائیڈرونوسینم HYDROPHOBINUM

یہ ہومیو پیتھی دوا کتے کے پاگل بن کے زمانے میں اس سے حاصل کئے گئے تھوک سے
بنائی جاتی ہے۔ بیشنج کی بہت اہم دوا ہے خصوصاً سمانس کی نالی کے نشنج میں بہت مفید ثابت
ہوتی ہے۔ اس کے نشنج کاروشنی اور پانی کی زود حسی سے تعلق ہوتا ہے۔ مریض کو تیزروشنی، چمک دار
اشیاءیا پانی دکھائی دی تواسے نشنج ہوجا تا ہے۔ ویسے تواس نشنج اور خوف کا تعلق پانی دیکھنے سے ہے
لیکن خوف کی وجہ سے مریض آئکھیں بند کر کے بھی پانی کا گھونٹ نہیں بھر سکتا۔ اس کا تھوک
کوکس کیکٹائی اور کالی بائیگرم کی طرح کیس دار دھا گوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ ہائیڈروکوٹائل
میں تھوک کا لیس دار اور دھا گے دار ہونا ضروری نہیں ہوتا مگر ہوسکتا ہے۔

ہائیڈرونو بینم کے مریض کو نگلنے میں دفت ہوتی ہے۔ بغیر کچھ کھائے بیے بھی نگلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ایسے مریضوں کے منہ میں جھا گ بھی آ جاتی ہے اور مریض مسلسل تھو کتا رہتا ہے۔ یہ دواجنسی امراض میں بھی مفید ہے۔ عورتوں میں خصوصاً رحم ڈھلکنے کے احساس کے ساتھ ہونے والے در دول اور تکلیفوں میں کارآ مد ثابت ہوتی ہے۔ بہتے ہوئے پانی کی آ وازسے یا اس کے تصور سے ہی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔خفیف سی ہوا کے جھونکے سے بھی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔خفیف سی ہوا کے جھونکے سے بھی تکلیفیں بڑھتی ہیں۔

دافع اثر دوائیں: ہائیڈروسائینک ایسڈ طاقت: 30سے 200 تک ہائیوشمس 457

116

ہائیوسس

HYOSCYAMUS

(Henbane)

ہائیوس ایک ایسے بودے سے تیار کی جانے والی دوا ہے جواپنی شکل وصورت میں بیلا ڈونا کے بودے سے ملتا جلتا ہے۔ بظاہرتو یہ بے ضررسا بودا ہے لیکن اس کے بچی بہت زہر یلے ہوتے ہیں۔اس بودے سے جودوا تیار کی جاتی ہے وہ ہائیوس کہلاتی ہے۔ بیاعصاب پرخصوصاً گہرااٹر کرنے والی دواہے۔

, ت<u>کھئے</u> تقرس)

ہائیوس کے مریض میں سوتے ہوئے یا بے ہوشی کے دوران مذیان بکنے کی علامت یائی جاتی ہے جو ہوش آنے پر باقی نہیں رہتی۔

ہائیومس کے مریض کے سب عضلات پھڑ کتے ہیں،اعصاب میں جیسے شعلہ سالیکتا ہے اور شنجی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے،ایسی چین جیسے سوئی سے ٹا نکا بھرا ہو۔ اعصاب میں شنج اور اکڑاؤیپدا ہوجا تا ہےاور جھٹکے لگتے ہیں۔بعض جگہ کےاعصاب پھڑ کنےلگ جاتے ہیں، کمزوری بہت ہوتی ہے اور مریض کا سر کمزوری کی وجہ سے کھسک کرتکیے سے نیچ آ جاتا ہے۔ یہ علامت میوریٹک ایسٹر (Muriatic Acid) کے مریض میں بھی پائی جاتی ہے۔ ہائیوسمس میں عورتوں میں وضع حمل کے وقت نہایت خطرنا ک قسم کا تشنج شروع ہو

ہائیوسمس میں ہرفتم کی د ماغی بیاریاں پائی جاتی ہیں لیکن ان میں مارکٹائی کا رجحان کم ہوتا ہے۔ بیلا ڈونا کے پاگل بین میں بیر جحان بہت زیادہ ملتا ہے۔ ہائیوسس میں مریض زیادہ تر وہم کا شکار ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کے یاس کھڑا ہے۔ پس وہ اس خیالی وجود سے با تیں کرنے لگتا ہے یا اسے بیوہم ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے جسے وہ مڑمڑ کر دیکھے گا۔ سخت شکی مزاج ہوجا تا ہے جولیب کی بھی علامت ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے قریبی عزیز وں نے دوا میں زہر ملا دیا ہے۔ ہائیوسمس میں بھی پیعلامات نمایاں ہے۔اگر کوئی مریض اس خوف سے دوااستعال نہ کرے کہاس میں کچھ ملا نہ دیا گیا ہوتوا سے بیدوازیا دہ یا نی میں ایک آ دھ قطرہ ملا کردینی جا ہئے۔

ہائیوسمس میں مریض نیم بے ہوشی کے عالم میں اپنے آپ سے بھی باتیں کرتا ہے پھر بہت چیخیں مارتا ہے اور بے ہوش ہوجاتا ہے۔اینے آب سے باتیں کرنے کی عادت تو بعض ا چھے بھلےلوگوں میں بھی ہوتی ہے مگر ہائیومس کے مریض میں <u>اپنے آپ س</u>ے باتیں کرنے کا ر جحان صرف بیاری کے دوران ملتاہے۔ جو تو ہمات دل میں جگہ بنالیتے ہیں ان میں ایک بیدہ ہم بھی ہوتا ہے کہ میری بخشش کا زمانہ گر رگیا ہے، اب بھی بخشانہیں جاؤں گا۔ بعض دفعہ فرضی جرائم کا خیال بھی دماغ پر قبضہ کرلیتا ہے۔ مثلاً میہ کہ اس نے تی اور بھیا نک جرم کیا ہوا ہے جو در حقیقت اس نے کیانہیں ہوتا ۔ یہ صرف وہم ہوتا ہے۔ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

ہائیوس کی ایک علامت گلونائن اور کیکیسس سے ملتی ہے کہ مریض راستہ چلتے ہوئے محول جاتا ہے کہ مریض راستہ چلتے ہوئے محول جاتا ہے کہ میں کہاں ہوں۔گر پر ہوتو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں ہوں،ا جنبیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔

ہائیوس کا مریض پانی سے ڈرنے گئا ہے اور پانی بہنے کی آ واز طبیعت میں ہجان پیدا

کر دیتی ہے۔ گلے میں شخ ہوجاتا ہے اور پانی اندر نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر کینٹ نے لکھا ہے کہ

پیلا ڈونا، ہائیوس کینقرس اور ہائیڈرونو پینم اس مرض کی بہترین دوائیں ہیں۔ میرے تجربے

میں ہے کہ سڑا مونیم اور ہائیڈروسائینک السٹر دونوں اس رجحان کا قلع قمع کرنے والی دوائیں

ہیں۔اگر پانی پینے ہوئے گلے میں شخ پیدا ہوجائے تو اس میں یہ بہت مفید ہیں۔ پانی کا خوف

ہیں۔اگر پانی پینے ہوئے گلے میں شخ پیدا ہوجائے تو اس میں یہ بہت مفید ہیں۔ پانی کا خوف

کاٹے کا بہترین علاج ہے۔ پرانے زمانے میں بعض اطباء ایسے مریضوں کوسٹر امونیم کھلایا

کرتے ہے جس کے اچھونا کئی نگلتے تھے۔ ہومیو پیتی میں بھی یہ بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ بعض

ملاکردینی چا ہمیں۔اللہ کے فضل سے بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔اگر کسی جگہ ٹیکے میسر نہ ہوں تو خواہ یہ

بیت نہ بھی ہوکہ کاٹے والا کتا پاگل تھایا نہیں ، فوراً یہ دونوں دوائیں ملاکردیں۔ چند دن روزانہ ، پھر

پن کے تارظا ہر ہی نہیں ہوتے اورخطرہ مشقلاً مل جاتا ہے۔

اگر <u>اعصاب کی خرابی کی وجہ سے نظر کمزور</u> ہوجائے تواس میں ہائیوسمس اچھاعمل

دکھاتی ہے۔ اگر نظر دھندلا جائے اور ایک جگہ نہ گھہر ہے اور وقباً فو قباً پیٹر ابی ظاہر ہونے لگے تو ہائیوسمس استعال کرنی جائے۔ بعض دفعہ بخار کی حالت میں مریض کو دندل پڑ جاتے ہیں اور منہ خشک اور بد بودار ہوجا تا ہے۔ زبان سرخیا بھوری، خشک اور کی بھٹی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ زبان پر سے کنٹرول اٹھ جاتا ہے یا کم ہوجا تا ہے۔ اس لئے مریض ہولتے بولتے فالج زدہ کی طرح رک کر بولتا ہے، زبان بے سیجی ہوجاتی ہے اور کھانا کھاتے ہوئے مریض کی زبان کٹ جاتی ہے۔ اگر معدے کی خرا بی کی وجہ سے بیعلامات پیدا ہوں تو اس میں پلسٹیلا اور کار بووت کے بھی مفید ہیں۔

ہائیوس میں معدہ ڈھیلا ہوکر پھیل جاتا ہے اور ٹائیفائیڈ کے اسہال کی طرح دانے دار اجابت ہوتی ہے۔ اجابت ہوتی ہے۔ اجابت ہوتی ہے۔ ایک اور تکلیف دہ بیاری ہے ہے کہ مریض کا بیشاب، پاخانہ بغیر علم کے نکل جاتا ہے اور عضلات پر کنٹرول نہیں رہتا۔

اگر وضع حمل کے بعد عورتوں کا بیشاب رک جائے تو کاسٹیکم اولین دوا ہے۔ آر نیکا کے ساتھ ملا کرکر دیں تو بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے لیکن اگر اس سے فائدہ نہ ہوتو ہائیوسس بھی استعال کرنی چاہئے کیونکہ ہائیوس بیشاب کی نالیوں کی انفیکشن اور سوزش میں مفید ہے۔

ہائیوس کی ایک علامت ہے ہے کہ پیٹ میں شدید مروڑ اٹھتا ہے اور یوں محسوں ہوتا ہے کہ درد کی شدت سے پیٹ بچٹ جائے گا۔ الٹیاں بھی آتی ہیں ہیجگی لگ جاتی ہے۔ مریض چینیں مارتا ہے، اسے چکر آتے ہیں اور معدے میں جلن کا احساس بھی ہوتا ہے۔

ایا م حیض سے بل عور توں میں ہسٹیریا ئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ شنج ہوتا ہے۔
دوران حیض بھی عضلات میں اپنٹھن ہوتی ہے۔ پسینہ بہت آتا ہے۔ چھاتی میں جکڑے جانے کا اور گھٹن کا احساس ہوتا ہے اور مریض آگے کو جھکتا ہے اور تکلیف کی شدت سے دہرا

ہوا جاتا ہے۔ رات کے وقت خشک کھانسی اٹھتی ہے جو لیٹنے سے بڑھ جاتی ہے لیکن اٹھ کر بیٹھنے سے افاقہ ہوتا ہے۔

ہائیوس کے مریض کورات سوتے ہوئے مرگی کے دورے پڑ جاتے ہیں۔ تشنی کیفیت ہوتی ہے۔ پچسوتے ہوئے روتا اور کراہتا کیفیت ہوتی ہے۔ پچسوتے ہوئے روتا اور کراہتا ہے۔ مریض رات کو بہت بے چین ہوتا ہے اور اسے نینز نہیں آتی۔ جسم کا ہر پٹھا پھڑ کتا ہے۔ مریض کپڑ الینا پینز نہیں کرتا۔

ہائیوس کے مریض کی تکلیفیں رات کوسوتے میں اور کھانا کھانے کے بعد اور لیٹنے سے بڑھ جاتی ہیں۔ مریض تنہائی سے ڈرتا ہے۔ البتہ جھکنے سے تکلیف کی شدت میں کمی ہوجاتی ہے۔

دافع اثر دوائيں: کیمفر پیلاڈونا طاقت: 30سے 1000 تک اكنيشيا 463

117

اكنيشا

IGNATIA

اگنیشیا تخم کااش دورکرنے کے لئے چوٹی کی دواہے۔اگنیشیا کا مزاج رکھنے والی عورتیں بہت حساس ہوتی ہیں، اپنی عادات و خصائل میں نہایت شائستہ اور لطیف احساسات کی مالک ہوتی ہیں گرنہایت چھوئی موئی اور نازک مزاج ، غم یا صدمہ کا بہت گہرااثر قبول کرتی ہیں۔ بیاثر دل کی طرف منتقل ہوتا ہے اور بسااوقات مختلف بیاریوں اور جسمانی عوارض میں تبدیل ہوجاتا ہے۔اگنیشیا کا مزاج رکھنے والی عورت کاغم کے اثر سے دل کی مریض یا دماغی مریض بن جانا بعید از قیاس نہیں ہے۔اسے بعض اوقات ہسٹیر یا کے دور سے بھی پڑنے لگتے ہیں۔ایسی صورت میں اگنیشیا کویا در کھنا جا ہئے۔

اگنیشیا کی ایک ظاہری پہچان ہے ہے کہ اس کا مریض کافی (Coffee) نہیں پی سکتا۔ چونکہ اعصاب بہت زود حس اور لطیف ہوتے ہیں، کافی اس حس کو بڑھادیتی ہے اور سخت تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے کافی کے ایک دو گھونٹ بھرنا بھی اس کے لئے مشکل ہوجاتا ہے۔ اس کا مریض بہت جذباتی ہو جائے تو کھل کر غصہ نکالنے کے بجائے تنہائی میں کڑھتا رہے گایا بہت افسردگی محسوس کرے گا۔ سٹی سیریا کے مریض میں بھی غصہ دبانے کا رجحان پایا جاتا ہے لیکن جب صورت حال حدسے بڑھ جائے تو پھراس سے بیدا ہونے والی گھٹن جسمانی عوارض میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ اگراس کی مریض عورت کسی مجلس میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ اگراس کی مریض عورت کسی مجلس میں جائے اور وہاں اسے کوئی طعنہ دیا جائے یا اس کا مذاتی اڑایا جائے تو وہ اسے خاموشی سے برداشت تو کرلے گی اور کوئی جواب نہیں دے گی لیکن گھر واپس آ کراسے شدید سردردہ ہوگا اور اعصابی تناؤ ور رہے گئی گی اور بھینی محسوس ہوگی۔ ایس کیفیت میں اگنیشیا کی ایک ہی خوراک اسے سکیوت بخشے گی اور

اسے جذبات دبانے کے بداثرات سے محفوظ رکھے گی۔

اگنیشیا میں بچوں یا عزیزوں کی وفات کا صدمہ بہت شدت سے محسوں ہوتا ہے اور دوررس گہرے بداثر ات باقی رہ جاتے ہیں۔ان سب میں اگنیشیا مفید ثابت ہوسکتی ہے کیکن میرا تجربہ ہے کئم اور صدمہ تازہ ہوں تو یہ بہت مفید ہے اور غم کے باقی رہنے والے بدا ثرات سے بھی بچاتی ہے۔ ہاں اگر جسمانی عوارض کو پیدا ہوئے دریہ وجائے تو پھریہ مفیز نہیں رہتی۔اگر غم کے بدا ثرات جسم کا حصہ بن چکے ہوں تو ان میں تین دوسری دوائیں یعنی ایم راگر سا،سلیشیا اور نیٹر م میور بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔

بعض اوقات مریضہ نروس (Nervous) ہوتو وہ کا نیتی ہے اور اعصاب جھر جھری ہی محسوں کرتے ہیں۔ یہ کیفیت بڑھ کرشنج میں تبدیل ہوجاتی ہے اور مریضہ ہو جاتی ہے جیسے ہٹیر یا کی مریضہ ہو۔ یہ ہوتی مرگ کی علامت نہیں ہے بلکہ ایسی عورتوں میں ہے ہوتی کا دور می کی المت نہیں ہے بلکہ ایسی عورتوں میں ہے ہوتی کا دور کی علامت ہوا کرتا ہے۔ اس بے ہوتی میں مرگ کی دوسری علامتیں موجود نہیں ہوتیں۔ غم یا خوف وغیرہ کے الثرات کی شدت کے وقت جو بے ہوتی ہوتی ہو وہ اعصابی کمزوری کی بے ہوتی ہوتی ہے وہ اعصابی کمزوری کی بے ہوتی ہوجاتی ہیں۔ اگنیشیا میں غم کے نتیجہ میں ایسے الثر است ظاہر ہوتے ہیں جوم گی کی علامتوں سے مشابہ ہوتے ہیں۔ اگنیشیا کی مریضہ میں مزاجی لحاظ سے یہ چیران کن بات پائی جاتی ہے کہ بعض دفعہ جب یہ توقع ہوتی ہے کہ اسے غصہ آ جائے گا وہ خوش ہوتی ہے اورخوشی کی بات پر اچا تک ناراض ہوجاتی ہے۔ اسی طرح جسمانی عوارض میں بھی یہ تیجب انگیز بات دکھائی دیتی ہے کہ جوڑسوج جانے سے سخت تناؤ ہوا در جلد پر سرخی اور تمازت ظاہر ہو جا ئیں تو اس کے با وجود مریضہ کو کوئی تکلیف محسوں خبیں ہوتی۔ خرضیکہ جس مریضہ میں نفسیاتی عوارض یا جسمانی عوارض میں تضادات پائے خبیں ہوتی۔ خرائیں ان کے لئے آگنیشیا ایک لازی دوا خابت ہوتی ہوتی ہے۔

ا گنیشیا کے مریض کے گلے میں تکلیف ہوتو <u>نگلنے سے آرام</u> آتا ہے۔ درد میں دباؤ سے آرام محسوس ہوتا ہے۔ جس کروٹ پہ تکلیف ہومریض اس کروٹ پر لیٹے گا۔ سر درد میں یوں لگتا ہے جیسے کسی نے میخ کھونک دی ہے جس طرف درد ہوا سے تکیہ میں زور سے دبانے سے کچھ آرام ماتا ہے۔

اگنیشیا میں نے بھی آتی ہے لین اس کا تعلق متلی سے نہیں ہوتا۔ کا کوس کی طرح احیا تک نے بھی آ جاتی ہے اور متلی بالکل محسوس نہیں ہوتا۔ اگنیشیا میں یہ تعجب انگیز بات ہے کہ اگر متلی ہوتو سخت اور نا قابل ہضم چیزیں کھانے سے آ رام آئے گا۔ نرم اور ہلکی غذا لینے سے تکلیف متلی ہوتو سخت اور نا قابل ہضم چیزیں کھانے سے آ رام آئے تو کھانسی تکلیف کو کم کرنے کی بجائے برخھ جائے گی۔ اگر کھانسی کے عین درمیان برخھادیتی ہے اور ایک دفعہ چھڑ جائے تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اگر کھانسی کے عین درمیان اگنیشیا کی ایک خوراک دے دیں تو کھانسی فور اً بند ہوجائے گی۔ یہاں اس کا اثر چیرت انگیز ہے۔ میں ہے کہ جب اگنیشیا فائدہ دے تو فوری اثر دکھاتی ہے۔

ا گنیٹیا کے مریض کو بعض دفعہ سانس کی نالی میں تشنج ہوجاتا ہے اور خرخراہ ہے گی آواز آتی ہے۔ اس شنج میں بھی اگنیٹیا جیران کن اثر دکھاتی ہے۔ چند گولیاں منہ میں ڈالتے ہی فوری طور پر شنج دور ہوجائے گا۔ پس اگنیٹیا ہر معاملے میں تعجب کا پہلور کھتی ہے۔ اثر میں بھی تعجب ہے اور بیاریوں کی عادات میں بھی تعجب یایا جاتا ہے۔

اگنیشیا کی مریضہ اکثر ناامبیداور مانیس رہتی ہے۔ کسی سے ملنا جلنا پیندنہیں کرتی۔
یادداشت کمزور ہوجاتی ہے اور ہسٹیر یا ہوجاتا ہے اوراس وہم کا شکار رہتی ہے کہ پچھ ہوجائے
گا۔عزیزوں کے مرنے کا خوف لاحق رہتا ہے۔ بعض دفعہ نظارے دیکھتی ہے۔ اگرالیں مریضہ کو
وقت پراگنیشیا نہ دی جائے تو یہ کیفیت بڑھ کریا گل بن میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اگرا کی دفعہ
مریضہ پاگل ہوجائے تو پھراگنیشیا کام نہیں آئے گی۔ اس کی بجائے نیٹرم میور بہت بہتر کام

ا گنیشیا میں بعض اور دواؤں کی طرح مریضہ اس وہم میں بھی مبتلا ہو جاتی ہے کہ وہ سخت گناہ گار ہے اور اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں رہی۔ پلسٹیلا، ہیلی بورس، آرم، ہائیوس، لیکیسس اور بعض دوسری دواؤں میں بھی بیعلامت پائی جاتی ہے۔ ا گنیشیا کے مریض کاجسم ٹھنڈا ہوتا ہے۔اس کے باوجود ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش رکھتا ہے۔عام کھانے سے بے رغبتی ہوجاتی ہے۔آ رام سے سکون مجسوس کرتا ہے۔

ہدی است سے بردی ہوتم کی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ آئکھوں کے سامنے دھیے دکھائی دکھائی ہیں۔ ٹائکھوں کے سامنے دھیے دکھائی دیتے ہیں۔ٹیڑھی میڑھی کئیریں آئکھوں کے سامنے جعلملاتی ہیں۔نظر کمزور ہو جاتی ہے اور آئکھیں دکھتی ہیں۔ چہرے کا اعصابی دردبھی اگنیشیا کے دائر ہوائر میں ہے۔عضلات پھڑ کتے ہیں،منہ کا ذاکقہ ترش ہوتا ہے۔ غیرمتو قع طور پر بےوقت پیاس گئی ہے اور جب پیاس گئی جا ہے اس وقت نہیں گئی۔

ا گنیشیا کے مریض سے بھی بحث نہیں کرنی جاہئے کیونکہ وہ مثبت دلیل کے مقابل پر اوٹ پٹا نگ بات کرے گا اور بحث کو ہڑھا تا جائے گا۔ بہتریہی ہے کہ اس سے کنارہ کشی کرلی جائے۔

ا گنیشیا کے مریض کی نیندگہری نہیں ہوتی۔ سوتے ہی اعضاء میں جھٹکے لگتے ہیں یاغم اور فکر کے نتیجہ میں نینداڑ جاتی ہے۔ بسااوقات غم اور صدمہ کے نتیجہ میں ایسی مریضہ کا حیض بند ہو جاتا ہے یا نظام میں سستی پیدا ہوجاتی ہے۔ پیٹ اور معدہ میں شنج اور در د ہوتا ہے۔ ہاتھ یاؤں میں جھٹکے لگتے ہیں۔ یاؤں اور مخنوں میں در د ہوتا ہے۔

ا گنیشیا کی تکلیفیں صبح کے وقت اور تھلی ہوا میں بڑھ جاتی ہیں، کھانا کھاتے ہوئے، آرام کرنے سے یا کروٹ بدلنے سے تکلیفوں میں کمی محسوس ہوتی ہے۔

> مددگاردوائیں: نیٹرم میور، سلیثیا دافع اثر دوائیں: کیمومیلا، کائس طاقت: 30سے 200 تک

118 انسولين

INSULIN

انسولین جسم میں شوگر کی مقدار کو اعتدال پر رکھنے والا قدرتی مادہ ہے جولبلبہ
(Pancreas) میں موجود ہوتا ہے۔اس مادہ سے ہومیو پیتھی دوابنائی گئی ہے۔ یددوا فریا بیطس کے علاج میں بھی مفید پائی گئی ہے۔ اگرجسم کوانسولین پوری مقدار میں مل جائے تو اس سے شوگر کا توازن بحال ہوجا تا ہے۔ ہومیو پیتھک انسولین بھی فریا بیطس کی بعض مخصوص علامتیں رکھنے والے مریضوں میں مفید بتلائی گئی ہے اوراگر وہ اسے ٹھیک نہ کر سکے تو کم از کم فریا بیطس سے پیدا ہونے والے بداثر ات کومٹا دیتی ہے۔ زخم، چھالے، بیڈسور، کار بنکل وغیرہ جو فریا بیطس کی وجہ سے پیدا ہوت ہوتے ہیں ان میں اچھا اثر دکھاتی ہے۔ انترائوں کی مزمن تکیفیں جن میں نرم اجابت کی طرف ربحان اور جگر کا برط ھا ہوا ہونا وغیرہ، ان علامتوں میں بھی انسولین مفید ہوتی ہے۔ ایسا خارش والا انگر یما جس میں جگر کی خرابی کی شکایت بھی موجود ہواور کسی اور دوا سے آرام نہ آئے اور جلدی امراض انسولین استعال کرنی جا ہے۔ اس طرح اگر مریض کو بار بار پیشا ب آئے اور جلدی امراض بھوڑے ہے۔ اس میں بھوڑے ہے۔ اس طرح اگر مریض کو بار بار پیشا ب آئے اور جلدی امراض بھوڑے ہے۔ اس طرح اگر مریض کو بار بار پیشا ب آئے اور جلدی امراض بھوڑے ہے۔ اس میں بھوڑے ہے۔ اس میں بھوڑے ہوتو بدوا کثر فائدہ دیتی ہے۔

اگر گردن کے غدودول میں پیپ پڑنے کار جمان ہوتو اس صورت میں تمیں طاقت میں انسولین دی جاتی ہے۔ اگر خون میں شوگر موجود ہولیکن پیشاب میں نہ ہوتو انسولین مفید ہے۔ نفر س کی تکلیف میں بھی مفید بتائی گئی ہے۔

طاقت: 30

119

469

آ بودم

IODUM

آ بوڈم بہت گرم مزاج دوا ہے۔اس کا مریض بہت شدت سے گرمی محسوس کرتا ہے۔ اسے بے حد بھوک لگتی ہے لیکن بہت کھانے کے باوجوداس کاجسم دبلا پتلا رہتا ہے۔ بہت تیز طرار ہونا ہے، نحلانہیں بیٹھ سکتا ،ادھرادھر گھومتار ہتا ہے۔جسم میں ہر جگہ غدود بڑھ جاتے ہیں اور بہت سخت ہوجاتے ہیں۔ پیخی کونیم سے مشابہ ہوتی ہے۔آپوڈین کا مریض سو کھے بن کے لحاظ سے ابراٹینم اور نیٹرممیور کی یا دولا تا ہے لیکن بیدونوں دوائیں ٹھنڈ بےمزاج کی ہیں۔ آ پوڈم کے مریض کی بے چینی کاتعلق اعصائی گھبراہٹ سے ہوتا ہے۔ یہ گھبراہٹ آ رسنک کی طرح کی نہیں ہوتی بلکہ اعصاب میں ضرورت سے زیادہ توانائی یائی جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چونکہ خوب کھا تا بیتا ہے اور چر بی نہیں بنتی اس لئے جسم میں پیدا ہونے والی زائد توانا کی اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ چنانچہ میسلسل حرکت کرتار ہتا ہے اور بھاگ دوڑ کراپنی طاقت خرچ کرتا ہے۔اگرا یسے مریض کوزبردستی بٹھانے کی کوشش کی جائے تو اس میں شدید غصے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔وہ مار دھاڑ اور قتل تک کرنے پر آ مادہ ہوجا تا ہے۔اگر ایسے مریض کا بجین میں آپوڈین سے علاج نہ کیا جائے تو بڑا ہو کر نہایت خطرنا ک مجرم بھی بن سکتا ہے اور بغیر کسی محرک کے قل وغارت میں ملوث ہوسکتا ہے۔ گونیٹر م میوراور ہیپر سلف میں بھی تشد داور بلاوجیق کرنے کار جحان پایا جاتا ہے لیکن ان کی دیگر علامتوں میں بہت فرق ہے۔ نکس وامیکا میں بھی پیہ خطرناک علامت یائی جاتی ہے کہ اس کی مریضہ کے دل میں بے اختیار بیخواہش ابھرنے گئی ہے کہ اپنے بیجے کو آگ میں جھونگ دے یا بے حدمحبت ہونے کے باوجود خاوند کوموت کے

گھاٹ اتاردے۔ پھروہ اس ارادے سے خت خوفز دہ بھی ہوجاتی ہے کین اسے رنہیں کر سکتی اور یہ خیال سامیہ کی طرح اس کے بیچھے لگا رہتا ہے۔ اگر مریضہ بہت خوفز دہ بھی ہوتو یہی علامتیں پاگل بن میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ اگر مریض کی دیگر علامتیں آیوڈین کا تقاضا کرتی ہوں تو یہ دوا بہت مفید ثابت ہوگی۔

کالی آیوڈائیڈ میں بھی آیوڈین کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں۔اس کا مریض بہت چلتا ہے اور چلنے سے تھکتا نہیں۔اگر کسی دن نہ چلے تو اعصاب میں تکلیف محسوس کرتا ہے۔اس کے مزاج میں بھی گرمی پائی جاتی ہے۔البتہ ایک فرق ہے کہ اس کے جسم میں گہرے زخم بن جاتے ہیں جونا سور بننے کار جحان رکھتے ہیں جبکہ آیوڈین میں غدودوں کے اندر کی سوزش اوران کے سخت ہونے کی علامت یائی جاتی ہے۔ تب دق کار جحان جمعی ملتا ہے۔

آیوڈین کی ایک خاص علامت ہے ہے کہ سار ہے جسم کے غدود پھولنے لگتے ہیں اور سخت ہوجاتے ہیں اور بالکل جھلی سی باقی رہ جاتی ہوجاتے ہیں اور بالکل جھلی سی باقی رہ جاتی ہے۔ یہ اس کی ایک استثنائی علامت ہے ور نہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ساراجسم سو کھر ہا ہوتا ہے اور غدود برٹھ دہے ہوں تو ایس برٹھ دہے ہوت ہوتا ہے اور غدود برٹھ در ہے ہوں تو ایس مریض کو آیوڈم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں غدود اور جسم بیک وقت موٹے نہیں ہوتے عموماً پیٹ کے غدود بہت زیادہ پھول جاتے ہیں اور ان میں گانٹھیں نمود ار ہوجاتی ہیں۔ بغلوں کے پنچ بیٹ غدود برٹے اور سخت ہوجاتے ہیں۔

چونکہ آ یوڈم گرم مزاج کی دواہے اس لئے اس کی کھانسی بھی گرمی سے بڑھتی ہے چنا نچہ گرم کمرے میں جانے سے کھانسی کا دورہ پڑ جاتا ہے مگر آ یوڈم کی پہچان کے لئے صرف یہی علامت کا فی نہیں ۔ باقی علامتیں بھی موجود ہونا ضروری ہیں۔ اس دوا میں جگر، تلی اور گلے کی سوزش بھی ملتی ہے ۔ عموماً ایسی سوزش اور غدودوں کی تکلیف کے نتیجہ میں مریض کو دست لگ جاتے ہیں۔ آ یوڈم میں ہر جگہ دھڑکن یائی جاتی ہے۔ یہ علامت

بیلا ڈونا اور آیوڈم میں مشترک ہے۔ چونکہ آیوڈم گرم مزاج کی دوا ہے اس لئے اس کی ایپس (Apis) سے بھی مشابہت ہوتی ہے۔ بیدونوں دوا ئیں گردوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایپس کی طرح آیوڈم میں بھی آئھ کے بیچے سوزش ہوجاتی ہے لیکن بیسوزش صرف نچلے حصہ میں ہی محدود نہیں رہتی بلکہ اس سے آئکھوں کے چھپر بھی سوج جاتے ہیں۔ اگر پوری آئکھ میں سوزش ہوتواس کے لئے فاسفورس بھی مفید ہے۔ اگر آئکھ کا صرف چھپر اور غلاف سوجے ہوں تو یہ کالی کارب کی علامت ہے۔ وہ مریض جو لمبی بیاریوں کے نتیجہ میں بالکل نڈھال ہوجا ئیں اور خون کی کمی کا شکار ہول تا تاہوں کی آئکھوں کے بیچ تھیلیاں ہی لئک جاتی ہیں اور وہ چھوٹی عمر میں ہی بوڑ سے دکھائی دینے موں تو ایک کار جاتی ہیں۔ ان کے لئے بیں۔ ان کے لئے جی میں بالکل نڈھال ہوجا کیں اور وہ چھوٹی عمر میں ہی بوڑ سے دکھائی دینے مفید ہوسکتی ہیں۔ ان کے لئے بینے ماری (Chininum Ars) اور سار سپر یلا (Sarsaparilla) وغیرہ مفید ہوسکتی ہیں۔ علامات کوا چھی طرح سے پیچان کر دو آنشخیص کرنی جا ہے۔

آ بوڈم کے مریض کی ایک خاص پہچان ہے ہے کہ اسے بھوک بہت گئی ہے۔ ہر بیاری میں بھوک بہت گئی ہے۔ ہر بیاری میں بھوک بے چین رکھتی ہے۔ ہر بیاری میں بھوک اور بیاری کا با ہمی تعلق ہے کین سورائینم میں بھوک خصوصاً رات کے وقت چمکتی ہے اور اس کا مریض عموماً شخنڈ اہوتا ہے اس لئے ان دونوں دواؤں میں فرق کرنا مشکل نہیں ہے۔

آ یوڈم کو گردوں کی بیاریوں میں بھی اہم مقام حاصل ہے۔ گردوں میں تکلیف کی وجہ سے ہاتھ پاؤں متورم ہوجاتے ہیں۔ اگر گردوں کی بیاری میں آ یوڈم کو وقت پر دے دیا جائے تو مریض بہت ہی نا قابل علاج اور تکلیف دہ بیاریوں سے خی جاتا ہے۔ کالی آ یوڈ ائیڈ (Kali Iod) بھی گردوں کے لئے مفید دوا ہے لیکن اس میں السر بننے کا رجحان ہوتا ہے جبکہ آ یوڈم میں السر کا رجحان نہیں ہوتا۔

آ یوڈم میں اندرونی اعضاء مثلاً جگر، تلی بھی پھول کر سخت ہوجاتے ہیں اور سارا جسم سوکھ جاتا ہے اس کے باوجود بھوک بدستور موجود رہتی ہے لیکن آخر کار معدہ جواب دے جاتا ہے اور اسہال شروع ہوجاتے ہیں۔ وہ اسہال جن کاسل سے تعلق ہوتا ہے جسج

کے وقت بڑھتے ہیں اور سلفر سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھیپھڑوں کی سل بڑھ جائے تو قدرتی طور یرز ہریلے مادوں کا اخراج اسہال کے ذریعے ہونے گتا ہے۔انہیں بند کر دیا جائے تو خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔اس لئے ان کا صحیح علاج ضروری ہے۔ ہومیو پینھی طریقہ علاج میں سلفر کے ذر بعہ علاج کرنے سے چھیچے وں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور اسہال بھی رک جاتے ہیں۔ایسے مریضوں میں اگر صرف ان کے اسہال کا علاج کیا جائے تو نہایت خطرنا ک نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اور بھیبے وں کوشد یدنقصان پہنچنا ہے۔ایسی صورت میں اگر سلفر کام نہ دی و آبوڈ م بھی مفید دواہے کیکن علامتیں موجود ہوں تو مکمل شفادینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔اس لئے بیوقتی علاج نہیں ہے۔ اس کی بعض بیاریوں میں سلفر سے مشابہت یائی جاتی ہے جیسے منہ میں سفید جھالے اورزخم ہونا۔ ہرقتم کے چھالے اور زخم جونزلاتی جھلیوں میں بنتے ہیں ان کا بھی آ بوڈم سے بہترین علاج ہوسکتا ہے بشرطیکہ مریض مزاجی طور پر آپوڈم کا ہو۔اس کا مریض گرم مزاج ہونے کے باوجود سردی لگ جانے سے نزلہ میں مبتلا ہوجا تا ہے اس کے لئے بیضروری شرط نہیں ہے کہ گرمی سے ہی نزلہ ہو۔ آیوڈم کے مریض کی نزلاتی حجلیاں جواب دے جاتی ہیں اس لئے معمولی بہانے سے بھی نزلہ ہوتا رہتا ہے۔ ناک میں موادجم جاتا ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے۔ ذراسی مھنڈ لگنے یا کھانے پینے میں بداحتیاطی سے زلہ ہوجا تا ہے۔ نزلہ کی بعض دواؤں کا سردی اور گرمی سے علق ہے جواپنی الگ علامتیں رکھتی ہیں اور آپوڈم سے متاز ہیں لیکن اگر ناک بندر ہےاور ہروفت نزلاتی کیفیت ہو۔ ناک سےخون نکلےاوراس کے ساتھ بھوک بھی بہت ہوتوایسے مریض کے لئے خداتعالی کے ضل سے آپوڈ ماس کی تمام بیاریوں میں شفا کا موجب بن جاتی ہے۔

آ یوڈم رحم کی رسولیوں میں بھی اچھااثر دکھاتی ہے۔خصوصاً اگر اس کی دیگر علامتیں بھی موجو د ہوں۔اس میں کیکوریا گاڑھااور تیز سوزش پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ وجع المفاصل میں بھی مفید ہے۔آیوڈم کے مریض کوٹھنڈی ٹکورسے فائدہ ہوتا ہے۔ آ یوڈم کی تکالیف خاموش رہنے ہمنت کرنے اور گرمی سے بڑھتی ہیں۔کھانا کھانے سے اور کھانے کے بعد کچھ دریتک آ رام رہتا ہے۔ کھلی ہوامیں چہل قدمی سے افاقہ رہتا ہے۔

مددگار دوائيں: لائيكو پوڈيم دافع اثر دوائيں: ميپر سلف _ گريثولا _ سلفر طاقت: 30 سے 200 تک

120

ا يي کاک

IPECACUANHA

(Ipecac-Root)

اپی کاک ایک پودے کی جڑوں کوسکھا کر تیار کی جانے والی دوا ہے۔ ایلوپلیتی میں اسے قے لانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ ہومیوپلیتی میں اپی کاک متلی اور قے دور کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ مریض قے آنے کے بعد بھی متلی محسوس کرتا ہے۔

اپی کاک ملیریا کی بہت اہم دوا ہے۔ ملیریا کا بھی متلی سے گہر اتعلق ہے اوراس کا معدے پر بھی جملہ ہوتا ہے۔ اس پہلو سے اپی کاک کا ملیریا سے طبعی تعلق ہے۔ اپی کاک کی ایک خاص پہچان سے ہے کہ کمر میں شخت سردی محسوس ہوتی ہے اور سردی کی اہریں او پر سے نیچے اور نیچے سے او پر جاتی ہیں۔ سردی کے علاوہ در دکی اہریں بھی یونہی او پر سے نیچے یا نیچے سے او پر کمر میں چاتی ہیں۔ اگر بیچے کوملیریا ہور ہا ہواور وہ بیساری با تیں بتا نہ سکے اور اپی کاک کی ضرورت ہوتو اس کی دو تین علامتیں نمایاں طور پر اپی کاک کی طرف اشارہ کریں گی۔ شدید سردی سے بدن کا نیچ گا اور دانت بجیں گے۔ اگر ایسے بیچے میں اپی کاک کی دوسری علامتیں بھی ملیس تو ایسے ملیریا کے علاق کی از اس بھی ملیس تو السے ملیریا کے علاق کی دوسری علامتیں بھی ملیس تو السے ملیریا کے علاق ہیں اور ان کی حرکت با ئیں طرف سے دائیں طرف ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے چاتو مار دیا ہوا ور مریض حرکت نہیں کر سکتا بلکہ ساکت و جامہ ہوجا تا ہے اور پھر ذراسی دیر میں ہی درد ختم ہوجا تا ہے۔ وہ درد جومستقل بیٹھ رہنے والے نہ ہوں بلکہ بکل کے کوندوں کی طرح آئیں اور ایک دم مریض کونڈ ھال کر کے چلے جائیں وہ اپی کاک سے تعلق رکھتے ہیں۔ طرح آئیں اور ایک دم مریض کونڈ ھال کر کے چلے جائیں وہ اپی کاک سے تعلق رکھتے ہیں۔

ا پی کاک کے ہرمرض میں متلی ضرور ہوتی ہے۔کھانسی سے بھی متلی ہوجاتی ہے۔

اپی کاک جریان خون کی بہترین دوا ہے۔ اس میں یکدم بڑے زور سے خون فکتا ہے۔
اپی کاک کے مریض میں جب بھی کہیں سے خون جاری ہو تلی بھی ضرور ہوتی ہے۔ مریض پیاس بالکل محسوس نہیں کرتا۔ بسااوقات آرسنک کی طرح کمزوری اور بے چینی بھی پائی جاتی ہے کین اس کا مزاح دوسری باتوں میں آرسنک سے مختلف ہے۔ ہر تکلیف دور نے کی شکل میں آتی ہے۔
کمزوری ہوگی تو کمزوری کا دورہ پڑے گا۔ سردی گلے گی تو دور نے کی شکل میں آئے گی۔ خون بہنے کا بھی دورہ پڑے گا اور پچھ عرصہ کے بعد ختم ہو جائے گا۔ بیدور نے لمینہیں ہوتے۔ اس میں مرض کے تیزی مستقل جاری رہنے والی اور آگے بڑھنے والی بیاریاں نہیں ہوتیں البتہ اس میں مرض کے تیزی سے بڑھنے کا امکان ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی تکلیف شروع ہوتی ہوتی مرض تیزی سے بڑھتا ہے۔ اور جلد ہی چھوڑ بھی دیتا ہے۔

افی کاک کی اعصابی بیاریوں میں تشخ پایا جاتا ہے۔ سیکوٹا اور ڈائسکوریا (Dioscorea) کی طرح اعصابی تشخ میں پیچھے کی طرف اکر نے کار جحان ملتا ہے۔ ابی کاک معدے کی بہت اچھی دواؤں میں سے ہے۔ اگر معدہ میں ہوا کا تناؤ محسوس ہوتو اپی کاک مفید ہوتی ہے۔ ایسی پیچیش جس میں بیٹ میں شدید بل پڑیں اور بار بارا جا نک حاجت محسوس ہوتو اس میں اپی کاک بہت کار آمد ہے۔ بیوں کی پیچیش میں سبزی مائل آؤں آتی ہے۔ بعض دفعہ خون کی آمیزش بھی ہوتی ہے۔ متلی اور نے کار جحان بھی ملتا ہے۔ ناف کے چاروں طرف ایسا درد جیسے کسی نے چٹکی بھر لی ہو۔ جسم اکڑ جاتا ہے۔ ان علامتوں میں ابی کاک مفید ہے۔

ا پی کاک کا دمہ ہے بھی گہراتعلق ہے۔اس کے دمہ کے مریض پرخون اور بھرے ہوئے چہرے والے ہوتے ہیں جبکہ اپنی مونیم ٹارٹ کے دمہ کا مریض کمزور اور آخری کمات پر پہنچا ہوا معلوم ہوتا ہے۔لیکن یہ تقسیم لازمی نہیں ہے۔اگر بیا نظار کیا جائے کہ مریض اس آخری شکل تک پہنچے اور پھر اپنی مونیم ٹارٹ استعال کریں گے تو یہ درست

نہیں۔ آغاز میں ہی جو علامتیں ظاہر ہوکران دونوں میں فرق کرتی ہیں انہیں پیش نظر رکھنا چاہئے۔ایی کاک میں مرض جلد ہوگا اور تیزی سے بڑھے گا اور جلد ہی چہرے برتمازت آ جائے گی لیکن اینٹی مونیم ٹارٹ میں اچھے بھلے کھیلتے ہوئے بچے کوسر دی لگے تو آ ہستہ آ ہستہ کمزوری ہو گی اور دوسرے دن وہ مرض شروع ہو گا اور آ ہستہ آ ہستہ بڑھے گا اور پھر جب ایک دفعہ مرض قبضہ کرلے تو اپی کاک کے مقابل پر علامتیں بہت زیادہ سکین ہوں گی اور مرض کے خلاف اندرونی دفاع بیدارنہیں ہوگا۔ ای کاک میں مریض کا بوراجسم بیاری سے مقابلے کے لئے جدوجہد کرتا ہے کیکن اینٹی مونیم ٹارٹ کے مریض کا سینہ بلغم سے بھر جائے اور سانس لینے میں دفت ہوتو بھی بلغم کو باہر نکالنے کا رجحان نہیں ہوتا اور مریض بہت تیزی سے بیاری سے مغلوب ہوجا تا ہے۔اگر شروع میں ہی اینٹی مونیم ٹارٹ کو پہچان لیں توبلا تا خیر شروع کروادینی جا ہے ۔ جب علامات بڑھ جائیں تو بہت خطرنا کے صورتحال ہو چکی ہوتی ہے۔ان دونوں دواؤں میں ایک اور فرق بیہ ہے کہ چونکہ تلی اپی کا ک کا خاصہ ہے اس لئے اگرمتلی ہومگر نے نہ آئے تو اس صورت میں ایی کاک کے زیادہ امکانات ہیں۔ ہاں متلی کے بغیریا معمولی متلی سے قے کار جحان ہوتو بیا بنٹی مونیم ٹارٹ کی علامت ہے سوائے اس کے کہ سینبلغم سے بھرا ہوا ہوتو کمزوری کی وجہہ سےاس کو باہر نکالنے کی طاقت ختم ہوجاتی ہے۔

رحم کی نکالیف میں بھی اپی کاک مفید ہے۔ اگر بکشرت اور بہت زور سے سرخ رنگ کا خون بہے اور مہت زور سے سرخ رنگ کا خون بہے اور متلی بھی ہوتو اس میں اپی کاک اچھا اثر دکھاتی ہے۔ ایا محمل کی مثلی میں بھی مفید ہے۔ وضع حمل کے بعدا گر پلیسنٹا (Placenta) کا پھھ مادہ رحم میں باقی رہ جائے اور مریض میں اپی کاک کی علامتیں ہوں تو اسے خارج کرنے میں بے مددگار ہوگی۔ اس کے نتیجہ میں پرسوتی بخار ہوں تواس کے لئے سلفراوریا ئیروجینم کے ابواب کا مطالعہ کریں۔

ا پی کاک کا نزلمے ناک میں جڑ کیڑ جاتا ہے۔رات کے وقت ناک بند ہوجاتا ہے اور بہت چھینکیں آتی ہیں۔نزلہ گلے اور چھاتی میں اتر تا ہے جس سے سانس گھٹتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے۔ دمہ کے آثار ظاہر ہوجاتے ہیں۔ جونزلہ ناک سے شروع ہوکر گلے اور چھاتی میں اترے اور یوں محسوس ہو کہ دمہ ہوجائے گاتوا پی کا ک دینے سے دمہ کا حملہ ٹل سکتا ہے۔ ٹکسالی کے نسخ عموماً نا واقف لوگوں کے لئے ہوتے ہیں لیکن ہر دفعہ علامات کے مطابق نسخہ سوچنا بھی مشکل کام ہوتا ہے۔ دمہ کا ہر حملہ گزرجانے کے بعد بیاری کا مزاج سمجھ کرمستقل علاج کریں۔ دمہ کے مریض کو کھانے پینے میں بہت احتیاط کرنی چاہئے۔ نزلہ اور گلاخراب ہونے سے بیخنے کی ہمکن کوشش کرنی جاہئے۔

گردوں میں افکیشن میں بھی شدید سردی گئی ہے۔ اس لئے ابتدائی سردی کے وقت مریض کو ڈھانپ دیں اور گھونٹ گھونٹ گرم پانی بلائیں۔ بسااوقات گردے کی افکیشن سے پیدا ہونے والی علامات بالکل ملیریا کے آغاز کی علامتوں سے ملتی ہیں اس لئے علاج میں جلدی نہ کریں بلکہ وقتی سہارے کی دوائیں دیں اور جب خوب کھل کران دونوں میں امتیاز ظاہر ہوجائے تو پھراصل بیاری کاعلاج شروع کیا جائے۔

اپی کاک کالی کھانسی میں بھی مفیدہے کیونکہ اس میں تشنج کی علامت پائی جاتی ہے۔ اگر تشنج کے ساتھ ساراجسم اکڑ جائے، چہرہ سرخ ہواور متلی بھی ہوتو ایسی صورت میں اپی کاک غیر معمولی فائدہ پہنچاتی ہے۔عموماً ایسی کیفیت میں بیلا ڈونا کا خیال آتا ہے لیکن پہلے اپی کاک دیں۔

ا پی کا ک کا ٹیٹنس (Tetanus) کے شنج سے بھی تعلق ہے۔ ابی کا ک کی تکلیفیں گرم مرطوب موسم میں بڑھ جاتی ہیں۔

مددگاردوائیں: کیوپرم-آرنیکا دافع اثر دوائیں: چائنا۔ٹو بیکم -آرسنک طافت: 30سے 200 تک

121 7 رسٹینکس

IRIS TENAX

آ ئرسٹینکس ایک بودے سے تیار کی جانے والی دواہے۔1885ء میں ڈاکٹر جارج وگ نے اس دوا کی آ زمائش کی اور اسے ایسے مریضوں پر استعمال کیا جنہیں آنتوں میں شدید در داور سنر رنگ کی قے آنے کی شکایت تھی۔ آئرس ٹینکس ، آئرس ورسیکولر (Iris Versicolor) سے ملتی جلتی دوا ہے کین دونوں میں فرق بھی ہےاور دونوں کی اپنی اپنی الگ خصوصیات بھی ہیں۔ آئرس ورسکولرمعدے کی کھٹاس اور تیزابیت کی بہترین دواہے جبکہ آئرسٹینکس میں معدے کی کھٹاس تو یائی جاتی ہے کیکن اس تکلیف کے ساتھ گلے اور منہ میں بھی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ آئرس ٹینکس اینڈ ہے۔الہٰذا اس کے فوائد وُحض (Appendicitis) کی بہترین دوائمجھی جاتی ہے۔الہٰذا اس کے فوائد وُحض اسی نکلیف تک محدود کردیا گیا ہے حالانکہ بیروزمرہ کی عام نکلیفوں میں بھی ایک کارآ مددوا ہے۔ آئرسٹینکس میں منہ میں جلن کا احساس ہوتا ہے۔ زبان ، گلے اور منہ کی اندرونی جلدمتاثر ہوتی ہے۔ گلاخشکہ ہوجاتا ہے اور ٹھنڈے یانی سے آرام نہیں آتا۔ جب بیر تکلیف بڑھتی ہے تو سر میں شدید در دہونے لگتا ہے جو بسااوقات دائیں طرف اپنا مقام بنالیتا ہے گر بائیں طرف بھی ہوتا ہے۔اس کے ساتھ قے آتی ہے جس میں صفراوی ما دہ نکلتا ہے۔ پیٹے میں شدید در د ہوتا ہے جس کے ساتھ کھیاؤ اور تناؤ کا احساس ہوتا ہے۔ تشنج بھی ہوتا ہےاوراسہال بھی شروع ہوجاتے ہیں۔ آئرسٹینکس میں مریض اداس ر ہتا ہے۔ ہر بات کا صرف تاریک پہلو دیکھا ہے۔ گھر سے دور ہوتو اعز ہ وا قارب کے لئے اداس ہو جاتا ہے اور واپس گھر آنے کی خواہش رکھتا ہے تا ہم اداس کا بیر جمان

بعض دفعہ خوتی ہے بھی بدل جاتا ہے لیکن پاگل بن کی علامتیں نہیں ہوتیں۔ موڈ بدل جاتا ہے۔

کبھی بشاشت محسوس کرتا ہے بھی اداس ہوجاتا ہے۔ آدھی رات کواداسی بڑھ جاتی ہے۔ کنپٹول
میں درد ہوتا ہے۔ سرکی جلد میں جلن اور خارش ہوتی ہے۔ بیام خارش نہیں ہے بلکہ جلن کے
ساتھ عارضی طور پر ہوتی ہے۔ بیکوئی مستقل بیاری نہیں ہے۔ سردرد عموماً دائیں آئکھ پر اپنا مقام
بناتا ہے۔ ہفتہ میں ایک دفعہ سردرد کا دورہ ہوتا ہے۔ کھی سبز رنگ کی قے آتی ہے۔ آئکھوں میں
بناتا ہے۔ ہفتہ میں ایک دفعہ سردرد کا دورہ ہوتا ہے۔ کھی سبز رنگ کی قے آتی ہے۔ آئکھوں میں
درد ہوتا ہے۔ میرے خیال میں مذکورہ علامات کے ساتھ کسی بھی دانت میں درد ہوتو اسے
استعال کرنا جا ہے۔

آئرسٹینکس میں اسہال بھی ہوتے ہیں۔ پیٹ کے نیلے حصہ میں درداور شنج ہوتا ہے۔ چونکہ اس دوا کا دائیں طرف سے نسبتاً زیادہ تعلق ہاں گئے یہ اپنڈیکس کے لئے بھی بہترین دواہے۔ ڈاکٹر وگ نے کہیں بھی اپنڈیکس کا ذکر نہیں کیا لیکن ان کے بعداس دوا کی علامتوں کو پیش نظر رکھ کر بہت سے ایسے تجارب ہوئے جن سے اس دوا کو اپنڈیکس میں بہت مفید پایا گیا۔ میں نے آئرسٹینکس کو آرنیکا اور برائیونیا کے ساتھ 200 طاقت میں ملا کر اپنڈیکس کی تکلیفوں میں بار ہا استعال کیا ہے اور یہ بے حدمفید نسخہ نابت ہوا ہے اور جرت انگیز کیس کی تکلیفوں میں بار ہا استعال کیا ہے اور یہ بے حدمفید نسخہ نابت ہوا ہے اور جرت انگیز اثر دکھا تا ہے۔ اگر شنجی علامات نمایاں ہوں تو برائیونیا کی بجائے بیلا ڈونا استعال کرنی چاہئے۔ افراد کھا تا ہے۔ اگر شنجی علامات نمایاں ہوں تو برائیونیا کی بجائے بیلا ڈونا استعال کرنی چاہئے۔ افتیار کر لیتی ہے۔ یہ تخطرنا کے صورت حال پر قابو پالیتی ہیں۔ مجھا کثر اپنڈیکس کی وجہ سے میں ٹھیک ہوجا تا تھا۔ ایک دفعہ میں سفر میں تھا۔ آغاز سے کی تکلیف ہوا کر تی تھی ۔ اس نے یہ تینوں دوائیں استعال کیں۔ سفر میں ایک رات گرزاری اورا گلے روز خود چارسومیل موٹر چلا کر کرا چی پہنچا۔ درد قابو میں رہا۔ اگلے روز صح مجھے ہیںتال لے جایا گیا۔ جب سرجن نے میرامعائنہ کیا تو جرت زدہ رہ گیا کہ اینڈیکس جگہ جگہ سے جبیتال لے جایا گیا۔ جب سرجن نے میرامعائنہ کیاتو جرت زدہ رہ گیا کہ اینڈیکس جگہ جگہ سے جب سرجن نے میرامعائنہ کیاتو جرت زدہ رہ گیا کہ اینڈیکس جگہ جگہ سے جب سرجن نے میرامعائنہ کیاتو جرت زدہ رہ گیا کہ اینڈیکس جگہ جگہ سے خوالی کیا جو بایا گیا۔ جب سرجن نے میرامعائنہ کیاتو جرت زدہ رہ گیا کہ اینڈیکس جگہ جگہ سے خوالی کیا جب سرجن نے میرامعائنہ کیاتو جرت زدہ رہ گیا کہ اینڈیکس جگہ جگہ سے خوالی کیا جب سرجن نے میرامعائنہ کیاتو جرت زدہ رہ گیا کہ اینڈیکس جگہ جگہ سے خوالیا گیا ہے جب سرجن نے میرامعائنہ کیاتو جرت زدہ رہ گیا کہ اینڈیکس جگہ جگہ سے خوالی کیا کہ کو میں کیا کہ کو میں جو باتا گیا کہ کو میں کیا کیا کہ کو میں کیا کو کر میں کیا کیا کہ کی خوالی کیا کہ کو کیا کہ کو کر میں کی کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کی کی کو کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کر کی کو کیا کہ کیا کی کو کی کو کیا کی کی کی کی کی کی کو کر کی کی کو کر کی کو کو کیا کیا کی کو کیا کر کر کی کی کیا کو کر کو کر کی کی کی کی

پھٹ چکا تھا اور پیپ بہہ رہی تھی۔ ایسی خطرناک حالت تھی کہ بظاہر میرا زندہ رہنا اور پھر چارسومیل موٹر چلا کرایسی حالت میں وہاں پہنچنا سرجن کے لئے نا قابل فہم تھا۔اس کے بعد میرا اپریشن تو ہوالیکن میں نے پنسلین کی بجائے اند مال زخم کے لئے ہومیو پیتھک جراثیم کش دوائیں ہی استعال کیں۔

ہومیواطباءاورمریضوں کومیرامشورہ یہی ہے کہان متیوں دواؤں پرا تناانحصار نہ کریں کہ باوجود اپریشن کی ضرورت کے اسے ٹالتے رہیں۔اگر ایک دفعہ اپنڈ میس خراب ہو چکا ہواور ہومیو پیتھک دواؤں سے اسے محض وقتی آرام ملتا ہوتو پھرایریشن کروانا ہی بہتر ہے۔

اینڈ کیس کا دورہ دن یارات کے سی بھی وقت ہوسکتا ہے۔ کتابوں میں عموماً رات کا وقت کی کھا ہوا ہے۔ کتابوں میں عموماً رات کا وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔

ہ مرس ٹینکس میں دردیں دائیں طرف سے شروع ہو کر سارے پیٹ میں پھیل جاتی ہیں۔شدید قے کی طرف رجحان ہوتا ہے۔

آئرس ٹینکس میں ضح کے وقت جاگئے پر اور کھڑے ہونے پر معدہ ڈو بنے کا احساس ہوتا ہے، پیٹ میں شدید درد جودائیں سے بائیں حرکت کرتا ہے۔ بسااوقات رات کے وقت اسہال کی تکلیف ہوتی ہے اور آ دھی رات کو شدید اسہال شروع ہوجاتے ہیں۔ اگر معدہ میں تیز ابیت زیادہ ہوجائے تو بار بار بیشاب آئے لگتا ہے۔ کھلے بیشاب کے ساتھ جلن ہونے لگا اور بار بار حاجت ہوا اور بیشاب کی رنگت نسواری ہوجائے تو بی ترس ٹینکس کی علامت ہے۔ آرسنگ اور خاجت ہوا اور بیشاب کی رنگت نسواری ہوجائے تو بی ترس ٹینکس کی علامت ہے۔ آرسنگ اور نیٹرم فاس بھی اس تکلیف میں مفید ہیں لیکن ان کی اپنی دیگر علامات کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔ نیٹرم فاس میں بیشاب کے رنگ میں کچھ پیلا ہے ہوتی ہے۔ تیز ابیت کے نتیجہ میں بیشاب کا بیلا ہو جانا اور دواؤں میں بھی ماتا ہے۔ تیز ابیت کی وجہ سے بار بار بیشاب آئے تو بہت کمزوری ہوجاتی ہے۔ چانا پھرنا دو بھر ہوجاتا ہے۔ ایسے مریضوں کو آئرس ٹینکس دینی چاہئے۔

آئرس ٹینکس کے مریض کو نینز نہیں آتی ۔ ضبح دردوں میں کمی کے باوجود کمزوری کی وجہ آئرس ٹینکس ہوجاتا ہے۔

طاقت: 30 ہے۔200 تک

122 آئرس ورسيکولر IRIS VERSICOLOR

آئرس ورسیکولر معدے کی کھٹاس کے لئے بہترین دوا ہے۔ بیانتڑیوں اور معدہ کی اندرونی جھلیوں پربھی اثر انداز ہوتی ہے۔اس میں دردشقیقیر کی تمام علامتیں پائی جاتی ہیں یعنی معدے کی کھٹاس متلی کار جحان، آ دھے سرمیں درد، جکڑن کا حساس وغیرہ وغیرہ۔

آئرس ورسیکولرمیں کا نول کی علامتیں بھی بہت نمایاں ہوتی ہیں۔کا نول میں شوراور بھنجناہے کی آ وازیں آتی ہیں اور رفتہ رفتہ بہرہ پن پیدا ہونے لگتا ہے۔ چونکہ بیدوا کا نول پراثر انداز ہوتی ہے اس لئے وہ چکر جوکان کی خرابی کی وجہ سے آتے ہیں ان میں بھی بیہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ عموماً ایسی کیفیت میں کا کولس بہت اچھا اثر کرتی ہے لیکن اگر کام نہ کرے تو آئرس ورسیکولر کو بھی یا در گھیں۔ یہ بھی کان کے پردہ کی خرابی اور اس میں موجود مائع کا توازن گرٹی وجہ سے جو چکر گرائی وجہ سے جو چکر آتے ہیں ان میں تنس والے چکروں کے لئے بہترین دوا ہے۔ معدہ کی خرابی کی وجہ سے جو چکر آتے ہیں ان میں تنس وامیکا اور برائیونیا مفید ہے۔

ناشتے کے بعد چہرہ پراعصابی درد ، زبان اور منہ کے اندر جلنے کا احساس ، لعاب دہن کوکس (Coccus) کی طرح ریشے دار اور تیز اب کی زیادتی کی وجہ سے اوپر سے لے کر نیچ تک تمام نظام ہضم میں جلن پائی جاتی ہے۔ پیٹ میں بہت ہوا بنتی ہے۔ جس کی وجہ سے درد کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ بھی قبض اور بھی اسہال شروع ہوجاتے ہیں۔ ہر پیز (Herpes) میں بھی یہ مفید دواہے بشرطیکہ معدے کی خرابی سے اس کا تعلق ہو۔

اس میں ہر قشم کی جلدی امراض بھی پائی جاتی ہیں لیکن محض جلدی امراض کی

علامتوں کے ذریعہ اس کی پہچان ممکن نہیں۔اسے زیادہ تر معدے کی علامتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کی تکلیفیں رات کو آرام کرتے ہوئے بڑھ جاتی ہیں۔ حرکت سے کم ہوتی ہیں۔ نکس وامیکا اس کی مصلح دواہے۔

> دافع اثر دوائیں: نکس وامیکا طاقت: 30سے 200 تک

123

كالى بائتكروم

KALI BICHROMICUM

(Bichromate of Potash)

کالی بائیگروم کا ہوا کی نالی اور ناک کی بلغی جھلیوں سے گہراتعلق ہے اس میں کالی کارب،کالی آ یوڈائیڈ اورکالی سلف کے ساتھ یہ بات مشترک ہے کہ بیاری اور درد کا احساس جسم کے بعض حصوں میں محدود دائروں میں ماتا ہے۔ بعض دفعہ اتنی تھوڑی سی جگہ میں بیاری سمٹ جاتی ہے کہ وہ جگہ ایک انگوٹھے کے پنچ آ سکتی ہے۔ نزلم بھی ناک کے اندرکسی معین جگہ درد کے جاتی ہے تہ وہ عیاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کا آغاز عموماً بائیں طرف سے ہوتا ہے۔ اس دواکی بیدونوں علامتیں قطعی طور پر مجر باور بہت نمایاں ہیں۔ مجھے بھی کسی زمانہ میں سردردکسی خاص جگہ مثلاً کنیٹی کے ایک نقطہ پر زیادہ شدت سے محسوس ہوتا تھا اور انگوٹھے سے دبانے سے آرام آتا تھا۔ اس طرح نزلہ بھی بائیس نتھنے میں ایک چھوٹے سے مقام پر درد کے احساس سے شروع ہوتا تھا۔ ان طرح نزلہ بھی بائیس نتھنے میں ایک چھوٹے سے مقام پر درد کے احساس سے شروع ہوتا تھا۔ ان دونوں تکلیفوں کو کالی بائیکر دم کے استعال سے آرام آگیا۔

کالی کارب میں درداور بیاری کے مقامات نسبتاً بڑے دائروں میں پائے جاتے ہیں۔
کالی بائیکروم میں دھڑ کنیں بہت ہوتی ہیں۔سرسے پاؤں تک ہر جگہ دھڑ کنے کی علامت ملتی ہے۔
تکیہ پرجس کروٹ سر رکھیں و ہیں دھڑ کن محسوں ہوتی ہے اور نیند نہیں آتی۔ یہ پوٹاشیم کے نمکیات
کی خاص نشانی ہے کہ سارے جسم میں دھڑ کنیں پائی جاتی ہیں مگر کالی بائیکروم کی میعلامت بہت
نمایاں ہے۔

ہڈیوں میں ایسے درد کا احساس ہونے لگتا ہے جیسے رکڑ لگ گئی ہواور مارا پیٹا گیا ہو۔ یوپیٹوریم (Eupatorium) میں جسم کی ساری ہڈیاں اندر تک دکھتی ہیں مگر کالی بائیکروم میں مڈیوں کی صرف سطح پر دکھن اور رگڑ کا احساس ہوتا ہے۔ کالی بائیکروم میں نزلاتی تکلیفیں جوڑوں کی اعصابی نکالیف سے ادلتی برلتی رہتی ہیں۔ گر بائی کے ان در دوں کا بہت احتیاط سے علاج کرنا جائے۔اگرکسی تیز دواسے ٹھیک کردی جائیں تو فائدہ کی بجائے نقصان ہوجا تا ہے اور زیادہ خطرناک بیاری گھیرلیتی ہے۔ کالی بائیکروم بھی بائی کی دردوں کی دواہے۔ بیان مریضوں پر استعال کرنی جاہئے جن کے جسمانی در دٹھیک ہوتے ہیں تو نزلاتی تکلیفیں شروع ہوجاتی ہیں۔اور نزلے کوکسی وقتی اور فوری دواہے آ رام دیں جومرض کی اصل دوانہ ہوتو اس کے نتیجہ میں بائی کی دردیں دوبارہ اٹھ کھڑی ہوں گی۔ جہاں بھی بیادل بدل پایا جائے وہاں کالی بائیکروم کو یا در تھیں۔ کالی بائیکروم خناق (Diphtheria ـ ڈفتھیریا) کی بھی اچھی دواہے مگر میوریٹک ایسٹر (Muriatic Acid) کا مقابلہ ہیں جو خناق کی اولین دوا ہے اور انتہائی کمزوری کو بھی دور کرتی ہے۔عموماً پوٹاشیم کے سب نمکیات میں کمزوری کا بہت احساس پایا جاتا ہے۔مثلاً کالی فاس اعصابی طاقت کے لئے استعال کی جاتی ہے اور اسی طرح کالی کارب کے بالمثل استعال سے بدن اورعضلات میں نئی جان پڑ جاتی ہے۔ٹانگیں ہلکی ہو جاتی ہیں اور اٹھنے بیٹھنے میں آ سانی ہو جاتی ہے۔کالی بائیکروم بھی یہی مزاج رکھتی ہے۔اگر مریض کالی بائیکروم کا ہوتو دوا کھاتے ہی جسم ملکا بھلکا ہوجائے گا۔ یوٹاشیم کے تمام نمکیات عضلات اوراعصاب کے لئے مقوی (Tonic) کے طور برمفید ہیں۔ان سبنمکیات میں زخم بننے کار جحان پایا جاتا ہے۔معدہ میں تیز ابیت زیادہ ہو جائے تو زخم بننے لگتے ہیں۔انترایوں میں یا کہیں اور زخم یا ناسوریائے جائیں تو یہ علوم کرنا جاہئے کہ مریض کی علامات کسی بوٹاشیم کے نمک سے تو نہیں ملتیں ۔ایک مریض کے یاؤں پر بہت گہرا اور برانا ناسور تھا۔اسے میں نے کالی آ بوڈ ائیڈ دی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ ناسور غائب ہو گیا۔اس سے پہلے وہ بہترین فوجی ہیپتالوں میں داخل ہو کرعلاج کروا چکا تھا۔ میں نے محض اس لئے بیدوا تجویز کی تھی کہاس کی ہاقی علامات پوٹاشیم سے ملتی تھیں۔

کالی بائیکروم <u>معدے کی تکلیفول میں بھی</u> بہت مفید ہے۔معدے میں ناسور اور

کینسر کی بیاریاں بیک وقت کسی ایک مریض میں شاذ ہی ہوسکتی ہیں یا وہ کینسر کا مریض ہوگا یا ناسوروں کا۔کالی بائیکروم کا مریض معدے کے ناسوروں کا مریض ہوتا ہے۔معدے کی تکلیفوں میں کالی بائیکروم کی علامتیں ملتی ہوں تو فوراً اسے شروع کرواد بنا چاہئے تا کہ بیاری سنگین صورت نہ اختیار کر سکے۔

کالی بائیکروم کے زخم بہت گہرے اور ان کے کنارے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں کیکن یہ کوئی ممتاز کرنے والی علامت نہیں، بعض اور دواؤں میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے۔
کالی بائیکروم میں ایک علامت کاسٹیکم سے ملتی ہے یعنی بعض اوقات چلتے پھرتے یا اٹھتے بیٹھتے کھٹنوں سے آ وازیں نکلتی ہیں جو تکلیف نہ بھی دیں تو ذہنی البحص ضرور پیدا کرتی ہیں۔ کاسٹیکم اس میں چوٹی کی دواشار کی جاتی ہے۔کالی بائیکروم بھی اس کی ہم پلہ دوا ہے۔ مگر اس میں جلن کا اس میں پایا جاتا ہے اور سردی جاتی ہوتی ہے۔سردی اور جلن پوٹاشیم کے نمکیات میں بیک وقت یائی جاتی ہیں۔

کالی ہائیکروم میں بیلا ڈونا سے مشابدایک خصوصیت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ بیلا ڈونا میں بیاری کی علامتیں تیزی سے پیدا ہوتی ہیں اور تیزی سے ختم ہو جاتی ہیں۔کالی ہائیکر وم کی بیاریوں میں بھی تیزی سے علامتیں پیدا ہوتی ہیں اور تیزی سے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔

لغفن کے بخار میں بھی کالی بائیکروم کافی مفید دوا ہے۔جسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے مریض بستر میں لحاف اوڑھ کر لیٹنے سے آرام محسوں کرتا ہے۔ رات کے بچھلے بہر مرض میں شدت بیدا ہوجاتی ہے۔ جس وقت کوئی مرض بڑھے،اگلے روز بھی اسی وقت اس میں جوش پیدا ہوگا۔

کالی بائیکروم مرگی کے مرض کو دور کرنے میں بھی شہرت رکھتی ہے۔اگر مرگی کے مریض کے منہ سے دھاگے دارتھوک نکلے توبیکالی بائیکر وم کی علامت ہے۔

کالی بائیکروم کے سردرد میں گرم مشروب سے آرام آتا ہے۔ رات کو درد میں اضافہ ہوتا ہے جو آ دھی رات کے پچھ در بعد بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔

آ نکھے سے دھاگے دارمواد نکلے تواس میں بھی کالی بائیکروم بہت اچھی دواہے کیونکہ بیآ نکھوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔

کالی بائیکروم میں اکثر درد بائیں طرف ہوتے ہیں لیکن دائیں طرف بھی ہوسکتے ہیں۔ زیادہ تر سر درداور چہرے کا اعصافی درد بائیں طرف ہی رہتا ہے۔ سر درد کے ساتھ متلی بھی ہوتی ہے۔ چند دنوں کے وقفہ سے دردعود کر آتا ہے۔ یہ درد شقیقہ کے لئے بھی اچھی دوا ہے۔

کالی بائیکروم سرکے ایگزیما کے لئے بہت اچھی ہے۔لیکن اگر ایگزیما میں سرکے زخموں سے زرد رنگ کا مواد خارج ہواور چھکے اتریں جن سے بہت بدبو آتی ہوتو بیاولین طور پر میزیرم (Mezereum) کی علامات ہیں۔

کالی بائیکروم میں میزریم کی ایک اور علامت بھی پائی جاتی ہے کہ اگر ناک کی علامات ٹھیک ہوجائیں توا یگزیما ہوجاتا ہے،ایگزیماٹھیک ہوتو نزلہ شروع ہوجاتا ہے۔

کالی بائیکروم میں ناک کے اندر گہرائی میں ایک خاص مقام ہوتا ہے جہاں سے نزلہ شروع ہوتا ہے۔ گلے اور ناک کے جوڑ کے پاس جراثیم کی کمین گاہ بن جاتی ہے اور پھرناک اور گلے سے اچانک نا قابل برداشت بد بو کے بھیجکے اٹھتے ہیں۔ ان علامات میں کالی بائیکروم اور میزرم مشترک ہیں لیکن میزرم کا دائر ہائر محدود ہے۔ وہ اسی حصہ میں رہتی ہے لیکن کالی بائیکروم تمام جسم پراثر انداز ہوتی ہے۔ میزرم کے ساتھ گرمی اور سردی کی علامات نہیں ہوتیں۔

کالی بائیکروم آئکھوں کی تکلیف کے لئے بھی بہت مفید ہے۔ روشنی سے تکلیف کا بڑھنا، آئکھوں کے سرا منے مختلف رنگوں کے دھبے، نظر کا دھندلا جانا، آئکھوں کے پردے کی تکلیفیں، کور نیا میں السر (Ulcer) ان سب کے لئے کالی بائیکروم بہت مفید ہے۔ اس کے زخم میں دھڑ کن کا احساس ہوتا ہے۔ آئکھ کے السر میں دھڑ کن بہت تکلیف دیتی ہے اس کئے فوراً کالی بائیکروم دینی چا ہئے۔ یہ بہت زودا ٹر اور کار آمد دوا ہے۔ آئکھ کے چھیر پر چھوٹے زخم بن جائیں یا جھلی کھول کر لٹک جائے۔ آئکھیں سرخ رہنے پر چھوٹے جھوٹے زخم بن جائیں یا جھلی کھول کر لٹک جائے۔ آئکھیں سرخ رہنے

لگیں تب بھی یہ مؤثر ہے۔

کالی بائیکروم میں کان ، ناک ، جبڑوں اور ہونٹ وغیرہ لیعنی تمام چہرے کی مشتر کے علامات

کانوں سے بھی چینے والامواد نکلتا ہے۔ کان میں بھی دھڑکن کا احساس ملتا ہے۔ اگریہ مزمن ہوجائے تو کان کے پردے میں سوراخ ہوجاتے ہیں۔ قوت شامہ بھی کمزور پڑجاتی ہے۔ ناک میں مواد جم جائے تو درد بھی ہوتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ نمی سے تکلیفیس بڑھتی ہیں۔ عام تیز کاٹے والامواد ناک سے بہتا ہے۔ اگر نزلہ مزمن ہوجائے تو ناک کے نھنوں کے درمیان والی ہڈی میں سوراخ ہوجائے ہیں۔ ایک عجیب علامت یہ بھی ہے کہ اگر اس ہڈی پر نزلہ کا مواد جم کر سخت ہو جائے تو اسے کھر چنے سے آئکھ کی بینائی پر اثر بڑتا ہے۔ بیشانی اور آئکھوں میں درد ہوتا ہے۔ داڑھوں میں کھانسی کی و جہسے درد ہوتا ہے۔ سردرداور نزلاتی تکلیفوں میں جس طرف بھی درد ہواس طرف کی نجلی داڑھوں میں ہوتا ہے جو احساس ہوگا گویا کہ درد کی اصل جڑ یہی ہے۔ یہ درد دراصل اعصابی ریشوں میں ہوتا ہے جو داڑھوں میں موتا ہے جو داڑھوں میں موتا ہے جو

ہونٹوں کے ناسور اور زخموں کے لئے بھی کالی بائیکروم مفید دوا ہے۔ سسٹس (Cistus) بھی ہونٹوں کے زخموں کے لئے مفید ہے خصوصاً نچلے ہونٹ کے السر میں فائدہ دیتی ہے۔ ڈلکا مارا دونوں ہونٹوں کے السر میں مفید ہے اور جلد کی بیاریوں میں بھی مفید ہے خصوصاً وہ بیاریاں جو تیزی سے بھیلتی ہیں۔ Pyretic Glands کے لئے بھی مفید ہے۔

کالی بائیکروم میں ناک سے خون نکلتا ہے۔ ناک کی باریک جھلیوں میں گومڑ سے بن جاتے ہیں۔ چہرے کی جلداوراندرونی جھلیول کے دق میں بھی بہت مفید دوا ہے اوران دونوں بیاریوں میں خدا کے فضل سے شافی ثابت ہوئی ہے۔

کالی بائیکروم میں زبان پر تہہ ہی جم جاتی ہے۔اگلے حصہ پر سفیدی اور پچھلے حصہ پر

زردی پائی جاتی ہے۔ زبان کہیں کہیں سے میلی ہوتی ہے اوراس بیاری کی ایک خاص چیک ہوتی ہوتی ہے جو عام صحت مند زبان پر دکھائی نہیں دیتی۔ بعض دفعہ زبان کے اندر گلے کی نالی کے قریب چھوٹے چھوٹے چھوٹے ابھار بن جاتے ہیں جوسٹر ابری (Strawberry) کی طرح کی شکل اور رنگت رکھتے ہیں اوران کا کھر درا بن گلے کومحسوں ہوتا ہے۔ زبان کے السر میں بھی بہت مفید دوا ہے۔ دانتوں کی جڑوں اور گالوں کے اندرونی حصول میں بھی السر بننے کا رجحان ہوتا ہے۔ گلے کی سوزش کے ساتھ زخم بن جاتے ہیں اور گلے کا درد علی کی نالی اور نیجی چھلیول میں بھی پیل جاتا سوزش کے ساتھ زخم بن جاتے ہیں اور گلے کا درد میں کھی کا درد عموماً ایک جگہ تک ہی محدود ہوتا ہے مگر گلے کی دکھن کا احساس وسیعے دائرہ میں بھیل حاتا ہے۔

کالی بائیکروم کی ورمول سے ملتی جلتی ورموں کی دیگر نمایاں دوائیں ہے ہیں کیکیسس ، کالی آیوڈ ائیڈ ، نائیٹرک ایسڈ ، فاسفورس اور سلفیورک ایسڈ ۔

کالی بائیکروم میں السر بننے کار جمان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ گلے کے غدود پھول جائیں تو درد کے علاوہ اسنے متورم ہوجاتے ہیں کہ گلے کے باہر گردن پر بھی ورم نمایاں ہوجاتی ہے اور سرخی بھی پائی جاتی ہے۔ گلے میں بال کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ ٹیرینٹولا میں بھی ہر جگداس فتم کے احساسات پائے جاتے ہیں۔ ہیپر سلف میں کسی چیز کے چیکنے کا احساس پایا جاتا ہے۔ زبان کی جڑکے قریب علامات سمٹ جاتی ہیں اور بہت شدید در دہوتا ہے۔ وہاں ایسے زخم ہوتے ہیں جونظر نہیں آئے۔

مملی اور قے کا رجمان: - قے میں غیرہضم شدہ خوراک نکلتی ہے جس میں صفراء کے علاوہ خون کی آ میزش بھی ہوتی ہے ۔ بلغم بھی نکلتی ہے جولیس دار دھا گے کی طرح ہوتی ہے۔ شراب کے رسیا لوگوں کی مملی کے لئے یہ چوٹی کی دوا بیان کی جاتی ہے۔ کالی بائیکروم بڑی آ نت کے زخمول یعنی تک اس کا نمایاں طور پر مؤثر علاج مند ہوسکتی ہے۔ یہ بہت ضدی بیاری ہے۔ ابھی تک اس کا نمایاں طور پر مؤثر علاج دریا فت نہیں ہوسکا۔معدے کے نزلہ میں بھی کالی بائیکروم مفید ہے۔ سردی لگنے سے معدہ میں کمزوری اور نقابت کا احساس ہوتا ہے اور اخراجات میں بلغم بیدا ہونے لگتی ہے اور

طبیعت بدمزہ ہوجاتی ہے۔

کالی بائیکروم میں دردجگر سے کندھوں کی طرف حرکت کرتا ہے۔ بیایک خطرناک علامت ہے۔ جگراور بیتے کے کینسر میں پیعلامت ملتی ہے اور مریض کندھے میں شدید درد کی شكايت كرتا ہے اس صورت حال ميں كالى بائيكروم كواستعال كرنا جاہئے۔ يہ بھى ان تكليفوں ميں کام آتی ہے جن کا پتھری سے علق ہو۔ یتے کی پتھری اور جگر کا کینسرل کر کندھے میں در پیدا کردیتے ہیں۔ پیجیب شم کا تکلیف دہ در دہوتا ہے۔ جس کا کندھے کے عضلات سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔کالی بائیکروم ہتے کی پھری اور جگر کی تکلیفوں میں بلاتا خیر شروع کروانی عاہے ۔اس کے اثر سے بسااوقات ہے کی پھریاں گھانے گئی ہیں اور آپریشن کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔صفراء میں خرابی پیدا ہو جائے تو بتے میں پھری بنتی ہے۔اگر صفراء میں خشکی پیدا ہو جائے اور بہت چھوٹی حچوٹی گھلیاں بنے لگیں تووہ بیتے میں جا کر پھریاں بنادیتی ہیں۔اگرصفراء کے کیمیائی مادے متوازن ہوجا ئیں تو وہ الیمی بنی ہوئی پتھریوں کو پھر سے خلیل کر دیتے ہیں۔ میرے پاس بیتے کی پتھریوں کے بہت مریض آتے ہیں۔ چونکہ میرے پاس اتناوفت نہیں کہ ہر ا یک کی علیحدہ علیحد ہشخیص کرسکوں اس لئے کسی ایک دوا کی بچائے ایک مرکب نسخہ استعمال کروا تا ہوں جواللہ تعالیٰ کے فضل سے اکثر مریضوں میں انتہائی کامیاب ثابت ہواہے۔اس کا ایک جزو کالی بائیکروم بھی ہے۔ یہ نسخہ حسب ذیل ہے۔

کالی بائیگروم، لائیگو پوڈیم، کولیسٹرینم، نیٹر مسلف 30 طاقت میں ملاکر دیں۔علاوہ ازیں اشنے کوفوراً دورکرنے کے لئے میگ فاس، کولوسنتھ اور ڈائسکو ریا کا مرکب 30 طاقت میں مددگار کے طور پراستعال کرایا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ جرمنی میں ایک دواملتی ہے جوبعض جڑی بوٹیوں سے بنائی گئی ہے اس کا نام اوسیا فیل (Ospafell) ہے۔ یہ بھی ہے کی پھری کوتحلیل کرنے میں بڑی شہرت رکھتی ہے۔ یہ دوا اگر ہومیو پیتھک نسخہ کے ساتھ مددگار کے طور پر استعال کی جائے تو مکور فر فضا کہ جائے تو محل مضا کے خاتے ہوتا ہے۔

کالی بائیگروم میں اسہال اور اجابت کے وقت درد ہوتا ہے یاحرکت سے درد ہوتا ہے۔ اجابت کے وقت انترا یوں میں ہونے والی حرکت سے جگر میں ٹا نکہ بھرنے کی طرح کا چھنے والا در د ہوتا ہے۔ تلی میں بھی چھن کا احساس ہوتا ہے۔ پیٹ میں بہت ہوا پیدا ہوتی ہے اور نفخ کی علامات ظاہر ہوجاتی ہیں۔ جسم میں ملکے ملکے درد کا احساس رہتا ہے، انترا یوں میں دکھن ہوتی ہے۔ اسہال سے قبل معدے میں کمزوری اور ڈو بنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ متلی کے ساتھ تے ہونے لگتی ہے پھر اسہال شروع ہوجاتے ہیں۔ کالی بائیگروم میں اسی تر تیب سے بیعلامتیں پیدا ہوتی ہیں۔ سلفر کی طرح صبح کے وقت اسہال شروع ہوتے ہیں۔ ایسے اسہال میں جن کا رنگ مٹیالا ہو کالی بائیگروم بہت کا م کرتی ہے۔

کالی بائیکروم کی بائی کی در دیں بعض دفعہ نزلے کی بجائے بیچیں سے ادلتی بدلتی ہیں اور بیچیں گئے پر مریض کا بدن ہاکا ہوجا تا ہے۔ حاجت سے پہلے اور رفع حاجت کے دوران در د ہوتا ہے اور فراغت کے بعد بھی بل پڑتا ہے کا نچے بھی باہر نکل آتی ہے۔ بواسیر کے مسے بھی باہر نکل آتے ہیں اور بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ کمر میں درد کے ساتھ بیشاب میں خون باہر نکل آتے ہیں اور بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ کمر میں درد کے ساتھ بیشاب میں خون آتا ہوتو کالی بائیکر وم کو بھی یا در کھنا چاہئے۔ بیشاب میں دھاگے دار رطوبت بھی نکلتی ہے۔ بیشاب سے پہلے کمر کی دمجی میں در دہوتا ہے۔ بیکالی بائیکر وم کی خاص علامت ہے۔

کالی بائیکروم کی مریض عورتوں میں گرمیوں میں رحم کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ حیض میں تیز ابیت اور جلن پائی جاتی ہے۔ وقت سے پہلے خون جاری ہوجا تا ہے۔ بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے دودھ کے دھاگے بننے گئیں تو کالی بائیکر وم خاص طور پر یا در کھنے کے لائق دوا ہے۔ اگر دودھ میں دہی کی طرح پھٹکیاں بننے لگیں تو اس کے لئے فائٹو لاکا (Phytolacca) بہترین دوا ہے جوحمل کی مثلی میں بھی فائدہ مندہے۔

اگر کسی کی آواز مستقل بیٹھ جائے تواس کے لئے کالی بائیکروم بہت اچھی دواہے۔ نرخرے میں خرخراہٹ کی آوازیں آئیں اور بلغم چمٹی رہے تو کالی بائیکروم سے فائدہ ہوتا ہے۔ عموماً دمہ میں ایسی آ وازین نکلتی ہیں۔ کیونکہ نالیاں سکڑ جاتی ہے اور تشنج بھی ہوتا ہے اس لئے خرخرا ہٹ ہوتی ہے۔ کالی بھانسی کے لئے بھی یہ مفید ہے۔ کالی بائیکروم کی نزلاتی تکلیفیں سردیوں کے نمدارموسم میں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ گرمیوں میں برسات کے موسم میں اسہال لگ جاتے ہیں۔ بستر میں لیٹ کرآ رام محسوس ہوتا ہے۔

کالی بائیگروم میں بلغم سبزی مائل ہوتی ہے۔ بلغم کے ساتھ خون کے اوھڑ ہے بھی آنے گئتے ہیں۔ پچھپچھڑ ول کی دق میں کالی بائیگروم اور کالی کارب بہت مفید دوائیں ہیں۔ پوٹاشیم کے نمکیات کا پھیچھڑ وں میں سوراخ واقع ہونے اوران سے خون کے اخراج سے بہت گہراتعلق ہے۔

کالی بائیکروم میں کالی کارب اور اپی کاک کی طرح بیٹے میں سردی کا احساس ہوتا ہے۔ البتہ کالی بائیکروم میں سردی کا بیاحساس پیٹے کے نچلے حصہ تک محدود رہتا ہے جبکہ کالی بائیکروم میں اپی کاک کی طرح گردن تک سردی کی لہریں جاتی ہیں۔ بائی کی دردیں حرکت سے بڑھ جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے بیرائیونیا سے مشابہ ہے۔ شبح کے وقت درد میں شدت ہوتی ہے جواٹھ کر چلنے بھرنے سے آ ہستہ آ ہستہ بھرنے گئی ہے۔ رات آ رام کرنے سے فائدہ ہوتا ہے گرضج تک دردیں ایک مقام پرسمٹ جاتی ہیں جواٹھ کر چلنے پھرنے سے منشر ہوجاتی ہیں۔

کالی بائیگروم میں ہرتتم کی جلدی بیاریاں پائی جاتی ہیں۔ایگزیما، چھالے اور پھنسیاں نکتی ہیں۔ایگزیما، چھالے اور پھنسیاں نکتی ہیں۔اگر جلد کی تکلیفوں کومرہم وغیرہ لگا کر دبا دیا جائے تو وہ اندرونی جھلیوں میں منتقل ہو جاتی ہیں۔اس لئے کالی بائیکروم کی علامتوں کے ساتھ بیرونی طور پرادویہ کے استعمال سے پر ہیز کرنا جا ہے۔

دافع اثر دوائين: آرسنگ کيکيسس پلسڻيلا طانت: 30 يا 200

124

کالی کارب

KALICARBONICUM

کالی کار بونیٹ پڑیشیم اور کاربن کا ایک سفیدرنگ کا مرکب ہے جو پہلے وقتوں میں لکڑی، پتوں اور سمندری پودوں کی را کھ سے نکالا جاتا تھا۔ پڑیشیم کلورائیڈ کے بعد بیدوسراا ہم مرکب تھا جو شجارتی مقاصد کے لئے تیار کیا جاتا تھا۔ بعد از اں بیہ پودوں کی را کھ سے بنانے کی بجائے معدنی ذخائر سے نکالا جانے لگا۔اس کا سب سے بڑا ماخذ جرمنی کی نمک کی کا نیس تھیں۔ آج کل پڑیشیم صنعتی پمانے برگی طریقوں سے تیار کیا جاتا ہے۔

جلدی امراض ایگزیما اور خارش میں اسے ایک محلول کی صورت میں استعال کیا گیا ہے۔ ہومیو پیتی میں پڑپنسی بنا کر استعال کی جہت ملکے محلول کی صورت میں پڑپنسی بنا کر استعال کی جاتی ہے۔ اس دوا کا گہرائی میں سمجھنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس میں کئی تضادات پائے جاتے ہیں۔ گرمی اور سردی دونوں کے لئے مریض زودس ہوتا ہے۔ اس کا مزاج بہت الجھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر دوا کی تشخیص صحیح بھی ہولیکن مریض کا مزاج اسے قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہوتو فائدہ کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ عموماً اگر دوا غلط ہوتو نقصان پہنچاتی ہے لیکن کالی کارب وہ دوا ہے جوضیح بھی ہوتو نقصان کاباعث بن سکتی ہے۔ جیسے سلیشیا اگر صحیح بھی ہولیکن زیادہ اونچی طاقت میں دے دی جائے تو شدید نقصان پہنچاتی ہے۔

عنی نقرس میں انگلیوں اور ہاتھوں کے جوڑوں میں گانٹھیں بن جاتی ہیں اور ہاتھوں کے جوڑوں میں گانٹھیں بن جاتی ہیں اور ہاتھوں کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ انگلیاں ٹیڑھی ہونے لگتی ہیں۔ ایسی صورت میں کالی کارب کو اونچی طاقت میں دینا، جبکہ وہ مریض کے مزاج کے عین مطابق بھی ہو، بہت خطرنا ک ہے اور مریض کو سخت تکلیف میں مبتلا کرکے جان سے مارنے کے مترادف ہے۔ اگر

کالی کارب سیح دوا ہے توجسم کوفوری شفا کا حکم دے دے گی لیکن مریض میں طاقت ہی نہیں ہوگی کہ وہ اس بیاری کا مقابلہ کر سکے۔ گاؤٹ لیعنی نقر س کی علامات میں اگر شیح تشخیص کے بعد کالی کارب دوا تجویز ہوتو کچھا حتیا طوں کی ضرورت ہوتی ہے۔کالی کارب کے استعال سے پہلے ہمیشہ کاربوو تج دیں۔کاربوو تج مریض کو کالی کارب کے لئے تیار کر دیتی ہے اور اس کے بعد کالی کارب دینے سے سخت رقمل نہیں ہوتا نیز کالی کارب کو شروع میں 30 طاقت سے اونچا نہیں دینا جا ہے ہیں گالی کارب کو شروع میں 30 طاقت سے اونچا نہیں دینا جا ہے۔جب مریض اس کا عادی ہوجائے تو پھر بیشک طاقت بڑھادیں۔

جوڑوں کے درد کے علاوہ کمر کے پرانے درد سے بھی کالی کارب کا گہراتعلق ہے۔
عاص طور پر بچے کی پیدائش کے بعد ہونے والے کمر کی تکالیف کالی کارب کے مزاج سے گہراتعلق رکھتی ہیں۔اگر وضع حمل کے بعد کمر درد ہونے والی شروع ہوتو بسااوقات وہ مزمن ہوجاتا ہے اور جب تک کالی کارب نددی جائے تو ٹھیک نہیں ہوتا۔ تپ دق میں بھی کالی کارب مفید ہے۔اگر بھی پھیچوطوں میں سوراخ ہو جا کیں تو کالی کارب ان سوراخوں کو بند کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ بیچر یان خون کی بھی مبارح ہوتا ہے اور ہوشم کے جریان خون میں مفید ہے۔اگر انتر گوں میں زخموں کے داغ ہوں تو بعض اوقات ان کی وجہ سے اجابت کے ساتھ خون آنے لگتا ہے۔ یہ علامت اپنی مونیم کروڈ میں بھی پائی جاتی ہے لیکن فرق سے ہے کہ اس میں کالی کارب کی طرح زم اجابت نہیں بلکہ خت اجابت ہوتی ہے۔ بعض اوقات کالی کارب میں بھی سخت قبض کی علامت یائی جاتی ہے۔ بیٹر بائی جاتی ہوتی ہے۔ بیکن میام دستور نہیں۔

کالی کارب میں پیٹ میں شدید درد ، بے چینی اور تشنج کے علاوہ خون بھی آتا ہے۔کالی کارب میں گئی قسم کے درد ملتے ہیں۔ پیٹ میں شدید بے چینی اور تشنج کے ساتھ خون کا اخراج پیچین کی اکثر دواؤں میں پایا جاتا ہے۔لہذا ضروری ہے کہ ہر دوا کی خصوصی علا مات سے اسے پیچانا جائے۔کالی کارب بعض اوقات نکس وا میکا کے غلط استعال کا علاج بن جاتی ہے خصوصاً اگرنکس وا میکا کے زیادہ استعال سے اسہال لگ

ِ جائیں یا سر در د شروع ہوجائے تو اسہال کے لئے کالی کارب اور سر درد کے لئے تسیمیم بہترین دوائیں ہیں۔اگرنکس وامیکا دیتے دیتے ایک دم اسہال شروع ہوجائیں تو کالی کارب کی ایک دوخورا کول سے ہی خدا کے فضل سے مریض صحت یاب ہوجا تا ہے لیکن اسے زیادہ دیر استعمال نہ کریں ورنہ بیض ہوجائے گی۔اگر ایک دوخورا کول سے فائدہ ہوجائے تواسے بند کردیں۔

کالی کارب میں چڑ چڑا بین بہت نمایاں ہوتا ہے جوا کثر اعصائی تکلیفوں میں ہوتا ہے۔

اکیلے بین کا خوف بھی اس کی ایک علامت ہے۔ مریض تو ہمات کا شکار ہوجاتا ہے کین ان

تو ہمات کا مریض کی تنہائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ہمات اس کی زندگی کی ایک عادت بن جاتے

ہیں۔ ہاں اکیلے بن سے گھبرا ہے ضرور ہوتی ہے۔ مریض گرمی اور سردی دونوں سے زودش ہوتا
ہے۔ مریض بہت زودر نج اور جلد طیش میں آنے والا ہوتا ہے۔

دانت سردی سے بہت زودس ہوجاتے ہیں۔اس کے مریضوں میں پائیوریا کی علامتیں بھی ملتی دانت سردی سے بہت زودس ہوجاتے ہیں۔اس کے مریضوں میں پائیوریا کی علامتیں بھی ملتی ہیں۔ ہیں۔ دانتوں کے اردگردگوشت میں سوزش ہوجاتی ہے اور مسوڑھے گئے سڑنے گئے ہیں۔ پیپ بھی نگلتی ہے۔ایسے مریض سردی کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں لیکن کالی کارب کے انہی مریضوں کو اگر شھنڈے برف جیسے پانی کی گلور کریں تو اعصاب بے حس ہوجاتے ہیں اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ یو ناکدہ وقتی ہوتا ہے، گرم ہونے پر تکلیف پھر واپس آ جائے گی۔ گرمی بھی محسوس کرتے ہیں۔ یہ فائلہ وقتی ہوتا ہے، گرم ہونے پر تکلیف پھر واپس آ جائے گی۔ گرمی بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔اس سے جلن کا احساس بڑھتا چلاجا تا ہے اور گرمی نا قابل برداشت ہوجاتی ہے۔ مرکسال میں بھی دانتوں کی تکلیف کرما دورسردی دونوں سے بڑھتی ہے۔ دانتوں کا نظام جواب دے جائے اور تعفن پیدا ہوجائے، مسوڑ سے گل سرخ جائیں اور خون اور پیپ آنے لگے جواب دے جائے اور تعفن پیدا ہوجائے، مسوڑ سے گل سرخ جائیں اور خون اور پیپ آنے لگے جواب دے جائے اور تعفن پیدا ہوجائے، مسوڑ سے گل مرخ جائیں کا درب سے اس کا علاج ممکن ہے بشرطیکہ کالی کارب کی دیگر علامتیں بھی مریض میں پائی جائیں ور نہ مرکسال بھی دوا ہو گئی ہے۔

کالی کارب میں ایک ہی مقام پر جامد اور کھڑے در دبھی پائے جاتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے والے در دبھی۔ کمر کا در دعمو ماً ایک مقام پر گھہرار ہتا ہے لیکن وضع حمل کے دوران اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر رات کو لحاف اتر جائے اور سر دہوا کے جھونکوں سے کمر میں در دہونے گئے تو کالی کارب بہت مفید ہے۔ میں نے اسے اپنے اوپر اور دوسروں پر بار ہا آ زمایا ہے۔ ایک دفعہ سفر کے دوران رات کو تین چار بج کے قریب میری آ کھی کی تو کمر میں شدید در دخھا حالا نکہ اللہ کے فضل سے مجھے عموماً کمر در دنہیں ہوتا۔ میں نے کالی کارب کی ایک خوراک کھائی جس سے فوری فائدہ ہوا اور دوبارہ یہ تکلیف نہیں ہوئی۔

گو کالی کارب میں اکثر سر دی سے تکایف بڑھتی ہے مگر ماؤف مقام گرم محسوں ہوتے ہیں جن میں بیرونی سردی سے آ رامنہیں ملتا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے بعض دفعہ اعصاب کے ریشوں میں آ گسی لگ جاتی ہے اور گرمی دانے نکل آتے ہیں۔ بیاس دوا کا طرفہ تماشا ہے کہ مھنڈی ہواسے تمازت کا حساس کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتا ہے جسے گرمی سے آرام آتا ہے۔ نزله شروع ہوجائے توعموماً سرمیں بھی درد ہونے لگتا ہے۔ سرا گرخالی خالی اور کھو کھلا سامحسوس ہواور پھر در د ہوتو یہ کالی کارب کی خاص علامت ہے۔ضمناً یہ یا در کھیں کہز لہ جمنے کی وجہ سے اگر سائنس (Sinus) کا در دشروع ہوجائے تونکس دامیکا کی ایک ہزارطافت کی ایک ہی خوراک اکثر شافی ثابت ہوتی ہے۔ مثانے کے نزلہ میں اگر بار بار ببیثاب کی حاجت ہوتو بعض صورتوں میں کالی کارب کی بجائے کالی فاس سے فائدہ ہوتا ہے کیکن کالی فاس میں دن کے وقت تھوڑی تھوڑی درر کے بعد حاجت ہوتی ہے جبکہ کالی کارب میں رات سونے کے بعد مریض باربار ببیثاب کے لئے اٹھتا ہے خصوصاً رات کوتین حیار بجے تکلیف میں بہت اضافہ ہوجا تا ہے۔ اگر رات کے وقت پیپٹاب کی غیر معمولی حاجت شروع ہو جائے جو ذیا بیطس کی وجہ سے نہ ہوتو کالی کارب کے علاوہ آرسنگ بھی مفید ہوتی ہے بشرطیکہ اس کی دوسری علامتیں بھی ملتی

ہوں۔اس کی ایک علامت عورتوں میں مردوں سے زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ پیشاب پر بالکل کنٹرول نہیں کرسکتیں اور عسل خانہ تک پہنچنے کی بھی نوبت نہیں آتی۔مردوں میں بھی مختلف عوارض یا محرکات کی وجہ سے بیعلامت ملتی ہے جس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ بیسیوں دواؤں میں سے بالمثل دوا کا تلاش کرنا آسان کا منہیں ہوتا۔

کالی کارب کے مریضوں کا گلاا کٹر خراب رہتا ہے۔ گلے کے گلینڈ زسوج کرموٹے ہوجاتے ہیں۔اگر کان کے بیچھے گلینڈ زمیں سوزش ہوجائے تو وہ اتی خطرنا کنہیں ہوتی ۔لیکن اگر گلے کے دونوں طرف کی رگیس پھول جائیں تو بیا چھی علامت نہیں۔ورم بعض اوقات مستقل گھہر جاتی ہے۔ غدود پھول کرسخت ہوجاتے ہیں اور پچھ مادے ان میں جم جاتے ہیں جوغدودوں کو سکڑ نے نہیں دیتے۔اگر دیگر علامتیں بھی ہوں تو کالی کارب اس مرض کا مؤثر علاج ہے۔

کالی کارب کی بیاریوں میں جسم میں جگہ جگہ ورم اور سوزش پائے جاتے ہیں خصوصاً آئیکھوں کے اوپر بیوٹوں کی ورم بہت نمایاں ہوتی ہے۔کالی کارب میں بعض اور دواؤں کی طرح بیعلامت بھی پائی جاتی ہے کہ انسان جس کروٹ پر لیٹے اسی کروٹ نبض کی دھڑ کن محسوس ہونے گئی ہے اور شدید گھبرا ہے ہوتی ہے، نیند نہیں آتی۔اگر بیدھڑ کن بہت شدید ہواور دوران خون سر کی طرف نمایاں ہوتو کالی کارب سے فائدہ نہ ہونے کی صورت میں بیلاڈ ونااچھا کام دکھاتی ہے۔

چونکہ کالی کارب میں اکثر با کیں طرف دل کے مقام پر ہو جھے اور دردمحسوں ہوتا ہے اس لئے دل کی تکلیف کا شبہ ہوتا ہے۔ حالا نکہ دل کی کیفیت میں دردا کثر سینے کے میں درمیان میں ہوتا ہے جو کمر اور باز و میں پھیل جاتا ہے اور انگلیوں تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ کالی کارب کے درد میں گودل کی تکلیف کا شبہ ہوتا ہے لیکن دوسری علامتوں سے فرق نمایاں ہوتا ہے مثلاً دل کی تکلیف ہوتو تیز چلنے سے ضرور بڑھے گی۔ لیکن اگر چلنے سے یا کروٹ بدلنے سے نسبتاً آ رام محسوس ہوتو یہ دل کی تکلیف نہیں ہوتے اس لئے ہوتی۔ چونکہ ہومیو پیتھک ڈاکٹر کے یاس ٹمیسٹ کے لئے مشینیں یا دوسرے ذرائع نہیں ہوتے اس لئے

اسے بہت باریک نظر سے علامتوں کودیکھنااوران سے نتائج اخذ کرنا پڑتے ہیں۔ عام اعصابی نکلیفوں کے علاوہ کالی کارب دل کی بیاری میں بھی مفید ہے خصوصاً دل کی غیر معمولی دھڑ کن میں۔

کالی کارب میں بواسیر کے ٹیومر گول گول مسوں کی بجائے لمبی غدودوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں جن میں شدید جلن ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے وقی طور پر آرام آتا ہے اور جلن کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ کالی کارب کی پیٹ کی خرابیوں میں درد ضرور ہوتا ہے مثلاً پیچیش ہوگاتو درد کے ساتھ ہوگا البتہ اسہال عمو ماً بغیر درد کے ہوتے ہیں جو بی جو بی سے ادلتے بدلتے رہتے ہیں۔ پیشاب کے بعد جلن کی شکایت ہوتو عمو ماً نیٹر م میور مفید دوا ہے لیکن اگر جلن پیشاب سے پہلے بھی ہوتو نیٹر م میور کام نہیں کرتی۔ یہ علامت کالی کارب کی ہے۔

خواتین کے لئے یہ بہت اچھی دواہے۔خصوصاً بچے کی پیدائش کے بعد جب کئ قتم کی المجھنیں پیدائش کے بعد جب کئ قتم کی المجھنیں پیدا ہوجاتی ہیں توان میں سب سے پہلے کالی کارب کا خیال آنا جا ہے کیونکہ یہ بالعموم ان المجھنوں کو دور کرنے کی بہترین دواہے۔ بلکہ رحم کی صفائی (DNC) کے بعد پیدا ہونے والی علامات میں بھی اچھااٹر دکھاتی ہے۔

بڑھی ہوئی غدودوں خصوصاً رحم کی بڑھی ہوئی غدودوں سے کالی کارب کا بھی تعلق ہے۔ اگر دیگر علامتیں بھی ملتی ہوں تو حمل کی قیے میں بھی استعال ہوتی ہے۔

وضع حمل کے وقت اگر نجے کی پیدائش میں روک پیدا ہورہی ہواور در دیں جس انداز میں اٹھنی چاہئیں ویسے انداز پر نہاٹھ رہی ہوں ، کمر کے نچلے حصہ میں در د ہواور در دکی اہریں ایک مقام پرنمایاں طور پر انٹھی ہوکر دائیں اور بائیں رانوں میں پھیل جائیں تو کالی کارب دواہے۔ شدید کھانسی میں جس میں اٹی بھی آتی ہو بہت مفید ہے۔ خسرہ کے بعد کھانسی کا حملہ ہوتو بھی کالی کارب مفید ثابت ہوتی ہے۔ کالی کارب اعصاب کی بہت گہری دوا ہے۔اس کا ہڈیوں سے بھی گہراتعلق ہے کیونکہ کاربن ہڈیوں پر بہت گہرااڑ دکھاتی ہے۔

کالی کارب کے مریض میں عمومی کمزوری پائی جاتی ہے۔ نبض مدہم ہوتی ہے۔ اس کے اعصافی دردوں میں سوئی کی طرح چین اور جلن پائی جاتی ہے۔ اندرونی نالیوں میں آگسی جلن کا احساس، رات دو بجے سے پانچ بجے تک بیاری کی شدت میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ بائیں کروٹ لیٹنے سے یا درد والی طرف لیٹنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ گرم موسم میں تکلیفیں کم ہوجاتی ہیں۔ کالی کارب کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ چھوٹے دائروں میں جن کوایک انگی یا انگو تھے سے چھیایا جاسکتا ہے ان میں بعض دفعہ شدید جائی کا حساس ہوتا ہے۔

مددگاردوائیں: کاربووت کیکس وامیکا دافع اثر دوائیں: کیمفرکافیا طاقت: 30سے 1000 تک

کا لی میور

125

كالى ميور

KALIMURIA TICUM

(Chloride of Potassium)

کالی میور نزلاتی بیار بول میں بہت مفید دوا ہے۔ اس کی امتیازی علامت یہ ہے کہ اس کے مریض کی زبان پر سلیٹی رنگ کا مواد جم جاتا ہے اسی وجہ سے اسے خناق (Diphtheria) میں استعال کیا جاتا ہے کیونکہ ڈفتھیریا کے اکثر مواد جوزبان کومیلا کرتے ہیں وہ سلیٹی رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس لئے بعض معالجین ٹکسالی کے نسخہ کے طور پر کالی میور کو ڈفتھیریا کی دواؤں میں شامل کرتے ہیں۔

کالی میور میں بچوں کی شیرخوارگ کے زمانہ میں سر پر ہونے والے ایگزیما کی علامت بھی پائی جاتی ہے۔ سرکی خشکی میں بھی مفید ہے۔ کان بہنے کی پرانی تکلیف میں بھی اچھا اثر دکھاتی ہے۔ کان کے اردگرد کے غدود میں سوزش پائی جاتی ہے۔ کانوں میں شور اور آواز س آتی ہیں۔

منہ میں سفید رنگ کے جیمالے بنتے ہیں۔ نزلہ جس میں ناک بندر ہتا ہے اور سفید رنگ کی رطوبت کثیر مقدار میں بنتی ہے۔ نیز گلے کی تکلیفوں اور ٹانسلز کے متورم ہونے میں بہت مفید ہے لیکن میں اسے اکیلا استعمال نہیں کراتا بلکہ سلیشیا کلکیر یا فلور اور فیرم فاس کے ساتھ 6x میں ملاکر دیتا ہوں۔ اکثر گلے کی تکلیفوں میں اس نسخہ سے فوری طور پر فائدہ پہنچا ہے۔

کالی میور میں پیٹ میں ہوا بھی ہوتی ہے۔ پیٹ کے کیڑ ہے جو خارش پیدا کرتے ہیں۔ ان میں مفید ہے۔ اگر قبض ہوتو جگر بھی متاثر ہوتا ہے اور اجابت مٹیا لے رنگ کی ہوتی ہے۔ ان علامات میں کالی میور کو فراموش نہیں ہے یا بالکل ملکی اور پھیکی رنگت کی ہوتی ہے۔ ان علامات میں کالی میور کو فراموش نہیں

کرنا چاہئے۔ بواسیر کے مسے بھی بنتے ہیں جن سے خون بہتا ہے۔

کالی میور کی مریض عورتوں میں جیض دیر سے ہوتے ہیں یا بالکل نہیں ہوتے۔اس تکلیف میں اگر کالی میور سے فائدہ نہ ہوتو نیٹرم میور دینی چاہئے۔ لیکوریا دودھیا ہوتا ہے جو بے ضرر ہوتا ہے،جلن پیدانہیں کرتا۔ایا محمل کی قے میں بھی سفیدموا دخارج ہوتا ہے۔

کالی میور میں آواز کا بیٹھنا بھی پایا جاتا ہے۔ دمہ کی علامتیں اور معدہ کی خرابی کی وجہ سے کھانسی اٹھتی ہے۔ با کی کے بخاراور رات کو بڑھنے والے در دوں میں مفید ہے۔ بیدر دبستر میں لیٹنے کے بعد بڑھتے ہیں اور بجلی کے کوندوں کی طرح جسم میں حرکت کرتے ہیں۔

کالی میور میں جلدی بیماریاں بھی ملتی ہیں۔اس کے ایکزیما کی خاص بیجان یہ ہے کہ جلد سے موٹے آٹے کی طرح کا خشک مواداتر تاہے۔

کالی میور کی تکلیفیں ثقیل اور مرغن غذائیں کھانے سے بڑھ جاتی ہیں اور حرکت سے بھی تکلیف بڑھتی ہے۔

> طاقت: بائيو كيمك مين 3x تا12x هوميو ليونيسي مين 30اوراو نجي طاقتين

كالى فاس

126

كالى فاسفورتكم

KALI PHOSPHORICUM

(Phosphate of Potassium)

پڑیشیم فاسفیٹ انسانی جسم کی رطوبتوں اور خلیوں میں پایا جانے والا ایک اہم جزوہ۔ خصوصاً د ماغ ، اعصاب ، عضلات اور خون میں محض اس کی موجودگی ہی ضروری نہیں بلکہ اس کا صحیح توازن قائم رہنا بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کی نشو ونما میں یہ ایک اہم اور لازمی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی کمی سے متعدد اعصابی اور ذہنی بیاریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کی زیادتی بھی بعض دفعہ انتہائی مہلک ثابت ہوتی ہے۔ اس کا کیمیاوی نام پولیشیم فاسفیٹ ہے اور ہومیو بیشی میں کالی فاس کے نام سے مشہور ہے۔

کالی فاس اعصاب کو تقویت دینے میں خاص شہرت رکھتی ہے۔ یہ اینٹی سورک (Anti-Psoric) دواہے بعنی ان امراض کی دواہے جوجلد پراثر رکھتی ہوں اور جبراً دبا دینے کے نتیجہ میں اندرونی جھلیوں یا اعصاب پر منفی اثر ڈالیس۔کالی فاس کو ہومیوڈ اکٹر اینٹی سورک ہی بتاتے ہیں لیکن اس کا مرکزی تعلق اعصاب سے ہے۔اعصاب کو تقویت دینا گویا اس کے مزاج کا حصہ ہے اوراسی بنا پر یہا ینٹی سورک کا کام بھی کرتی ہے۔ مثلاً اعصا بی کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی بیاری دبی رہے اورجسم میں طاقت نہ ہوکہ اسے با ہر نکال سکے تو کالی فاس اسے اچھال کر جلد پر غالم کردےگی۔

کالی فاس د ماغ ، اعصاب اورخون پر اثر کرتی ہے۔ <u>اعصابی کمزوری</u> اور زہنی وجسمانی تھکاوٹ میں حیرت انگیز اثر دکھاتی ہے۔ فکر ، پریشانی ، کام کی زیادتی اور پیجانی کیفیات کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی تکلیفوں میں مفید ہے۔ کالی فاس کا مریض ست اورخوفز دہ رہتا ہے، لوگوں سے ملنے جلنے سے گھبراتا ہے، بادداشت بھی کمزور ہوجاتی ہے اور اینے کام سے لاپرواہ ہوجاتا ہے۔

کالی فاس میں سرداور مرطوب موسم میں آ رام کرنے سے تکلیفوں میں اضافہ ہوتا ہے۔

پیملامتیں رسٹاکس میں بھی پائی جاتی ہیں۔ رسٹاکس میں مریض تکلیف بڑھنے کی وجہ سے کروٹ

بدلتا رہتا ہے لیکن کالی فاس میں بیاری کی علامات رات بھرجسم میں اکھی ہوتی رہتی ہیں اور صبح

الحضے پر گویا انسان کے ساتھ ہی بیدار ہوجاتی ہیں اور صبح کا وقت بہت تکلیف میں گزرتا ہے پھر

آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ افاقہ ہونے لگتا ہے۔ کالی فاس کا بیا ہم نشان ہے کہ بیاریاں آ ہستہ آ ہستہ بڑھتی

ہیں۔ رسٹاکس کا مریض جب چاتا ہے وابتدائی حرکت میں اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ لیکن پچھ

چلنے کے بعد آ رام محسوس ہوتا ہے۔ کالی فاس کے مریض کو آ ہستہ حرکت سے آ رام ملتا ہے۔ رسٹاکس

مریض کے بعد آ رام محسوس ہوتا ہے۔ کالی فاس کے مریض کو اخراجات میں ایس بوتی ہوتیں ہوتی

کی طرح کالی فاس میں بھی ہاتھ یا وال کاسن ہونا اور عضلات کا بے حس ہونا پایا جاتا ہے۔ اس

کے تمام اخراجات بد بودار ہوتے ہیں۔ رسٹاکس کے مریض کے اخراجات میں ایس بوتی ہوتی ہوتی کی اینٹی سورک دوا ئیں ہیں جن سے علاج کیا جاتا ہے کیاں رس گلا برا 3 لیوٹینسی با کہ کاروں میں گی اینٹی سورک دوا ئیں ہیں جن سے علاج کیا جاتا ہے کیان رس گلا برا ویا تعلق ہے۔ بخل گذشتم کی بیاریوں میں گی اینٹی سورک دوا ئیں ہیں جن سے علاج کیا جاتا ہے کیان رس گلا برا ویا تعلق ہے۔

کالی فاس گینگرین کے لئے بھی بہت مفید دوا ہے۔ زخم گل سر کر ناسور بن جائیں اور گینگرین کے لئے بھی بہت مفید دوا ہے۔ زخم گل سر کر ناسور بن جائیں اور گینگرین کی شکل اختیار کرلیس تو ایلو بیتھی میں عموماً ایسے اعضاء کو کاٹ دیا جاتا ہے اور احتیاطاً اس جگہ سے کاٹتے ہیں جو ماؤف جگہ سے اوپر کی طرف اور صحت مند ہو۔ میں نے بعض ایسے مریضوں پر کالی فاس اور سلیشیا کامیا بی سے استعمال کی ہیں۔ اس کے بعد انہیں کسی آپریشن کی ضرور ہے۔

الله تعالی نے انسانی جسم میں بیاریوں کے خلاف ایک دفاعی نظام پیدا کیا ہے۔ ان دفاعی خلیوں (Anti Bodies) کے بغیر شفا کاعمل ممکن نہیں ہے۔ اگر کسی بیاری کے غلبہ سے اعصاب اتنے کمزور ہو جائیں کہ ردعمل نہ دکھا سکیں تو خواہ کتنی ہی جراثیم کش ادویات استعال کی جائیں وہ فائدہ نہیں پہنچائیں گی کیونکہ جسم روعمل چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ گینگرین میں بھی جسم کا بیط بھی رومل ختم ہو جاتا ہے لیکن کالی فاس اس کے روعمل کو جگا دیتی ہے اور اعصاب کو مقابلہ کی طاقت بخشتی ہے۔ جس کے نتیجہ میں جسم گینگرین کا مقابلہ شروع کر دیتا ہے۔ اعصاب مضبوط ہو جائیں توسلیثیا بھی خوب اثر دکھاتی ہے۔

غدودول کی سوزش میں بھی کالی فاس بہت مفید ہے۔ بسااوقات گردن کی دونوں اطراف میں غدود پھول جاتے ہیں، بیت دق یا کینسر کی وجہ سے بھی ہوسکتا ہے۔ایسے مریضوں كوبراه راست سليشيا دين توبعض اوقات خطرناك نتائج نكلته بين ليكن حسب حالات مريض كو سلیشیا دیتے وقت کئی دوسری دوائیں پہلے یا ساتھ ملا کر دینی بڑتی ہیں۔انہی دواؤں میں سے ایک کالی فاس ہےجس سے سلیٹیا کارڈمل متوازن ہوجا تا ہے۔میرے نز دیک بیر کیب اچھا اثر دکھانے والی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سلیشیا دینے سے پہلے کالی فاس دے کر مریض کو سیجے ر مِمل کے لئے تیار کرلیا جائے۔ایس صورت میں بہتر ہے کہ کالی فاس کی ایک ہزار طاقت کی خوراک دے کر چنددن انتظار کرلیا جائے ۔بعض اوقات اسی سے حیرت انگیزنتائج سامنے آتے ہیں اور ایک ہی خوراک غدودوں کو چھوٹا کرنے لگتی ہے۔ ایسی صورت میں سلیشیا دینے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ آٹھ دس دن کے بعد ایک خوراک اور دی جاسکتی ہے۔ جب تک غدود چھوٹے ہوتے جارہے ہوں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ کالی فاس صرف بیرونی طور پر نظر آ نے والے غدودوں میں ہی نہیں بلکہ اندرونی اعضاءاور رحم کے غدودوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔اگریہشک ہوکہ بیگومڑ کینسری شکل اختیار کررہے ہیں تو کالی فاس کولاز مآیا در کھنا جا ہے کہ یہ کینسرکے زخمول کومندمل کرنے میں بھی مدد گار ہوتی ہے۔

کالی فاس کا ایگیریکس (Agaricus) سے بھی کسی حد تک مزاج ملتا ہے۔ بعض اوقات چہرے کے پٹھے پھڑ کنے لگتے ہیں جو کالی فاس، ایگیریکس یا اس سے ملتی جلتی دواؤں کا

تقاضا کرتے ہیں۔

کسی حادثے یا بری خبر کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے بدا ترات کودورکرنے کے لئے ایمراگر بیا (Ambra Grisea) کی طرح کالی فاس بھی مفید ہے۔اگر صدمہ کی وجہ سے دماغ ماؤف ہوجائے تو یہ کالی فاس کی اہم علامت ہے۔ بری خبر سے معدے اور دل کو نقصان پنچے تو کالی کارب بہترین دوا ہے۔ نیٹرم میور بھی صدمہ کے اثرات سے پیدا ہونے والے پاگل بن میں مفید ہے۔صدمہ اور بری خبر کے بدا ترات سب پرایک جیسے نہیں ہوتے ۔کالی فاس پاگل بن میں مفید ہے۔صدمہ اور بری خبر بی نمایاں طور پراعصاب کو نقصان پہنچاتی ہیں اور مریض میں صدمہ کا اثر کہی افسر دگی اور کمزوری کا شکار ہوجاتا ہے۔ جس مریض کا مزاج نیٹرم میور کا ہواس پر صدمہ کا اثر پاگل بن کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔

اگر اعصابی تناو ٔ اور سخت تھ کاوٹ ہوتو کالی فاس اس میں بہت مفید ہے۔ میرے والدمرحوم نے اعصابی کمزوری دورکرنے کے لئے ایک نسخہ بنایا ہوا تھاوہ یا در کھنا چاہئے۔ کالی فاس 6x کمکٹیر یا فاس 6x میگ فاس 6x ملاکر دن میں دوئین دفعہ استعال کریں۔ یہ ہرشم کی اعصابی کمزوری کو دورکرنے کا بہترین نسخہ ہے۔

کالی فاس میں خون کی نالیاں نگ ہوئے بغیر بھی یا دواشت متاثر ہوتی ہے۔ گریہ کمزوری وقتی ہوتی ہے، مستقل نہیں۔ اگر دماغ کسی خاص سوچ میں مصروف ہواورا جا نگ کسی دوسری طرف منتقل ہوتو وہ نام یا لفظ فوری طور پر ذہن میں نہیں آتا جس کی اسے تلاش ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذہن فوراً اس طرف توجہ نہیں دے رہا کیونکہ وہ ایک اور سوچ میں غرق ہے اور اس سے وہ فوری طور پر کسی نئی سوچ کی طرف منتقل نہیں ہوسکتا۔ ایساذ بنی دباؤکی وجہ سے ہوتا ہے جو آرٹیر یوسکار وسس (Arteriosclerosis) کی علامت نہیں ہے۔ اس عارضی بیاری میں کالی قاس کے علاوہ کلیڈیم (Caladium) بہت مفید دوا ہے۔

کالی فاس میں بعض دفعہ اچا نک چکر آنے لگتے ہیں جو برائیونیا کی یاد دلاتے ہیں۔

ا چانک اٹھنے سے ،سر جھکانے سے اور سرکے دائیں بائیں حرکت کرنے سے چکر آنے کی علامت برائیونیا اور کا کی فاس کے علاوہ کئی اور دواؤں میں بھی پائی جاتی ہے۔ نکس وامیکا بھی چکروں کا بہت اچھا علاج ہے۔ بعض دفعہ سر بوجھل سامحسوس ہوتا ہے اور تو ازن ٹھیک نہیں رہتا۔ چلتے وقت قدم لڑکھڑاتے ہیں۔ سرکوحرکت دینے سے چکروں کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح جب پیٹ کی ہوا معدہ میں اچپا تک لرزہ پیدا کرتی ہے تو اس حرکت سے بھی تو ازن بگڑ جاتا ہے اور چکر آجاتے ہیں۔ ایسی صورت میں نکس وامیکا بہت اچھا اور فوری اثر دکھاتی ہے۔ اگر چکرمخض اعصا بی تھکا وٹ کی وجہے سے آئیں تو کالی فاس اول طور پریا د آئی جا ہے۔

اگر ہر بیاری حرکت سے بڑھتی ہواور سفر کی حالت میں چکر آئیں تواس میں کا کولس اور برائیونیا دونوں مفید ہوتی ہیں۔ کالی فاس کا مریض توازن قائم ندر کھ سکے تو سامنے کی طرف گرنے کا رجحان رکھتا ہے۔ بعض مریض کچھاڑ کھا کر پیچھے کی طرف گرتے ہیں۔ ان میں یہی رجحان بعض دفعہ آگے کی طرف گرنے کے رجحان میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ کالی فاس کا مریض عموماً ذبین ہوتا ہے اور اسے چکر کھا کر پیچھے گرنے کا خوف آگے کی طرف جھکنے پر مجبور کرتا ہے لہذا اس اند فاعی کوشش میں بعض اوقات وہ آگے کی طرف گربھی جاتا ہے۔

کالی فاس کے علاوہ چہرے کے اعصابی دردوں میں عموماً فاسفورس، سلیشیا، سپائی جیلیا اور میں عموماً فاسفورس، سلیشیا، سپائی جیلیا اور میں عنین مفید ہوتی ہیں۔ میگ فاس بھی اعصاب سے گہراتعلق رکھنے والی دوا ہے۔ اگر اعصاب میں بے چینی اور عضلات میں شنج پیدا ہوجائے تو کالی فاس سے زیادہ میں نیشینیا فاس کی طرف دھیان جانا چاہئے۔ لیکن کالی فاس بھی تشنج پیدا کرتی ہے اور ہومیو پیتھک یا بائیوکیمک صورت میں استعال سے شنج کو دور کرتی ہے۔ اس کا تشنج زیادہ تردھڑ کے نیلے حصہ سے تعلق رکھتا ہے۔ عموماً دانوں، پیڈلیوں یا پاؤس میں تشنجی کیفیت بیدا ہوتی ہیں۔ جراثیم کے ذریعہ جھینے والی گردوں کی بھاریوں پر اور بعض دفعہ انترٹیاں بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ جراثیم کے ذریعہ بھیلنے والی گردوں کی بھاریوں پر اور بعض دفعہ انترٹیاں بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ جراثیم کے ذریعہ بھیلنے والی گردوں کی بھاریوں پر

بھی کالی فاس اچھااٹر دکھاتی ہے۔میگ فاس میں زودحسی کےعلاوہ بعض اور بھی محرکات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نشنج ہوسکتا ہے۔

کالی فاس اور آرسنگ الیسی دوائیں ہیں جن کے مریض صاف ستھرے اور صفائی پسند ہوتے ہیں لیکن جب بیاری سخت جملہ کرے یا بخار ہوجائے تو مریض کے اخراجات میں سخت بد بو بیدا ہوجاتی ہے۔ چونکہ بد بو دار اور بھی بہت سی دواؤں کے مزاج میں ہے۔ اس لئے ہر مریض میں محض اس علامت پر انحصار نہیں کرنا چاہئے۔ جو امراض چھوت اور جراثیم وغیرہ سے پیدا ہوتی ہیں ان کے مادے ہمیشہ بد بودار ہوتے ہیں۔ ایسے مریضوں کی شفا میں کالی فاس کو اونچا مقام حاصل ہے۔ 6x میں فیرم فاس اور کالی فاس ملاکر دن میں

پاپنج چیدد فعہ دی جائے اوراونچی طاقت میں پائیروجینم 200 اورٹائیفائیڈینم 200 ملاکر دی جائے تو ٹائیفائیڈینم 200 ملاکر دی جائے تو ٹائیفائیڈ کے ہرایسے مریض کوجس کا قبض کی طرف رجحان ہوتو یہ نسخہ غیر معمولی فائدہ دیتا ہے۔کالی فاس کے مریض کوٹھنڈے اور کھٹے مشروبات پسند ہوتے ہیں۔

جگر اور انتر یوں کی سوزش میں کالی فاس اچھی دوا ہے۔ مریض کے کسی بات پر چڑ جانے سے انتر یوں میں جو تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں انہیں کالی فاس ٹھیک کرتی ہے۔ بعض دفعہ اچا نک پیچین ہوجاتی ہے اور پیٹ میں بل پڑنے گئے ہیں۔ الیی صورت میں کالی فاس کی ایک دوخورا کیس ہی بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ یادر کھیں کہ اگر نظام ہضم اعصابی ہیجان کی وجہ سے خراب ہوتو کالی فاس ہی فائدہ دے گی۔ اگر باقی مشابہ دوا ئیں ناکام ہو چکی ہوں تو اسے ضرور استعال کرنا چاہئے۔ عام طور پر کالی فاس، میگنیشیا فاس اور کلکیر یا فاس کو ملا کرٹا نک کے طور پر دیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی تکلیف کالی فاس کا واضح مطالبہ کرتی ہوتو دوسری دوا ئیں ملا کر دینے سے جاتا ہے لیکن اگر کوئی تکلیف کالی فاس کا واضح مطالبہ کرتی ہوتو دوسری دوا ئیں ملا کر دینے سے کالی فاس کا اثر پچھکم ہوجاتا ہے۔ اس صورت میں ہمیشہ بیاصول پیش نظر رکھیں کہ جب تشخیص کالی فاس کا اللہ کے فضل سے خوب نشانے پر پیٹھتی ہے۔ ایک دوخورا کیں ہی مرض کے ازالہ گھیک ہو اکیلی دوا اللہ کے فضل سے خوب نشانے پر پیٹھتی ہے۔ ایک دوخورا کیں ہی مرض کے ازالہ گھیک ہو آگیلی دوا اللہ کے فتل سے خوب نشانے پر پیٹھتی ہے۔ ایک دوخورا کیں ہی مرض کے ازالہ کے لئے کافی ہوتی ہے۔ فائدہ نہ ہوتو پھر دوسری دوا ئیں تلاش کریں۔

بعض دواؤں کی علامتوں میں تکلیف دائیں سے بائیں یابائیں سے دائیں جرکت کرتی کے ۔ ہے۔کالی فاس میں کیکیسس کی طرح بائیں سے دائیں طرف حرکت کار جھان ہوتا ہے۔کالی فاس میں بیاری بائیں سے دائیں طرف لیکتے میں بیاری بائیں سے دائیں جانب منتقل نہیں ہوتی محض درد کے وندے بائیں سے دائیں طرف لیکتے ہیں جبکہ کیسس میں خود بیاری کے بائیں سے دائیں منتقل ہونے کار جھان ماتا ہے۔

کالی فاس میں اگر کسی خوف اور دہشت کی وجہ سے اسہال شروع ہوں تو وہ پانی کی طرح پتلے اور سخت بد بودار ہوتے ہیں اور کمزوری پیدا کردیتے ہیں۔کالی فاس کی پیچیش میں اکثر خون کے بغیر آؤں ہوتی ہے لیکن بھی بھی جب مرض بہت بڑھ جائے تو

خالص خون آنے لگتا ہے۔ اعصاب کے اضطراب کی وجہ سے تخت بے چین کرنے والی حرکت ہوتی ہے اور انتزایاں ایک دوسرے کے ساتھ رگڑتی ہیں تو سوزش کے نتیجہ میں ان سے جولعاب نکلتا ہے وہ آؤں کہلاتا ہے۔ پھرخون جاری ہوجاتا ہے۔

مثانے کے نزلہ میں بھی کالی فاس اثر رکھتی ہے۔ بعض لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کی بھاری ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو بار بار پیشاب آنے میں بھاری ہوتی ہیں۔ ایسے مریضوں کو عموماً مثانے میں کھنڈ گئے سے مثانے کا نزلہ پیدا ہوجا تا ہے جس کی وجہ سے بار بار پیشاب آتا ہے لین اس میں جلی نہیں ہوتی بلکہ پیشاب پانی کی طرح صاف ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بیہ گہری سوزش کے نتیجہ میں نہیں ہے بلکہ نزلاتی تح یک ہے۔ جیسے ناک سے بھی پانی نکلتا ہے تو تکلیف نہیں دیتا لیکن پونچھ لونچھ کو نچھ کو نچھ کو نجھ کر سوزش پیدا ہوجاتی ہے۔ اگر کالی فاس کا مثانے کا نزلہ جلد ٹھیک نہ ہوتو اس میں بھی سوزش ٹھہر جاتی ہے اور بعض اوقات تعفی بھی پیدا ہوجا تا ہے۔ بھی کالی فاس کا مریض کا سردرد اعصابی تھکا وٹ کی وجہ سے ہو بظاہر ٹھیک ہوجا تا ہے۔ مگر در اصل وہ اعصابی تناوگر دوں کی طرف منتقل ہوجا تا ہے اور اس اعصابی دباؤکی وجہ سے اسے بکثر ت پیشاب آنے لگتا ہے۔ بعض دفعہ عار پانچ منٹ کے اندر ہی بار بار زور سے پیشاب آتا ہے۔ بسا اوقات علمی کام کرنے والوں میں ایسے دور سے ہوتے ہیں۔ بھی دور ان سر بھی سردرد والی میں اور بھی بین بار بار بزور والے میں اور اعصابی دباؤکے تیجہ میں بھی دور ان سر بھی سردرد ور کے ہوتے ہیں۔ بھی حادت پیدا ہوتی ہے۔

اعصابی تناؤسے جوجنسی کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں ان کا بھی کالی فاس علاج ہے۔
اسی طرح جن عورتوں میں حمل گرنے کار جھان پایا جائے ان کے علاج میں کالی فاس کونہیں بھولنا چاہئے۔ عام طور پرحمل کے آغاز میں حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہوتو وائی برنم او پولس بھولنا چاہئے۔ عام طور پرحمل کے آغاز میں حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہوتو وائی برنم او پولس (Vi. Burnum Opulus Q) مرتئی میں دی جاتی ہے۔ دوسرے تیسرے مہینہ میں سائنا اور چوتھے یا نچویں مہینہ میں کالی کارب لیکن اگر اعصا بی تناؤسے مل گرتا ہوتو کالی فاس میں چوٹی کی دواہے۔

حمل ضائع ہونے میں اگر اعصاب ذمہ دار ہوں تو اس کا گہر اتعلق کالی فاس سے ہے جن عور توں میں بیر برجان ہوتو ان کو بغیر حمل کے بھی کالی فاس 1000 کھلاتے رہنا چاہئے۔ ہر مہنے ایک دوبار اسے دہرایا جاسکتا ہے۔ جریان خون کے آغاز میں کالی فاس کے ساتھ فیرم فاس ملانا بہت ضروری ہوجا تا ہے۔

دل کی تکلیف انجائنا میں بھی کالی فاس یا در کھنے کے قابل دوا ہے۔انجائنا میں اسے میگ فاس سے ملا کر دیا جائے نئا میں اسے میگ فاس سے ملا کر دیا جائے تو بہت مفید ثابت ہوتی ہے کین حسب ضرورت دوسری دوائیں بھی دینی پڑتی ہیں۔

کالی فاس کی بیخسیال اوردانے چہرے اور دیگراعضاء پرنہیں ہوتے بلکہ پیٹ یا کمر پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے لئے صرف کالی فاس استعال کروائیں لیکن اگر افاقہ نہ ہوتو دوسری دوائیں استعال کریں۔

اگر جلدی بیاریاں جسم کے اندر منتقل ہوجائیں تو بسااوقات وہ اعصاب پراثر انداز ہوتی ہیں اور اعصاب جواب دے جاتے ہیں۔ جسم ٹھنڈ اہوجا تا ہے اور اس میں دفاع کی طاقت نہیں رہتی ۔ کالی کارب اور سورائینم کا شارالیں دواؤں میں ہے جوایسے مریض کے جسم کوفوراً گرم کر دیتی ہیں اور بیاری کوجلد پراچھال دیتی ہیں۔ لیکن کالی فاس کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب جسم کے اندر سے شروع ہونے والا مرض مثلاً خسر ہ اور کا کڑ الاکڑ اوغیرہ اعصا بی کمزوری کی وجہ سے جلد پر ظاہر نہ ہوسکے۔ کالی فاس سورائینم وغیرہ سے بالکل مختلف دوا ہے۔

بعض ہومیو پینظک معالجین نے کالی فاس اور دیگرتمام پڑیشیم والے نمکیات کے بارے میں تنبید کی ہے کہ بخار کے دوران ہرگز استعال نہ کئے جائیں لیکن بیا حتیاط صرف چڑھتے بخار میں لازم ہے۔ جب بخار اتر نے لگے تو ہر دوادی جاسکتی ہے اور بہت مفید ٹابت ہوتی ہے۔ اگر یا دداشت کمزور ہواوراعصاب جواب دے جائیں اور آخر پاگل بن کی علامتیں فاہر ہونے کالی فاس ایک لا کھ طافت میں دیں۔

كالى فاس كالى فاس

جسم میں خون کی مقدار بڑھانے اور بچوں کی عمومی صحت کی بحالی کے لئے کالی فاس ،کلکیر یا فاس اور فیرم فاس کھ میں ملا کر دینا بہت مفید نسخہ ہے۔ اگر بچہ پیدائش طور پر کمزور ہوتواس کے ساتھ سلیشیا بھی ملا دینی چاہئے۔ اگر بچہ وقت سے پہلے پیدا ہوگیا ہوتواس کے بہت سے عضلات جو ماں کے پیٹ کے اندر نشو ونما پانے چاہئے تھے وہ بہت کمزور ہوجاتے ہیں۔ ان کوسلیشیا تقویت دیتی ہے۔ پیدائش کمزوریاں دور کرنے کے لئے یہت اچھا ہے۔ ان کوسلیشیا تقویت دیتی ہے۔ پیدائش کمزوریاں دور کرنے کے لئے یہت اچھا ہے۔ عور توں کے برسوتی بخار (Puerperal Infection) میں پائیر وجینم + سلفر کے علاوہ کالی فاس بھی اچھا کام کرتی ہے۔

طاقت: 6x سے لے کر 30۔200۔1000۔10,000 ماقت: 6x

كالى سلف كالى سلف

127

كالىسلفيورنكم

KALI SULPHURICUM

(Sulphate of Potash)

کالی سلف بھی ایک بائیوکیمک دوا ہے جو پڑیشیم اور سلفر کے عناصر سے مل کربنتی ہے۔ سلفراور پٹیشیم دونوں بہت اہم دوائیں ہیں اس لئے ان دونوں کا مرکب کالی سلف بھی بہت گہرا اثر کرنے والی دوا ہے۔ یہ جسم کے ہر حصہ پراثر انداز ہوتی ہے۔اس میں اتنی بیاریوں کے لئے شفا کاامکان ہے کہ انہیں ایک باب میں احاط تحریر میں لا نامشکل کام ہے۔سب کواپیخ اپنے ذاتی تجربہ سے بیمعلوم کرنا چاہئے کہ کن کن بیاریوں میں علامتیں اس کا تقاضا کرتی ہیں۔ابتدائی مطالعہ سے ہر پڑھنے والے کو یوں لگے گا کہ کالی سلف ہر بیاری کا تریاق ہے لیکن ہر بیاری کے لئے یہ بالمثل ثابت نہیں ہوگی۔جتنی زیادہ بیاریاں اس کے ذکر میں ملتی ہیں اتنی ہی بیشخیص مشکل ہے کہ بہ کس مریض کے مرض میں کام آ سکتی ہے۔اس دوا کابار بار بعنی کم از کم دس پندرہ بارمطالعہ کیا جائے تو آ ہستہ آ ہستہ سی مجھ آتی ہے کہ جوعوارض اس میں ملتے ہیں، ضروری نہیں کہان کو بیہ فائدہ بھی پہنچائے۔عوارض کا ملنا کافی نہیں ،کسی دوا کے بنیادی مزاج کا مریض سے ملنا ضروری ہے۔اگرابیا ہوتو بیددوا خطرناک امراض کوبھی جڑ سے اکھیڑ سکتی ہے۔مثلاً مرگی کے مرض سے متعلق ڈاکٹر کینٹ کا بہ دعویٰ ہے کہ بہ دوااس موذی مرض کوجڑ سےاکھیڑ دیتی ہے لیکن ضروری نہیں کہایک ہی خوراک سے بہ نتیجہ ظاہر ہو۔بعض اوقات وقفوں کے بعد دواکو لمبے عرصہ تک دہرانا پڑتا ہےاور درمیان میں دوسر ہےعلاج بھی کرنے پڑتے ہیں۔ کالی سلف کے متعلق مشکل بیہے کہ اس بات کی تفصیل معلوم نہیں کہ س قتم کی مرگی میں بیمفید ہے کیونکہ بھی طریقہ آ زمائش (Proving) سے یہ معلوم نہیں کیا گیا۔اس لئے بہت سے ہومیو پیتھک ڈاکٹر اس دواکوکوئی خاص اہمیت نہیں دیے۔اگر پروونگ ہوجاتی تو قاعدہ قانون کے مطابق بیعلم ہوسکتا تھا کہ س قتم کی مرگی میں یہ ضرور کام آئے گی۔ پس موجودہ صورت حال میں تو یہی ہوسکتا ہے کہ اگر دوسری بالمثل دواؤں سے مرگی قابومیں نہ آئے تواس دواکی آز ماکش بھی ضرور کی جائے۔

کالی سلف جلدی امراض کے علاوہ اندرونی جھلیوں کے علاج میں بھی مفید ہے۔
کالی سلف کے متعلق میہ بیان کیا جاتا ہے کہ لیوپس (Lupus) کے بعض مریض اس سے بعلی شفا
پاگئے۔ کہتے ہیں اگر ملیریا بخار بگڑ جائے تو کالی سلف اگر مزاجی دوا ہوتو بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔
مزلاتی تکلیفوں میں کالی سلف استعمال کی جائے خصوصاً مزمن نزلہ میں جبکہ نزلہ میں نزلاتی مواد سبزرنگ کا ہوچکا ہو۔

کالی سلف کو بائیوکیمی کی پلسٹیلا کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی بہت سی علامتیں پلسٹیلا سے مشابہ ہیں۔ مثلاً گرمی سے تکلیفوں کا بڑھنا، ٹھنڈ اور کھلی ہوا سے فائدہ پہنچنا۔ بیہ بات کالی سلف کی مزاجی بہچان میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ پلسٹیلا کی تفصیلی علامتیں اسے کالی سلف سے الگ دکھا دیتی ہیں لہٰذا جس مریض میں پلسٹیلا سے مشابہت پائی جائے کیان اس میں اس کی عمومی علامتیں نہ ہوں تو یہی بات کالی سلف کی نشاند ہی کے لئے کافی ہے۔ پھر عموماً ان سب بیاریوں میں بیمفید ثابت ہوگی جن کا ذکر اس باب میں ماتا ہے۔

کالی سلف میں عضلات کے ڈھیلے ہو کر لٹکنے کا رجمان بھی پایا جاتا ہے۔ ایسے مریض جن کے جگر میں خرابی ہواور دل کے عضلات بھیل کر بے جان ہونے لگیں، کالی سلف ان کے عضلات کے ڈھیلے بن میں کام آئے گی۔لیکن میے چھوٹی طاقت میں لمبے عرصہ تک کھلانی پڑتی ہے جس کے نتیجہ میں چند مہینوں کے اندراندرا چھی تبدیلی واقع ہوجاتی ہے۔مریض میں جان آنے لگتی ہے اور بہت حد تک جگر اور جسم کی چربی پگھل جاتی ہے۔خواتین میں عموماً بچوں کی پیدائش کے بعد بیا لجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔جگر رج بی چڑھے لگتی

ہے، جسم کے اعصاب بھیل جاتے ہیں، دل میں طاقت نہیں رہتی اور سانس جلد چڑھتا ہے۔ کالی سلف اگر بالمثل ہوتو بہت فائدہ ہوگا۔ایسی مریضہ کی ٹائکیں بھاری ہوجاتی ہیں۔کالی سلف میں لمس سے تکلیف اور مضبوط دباؤسے آرام ملتاہے۔

کالی سلف میں سر درد حرکت سے بڑھ جاتا ہے۔ کھلی ہوا میں آ رام محسوس ہوتا ہے۔ بیہ درد آئکھوں، پیشانی اور سر کی دونوں اطراف میں پھیل جاتا ہے۔ سریرنگی اور گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ آئکھوں کے پیوٹے آپس میں چیک جاتے ہیں، آئکھوں سے زردی مائل رطوبت لگتی ہے، بہت خارش ہوتی ہے اور یانی نکلتا ہے۔ پیوٹوں پر دانے نکل آتے ہیں۔ آئکھ کا بصری بردہ (کورنیا) دھندلاجا تاہے۔کالی سلف اگر مزاجی دواہوتو آئکھ کی ان سب تکلیفوں کا ازالہ کرسکتی ہے۔ کان سے زردرنگ کی بد بودار رطوبت نکلتی ہے۔کان کے درمیانی حصہ میں خشکی یائی جاتی ہے۔ پہلے کان سے یانی کااخراج ہوتا ہے پھر کچھگا ڑھا ہوکروہ اخراج زردرنگ کا ہوجا تا ہے۔ جب بیاری مزمن شکل اختیار کر لے تو مزید متعفن ہوکر سبز رنگ کا ہو جاتا ہے اور کان کی جھلیوں سےخون بہنے گتا ہے۔ یہ پیچید گیاں آ ہستہ آ ہستہ بڑھتی ہیں اور کئی سالوں کے بعد کا نوں کے یردے موٹے ہوجاتے ہیں، سخت بدبوآتی ہے اور بہرے بن کے آثار نمایاں ہوجاتے ہیں۔اگر کالی سلف مزاجی دوا ہوتو شروع ہی میں دینے سے مٰدکورہ بالا کوئی پیچید گی پیدانہیں ہوگی۔ کالی سلف میں کا نوں میں اور کا نوں کے بیچھے خارش ہوتی ہے اور شمشم کا شور سنائی دیتا ہے۔ کالی سلف کے ایگزیما میں دانے اور چھالے نکل آتے ہیں، جلن کا بہت احساس ہوتا ہے، جلد کا رنگ بدل کر مینڈک کی کھال کی طرح زردی مائل بے جان یا بے رنگ ہوجاتا ہے۔عموماً حبگراورتلی کی خرابیوں کے نتیجہ میں ایبا ہوتا ہے۔خون کی کمی اورسل کی بیاری بھی چہرہ پر بے رفقی اور زردی پیدا کر دیتی ہے۔ایسی صورت میں چہرہ د کیچکر بیاری کاانداز ہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ چبرہ اور آئکھوں کی علامتوں سے امراض کی تشخیص نے ایک با قاعدہ فن کی صورت اختیار کرلی ہے اور جرمنی میں اس کے کئی پیشہ ور

ماہرین ملتے ہیں۔چھوت کے ہوتشم کے بخارو<u>ں</u> میں بھی کالی سلف اگر مزاجی ہوتو بہت مؤثر دواہے۔

مثانے کا زار مزمن ہوجاتا ہے۔ پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے۔ زیادہ تر رات کے وقت تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ کالی سلف میں پریشان کن خواب بھی آتے ہیں۔ سرمیں کھیاؤ ہوتا ہے، آتی۔ رات کو کھانے کے بعد گرم کرہ میں گھرنے سے چکر آتے ہیں۔ سرمیں کھیاؤ ہوتا ہے، بال گرتے ہیں اور سرمین شکی ہوتی ہے۔ ہونٹ کئے پھٹے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کینٹ کے زدیک اگر ہونٹ ہوت کے پریشہ بن جائے تو کالی سلف سے فائدہ ہوتا ہے۔ اپی تھیلیوما (Epithelioma) میں بھی کالی سلف مفید ہے۔ منہ میں چھالے بن جاتے ہیں۔ زبان پر لیس دار زر در طوبت ہوتی ہے۔ خشک کھانی مگر کھڑ کھڑ اہٹ کی آواز آتی ہے۔ زبان خشک ہوتی ہے۔ گلے کے غدود پھول جاتے ہیں اور نگلنے میں دفت ہوتی ہے۔ انڈے، ڈبل روٹی، گوشت، گرم کھانے اور پینے سے نفرت ہوجاتی ہے۔ کھانے کے بعد پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہوتی ہے، تناؤ کا احساس بڑھ جاتا ہے اور ہوا با ہز ہیں نگتی۔ کھانے کے بعد پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہیں ہوتی ہے۔ تاؤ کا احساس بوتا ہے۔ سخت قبض اعتصاء یا چرے پر دکھائی دیتی ہیں۔ رات کو پیٹ میں درداور دکھن کا احساس ہوتا ہے۔ سخت قبض اسہال سے ادتی براتی رہتی ہے۔ بواسیر کے مسے ہیرونی سطح کے علادہ اندر بھی ہوتے ہیں جن میں میں خواب ہوتی ہوتی ہے۔ بواسیر کے مسے ہیرونی سطح کے علادہ اندر بھی ہوتے ہیں جن میں اسہال سے ادتی براتی رہتی ہے۔ بواسیر کے مسے ہیرونی سطح کے علادہ اندر بھی ہوتے ہیں جن میں خون بہنے کار بحان ہوتا ہے۔

کالی سلف میں اجابت کے بعد پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں۔ مرک کار میں بھی میہ علامت ہے۔ اس میں اجابت کے دوران در دشروع ہوتا ہے جو بعد میں بھی جاری رہتا ہے۔ اسہال پتلے سیاہی مائل، چھیلنے والے اور بد بودار ہوتے ہیں۔ کالی سلف میں شدید خارش ہوتی ہے۔ گردوں کی اندرونی جھلیوں میں سوزش اور ملکے یا شدید چھین والے دردیائے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ پیشاب میں البیومن بھی آتی ہے۔ پیشاب گہرے رئگ کا، مقدار میں زیادہ اور جلن والا ہوتا ہے۔ بھی پیھوڑ اتھوڑ اتا تا ہے گرآتا چلا جاتا

ہے۔ یوں لگتا ہے کہ گرد مے سلسل تھوڑا تھوڑا بد بودار متعفن پیشاب مزید بنائے چلے جارہے ہیں۔
کالی سلف مردانہ نا طاقتی اور کمزوری کے لئے بھی اچھی دوا ہے۔ ہرفتم کے
سیلان الرحم، سوزش اور جلن میں مفید ہے۔ رحم اپنی جگہ سےٹل جاتا ہے، دوران حیض رحم
میں درد ہوتا ہے اور نیچے دبانے والا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔

ہوا کی نالی میں سبز،زرداور بھی سفید بلغم بنتا ہے۔ خجرہ میں خشکی اور حصیلنے کاا حساس جو کھانے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت بستر میں تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ هنجرہ میں سرسراہٹ ہوتی ہے۔ آ واز کا بیٹھ جانا، بار بارز کام ہونا، بند کمرے میں دمہ کی تکلیف کا بڑھ جانا،سانس میں دفت جوکھانسے سے یالیٹنےاور چلنے سےاورشام کےوفت بڑھ جاتی ہے کھلی ہوا میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ نزلہ کے ساتھ کھانسی اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ سردی سے سینہ میں کھڑ کھڑا ہے گھٹن ،جلن ، در داور بے چینی ہوتی ہے۔ صبح کے وقت بلغمی کھانسی بڑھ جاتی ہے اور رات کوخشک کھانسی زیادہ ہو جاتی ہے۔موسم میں اچا نک تبدیلی ہواورسردی بڑھ جائے تو ایسی سردی سے بھی تکیفیں بڑھ جاتی ہیں حالانکہ اس کی تکیفیں عموماً پلسٹیلا کی طرح گرمی سے بڑھتی ہیں۔ گویا بیدوا تضادات کا مجموعہ ہے۔ مزاج اور پیاس میں بھی یہی تضادیایا جاتا ہے۔ یہی دوا بعض ایسے مریضوں کو بھی موافق آتی ہے جن کے مزاج پلسٹیلا کی طرح نرم اور عمگین ہوں اور بعض ایسے مریضوں کو بھی موافق آئے گی جن کے مزاج میں چڑ چڑا پن اور غصہ ہو۔ پھراسی دوا میں پلسٹیلا کی طرح پیاس کا نہ ہونا بھی ملتا ہے اور کبھی سخت پیاس بھی ملتی ہے جو بجھنے کا نام نہ لے، منہ خشک ہی رہے اور معدہ میں گویا آ گسی گی ہوئی ہو۔ انہی تضادات کے باعث میں نے شروع ہی میں متنبہ کیا تھا کہ اس دوا کا سمجھنا آسان کا منہیں۔ بائیویمی میں کالی سلف چھوٹی طاقتوں میں استعمال ہوتی ہے کیکن ہومیو بیتھی میں بڑی طاقت میں دینازیا دہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔

> طاقت: بائيو کيمک 6x يا هوميو پيټ کک کې حسب ضرورت او نچې طاقتير

128

كرئيوز وثم

KREOSOTUM

كرئيوزوك كامزاج ركف والے مريضوں ميں تين علامات نماياں طوريريائي جاتي ہیں۔اوّل یہ کہان کے تمام اخراجات کاٹنے ، جلانے اور جیھنے والے ہوتے ہیں جن سے خراش پیدا ہوتی ہے۔ دوم، تمام جسم میں دھو کن یائی جاتی ہے جو کیکٹس کی طرح شدید ہوتی ہے کیکن نشنج اور در د کا فقدان ہوتا ہے۔ تیسری خاص علامت سیلان خون ہے۔ ذرا سے دباؤ سے خون جاری ہوجا تا ہے۔ آئھ میں ورم ہوتو معالج کے ہاتھ لگا کرد یکھنے سے بھی خون نکل آتا ہے۔ رحم میں ایسی کیفیت پیدا ہوتو ایسی عورتو ل کوسلسل خون آنے کی شکایت ہوجاتی ہے۔ حیض کے ایام گزرنے کے باوجود بھی خون جاری رہتا ہے۔ ذراسی سوئی چبھ جائے تو خون کی بوندیں ٹیکنے گئی ہیں۔بعض دفعہ آنسوؤں میں بھی خون کی آمیزش ہوتی ہے۔ چیوٹی چیوٹی وجوہات سے خون کا جاری ہونا اورجسم کے کسی بھی حصہ سے خون جاری ہونے کا رجحان کرئیوزوٹ کی خاص علامت ہے۔مسوڑ ھے بھی ڈھیلے پڑ کردانتوں کوچھوڑنے لگتے ہیں۔ ہاتھ سے دانت صاف کرنے پر بھی خون نکل آتا ہے۔ عام طور پر سرخ خون بہتا ہے لیکن درمیان میں سیاہ خون کا سیلان بھی شروع ہوجا تا ہے۔منہ کے کنار ہے چپل جاتے ہیں۔خشک اور چھلے ہوئے ہونے اس کی خاص علامت ہیں۔ناک کے کنار ہے بھی چھلے ہوئے اور زخمی ہوتے ہیں۔عموماً گبڑے ہوئے نزلہ میں بیعلامت ملتی ہے لیکن کرئیوزوٹ میں بیعلامت مشتقلاً یائی جاتی ہے۔اکثر مخارج سےخون بہتا رہتا ہے۔ناک، آئکھ، گردوں اور رحم سےخون بہنا اس دوا کا خاص مزاج ہے۔ کرئیوزوٹ میں مزاج کی تیزی اور جلدغصه آجانا کیمومیلا سے مثابہ دکھائی دیتا ہے۔

لیکن کیمومیلا کا مزاح ہی غصہ والا ہوتا ہے جبکہ کرئیوزوٹ میں یہ کیفیت عارضی ہوتی ہے۔ بیاری کی شدت سے مریض چڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے طبیعت میں کیمومیلا کی علامات پیدا ہوجاتی ہیں۔
کیمومیلا کا مریض تندرست ہویا بیار، ہر حال میں غصے والا ہی رہے گا اور اس کے مزاج میں بدخلقی اس کی سرشت بن جاتی ہے۔

كرئيوزوٹ ميں خون كے اخراج كى وجہ سے ماؤف حصہ چپل جاتا ہے اور جلن ہوتى ہے۔اگراس کےاخراجات سیاہی مائل ہوں تو ان میں بد بوجھی یائی جاتی ہے۔کرئیوز وٹ رات کو بچول کے بیشاب نکل جانے کی بہترین دواہے۔اس میں یکا یک بیشاب کی حاجت اتی شدید ہوتی ہے کہ بیشاب کرنے کی جگہ تک بھی نہیں بہنچ یاتے۔اگراس دوا کو بچھ عرصہ استعال کیا جائے تو رفتہ رفتہ بیشاب کی حاجت کی تیزی میں کمی آ جاتی ہے اور بیشاب کورو کنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ معدے میں بھی تیز ابیت، قے اور تلی کار جحان ملتا ہے۔ قے کامواد گلے میں جلن اور خراش پیدا کرتا ہے۔منہ کا ذا کقہ خصوصاً یانی پینے کے بعد کڑوامعلوم ہوتا ہے۔معدے میں درد جسے کچھ کھانے سے آ رام ہوگر کھانے کے بعد قے ہوجاتی ہو۔گرم غذاسے مریض بہترمحسوں کرتا ہے جبکہ مھنڈی غذاسے بیاریوں میں اضافہ ہوجاتا ہے۔معدے میں کھیاؤاور شنڈک محسوس ہوتی ہے۔ کینسر کے رجحان والے مریض میں بھی کرئیوزوٹ مفید ہے خصوصاً معدے کے کینسر کے آغاز میں کو پنم کے ساتھ ملا کر دی جائے تو فائدہ پہنچاتی ہے۔ بیاری کی پوری علامتیں ظاہر ہونے سے پہلے ہی اگر کرئیوزوٹ کی علامتیں نظر آئیں تو فوراً شروع کروا دینی جاہئے ورنہ اگریہ کینسرایک دفعہ شروع ہوجائے تواسے سنجالنا ناممکن ہوتا ہے۔ مناسب علاج مریض کوصرف آرام تو پہنچا سکتا ہے، کمل شفانہیں بخشا۔ زندگی کو سہولت سے اپنی آخری "مقررہ اجل" تک بڑھانے کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ بیرمحاورہ میں نے عمراً استعمال کیا ہے کیونکہ عموماً بیرکہا جاتا ہے کہ زندگی کے پچھ سال بڑھائے جاسکتے ہیں۔سال تو نہیں بڑھ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ انتہائی مدت سے زندگی کے جوسال کم ہورہے ہیںان کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ بیاری اور شفا کا یہی فلسفہ ہے۔ گویا سیح

علاج سے مقررہ مدت تک عمر کمبی کی جاسکتی ہے۔ بیاری عمر کو کم کردیتی ہے اور صحت عمر کو مقررہ عمر تک لے جانے میں مدد کرتی ہے۔

کرئیوزوٹ گرمیوں کے اسہال میں بھی کام آتی ہے کیونکہ سخت گرم موسم میں جواسہال شروع ہوجا ئیں ان میں بسااوقات کرئیوزوٹ کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔اسی طرح بیددوا فریا بیطس کے مریض کوبھی مکمل شفا بخشنے کی طاقت رکھتی ہے۔ بچوں کے دانت نکا لنے کے زمانے میں اگر بوسیدہ اور کالے رنگ کے دانت نکلیں اور دانتوں کو نکلتے ہی کیڑا لگ جائے اور مسوڑ ھے سیاہی مائل ہوں تو کرئیوزوٹ اکسیر ثابت ہوتی ہے۔ کرئیوزوٹ میں زبان پرسفیدی مائل نہ جم جاتی ہے۔ ہون قد کر وا ہوتا ہے۔ کھی ہوا،سردی کے موسی مرخ جن میں خون بہنے کار جمان ہوتا ہے۔ منہ کا ذاکقہ کڑوا ہوتا ہے۔ کھی ہوا،سردی کے موسم ، ٹھنڈے یانی اور نہانے سے اور لیٹنے سے تکیفیں بڑھتی ہیں جبکہ گرمی سے عموماً تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ جاتی ہوائی موسم ، ٹھنڈے یانی اور نہانے سے اور لیٹنے سے تکیفیس بڑھتی ہیں جبکہ گرمی سے عموماً تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ سوائے اس کے کہ شخت گرمی کے اثر سے اسہال شروع ہوجائیں۔

129 ليك كينائينم LACCANINUM

لیک کینائینم کتیا کے دودھ سے تیار کی جانے والی دوا ہے۔اسی وجہ سے اکثر لوگ اس سے کراہت محسوں کرتے ہیں اور ہاتھ لگانے سے بھی اجتناب کرتے ہیں حالانکہ بعض دوائیں مثلاً سورائینم اور شلینیم وغیرہ کتیا کے دودھ سے بھی زیادہ مکروہ اور خطرناک مواد سے تیار کی جاتی ہیں۔ کتیا کا دودھا گر ہومیو پیتھک طاقت میں دیا جائے تواصل سے بالکل برعکس ہوجا تا ہےاورایک یا ک صاف اور شفاف دوابن جاتا ہے۔اس لئے اس کے استعمال سے گھبرانانہیں جا ہئے۔ پہلے پہل ڈاکٹر رائز گ (Dr. Reisig)اور ڈاکٹر بیئر ڈس (Dr. Bayard's) نے اس دوا کی آ زمائش کی اورکئی بیاریوں میں اسے بہت مفیدیایا۔ان دونوں کی وفات کے بعد ڈاکٹر ڈائر (Dr. Dyer) نے اس دوا کواز سرنورواج دیا جس کے بعد ڈاکٹر کینٹ نے اسے بہت شہرت دی اور بہت وسیع پیانہ براسے بعض بہاریوں کےعلاج میں کامیابی سے استعمال کیا۔اس دوا کی سب سے بڑی علامت اعصابی بے چینی اور اعصابی انتشار ہے۔اعصاب اچھلنے لگتے ہیں۔کتوں میں بہعلامت بائی جاتی ہے کہ بہ فرضی چیز وں براجھلتے ہیں اور فضامیں بھو نکتے ہیں۔اسی وجہ سے ا کثر افسانہ نگاروں نے اپنی کہانیوں میں بیلکھا ہے کہ کتوں کوجن بھوت اور روحیں نظر آتی ہیں۔ ان ڈاکٹر وں کواس پس منظر کاعلم نہیں تھالیکن جب کتیا کے دودھ کی ہومیو پیتھک پٹینسی بنائی گئی تو یتہ چلا کہاس میں بیخاصیت یائی جاتی ہے کہا گرانسان براس کی آ زمائش کی جائے تواسے فضا میں فرضی چیزیں دکھائی دیے لگتی ہیں اور وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ چیزیں ابھر کرایک وجود بن کر مجھے نقصان پہنچائیں گی۔ یہ بات کتے کے مزاج میں داخل ہے اور اس کے دودھ کے ذریعہ

انسانی د ماغ میں بیاریاں بن کرا بھرتی ہے۔اگر بیاریاں پہلے سے موجود ہوں تو اس دودھ کی ہومیو پیتھک دوائی میں ان کوٹھیک کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔

اس دوامیں اعصابی علامات بہت نمایاں ہوتی ہیں۔ غدودوں پر بھی بیاثر انداز ہوتی ہیں۔ غدودوں پر بھی بیاثر انداز ہوتی ہے۔ بڑھے ہوئے غدودوں کو ٹھیک کردیتی ہے۔ اگر غدودوں میں زخم ہوجائیں توان کی سطح بہت چمکدار ہوجاتی ہے۔ الیمی چمک پائی جاتی ہے جونظر کو بری لگتی ہے۔ تناؤ بھی ہوتا ہے۔ لیک کینائینم ایسے زخموں کو ٹھیک کردیتی ہے۔

لیک کینائینم میں جلد کی شدید زودسی پائی جاتی ہے۔ عموماً عورتوں میں یہ زودسی نمایاں ہوتی ہے اور وہ پانچوں انگلیاں پھیلا کررکھتی ہیں۔ اگراتفا قا ایک انگلی دوسرے سے لگ جائے تو چلا اٹھتی ہیں۔ کیڑے کا ہلکا سالمس بھی برداشت نہیں کرسکتیں۔ لیکیسس میں بھی یہ زودسی پائی جاتی ہے اور بعض دفعہ یہ دونوں ایک دوسرے کی متبادل دوائیں بن جاتی ہیں۔ لیکیسس اور لیک کینائینم میں ایک اور مشترک بات یہ ہے کہ دونوں کے مریضوں کے لیکیسس اور لیک کینائینم میں ایک اور مشترک بات یہ ہے کہ دونوں کے مریضوں کے احساسات بہت تیز ہوجاتے ہیں اور وہ خیالی چیزوں سے بھی خوف کھانے لگتے ہیں۔ اس قسم کی علامات ملنے کے باوجود دونوں میں فرق بھی نمایاں ہیں۔ لیک کینائینم کا مریض اکیا نہیں رہ سکتا جبکہ لیکیسس کا مریض تنہائی جا ہتا ہے۔ لیکیسس کی تکلیفیں نیند کے بعد بڑھتی ہیں اور بائیں طرف سے دائیں طرف حرکت کرتی ہیں۔

فہنی اور نفسیاتی بیاریاں: ۔ لیک کینائینم میں ایک اور بات نمایاں ہے کہ اس کا مریض چاتا ہے تو محسوں کرتا ہے کہ وہ فضا میں تیرر ہا ہے۔ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ جو کھے کہ در ہا ہے وہ جھوٹ ہے۔ وہ اپنے آپ کو جھوٹا سمجھتا ہے۔ لیک کینائینم کی ایک علامت جو کسی اور دوا میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مریض سمجھتا ہے کہ اس کے منہ پر دوسرے کی ناک گی ہوئی ہے یا میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مریض سمجھتا ہے کہ اس کے منہ پر دوسرے کی ناک گی ہوئی ہے یا یہ کہ اس کا جسم کسی اور کا جسم سے اور اس کی بجائے کوئی اور بات کر رہا ہے۔

لیک کینائینم جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہے۔سارے بدن کے عضلات میں در دہوتا ہے جوایک جگہدے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔اچپل اچپل کرجگہیں بدلتا ہے

اورسردی سے آرام پاتا ہے۔لیڈم اور پلسٹیلا میں بھی خصوصیت سے بیعلامت پائی جاتی ہے۔
پلسٹیلا کاعمومی مزاج گرم ہے کیکن لیڈم کا مزاج گرم نہیں ہے البتہ وجع المفاصل کو شٹڈی نکور سے
آرام آتا ہے یہاں تک کہ بعض مریض پانی میں برف کی ٹکڑیاں ڈال کر اس میں اپنے پاؤں
رکھتے ہیں۔لیڈم میں جوڑوں کی دردیں اکٹر نیچے سے شروع ہوکراو پر کی طرف حرکت کرتی ہیں۔
لیک کینائینم میں روشنی اور شور سے زود سی پائی جاتی ہے۔ پڑھتے ہوئے آئکھوں کے
سامنے ہلکی سی دھند آجاتی ہے۔آوازیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔قریب کی آوازیں
ہمی دور ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ بیعلامت کسی اور دوا میں نہیں یائی جاتی۔

لیک کینائینم و فتھیریا لینی خناق کی بہترین دواؤں میں سے ایک ہے۔خصوصاً اگر گلے میں دردیں ایک طرف کے ٹانسلز سے دوسری طرف اور پھر دوسرے ٹانسلز سے پہلے ٹانسلز کی طرف بار بار کودتی رہیں کسی زمانے میں خناق بہت عام بیاری تھی اوراس کا علاج بہت مشکل تھا لیکن اب اس کا مدافعتی ٹیکہ ایجاد ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اس بیاری پر قابویالیا گیا ہے۔لیکن تیسری دنیا کے غریب ممالک میں ابھی بھی ہیا ہی موجود ہے۔ یہ بہت خطرناک بیاری ہے اس میں بیاری کا زہر بلا مادہ سرمئی رنگ کے مواد کی صورت میں گلے میں جم جاتا ہے اور تہد بہتہد موٹا ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ سانس کی نالی کو بند کردیتا ہے۔ سانس لینے میں سخت دفت ہوتی ہے اور کھانا پینا تو تقریباً ناممکن ہوجا تا ہے۔خناق کی بہترین ہومیو پیتھک دوااسی بیاری کے مادے سے تیار کی گئی ہے جس کا نام وقتھرینم (Diphtherinum) ہے۔ دوسوطاقت سے شروع ہوکر آ ہستہ آ ہستہ طاقت بڑھانی جا ہے۔اس کی تفصیل کے لئے ڈفتھیرینم کے باب کا مطالعہ کریں۔ اگر خناق کی علامت بیہو کہ ایک طرف سے تکلیف اچھل کر دوسری طرف جائے اور پھر واپس آ جائے توالی صورت میں لیک کینائینم چوٹی کی دواہے۔بسااوقات خناق کے زہرسے گلے میں مستقل فالح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یعنی خناق ٹھیک بھی ہو جائے لیکن فالح رہ جائے تو لیک کینائینم بہت فائدہ مند ہے۔ اگر نزلہ، زکام کے بعد یا خناق کے امراض کے ٹھیک

ہونے کے بعد دل کی تکلیف ہوجائے توسب سے پہلے سپائی جیلیا ذہن میں آنی چاہئے۔اس
سے تکلیف و ہیں رک جاتی ہے اور آ گے نہیں بڑھتی ۔ بعض مریضوں کو کھانے کی نالی میں فالجے
ہوجا تا ہے اور وہ کوئی ٹھوس چیز نگل نہیں سکتے ۔ بعض بچوں میں فالجی کیفیت تو نہیں ہوتی لیکن اس
نظام میں کمزوری کی وجہ سے ٹھوس چیزیں نگلنے کی طاقت ہی نہیں رہتی ۔ اس علامت میں
لیک کینائینم بہت مفید ہے مگر اس کا تعلق صرف عضلات کے فالج سے ہے دوسری کمزوریوں
سے نہیں ۔

لیک کینائینم کاعورتوں کی بیاریوں سے بھی تعلق ہے۔رحم اور بیضة الرحم میں دونوں طرف درد ہوتا ہے۔حیض کھل کر جاری ہونے سے مریض کی تمام نسوانی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔اس لحاظ سےاس کا مزاج سمی سی فیوجا سے بالکل مختلف ہے۔سمی سی فیوجا میں حیض کھل کر جاری ہوتو تکلیفیں بھی بڑھ جاتی ہیں لیک لیک کینائینم میں رحم کی وہ تکلیفیں شامل ہیں جوسارا مہینہ جاری رہیں اور کھل کر حیض جاری ہونے پر بالکل ختم ہو جائیں۔ گلے کی خرابی حیض کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور حیض ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ لیک کینائینم کی امتیازی علامت ہے جوذ ہن نشین رہنی جاہئے۔ دنیا کے کسی اور طبی نظام میں ایسی علامتوں برغور نہیں کیا جاتا بلکہان کے نز دیک تو بیفرضی اور بے معنی باتیں ہیں۔ ہومیو پینھی میں اس فتم کی عجیب علامتیں ضرور کسی نہ کسی دوا کی طرف اشارہ کرتی ہیں اس لئے انہیں یا در کھنا ضروری ہے۔ مثلًا اگر حیض شروع ہونے سے پہلے گلاخراب ہوتا ہوتو یہ میگنیشیا کارب کی بھی علامت ہے لیکن اس صورت میں حیض ختم ہونے کے ساتھ گلاٹھیک نہیں ہوگا بلکہاس کا الگ علاج کرنا پڑے گا۔ گلے کی خرابی کا حیض کی ابتدا اور اختیام سے تعلق ہونا لیک کینائینم کا خاصا ہے۔کلکیریا کارب میں بھی سی سی فیوجا کی طرح حیض کے کھل کر جاری ہونے سے تکلیف بڑھتی ہے مگر كلكير بإكارب ميں اس تكليف كا گلے سے تعلق ہوتا ہے، اندرونی اعضاء سے ہيں۔ لیک کینائینم میں حیض کے خون کے ساتھ جے ہوئے خون کے لوٹھڑے آتے ہیں۔

بعض دفعہ یوں محسوں ہوتا ہے کہ رحم کی جھلیوں کے نگڑے کٹ کٹ کر آ رہے ہیں۔ یہ علامت کر ئیوزوٹ میں بھی پائی جاتی ہے۔ چیض کا خون وقت سے پہلے اور مقدار میں زیادہ ہوتا ہے۔ عورتوں کی چھاتیاں چیض آ نے سے پہلے یا دودھ پلانے کے زمانے میں پک جاتی ہیں اور ان میں سوزش ہوجاتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے عورت بچ کو دودھ نہ پلا سکے اور دودھ خشک کرنا مطلوب ہوتو پلسٹیلا اور لیک کینائینم بہت مفید دوائیں ہیں کیونکہ ان دونوں دواؤں کا مزاج اس پہلوسے باہم ملتا جلتا ہے۔

طاقت: 30 يااس سےاونچی

130

ليك ڈیفلوریٹم

LAC DEFLORATUM

لیک ڈیفلوریٹم ایک ایسی دواہے جس کے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ اسے چکنائی نکلے ہوئے دودھ (Skimmed milk) سے تیار کیا جاتا ہے۔ میں اس نظریہ سے کلیٹا متفق نہیں ہول کیونکہ دودھ سے جس حد تک بھی چکنائی نکالی لی جائے پھر بھی اس کے پچھ نہ پچھ ذرات دودھ میں موجودر ہے ہیں۔ چنانچہ یہ محض وہم ہے کہ یہ چکنائی کے بغیر دودھ سے تیار کی جانے والی دواہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ چکنائی نکلنے کی وجہ سے دودھ بتال ہوجائے مگریہ درست نہیں کہ اس میں چکنائی کا کوئی حصہ بھی باتی نہرہے۔ اگر ہومیو بیتھی نظریہ درست ہے توایسے دودھ میں چکنائی کا جز وضر ورموجو در ہے گا۔ اس لئے اگر عام دودھ سے بھی یہ دوا تیار کی جائے تو بعینہ وہ بھی وہی میں خات رکھے گی جو چکنائی نکلے ہوئے دودھ سے بنائی گئی دوار کھتی ہے۔

لیک ڈیف ان بچوں کے لئے بہت مفید ہے جنہیں <u>دودھ سے الرجی ہوتی ہے۔ وہ</u>
دودھ ہضم نہیں کر سکتے اور انہیں اسہال وغیرہ شروع ہوجاتے ہیں۔ بعض اوقات لیک ڈیف کی
CM میں ایک خوراک ہی بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے اور پھر دوبارہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی لیکن
کبھی بعض جزوی علامتیں باقی رہ جاتی ہیں یا کچھ عرصه اثر دکھا کر پھر فائدہ رک جاتا ہے۔

لیک ڈیف بہت ٹھنڈے مزاج کی دوا ہے جبکہ لیک کینائینم کا مزاج بہت گرم ہوتا ہے۔ لیک ڈیف کا مزاج بہت گرم ہوتا ہے۔ لیک ڈیف کا مریض بے حد ٹھنڈا ہوتا ہے۔ گرم کمرے میں گرم کیڑوں میں لیٹ کر بھی اس کی سردی دور نہیں ہوتی۔ سانس لینے سے جو ہلکی سی ہوا چہرے پرمحسوس ہوتی ہے۔ اس سے بھی اسے سردی لگتی ہے۔ سردی کا بیشد ید احساس آرنیکا، کیکیسس اور

سورائینم وغیرہ کی سردی سے بہت مختلف ہے۔ اس میں سارا بدن ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ مریض سردی سے اس حد تک زود حس ہوجا تا ہے کہ بند کمرے میں جہاں ہوا کا نام ونشان بھی نہ ہووہ ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرتا ہے اور اعصابی اور بائی کی در دوں میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ ویسے تو عموماً سارے جسم میں ہی در دہوتا ہے لیکن سرمیں خاص طور پر زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ بیدرد تعفیٰ مادوں کی وجہ سے نہیں بلکہ بائی کا درد (Rhematic) ہوتا ہے۔ چہرے اور سرکے اعصابی ریشوں میں شدیددر دہوتا ہے۔ اگر مریض بہت ٹھنڈ اہوتو لیک ڈیف کو یا در کھنا چاہئے۔ لیک ڈیف کو یا در کھنا چاہئے۔ اگر مریض بہت ٹھنڈ اہوتو لیک ڈیف کو یا در کھنا چاہئے۔ اگر مریض بہت ٹھنڈ اہوتو لیک ڈیف کو یا در کھنا چاہئے۔ نہونے میں نہیں آتا۔ ہمیشہ ٹھنڈ اہی رہتا ہے۔ آرام اور دباؤ سے در دمیں افاقہ ہوتا ہے۔ جلد بہت زود حس ہوجاتی ہے۔ یہ زود حسی بعض اور دواؤں میں بھی پائی جاتی ہے۔ لیک کینائینم میں جلد کی زود حسی دردوں کے حساس سے تعلق رکھتی ہے کین لیک ڈیف میں محض سردی سے۔

لیک ڈیف ایک ایسی دواہے جے عموماً ذیا بیطس میں نظر انداز کیا گیا ہے۔ حالانکہ اگراس کی دوسری علامتوں کے ساتھ ذیا بیطس بھی ہوتو یہ خدا کے فضل سے اکیلی ہی مکمل شفا بخشنے کی طاقت رکھتی ہے۔ بعض دفعہ اونچی طاقت میں ایک ہی خوراک مریض کوٹھیک کر دیتی ہے۔ میں نے بار ہا ذیا بیطس کے مریضوں کوٹھیک ہوتے دیکھا ہے۔ یہ کوئی ایسی بیاری نہیں ہے کہ ہر مریض کو مسلسل دواؤں کا مختاج رہنا پڑے۔ مناسب ہومیو پیتھک علاج سے مرض سرے سے غائب ہوسکتا ہے لیکن بہت سے مریضوں کے متاب ہوسکتا ہے گئن بہت سے مریضوں کا مسلسل علاج بھی کرنا پڑتا ہے۔ ذیا بیطس کے مریضوں سے تعلق رکھنے والی بعض علامتیں مثلاً پیشاب کی کثافت، بار بار پیشاب کا آنا ، شدید پیاس لیک ڈیف میں بغیر بعض علامتیں مثلاً پیشاب کی کثافت، بار بار پیشاب کا آنا ، شدید پیاس لیک ڈیف میں بغیر ذیا بیطس کے بھی یائی جاتی ہیں۔

ہومیو پیتھی دوائیں بیار یوں کے مخصوص گروہوں سے تعلق رکھتی ہیں۔اگر بنیا دی علامتوں کا علاج کیا جائے تو اس گروہ سے تعلق رکھنے والے دیگر امراض بھی دور ہو سکتے ہیں۔ وہ مریض جنہیں دودھ سے نفرت ہویاان کی تکیفیں دودھ پینے سے بڑھ جائیں،
متلی، قے، سر درد، ڈکار، معدہ میں ہوا وغیرہ پیدا ہونے گئے تو اس قتم کی سب علامتوں میں
لیک ڈیف کی ایک لاکھ میں ایک خوراک ہی کارگر ثابت ہوسکتی ہے۔ بعض دفعہ اسے پچھ عرصہ
بعد دوہرانا پڑتا ہے۔ اگر دوخوراکوں کے بعد بھی کوئی فرق نہ پڑے تو پھراس دوا کے پیچھے نہیں
پڑنا چاہئے۔ اگر اس نے فائدہ دینا ہوتو فوراً دیتی ہے در نہ بالکل اثر نہیں کرتی ۔ پہلی خوراک سے
افاقہ ہولیکن علامتیں جلدوا پس آ جائیں توایک ہفتہ کے بعد دوسری خوراک دے دیں۔

لیک ڈیف کی سب علامتوں میں ملیریا کے پرانے اثرات بھی ملتے ہیں مثلاً خون کی کمی،سوجن، ذیا بیطس کی علامتیں، دل کی کمزوری وغیرہ وغیرہ -ان سب علامتوں کوالگ الگ یاد رکھنے کی بجائے صرف یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ اس دوا کا مزاج سخت ٹھنڈا ہے۔جلد سردی کی وجہ سے شخت زودس ہوجاتی ہے اگر میعلامتیں اکٹھی ہوجا ئیں اور پھردل کی تکلیف ہو یا ملیریا اور ذیا بیطس کے آثار ظاہر ہوں توان میں اس بات کا بھاری امکان ہوتا ہے کہ یہ ان سب بیاریوں میں بھی مفید ثابت ہوگی۔

دل کی بیاریوں میں لیک ڈیف کے استعمال کا مجھے ذاتی تجربہ نہیں ہے اس لئے میں یفین سے نہیں کہ سکتا کہ لیک ڈیف اونجی طاقت میں مفیدر ہے گی یا چھوٹی طاقت میں ۔ تاہم چونکہ بید دل کا معاملہ ہے اس لئے احتیاطاً چھوٹی طاقت سے علاج شروع کرنا چاہئے۔ اگر فائدہ ہوتو دہرائیں اور پھر آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ ہوتو دہرائیں اور پھر آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ رام آتا ہے اس لئے چھوٹی طاقتیں ہی محفوظ ہیں۔

لیک ڈیف کے مریض کی یا دواشت بھی کمزور ہوجاتی ہے اور وہ دماغی کام سے ہوجھ محسوس کرتا ہے۔ یہ دوا دل اور جگر کی جربی کی بیماری (Fatty Degeneration) میں بھی بہت مفید ہے۔ عموماً یہ بیماری شراب کے عادی لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ لیکن زیادہ چربی کھانے والوں کو بھی ہوجاتی ہے۔ جگر میں چربی کے جالے بننے لگتے ہیں جو عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں۔ جگر کے جس حصہ میں بھی یہ بیماری ہو وہ حصہ عملاً ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں۔ جگر کے جس حصہ میں بھی یہ بیماری ہو وہ حصہ عملاً

ماؤف ہوجاتا ہے اور جو کیمیائی رطوبات وہاں بننی چاہئیں ان کی مقدار کم ہونے گئی ہے۔
لیک ڈیف کا اس مرض میں مفید ہونا بیٹا بت کرتا ہے کہ یہ چکنائی کے بدا ترات کو دور کرتی ہے۔
لیک ڈیف کے مریض میں غم کا احساس بھی پایا جاتا ہے جس کے نتیجہ میں موت کی خواہش بڑھ جاتی ہے اور مریض ایسا طریقہ ڈھونڈ تا ہے جس میں سب سے زیادہ آسانی سے موت واقع ہو۔ ایسا مریض مقتد دنہیں ہوتا۔ اس کی اداسی میں نرمی پائی جاتی ہے اور وہ موت میں بھی آسانی ڈھونڈ تا ہے کہ مرتے ہوئے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ مشہور شاعر غالب بھی لیک ڈیف کا مریض معلوم ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے۔

ڈھونڈے ہے اس مغنی آتش نفس کو جی جس کی صدا ہو جلوہ برق فنا مجھے

یعنی دل ایسے مغنی (گانے والے) کو ڈھونڈ رہا ہے جس کی آواز میں ایساسوز ہوجس سے فٹا کی بجلی چیکے اور انسان آنا فاناً بغیر تکلیف کے احساس کے مرجائے۔ بیتو مرنے کا بہت عمدہ طریقہ ہے کیکن افسوس! اسے کوئی ایسامغنی ملانہیں۔

لیک ڈیف کے مریض کو ہاتھ اونچا کرنے سے بھی چکرآتے ہیں۔اس کے سرکے چکر کونیم (Conium) سے مشابہ ہیں۔ کونیم میں لیٹ کر ذراسی کروٹ بدلتے ہوئے یا آنکھی حرکت سے بھی چکرآتے ہیں اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے بستر گھوم گیا ہے۔لیک ڈیف میں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے جبکہ لیک کینائینم میں چلتے ہوئے چکرآتے ہیں مگر مریض کو محسوں ہوتا ہے کہ ساری کا ئنات بہت لطیف انداز سے گھوم رہی ہے اور وہ پر یوں کے دلیں میں چلا گیا ہے۔اس علامت کا فلک سیر یعنی بھنگ سے بھی تعلق ہے جس میں مریض کو ہواؤں میں پھرنے اور تیرنے کا احساس ہوتا ہے۔اس کی سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ وقت گزرنے کا احساس متاثر ہوتا ہے۔ بھی لگتا ہے کہ ایک سینٹر میں ساراز مانہ گزرگیا ہے بھی غم اور تکلیف کے دور میں وقت گزرتا ہی نہیں اور ہر لمحہ لمباہوتا جاتا ہے۔لیک ڈیف میں یہ بجیب کیفیت ہوتی ہے کہ وقت مزے کے احساس کے ساتھ لمباہوتا جاتا ہے حالانکہ خوشی اور مزے کے دور میں کمی سکڑ جایا کرتے ہیں اور وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے۔ لیک ڈیف کے مریض کا دماغ ایک بات پڑھہرتا نہیں بلکہ ادھرادھر بھٹکتا رہتا ہے۔اسے کسی بات پریقین نہیں رہتا۔

لیک ڈیف میں عورتوں کے سردرد سے تعلق میں ایک علامت بہت نمایاں ہے یعنی حیض سے پہلے اور بعد میں سر میں درد ہوتا ہے جو گدی، پیشانی اور کنپٹیوں تک پھیل جاتا ہے۔ اگر حیض سے پہلے اور بعد میں زردی مائل بد بودارلیکوریا کا اخراج ہوتو یہ بھی لیک ڈیف کی پختہ علامت ہے۔ یہ دونوں علامتیں مل جائیں تو علاج بہت ہمل ہوجاتا ہے۔ لیک ڈیف حمل کی متلی میں بھی بہت مفید دواہے۔

الیں مریضہ جس کا موٹا پے کی طرف میلان ہواور جسم ٹھٹڈار ہتا ہو۔اسے ذیا بیطس ہو جائے تولیک ڈیف بھی اس کی ایک امکانی دوا ہوگی۔اگر کوئی عورت ضرورت سے زیادہ موٹے بچکو جنم دے جبہ غذا وغیرہ نارمل ہوتو اس بات کا بھاری خطرہ موجود ہے کہ اسے ذیا بیطس ہو جائے گی اور بچے میں بھی ربحان ہوگا۔ اگر اس کا مزاج ٹھٹڈا ہے اور جسم ٹھٹڈا رہتا ہے تو لیک ڈیف اسے مکمل شفاد ہے تی ہے اس لئے فوراً اس کے ذریعہ علاج شروع کرنا چاہئے۔وہ عورتیں جوموٹی ہوں جسم ٹھٹڈا ہواوروہ دودھ ہضم نہ کرسکتی ہوں ان کے لئے بیددوا نہایت مفید ہے۔اگر کسی عورت کو دودھ سے نفر ت نہ بھی ہو گراسے دوران حمل دودھ ہضم نہ ہوتا ہوتو اس کی حمل کی متلی کو بھی خدا کے فضل سے بیدوا ٹھیک کردیتی ہے۔اس میں معدہ کی ان تمام بیاریوں کی علامت ان بیجہ میں یا مرغن غذاؤں کے استعال سے نظام ہضم میں خرابی ہوجائے تو عموماً پلسٹیلا استعال کی جاتی ہیں۔دودھ ہضم نہ ہونے کے جہ سے بیدا ہوتی ہیں۔دودھ ہضم نہ ہونے کے جاتی ہیں یا مرغن غذاؤں کے استعال سے نظام ہضم میں خرابی ہوجائے تو عموماً پلسٹیلا استعال کی جاتی ہے۔ گریک متاز کرتی ہے۔ اور یہی علامت ان دونوں کو متاز کرتی ہے۔

لیک ڈیف میں روشنی سے شدید زود حسی پائی جاتی ہے۔ آئھوں میں چھوٹے چھوٹے کچھوٹے کیکر چیھنے کا حساس ہوتا ہے۔ نظر دھندلا جاتی ہے۔

لیک ڈیف کا مریض سوتے ہوئے دانت آپس میں کٹاٹا تا ہے۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو بچسوتے ہوئے دانت رگڑتے ہیں یا جبڑوں میں سوجن ہوجائے تواس کے نتیجہ میں بھی بچہ دانت کٹاٹا تا ہے۔ اسی طرح معدہ کی خرابی خواہ پیٹ میں کیڑے نہ بھی ہوں لیکن دودھ ہضم نہ ہوتو تب بھی بچہ دانت کٹاٹا تا ہے۔ یہ تینوں اختالات ہیں جنہیں پیش نظر رکھنا چاہئے۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو تب بھی بچہ دانت کٹاٹا تا ہے۔ یہ تینوں اختالات ہیں جنہیں پیش نظر رکھنا چاہئے۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو تب بھی کی دانت کٹاٹا تا ہے۔ یہ تینوں اختالات ہیں جنہیں پیش نظر رکھنا چاہئے۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو بھوک پیٹ میں کرتا ہے۔ ان دونوں علامت میں سائنا (Cina) چوٹی کی دوا تبھی جاتی ہے اور سباڈیلا

لیک ڈیف میں تیسری علامت متلی کی ہے جس کے ساتھ قے کار جمان نہیں ہوتا اور قے شاذ کے طور پر ہوتی ہے۔اس لحاظ سے بیا پی کاک سے مشابہ ہے مگرا پی کاک میں قے کار جمان نسبتاً زیادہ ہے۔

لیک ڈیف کے مریض کی قبض بہت شدید ہوتی ہے۔قبض کے نکتہ نگاہ سے یہ سلیشیا سے بھی زیادہ سخت علامتوں کی حامل ہے۔ بعض دفعہ زورلگانے سے رگیس بھٹ جاتی ہیں لیکن اجابت نہیں ہوتی ۔ایسے مریضوں کو بواسیریا ہرنیا کی شکایت بھی ہوجاتی ہے۔

لیک ڈیف میں سر درد کے ساتھ کھلا پیشاب آتا ہے جو حکسیمیم کی بھی علامت ہے۔ حبسیمیم بھی شخت کے دلیک ڈیف میں سخت بیاس ہوتی ہے جبکہ حبسیمیم میں پیاس مفقود ہوتی ہے۔ لیک ڈیف میں پیشاب مقدار میں پیاس ہوتی ہے جبکہ حبسیمیم میں پیاس مفقود ہوتی ہے۔ لیک ڈیف میں پیشاب مقدار میں زیادہ اور ملکے پیلے رنگ کا ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ گاڑھا اور سیاہی مائل بھی ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ البیو من (Albumen) آرہی ہے۔ اگر باقی علامتیں بھی لیک ڈیف کی ہوں تو یہ بہت مفید ثابت ہوگی۔

لیک ڈیف کی ایک عجیب علامت جوغالبًا مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ نمایاں ہوتی ہے یہ ہے کہ اگر بہت سردی کے موسم میں باہر نکلیں تو پیشاب پر کنٹرول نہیں رہتا اور بے اختیار ازخود ہی نکلنے لگتا ہے۔ وہ عضلات جو پییٹا ب کو کنٹرول کرتے ہیں سردی کی وجہ سے بے حس ہوجاتے ہیں اوران میں وقی طور پر فالجی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ کاسٹیکم میں بھی بیعلامت ہے لیکن اس میں مستقل فالج کی وجہ سے بیعلامت پیدا ہوتی ہے۔کالی کارب میں بھی پیشا ب پر سے کنٹرول اٹھ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے۔لیک ڈیف میں یہ کیفیت عارضی ہوتی ہے۔ جب سردی ختم ہوجائے تو مریض واپس اپنی اصل حالت پر لوٹ آتے ہیں۔

حیض کے دوران کمر میں درد ہوتو اس میں بھی لیک ڈیف کار آمد دوا ہے۔اس کی مریض کے دوران کمر میں درد ہوتو اس میں بھی لیک ڈیف کار آمد دوا ہے۔اس کی مریض کے دوران سخت ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالے تو حیض فوراً رک جائے گا اور کوئی دوران دوسرا عارضہ لگ جائے گا۔اس لئے ایسی مریضا وُں کواحتیاط کرنی چاہئے اور حیض کے دوران سردیانی کے استعال سے احتراز کرنا چاہئے۔

لیک ڈیف دل کی تکلیفون میں بھی مفید ہے۔ دل کی کمزوری یا تنگی کی وجہ سے دمہ (Cardiac Asthma) ہوجا تا ہے۔ یہی علامت سپونجیا میں اپنی مخصوص شکل میں پائی جاتی ہے۔ (دیکھیئے سپونجیا)

لیک ڈیف کے مریضوں میں بعض دفعہ سارا ہاتھ نہیں بلکہ صرف انگلیاں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور کسی طرح گرم ہونے میں نہیں آئیں۔اس کی ایک استثنائی علامت یہ ہے کہ سر در دکو سخت سردی محسوس ہونے کے باوجود ٹھنڈک ہی سے آرام آتا ہے اور بیعلامت فاسفورس سے مشابہ ہے۔فاسفورس کا مریض سردی کے شدیدا حساس کی وجہ ہے جسم کوگرم کپڑوں میں لیپٹے رکھتا ہے لیکن سرکو ٹھنڈ ارکھنا جا اور سردی کے احساس کے بغیر کسی چیز سے اسے تسکین نہیں ماتی۔اس علامت کے علاوہ فاسفورس کی دیگر علامات لیک ڈیف سے بہت مختلف ہیں۔

طاقت: CM تا 30

ليكييس 539

131 ليپسس

LACHESIS (سیاه پیمن دارسانپ''سر دکوکو'' کاز ہر)

"سروکوکو"بہت ہی خطرناک سانپ ہے جو بہت بڑااور لمباہوتا ہے۔اس کی سرخی ماکل جلد پرسیاہی ماکل ملک علامی سرخی ماکل جلد پرسیاہی ماکل مٹیا لے داغ ہوتے ہیں۔اس سانپ کے زہر سے تیار کی جانے والی دوا"دلیکیسس"
کہلاتی ہے۔اس سانپ کے زہر کی آزمائش (Proving) بہت وسیع پیانہ پر کی گئی ہے۔

مختلف اقسام کے سانپول کے زہروں میں بہت باریک فرق ہوتے ہیں۔ تا ہم سانپول کے زہروں میں بہت باریک فرق ہوتے ہیں۔ تا ہم سانپول کے زہروں کوعموماً دوحصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک وہ زہر ہیں جوخون پر جملد آورہوتے ہیں۔ دوسرے وہ زہر جواعصاب پر جملد کرتے ہیں۔ اعصاب پر جملد آورہونے والے زہرخون پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں مگر وہ اعصابی نظام کوخصوصاً متاثر کرتے ہیں اور اعصابی ریثوں کومفلوج کر دیتے ہیں اور دل پر بھی براہ راست جملہ کرتے ہیں۔ اسی طرح خون پر اثر کرنے والے زہروں کا دل پر بھی اثر ہوتا ہے لیکن براہ راست نہیں۔ وہ عموماً خون کو مجمد کرے دل پر جملہ کا سبب بنتے ہیں۔

سانپ کا زہر فی ذاتہ کوئی ایسانہیں ہے جسے کھانے سے عام زہر کا اثر ظاہر ہو۔
سب جانوروں کے زہر بہت گاڑھی پروٹین کی شکل میں ہوتے ہیں جومنہ کے راستے جسم
میں داخل ہوجا کیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ اسی لئے سانپ کے کاٹے کا علاج یہ
بتایا جاتا ہے کہ فوری طور پرزخم پر منہ رکھ کر زہر کو چوس لیا جائے۔ اس کے چوسنے والے
کوکوئی نقصان نہیں پہنچتا بشر طیکہ منہ میں کوئی زخم نہ ہوا ور زہر براہ راست خون پراثر انداز
نہ ہو سکے۔ انسانی جسم پروٹین کے براہ راست جسم میں داخل ہونے کے خلاف

سخت رقمل دکھا تا ہے اور وہ خود بھی ایک پروٹین ہے جسے مختلف گروپس (Groups) میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہرگروپ کا الگ نام رکھا گیا ہے خون دیتے وقت ان گروپس کو پیش نظر رکھا جا تا ہے۔ یہ اس لئے کیا جا تا ہے کہ انسانی خون بھی اسی طرح کا زہر ہے جیسے سانپ کا زہر بلکہ انسانی خون تو سانپوں کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوسکتا ہے۔ اگر بیز ہرخون میں گروپ میچنگ کئے بغیر براہ راست داخل کر دیا جائے آؤ آ نافاناً موت واقع ہوسکتی ہے۔

سانپوں کے جسم میں موجود پروٹین ان کے منہ میں موجود غدودوں میں جمع ہوتی رہتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ گاڑھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ کاٹنے کا بیسارانظام کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ بیخدا تعالیٰ نے باقاعدہ ترکیب دیا ہے۔اس کے بغیراس نظام کا ازخودارتقاءیا کسی اتفاق کے نتیجہ میں پیدا ہوجانا ممکن نہیں ہے۔

سانپ کی کچلیوں کے ساتھ دومڑ ہے ہوئے دانت ہوتے ہیں جن میں سوراخ ہوتا ہے۔
ان دانتوں کا زہر کی تھلیوں سے ملاپ ہوتا ہے۔ جب سانپ کاٹنے کے لئے ضرب لگا تا ہے تو کوئی
زہر نہیں نکلتا لیکن جب سانپ سر پیچھے کر کے دانت باہر نکا لنے کی کوشش کرتا ہے تو زہر کی تھیلیاں
دبتی ہیں اوران کا زہر دانتوں میں واقع سوراخ کے رستے ٹیکے کی طرح بدن میں داخل ہوجاتا ہے۔
اس کے نتیجہ میں سخت رقمل بیدا ہوتا ہے۔

ان سبز ہروں میں کیکیسس کو ہومیو پیتھک علاج کے لحاظ سے بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ ہومیو پیتھی طریقہ علاج میں جتنا کیکیسس کے زہر کا استعال ہوا ہے اتنا کسی اور زہر کا نہیں ہوا اور اس سے غیر معمولی فوائد حاصل کئے گئے ہیں۔ ڈاکٹر کینٹ کا خیال ہے کہ اس کا کسی خاص علاقے سے تعلق نہیں ہے بلکہ تمام دنیا میں ہر جگہ اس دواکو مفید پایا گیا ہے۔ کیکیسس کے زہر میں جو شراور تیزی پائی جاتی ہے وہ دنیا کے تمام بر کارانسانوں اور بگڑے ہوئے مزاجوں میں پائی جاتی ہیں لینی شدید حسد، شرارت، فساد وغیرہ کا رجحال کیکیسس میں بہت شدت سے موجود ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے بیالمی زہر کہلاتا ہے۔

سانپوں کے زہرعموماً موسم بہار میں شدت اختیار کر جاتے ہیں۔موسم سر ما میں سانپ

اپنی کمین گاہوں میں پڑے سوئے رہتے ہیں۔اس تمام عرصہ میں ان کا زہر گاڑھا ہو ہو کر بہت خطرناک ہو چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب موسم سر ماکے بعد موسم بہار میں بیا پنی پناہ گاہوں اور بلوں سے باہرنکل آتے ہیں تو یہی وہ موسم ہے جس میں جب سانپ کاٹے تواس کا زہرانتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔

سانپ کے زہر کی علامتوں میں وقت کی بہت پابندی پائی جاتی ہے۔ سانپ جس موسم میں بھی کائے اگے سال عین انہی دنوں میں اس کے بدائر ات دوبارہ اجھر آتے ہیں اور علامات واپس آجاتی ہیں۔ بہار میں جن مریضوں کوسانپ کا ٹنا ہے۔ اگر وہ زندہ رہ جا کیں تو ہر بہار میں ان کوولیں ہی علامتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ سوتے میں سانپ نے دوبارہ کا ٹاہو اس کا زخم بھی اجھر آتا ہے اس لئے اس وہم کو مزید تقویت ملتی ہے۔ دوسرے موسموں میں بھی سانپ کائے کی علامتیں کچھ نہ بچھ اجھر تی تو ہیں مگر اس شدت سے نہیں کہ انسان سمجھے کہ سانپ نے دوبارہ کا ٹا ہے۔

بہار میں اگر اچانک سخت جیسینکیں آنے لگیں تو یہ جی لیکیسس کی ایک علامت ہے اور بعض مریضوں پر میں نے خود آزما کر دیکھا ہے کہ سالہ اسال کی بہار کی الرجی یعنی دن رات بکتر تے چینکیں آنالیک ہزار کی ایک ہی خوراک سے دور ہوگی اور پھر دوبارہ بھی تکلیف نہیں ہوئی ۔ غالبًا سومیں سے دس مریض ضرورا یسے ہوں گے جن کولیکیسس ایک ہزار کی ایک ہی خوراک نے اتنا نمایاں فائدہ پہنچایا لیکیسس سے ٹھیک ہونے کے بعدا گر دوبارہ الرجی ہوتو کچھ خوراک نے اتنا نمایاں فائدہ پہنچایا لیکیسس سے ٹھیک ہونے کے بعدا گر دوبارہ الرجی ہوتو بھی عرصہ کے بعد مثلاً پندرہ دن یا مہینے کے وقفہ سے لیکیسس کو دہرایا جا سکتا ہے۔ اگر لیکیسس ناکام ہوتو اس سے می الرجی میں نیڑم میوراور سباڈیلا بھی اچھا کام کرتی ہیں۔ اس لئے مریضوں کی تشخیص ہوتو اس سے ہوئی چاہئے۔

ہروہ مریض جوموسی یا جغرافیائی لحاظ سے سردی سے گرمی کی طرف حرکت کرنے سے بہار ہو جائے ، اس کی دوسری بیاریوں میں بھی کیکیسس کو یا درکھنا چاہئے۔ البتہ ڈلکا مارا ایک ایسی دواہے جس کا ہرموسم میں چھینکیں آنے سے تعلق ہے۔ برائیونیا بھی

سردی سے گرمی میں بدلتے ہوئے موسم میں بہت کارآ مدہے۔

کیکیسس میں خاص علامت بہ یائی جاتی ہے کہ سونے کے بعد تکلیف ضرور بڑھتی ہے۔ سانب کے اکثر کاٹے ہوئے مریضوں کا یہی حال ہوتا ہے مگراس خاصیت میں سانب کے سب ز ہروں میں کیکیسس نمایاں ہے۔اگر چہ بیا کثر ایسے مریضوں میں کام آتی ہے جن کی تکلیف سونے سے بڑھتی ہو لیکن اس کا ہرگزیہ مطلب نہیں کہ ان کوسانی ہی نے کا ٹاہے۔مطلب بیہ کہ بیالک ملتی جلتی علامت ہے جس میں کیکیسس کارآ مد ہوسکتی ہے۔اگر واقعتاً کیکیسس سانپ نے ہی کا ٹا ہواور مریض سوجائے تووہ اٹھتا ہی نہیں کہ بعداز ال کسی علاج کے قابل رہے۔ ہر طبیب کو پیامر پیشِ نظرر کھنا جاہے کہ اگر واقعتاً کسی سانب کے کاٹے ہوئے مریض کے علاج کے لئے اسے بلالیا جائے تو وہ ایسے مریض کو جگانے کی ہمکن کوشش کرے خواہ اسے زورز ورسے تھیٹر مارنے یڑیں۔اگراس کی آ نکھ کھل گئی اور کچھ دیراس کو جگائے رکھا گیا تو پھراس کے بچنے کا امکان پیدا ہو جائے گا۔لیکیسس کے مریض کا مرض سوتے میں رات بھر بڑھتا رہتا ہے اور بعض مریضوں کو یریشان کن خوابیں بھی آتی ہیں اور صبح اٹھنے تک بیاری میں بہت اضافہ ہو چکا ہوتا ہے۔مریض سخت یے چین ہوتا ہے۔ صبح سر میں تپکن والا درد ہوتا ہے، دل کی دھڑ کن تیز ہوتی ہے۔اس کے علاوہ مریضغم کا گہرا ازمحسوں کرتا ہے جولیکیسس کا خاص نشان ہے۔ حکسیمیم میں بھی مریض صبح سر درد کے ساتھ اٹھتا ہے لیکن اس کی رات بے چینی سے نہیں گزرتی اور نہ ہی اسے ڈرواؤنے خواب آتے ہیں۔اگراٹھنے کےاوقات میں تبدیلی ہو یا جائے اور ناشتہ کا وقت بدل جائے تو حبلسیمیم کے مریض کوعموماً سرمیں در دشروع ہوجاتا ہے۔اوقات کی تبدیلی سے پیدا ہونے والے ایسے سر در د میں جلسیمیم دواہےنہ کے لیکیسس۔

لیکیٹس کا مریض بہت ٹھنڈا ہوتا ہے خصوصاً اس کے پاؤں برف کی طرح سھنڈ سے ہوتے ہیں مگر گرم پانی سے تکلیف بڑھتی ہے خصوصاً سرکی علامتیں بہت بڑھ جاتی ہیں۔خون کا دباؤشد یدمحسوس ہوتا ہے اورلگتا ہے کہ سرپھٹ جائے گا۔لیکیٹس میں بیلا ڈونا

کی طرح خون کا دبا و ایک طرف زیادہ ہوجاتا ہے۔ بیلا ڈونا میں مختلف اعضاء میں خون کا دبا و برٹر ھ سکتا ہے ضروری نہیں کہ سرکی طرف ہی دبا و کار جحان ہو مگرلیکیسس میں دوران خون زیادہ ہونے کا خاص مقام سر ہے۔ خون کا اجتماع تیزی سے سرکی طرف ہوجاتا ہے اور یا و ک شعنڈے ہوجاتے ہیں۔ درد کے ساتھ باند ھے جانے کا احساس ہوتا ہے جیسے کسی نے سرکے اوپر کپڑا کس دیا ہو۔ لیکسسس کی علامتیں رکھنے والے بعض مریض گرم یا نی سے نہانے کے دوران بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔

س کی ایک اورنمایاں علامت بیہے کہ بدن برجامنی پاسیاہی ماکل داغ بڑجاتے ہیں جو چہرے برنمایاں دکھائی دیتے ہیں۔وہ مریض جن پر دل کاحملہ ہوا ہوان کے چہرے پر بھی ایسے ہی نشان پڑتے ہیں۔ایسے مریض جن کے جسم پریہ نشان بڑنے کا رجحان ہوان کو وقباً فو قباً کیکیسس دیتے رہنا جاہئے۔ بیخون میں Clot بننے اور نیتجاً دل کے حملے کی روک تھام کے لئے بہترین دواہے۔اس مقصد کے لئے اسے آرنیکا سے ملا کر دیا جائے تو اور بھی زیادہ کارآ مدہوتی ہے۔ کیکیسس متورم غدودوں میں بھی بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔اس کے زخموں سے آ رسنک اورسیکیل کی طرح سیاه رنگ کا خون بہتا ہے جو گھاس پھوس کے ریشوں کی طرح جم جاتا ہے اور مقدار میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کرئیوز وٹ اور فاسفورس کی طرح کیکیٹس میں بھی بہت زیادہ سیاہ خون بہنے کا رجحان ملتا ہے۔ کرئیوزوٹ کی بیرخاص علامت ہے کہ معمولی دباؤ سے خون بہنے گتا ہے۔ اچھے بھلے نظر آنے والے مسوڑ ھوں کو انگلی سے دبادیں تو خون نکل آئے گا یا کہیں کوئی معمولی سی بھی تکلیف ہوتو ذراسا دبانے سے بھی خون رسنے لگے گا۔ فاسفورس میں ہمیشہ سرخ رنگ کا خون بہتا ہے اور یکدم شدت کے ساتھ جاری ہوتا ہے۔ سیکیل کار (Secale Cor)اور کیلیسس میں خون کی رنگت سیاہی مائل ہوتی ہےاوران کے زخموں کی شکل بھی ایک جیسی ہوتی ہے۔ سیکیل کی طرح کیکیسس کے زخموں میں بھی گینگرین بننے کار جحان ہوتا ہے اور ان سے سیاہی ماکل خون رستا ہے۔ زخموں کے اردگر دیے کنارے گل کر متورم ہو جاتے

ہیں۔جلدسکڑ کرسیاہی مائل ہوجاتی ہے اوراس میں جھریاں پڑجاتی ہیں کیا۔ کیسسس کی باقی علامتیں سے بہت مختلف ہیں۔ اس میں مریض کا جہم ٹھنڈا، اور مریض شخت سردی محسوں کرتا ہے جبکہ سیکیل کا مریض شخت گری محسوں کرتا ہے گین ماؤف جگہوں کوٹھنڈی چیز لگانے سے آرام آتا ہے۔
سیکیل کا مریض شخت گری محسوں کرتا ہے گین ماؤف جگہوں کوٹھنڈی چیز لگانے سے آرام آتا ہے۔

لیسسس میں ایک علامت رگوں کے شجھے کا نیلا ہوکر پھول جانا (Varicose Veins)

ہے۔ جن میں خون جم جاتا ہے اور ابھاراور گاٹھیں بن جاتی ہیں ان کے پھٹ جانے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک اور تکلیف دہ بیاری ہے۔ عموماً بعض عورتوں میں حمل کے دوران یا بعد میں ٹائلوں اور پاؤں پر یہ بیاری حملہ کرتی ہے۔ بعض دفعہ یہ تکلیف اتی شدید ہوتی ہے کہ چلنا پھرنا دو بھر ہو جاتا ہے۔ ان پھولی ہوئی رگول کے علاج میں آکیلی سیسس ناکام رہتی ہے۔ الیصورت میں بہت میں الیک علامت بھی ہوتو اسے ہی اولیت دینی چاہئے دوا کا نقاضا کرتا ہے اورا گراس دوا میں رگیں پھولنے کی علامت بھی ہوتو اسے ہی اولیت دینی چاہئے گھرنی لیکن اگر شخیص نہ ہو سیکے تو روز مرہ کی دوا کے طور پر آریز کا اور کیسسس بار بار دینے سے پھونہ کچھ نہ پچھرنی کہونا ہے۔ کہونہ کے گھرنی کوٹا ہے کیکن سب سے اچھارو ٹین کا علاج ایسکولس ہے۔

آ تکھوں کی بواسیر جس میں آ تکھیں سرخ اور شدید متورم ہو جاتی ہیں، اس میں بھی ایسکولس بہت مفید دوا ہے۔ عام بواسیر میں بھی بہت سے مو کیے کچھوں کی صورت میں بن جاتے ہیں جو جامنی رنگ کے ہوتے ہیں اوران میں شدید در دہوتا ہے۔ ایسکولس کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ لگتا ہے ذخم جلد ہی گل سڑ جا ئیں گے لیکن کسی طرح پینے ہی میں نہیں آتے اور پیپ بن کر چھٹے نہیں۔ پھٹے بغیر لمبے عرصہ تک زخموں کا اس بین بین میں نہیں آتے اور پیپ بن کر چھٹے نہیں۔ پھٹے بغیر لمبے عرصہ تک زخموں کا اس بین بین میں شہرت حاصل ہے گیا بہت تکلیف دہ مرض ہے۔ ایسکولس کوا پسے مریضوں کی شفایا بی میں شہرت حاصل ہے لیکن بید وابھی اکیلی مکمل فائدہ نہیں دیتی بلکہ آر زیکا الیکیسس اوراسی طرح کی دوسری مددگار دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس مرض کو آغاز ہی میں پکڑنے

کے لئے ہمیشہ اپنے پاؤں کا معائنہ کرتے رہنا چاہئے۔اگر پاؤں دھوتے ہوئے مخنوں کے دونوں طرف پنچ اورایر بھی سے اوپر نیلے رنگ کے نشان طاہر ہونے لگیں توبیاس بات کا نشان ہیں کہ خون کی نیلی رگوں میں خرابی بیدا ہور ہی ہے اور وہاں خون جم سکتا ہے۔اگر وہ رگیس پھول جائیں اور شچھے سے بننے لگیں توبیہ مرض ہاتھ سے نکل بھی سکتا ہے اور ایسے مریض کی وریدوں میں اجا نک ایسا سے بننے لگیں توبیہ مرض ہاتھ سے خودل کے حملے پر منتج ہو۔اگر آغاز میں ہی پتہ چل جائے تو خدا کے فضل سے آر نیکا اور کیکیسس حفظ ما تقدم کے طور پر بہت اچھا کام کرتی ہیں۔

شنگلز (Shingles) کی بیاری میں جیسا کہ بعض دوسر ہے ابواب میں بھی تفصیلی ذکر گزر چکاہے آرنیکا،لیڈم یال کیکیسس اور نیٹرم میورمفید ثابت ہوتی ہیں۔

لیکیسس میں ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوجاتے ہیں اور دل کمزور ہوجاتا ہے، سرمیں تیکن ہوتی ہے اور رکیس پھڑکتی ہیں۔ اگر سرمیں درد ہوتو بعض اوقات مریض تکیہ پر سرر کھ کرسوبھی نہیں سکتا۔ جس طرف بھی سرر کھے گا وہاں دھڑکن محسوس ہوگی کیونکہ خون کار جان سر کی طرف ہوتا ہے۔
لیکیسس انسانی جذبات پر بھی اثر انداز ہونے والی دوا ہے۔ اگراچا نگ غم کی کوئی خبر ملے یا مریض کسی وجہ سے جذباتی ہوجائے تو دل کی رفتار ہلکی ہوجاتی ہے، جسم پر پیدند آجا تا ہے، سرگرم یا موبائ سے نہوجائے ہیں۔ اگر پاول ٹھنڈے ہول اور کیکسس کی معمول کی علامتیں بھی یا کی جا کیس تو اس کی ایک خوراک ہی جادوکا سااثر دکھاتی ہے۔ سردی سے بخت کا نیتا ہوا مریض جو یہ بہتہ لیا ہوا ہوا وراس کے پاؤں نا قابل برداشت حد تک ٹھنڈے ہول، دوا دینے کے چندمنٹ بعد ہی یوں محسوس کرتا ہے کہ میکدم گرمی کی لہریں جسم میں اوپر سے نیچے کی طرف سرایت کر چندمنٹ بعد ہی یوں محسوس کرتا ہے کہ میکدم گرمی کی لہریں جسم میں اوپر سے نیچے کی طرف سرایت کر اور پاؤں د کھتے ہی د کھتے گرم ہوجاتے ہیں۔ سورائینم میں بھی بیٹو بی پائی جاتی جاتی فرق سے کہ سورائینم کے مریض کا سارا جسم ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ سورائینم کے مریض گرمیوں کے مریض گرمیوں

میں بھی اپنے آپ کوڈھانپ کرر کھتے ہیں۔ان کی جلد سیاہی مائل ہوجاتی ہے،اخراجات میں بد بو یائی جاتی ہے لیکن کیکیسس میں بیعلامتین نہیں ہوتیں اس میں کسی بوجھ،اچا نک پریشانی یاویسے،ی مجھی بھی مریض میں کمزوری سے اس کا بدن یک دم ٹھنڈا ہوجا تا ہے کیکن سرگرم ہی رہتا ہے۔اس وقت کیکیسس کام آتی ہے۔

لیکیسس میں بیماری کا حملہ عموماً بائیں طرف ہوتا ہے لیکن بیماری یہاں طہرتی نہیں بلکہ کچھ عرصہ زور دکھا کر دائیں طرف منتقل ہوجاتی ہے۔ یہ بہت واضح علامت ہے۔ اگراس کے ساتھ سونے سے تکایف میں اضافہ بھی ہوجائے توبلا جھجک کیکیسس استعال کروانی جا ہے۔

عورتوں کے بیضۃ الرحم (Ovaries) کی تکلیفوں میں بھی لیکیسس بہت مفید دوا ہے۔ اگر بائیں طرف مختیط الرحم میں تکلیف کا آغاز ہواوردائیں طرف منتقل ہوجائے تواس میں لیکیسس بہت اچھی ثابت ہوگی۔ اگر دائیں بیضۃ الرحم میں تکلیف ہوتو لائیکو پوڈیم اور ٹیم ٹولا میں لیکیسس بہت اچھی ثابت ہوگی۔ اگر دائیں بیضۃ الرحم میں تکلیف ہوتو لائیکو پوڈیم اور ٹیم ٹیم میں گلے کی تکلیف بائیں طرف سے شروع ہوکر دائیں طرف منتقل ہو جاتی ہے جبکہ لائیکو پوڈیم میں دائیں سے بائیں طرف بھاری حرکت کرتی ہے۔ پلسٹیلا میں درد کی اہریں ادھر سے ادھر حرکت کرتی ہیں جبکہ امراض کی دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں حرکت لیک کنائینم میں بہت نمایاں ہے۔

لیلیسس میں سردرد بھی ہمیشہ بائیں طرف سے شروع ہوتا ہےاور گدی تک پھیل جاتا ہے کنیٹی پر بہت دباؤ ہوتا ہے اور جبڑا بھی متاثر ہوتا ہے۔ حکسیمیم بھی اس قتم کے سر درد کے حملوں میں بہت مفید ہے لیکن اس میں در دسر کے بیچھے کندھوں میں اثر تا ہے اور پیٹھ کے عضلات تک پھیل جاتا ہے۔ صرف گدی کے ایک طرف ہی محدود نہیں رہتا۔

لیکیسس میں ایک خاص علامت میہ ہے کہ اس کی تکلیفیں اوپر کے دھڑ سے نچلے دھڑ میں منتقل ہوں تو سمت تبدیل کر لیتی ہیں۔ مثلاً اگر بائیں طرف دل کے پاس در دہو اور د باؤمحسوس ہوتو یہ تکلیف دائیں طرف کو لہے میں یا بن ران میں منتقل ہوسکتی ہے اور بعض دفعہ بیک وقت دونوں سمتوں کو ماؤف کر دیتی ہے۔ بسااوقات سرسے لے کر پاؤں

تک بیاری بائیں طرف ہی رہتی ہے،خصوصاً فالح میں ایسے ہوتا ہے کیکن دردوں کے احساس اور عضلات کے تناؤ میں اوپر کے بائیں طرف کے دھڑ میں عضلات کے تناؤ میں اوپر کے بائیں طرف کے دھڑ میں علامتوں کا موجود ہونالیکیسس کا خاص نشان ہے۔

لیکیسس کی منہ کی علامتوں میں زبان کا سوج کرموٹا ہونا اور ہونٹوں کا بے س ہونا شامل ہے۔ اس صورت میں لفظوں کی ادائیگی مشکل ہوجاتی ہے۔ اگر اس قسم کی علامات کسی مریض میں ظاہر ہوں، سرگرم رہتا ہواور جسم پر جامنی رنگ کے داغ بھی پڑجاتے ہوں تولیکیسس ہی دوا ہے۔ دراصل زبان کا موٹا ہونا اور ہونٹوں کی بے سی منہ اور گلے کے اندر فالجی علامتیں پیدا ہونے کا آغاز ہے۔ اگر اسے بروقت قابونہ کیا جائے تو زبان اور گلے پر فالج گرسکتا ہے۔ اس لئے ایسے مریض کوفوری طور رکیکیسس دینی جائے۔

لکیسس کی ایک اور علامت جونمایاں طور پر ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ گلے میں جکڑ ن کا حساس ہوتا ہے اور کالر برداشت نہیں ہوتا ہے اور لو پی تک برداشت نہیں ہوتا ہے اور لو پی تک برداشت نہیں ہوتی ۔ اگر گلونائن کے مریض کے سرمیں بھی جکڑن کا احساس ہوتا ہے اور لو پی تک برداشت نہیں ہوتی ۔ اگر گلونائن کے مریض کے سرمیں بھی جکڑن کا احساس زیادہ شخت ہوتو غالبًا یہ ہائیڈرونو پینم کا تقاضا کرتا ہے ۔ لیکیسس میں گلے کے اندر تکی اور جکڑن کا احساس ہوتا ہے لیکن مریض یہ فرق نہیں کرسکتا کہ تکلیف گلے کے اندر کی طرف ہے بایا ہر کی طرف ہے بایا ہر کی طرف ہے بایئڈرونو پینم اور ہائیوس میں گلے کی نالی کے اندر کی تالی میں شنج نہیں ہوتا بلکہ گلے کے گردکوئی بھی چیز برداشت نہیں ہوتی ۔ میں گلے کے اندر کی نالی میں شنج نہیں ہوتا ہے لیکن کی میں گلے کے اندر کی نالی میں شنج نہیں ہوتا ہے لیکن کی میں گلے کے اندر کی نالی میں شنج نہیں ہوتا ہے کہا کے گردکوئی بھی چیز برداشت نہیں ہوتی ۔

لیکیسس کے مریض خطرنا ک قتم کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔
شروع شروع میں وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ سب لوگ ان کے خلاف با تیں کررہے ہیں یا
ان کے کھانے پینے میں کچھ ملا دیا گیا ہے۔ وہ اپنے قریبی عزیز وں پر بھی شک کرتے
ہیں۔ بعد میں بیعلامتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ایسے مریضوں کولیسس دینا ضروری ہے۔
میرا تجربہ ہے کہ گوشروع شروع میں کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے لیکن بعد میں بیاس مرض میں

مزید کام نہیں کرتی اور پھر دوسری دوائیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں۔نفسیاتی علاج کی خاطران شکوک وشبہات کو پیدا کرنے کی موجب وجوہات ڈھونڈنی پڑتی ہیں۔اس مرض میں لیکیسس سے مکمل فائدہ اسی وقت ہوگا جب لیکیسس کی دوسری بنیا دی علامتیں بھی اس مریض میں ملتی ہوں۔

یلیسس کے مریضوں کو بیخطرہ رہتا ہے کہان کامنتقبل ہمیشہ کے لئے تاریک ہو گیا ہے باان سے کوئی ایسا گناہ سرز دہو گیا ہے جونا قابل معافی ہے یاان کا وجو دکسی اور بالاطافت کے قبضہ میں آ گیا ہے اور وہ اس کے ہاتھوں میں آلہ کاربن چکے ہیں۔الیی ہی ایک مریض بچی میرے یاس لائی گئی جو چوری کی عادت میں مبتلاتھی ، یو چھنے پر کہتی تھی کہ اللّٰد کا حکم ہوتا ہے اس لئے کرتی ہوں ۔ایسے مریضوں کا علاج لیکیٹس سے کرنا جا ہے ۔ جو خدا کے حکم پراسی کی نا فر مانی کریں وہ سانپ کے حکم پراس کی فر ما نبر داری شروع کر دیتے ہیں لیلیسس کی مریضائیں ایسے شکوک میں مبتلاً ہو جاتی ہیں کہان کے پیچھے کوئی آ رہاہے۔ مذہبی رجحانات غیر معمولی شدت اختیار کر لیتے ہیں۔ بیشدت کیکیسس سے تعلق رکھتی ہے مگراس کی سب سے خطرنا ک علامت پیہ ہے کہان کے دل میں بعض دفعہ یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ کسی کوفتل کر دیں اور یہ یقین جا گزیں ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا م پر ما مور کر دیا ہے ۔ایسے مریض بعض دفعہ وا قعتاً قتل کر بھی دیتے ہیں یاقتل کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔اگریہ مذہبی جنونی ہوں تو بے حد با تو نی بھی ہو جاتے ہیں۔ان کے ہر کام میں افراتفری اور بےصبری ظاہر ہوتی ہے۔ بات چیت بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتے۔ آ دھی بات کر کے درمیان میں کوئی دوسری بات شروع کر دیتے ہیں۔ جملہ کمل نہیں کریاتے۔خود حیا ہیں جتنا مرضی شور ڈالیں ان کے لئے بیرونی شورنا قابل برداشت ہوتا ہے اوران کے اعصاب بھنا اٹھتے ہیں۔ان میں خودکشی کار جحان بھی یا یا جاتا ہے لیکن بیر جحان صرف ان کی سوچ تک محدودر ہتا ہے جملی قدم اٹھانے سے ڈرتے ہیں۔اونچی جگہ سے چھلانگ لگانے کودل جا ہتا ہے کین ساتھ ہی الیی جگہوں سے خوفز د ہ بھی ہوتے ہیں۔ مریض نیچے کھڑا ہواوراونچی جگہ کے تصور سے خوف آئے تو آرسنک یا ارجنٹم نائٹر کیم مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر ایسے نفسیاتی اور دماغی امراض میں کیکیسس بہت اچھا کام کرتی ہے۔اسے کم از کم 200 کی طاقت میں دینا چاہئے۔تاہم میرا تجربہ ہے کہ 1000 طاقت میں زیادہ بہتر نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ میں نے کئی بارلا کھ طاقت میں بھی استعال کی ہے اور وہ واقعتاً مفید ثابت ہوئی ہے۔

سردیوں کے موسم میں گلے کی خرابی کیکیسس کی خاص علامت ہے۔ سورائینم میں بھی سردیوں کے موسم میں داخل ہوتے ہوتے بہت نزلہ ہو جاتا ہے۔ سورائینم گلے کے لئے بھی اچھی دوا ہے لیکن اس میں نزلہ خصوصیت سے نمایاں ہے اور ایک خاص نشان بہ ہے کہ جب بھی نزلہ بند ہوگا سرمیں در دشروع ہوجاتا ہے۔ لینی سر در داور نزلہ آپس میں ادلتے بدلتے رہتے ہیں لیکن کیکیسس میں ایسانہیں ہوتا۔

لیکیسس کی ایک اور نمایاں علامت جلد کی زودسی ہے۔ یہ زودسی بھی اتن بڑھی جاتی ہے کہ مریض جسم پر ہلکا سا کپڑا بھی برداشت نہیں کرسکتا۔ کسی خاص حصہ پر تکلیف اور وہاں لمس کے احساس سے شدید بے چینی اور درد کا بڑھ جانالیکیسس کی خاص علامت ہے۔ کالی کارب میں بھی یہ علامت یائی جاتی ہے۔ مضبوط دباؤ آ رام دیتا ہے لیکن ہلکی لمس تکلیف دہ ہوتی ہے۔ لمس سے تکلیف کا نمایاں احساس لیک کنائینم میں بھی لیکن ہلکی لمس تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اگر انگلیوں میں معمولی سی بھی تکلیف ہوتو مریض انگلیاں بہت شدت سے پایا جاتا ہے۔ اگر انگلیوں بین معمولی سی بھی تکلیف ہوتو مریض انگلیاں بغلی ہیں۔ اگر بغلی کے نیچے زود حسی ہوتو مریض بروقت بغلی کھی رکھے گا۔

لیکیسس کا برقان سے بھی گہراتعلق ہے۔ میں نے برقان کے لئے ایک عمومی نسخہ بنایا ہوا ہے جس میں سلفر، برائیونیا اور کارڈس میر یانس (Cardus Merianus) شامل بیں۔ یہ نسخہ خدا کے فضل سے برقان کے مریضوں میں بہت کا میاب ہے۔ اگر فائدہ نہ ہوتو دوسری دوائیں ڈھونڈنی بڑتی ہیں۔ مثلاً چیلی ڈونیم، لیکیسس، بربرس اور لائیکو پوڈیم وغیرہ۔ یہ سب جگرکی تکلیفوں میں بہت مفید دوائیں ہیں۔ فاسفورس کا بھی جگر سے تعلق ہے اور عموماً جگرکے کینسر میں مفید ثابت ہوتی ہے لیکن اسے بہت احتیاط سے استعال کرنا

چاہئے کیونکہ اونجی طاقت میں بار بار اور غیر ضروری طور پر دینے سے خطرناک نتائج پیدا ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات برقان مزمن شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ایسی صورت میں لیکیسس بہت کام آنے والی دوا ہے۔ لیکیسس کی ایک علامت یہ ہے کہ برقان ہوجائے تواس کے ساتھ متلی بھی ہوتی ہے۔ چیلی ڈونیم میں بھی برقان اور متلی کی علامات اکھی ملتی ہیں۔ اسی طرح اپی کاک بھی مفید ہے لیکن میریقان کے لئے اتنی طاقتور دوانہیں ہے۔ ہیں۔ اسی طرح اپی کاک بھی مفید ہے لیکن میریقان کے لئے اتنی طاقتور دوانہیں ہے۔ ہاں بعض صورتوں میں معمولی فائدہ دیتی ہے۔ اگر برقان کے ساتھ لیکیسس کی عمومی علامتیں بھی پائی جائیں اور متلی بھی ہوتو یہ بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ساتھ پیتہ کی بیتری میں بھی اگرلیسس کی دیگر علامات موجود ہوں تو فائدہ مند ثابت ہوگی۔ پیتہ کی بیتری میں بھی اگرلیسس کی دیگر علامات موجود ہوں تو فائدہ مند ثابت ہوگی۔

علی میں ہلکی سی دکھن کا احساس ہواور جب اسے ہاتھ سے دبایا جائے تو آکھوں میں شدید درد شروع ہوجا تا ہے۔اسی طرح کان میں کوئی آلہ ڈال کر معائنہ کیا جائے تو سخت کھانسی شروع ہوجا تی ہے۔کان، گلے اور آئکھ کی نالیوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ان تیوں اعضاء میں کسی ایک جگہ تکلیف ظاہر ہواور اسے چھٹرا جائے تو دوسری جگہ بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ لیکسس کی خاص علامت ہے۔اس کے استعال سے تیوں اعضاء کی تکلیفیں خدا کے فضل سے دور ہوجاتی ہیں۔

بعض اوقات آئھوں کے وہ غدود جوآنسو بناتے ہیں ان میں زخم بن جاتے ہیں جو بہت نکلیف دہ ہوتے ہیں لیکیسس کی جو بہت نکلیف دہ ہوتے ہیں لیکیسس ان زخموں میں بھی بہت مفید ہے۔ یہاں لیکیسس کی خاص پہچان یہ ہے کہ چہرے پر ایگزیما، ابھار اور چھالے وغیرہ بننے لگتے ہیں۔ غالبًا چہرے کی یہی نکھوں کے زخموں سے چہرے کی یہی نکھوں کے زخموں سے لیکیسس کی پہچان نہیں کی جاسکتی۔اگر چہرے کی علامتیں نمایاں ہوں تو اس صورت میں آئکھ کے نخم کے لئے بہترین دوا ہے۔ مثلًا آئکھ کے تسچو لا (Fistula) میں کالی بائیکر وم کی طرح کیکیسس بھی چوٹی کی دوا ہے۔

کیلیسس میں نزلہ زکام کے دوران ناک سے خون بھی بہتا ہے۔ اس قتم کی باریک علامتوں پرغور کرنے سے دواؤں میں باہم تمیز کی جاسکتی ہے۔سورائینم اور کیکیسس میں ایک قدرمشترک ہے کہ دونوں میں ناک سے شدید بدیودارنز لے کا مواد خارج ہوتا ہے۔ بیز لہ ہر کے ایکزیما میں بھی تبدیل ہوجاتا ہے جس میں سر پرایک سخت خول سا
بن جاتا ہے جس کے اندر جراثیم پلتے ہیں۔ اگر بیخول پھٹ جائے تو اس سے نہایت
بد بودار مواد خارج ہوتا ہے اس ایگزیما کومقا می طور پر علاج سے دبا دیا جائے تو ناک میں
انتہائی خطرناک نزلہ شروع ہوجاتا ہے جوٹھیک نہیں ہوتا۔ اس بماری میں لیکیسس اور
سورائیم دونوں سے بہت بہتر دوا میز پریم (Mezereum) ہے۔ ایک دفعہ میرے
پاس ایک بچرلایا گیا جے شدید ضدی قسم کا نزلہ تھا، کسی علاج سے آرام نہیں آتا تھا، ناک
سے شدید بو آتی تھی جو سارے کمرے میں پھیل جاتی تھی۔ خوش قسمتی سے میں نے ان
دنوں میز برم کے بارے میں نیانیا پڑھا تھا۔ میں نے اسے میز برم دی تو فوراً نزلہ ٹھیک ہو
گیا۔لیکن سر پر شدید ایگزیما ظاہر ہوگیا۔ چند دنوں میں اللہ کے فضل سے میز بریم ہوگیا۔

لیکیسس اورسورائیم دونوں اینٹی سورک (Anti Psoric) ہیں۔ جلد پر بعض دفعہ خون کے کیچے جھالے ابھر آتے ہیں۔ لیکیسس ان خون کے جھالوں کی چوٹی کی دوا ہے۔ عام طور پرلیکیسس میں آر نیکا کی طرح سیاہی مائل خون بہتا ہے لیکن چہرے پر سرخ رنگ کے خون کے چھالے بنتے ہیں جن کالیکیسس سے ہی تعلق ہے۔ اس میں مسوڑھوں سے بھی خون بہتا ہے ، زبان بالکل خشک ہوکر چڑے کی طرح ہوجاتی ہے، منہ بھی بالکل خشک ہوتا ہے لیکن پیاس نہیں ہوتی۔ منہ اور زبان کا خشک ہونا جلسیمیم کی منہ بھی یا ددلاتا ہے لیکن لیکسس اپنی دوسری علامتوں کی وجہ سے ممتاز ہوجاتی ہے۔ لیکیسس میں تھوک صابن کی جھاگ کی طرح ہوجاتا ہے، مزے کے لحاظ سے نہیں بلکہ شکل سے بین لگت ہوتا ہوجاتا ہے، مزے کے لحاظ سے نہیں بلکہ شکل سے بین لگتہ شکل سے کی رطوبت خارج ہوتی ہے۔ کالی بائیکر وم (Kali Bichrome) میں یہ علامت سب کی رطوبت خارج ہوتی ہے۔ کالی بائیکر وم (Kali Bichrome) میں یہ علامت سب

" کیکیٹس میں مائع چیز گلے میں سیننے کا رجحان بھی پایا جاتا ہے،خصوصاً گرم مشروب سے تکلیف ہوتی ہے۔سانپ کے تقریباً سب زہروں کے نتیجہ میں شنج پیدا ہوتا ہے اور خوراک اور پانی گلے میں پھنتا ہے۔ لیکیسس میں گرم مشروب سے اس کیفیت میں مزیداضا فہ ہوجا تا ہے جبکہ ٹھنڈے پانی سے قدرے افاقہ ہوتا ہے۔ یہ علامت لیکیسس کے عمومی مزاج سے برعکس ہے کیونکہ اس میں مریض کا جسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور وہ گرمی کو پیند کرتا ہے لیکن گلے کے تشنج میں لیکیسس کا مریض بیلا ڈونا کے مریض سے مشابہ ہوجا تا ہے۔ بیلا ڈونا میں گرمی گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے اور سردی سے ان میں کمی آ جاتی ہے۔ امیس کی تکلیفیں بھی گرمی سے بڑھتی ہے اور سردی سے آ رام آتا ہے۔ لیکیسس میں ٹھنڈے مشروب سے آ رام آتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے مگر ماتھ ہی ایس سے مثلی شروع ہوجاتی ہے۔ لیکیسس کی واضح بہوان ہے۔ لیکیسس کی واضح بہوان ہے۔ لیکیسس کی واضح بہوان ہے۔

لیکیسس سے ملتی جلتی خشک کھانسی کو بیلا ڈونا سے بھی آرام آ جاتا ہے۔اگر لیکیسس کے غلط استعال سے کھانسی ہو جائے یا کسی کولیکیسس نا می سانپ کاٹ لے اور وہ نج جائے اور اسے مسلسل خشک کھانسی ہو جائے تو اس میں بیلا ڈونا بہت مفید ہے۔ اگر چہ بیلا ڈونا مزمن دوانہیں ہے بلکہ درمیانے درجہ کی دوا کہلا تی ہے۔لیکن پیلیسس کے بدا ثرات کو جو کھانسی میں تبدیل ہو جائیں ، دور کر دیتی ہے۔اسی طرح کیکیسس بھی بیلا ڈونا کے بدا ثرات کوزائل کرسکتی ہے۔

لیکیسس پیٹ کی ہوا کے لئے بھی مفید ہے۔ اس کے مریض کا پیٹ ہواسے تن جاتا ہے۔ اگر یہ معلوم کر لیا جائے کہ مریض کا مزاج کس دوا کا مطالبہ کرتا ہے توضیح معنوں میں اس کی مرض پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ سر دموسم میں مریض بہت ٹھنڈا ہواور پیٹ میں ہوا بھی ہوجائے تو سورائینم مفید ہے۔ رکی ہوئی ہوائیں جاری ہو جاتی ہیں لیکن ان میں سخت بد بو ہوتی ہے۔ لیکن ہوا خارج ہونے سے پیٹ کا تناؤ کم ہوجاتا ہے لیکن ہوا میں بد بونہیں ہوتی۔

مددگاردوائیں: لائیکو پوڈیم۔ ہیپر سلف۔ نائیٹرک ایسڈ دافع اثر دوائیں: آرسنک۔ مرکری طاقت: 30سے 1000 تک

132

ليكظك البييثر

LACTICUM ACIDUM

لیک ایسڈ ذیابطس کی بہت عدہ دوا ہے لیکن اس کا استعمال بہت کم ہوا ہے۔اگر دوسری دواؤں کے علاوہ لیک ایسڈ دوسوطافت میں دی جائے تو وہ مریض جو دوسری دواؤں کا اثر قبول نہیں کرتے اس کی وجہ سے وہ دوائیں بھی کام کرنے گئی ہیں۔

لیکک ایسڈ صبح کی متلی میں بہت مفید ہے خواہ یہ تلی مویا ذیا بیطس کی وجہ سے۔
لیکک ایسڈ میں متلی کو پچھ کھا لینے سے آ رام ملتا ہے۔ کھانے کی نالی میں پنچ کی طرف تنگی کا احساس ہوتا ہے جیسے کوئی گولہ پھنسا ہو جسے مریض ہر وقت نگلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسی عور تیں جنہیں خوان کی کمی کی شکایت ہواوران کا چہرہ زر در ہتا ہوان کے لئے بھی بید وامفید ہے۔ سینے کی تکلیفوں میں بھی اچھا اثر رکھتی ہے۔

اگر بغلوں کے غدود بڑھ جائیں تواس بیاری میں بھی لیکٹ ایسٹر مفید ہوسکتی ہے۔ سلیشیا بھی بہت اچھااٹر دکھاتی ہے۔اونچی طاقت میں سلیشیا دینے سے تھلی اندر ہی اندرگل جاتی ہے لیکن اگر تھلی کپنے کے قریب ہوتو پھراونچی طاقت کی بجائے چھوٹی طاقت میں سلیشیا یا ہمیر سلف دین جاہئے۔

کیٹک ایسڈ کے بعض مریضوں کا ساراجسم کا نیتا ہے۔ پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے اور پیشاب مقدار میں بہت زیادہ آتا ہے۔ جوڑوں، کندھوں، کلا ئیوں اور گھٹنوں میں در دہوتا ہے۔ سخت کمزوری اور سردی کا احساس ہوتا ہے۔ زبان بالکل خشک، بیاس کی شدت اور بھوک کی زیادتی ہوتی ہے۔ رالیں بہت زیادہ بہتی ہیں۔ گلابالکل خشک رہتا ہے اور پانی پینے سے بھی ہے ختم نہیں ہوتی۔

دافع الرْ دوا: برائيونيا طاقت: 30

ليك ايستر 554

133

لاروسيراسس

LAUROCERASUS

(Cherry-Laurel)

یہ دوا دل کی بیار یوں میں بہت کام آتی ہے۔ اجا نک خوف اور دہشت کی وجہ سے یا گہرے غم کے نتیجہ میں جسم کانینے لگ جائے تولاروسیراسس فوری فائدہ دیتی ہے۔اس کا مریض خواب میں ڈرکر پاکسی اجنبی کوا جانک سامنے دیکھ کرخوف سے کا نینے لگتا ہے۔ جب بھی کوئی بیجانی کیفیت ہوتو خوف غالب آ جا تا ہے۔جسم ٹھنڈااور نیلا ہوجا تا ہے۔بعض دفعہ ایسے مخص کو مرگی کے دور ہے بھی پڑنے لگتے ہیں نظر دھندلا جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے مریض کادل کمزور ہوگا اور دل کے مریضوں کے لئے واقعی بیایک مقوی دواہے۔نسبتاً بوڑھے مریضوں میں بیددوا بہت مفیدہے۔ایسے مریضوں کے دل کے نیلے حصہ کے عضلات کمزور بڑ جاتے ہیں اور دل کی کمزوری کے باعث چھپیرو وں بر دباؤیرٹا تا ہے اور یانی جمع ہونے لگتا ہے جس سے مریض کے لئے سانس لینا بھی مشکل ہوجاتا ہے۔ڈاکٹرعموماًدل کے ایسے مریضوں کودمہ کی تیز دوائیں اور Inhaler دے دیتے ہیں یعنی وہ آلہ جس کے ساتھ مندلگا کر سانس کھینچنے سے قتی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں تشنج کوزبردسی ختم کرنے کی دوائیں ہوتی ہیں جو چھیچروے کی نالیوں کو کھول دیتی ہیں۔لیکن لمبے استعمال سے آخر بیز ہریلی دوائیں کام کرنا حچوڑ دیتی ہیںاور شنج کے وقت مریض جتنا جاہے اس آلہ کے ساتھ منہ لگا کر سانس کھنچے تشنج نہیں ہٹااورمریض اسی حالت میں مرجا تا ہے۔لاروسیر اسس Inhaler سے بیجانے میں اہم کر دارا دا کرتی ہے۔ سانس لینے میں دشواری ، دم گھٹنا ، سینے کا تنگ ہونا ،ایک دم گھٹن کا احساس جیسے دل کو کچھ ہو گیا ہے،ان سب کا بیمو تر علاج ہے۔دل کے والوز (Valves) کوطافت بخشی ہے اور دل

کے خون کے پنچار نے کی سرسراہٹ کے احساس کے لئے بھی بیدوا بہت مفید ہے۔ دل کے عضلات کو تقویت دے کروہ کمزوری جس کے نتیجہ میں خون واپس چیپچرٹوں میں چلا جاتا ہے اسے دور کر دیتی ہے۔ دل کی کمزوری کی وجہ سے بیدا ہونے والی کھانسی جو بار بارا تھے، اس میں بہت فائدہ دیتی ہے۔ سپونجیا بھی ایسے مریضوں کی اہم دوا ہے۔ اس میں مریض کے جہرے پر نیلا ہٹ آ جاتی ہے جس کا مطلب ہے کہ سانس کی کمی کی وجہ سے خون میں آئسیجن کی آمیزش کم ہوگئ ہے لیکن سب مریضوں کے چہرے پر نیلا ہٹ نہیں آتی بلکہ بعض چہرے زرد پرٹ جاتے ہیں،ان کے لئے اس بیاری کی الگ دوائیں ہیں۔ نیلا ہٹ بیدا کرنے والی دل کی بیاری رفع کرنے کے لئے ہومیودوا لارواسیراسس شہرت رکھتی ہے۔

لاروسیراسس میں سینے کی فالجی علامات پائی جاتی ہیں۔ بعض دفعہ ڈایافرام (Diaphragm) کام کرنا چھوڑ دیتا ہے،جس کے نتیجہ میں سانس باہر نکالنامشکل ہوتا ہے جبکہ اندر کھینچنا اتنامشکل نہیں ہوتا۔ یہ بیاری لاروسیراسس کی یا د دلاتی ہے کیونکہ اس کا اردگر د کے عضلات کے فالج سے کچھالیہا ہی تعلق ہے کہ سانس اندر کھینچنا مشکل نہیں ہوتا، باہر نکالنا دو کھر ہوتا ہے۔

لاروسیراسس کے مریض کو سردی بہت گئی ہے، بیرونی ذریعہ سے گرمی پہنچانے سے بھی سردی کا احساس کم نہیں ہوتا۔ بعض اوقات معدے میں شد بدورد اٹھتا ہے جس کی وجہ سے مریض بات بھی نہیں کرسکتا۔ چہرے کے عضلات میں تشنجی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے، سخت پیاس گئی ہے اور منہ بالکل خشک ہوجاتا ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں پر چھوٹے چھوٹے ابھار بن جاتے ہیں۔ کولہوں اور ایڑیوں میں موج آنے کی طرح کا در دہوتا ہے۔ انگلیاں بدشکل ہو جاتی ہیں اور ہاتھوں کی رگیں پھول جاتی ہیں۔

لاروسیراسس میں غنودگی اور چکر پائے جاتے ہیں۔بعض دفعہ غثی طاری ہو جاتی ہیں۔بعض دفعہ غثی طاری ہو جاتی ہے۔ د ماغی کمزوری کی وجہ سے یا دواشت ختم ہوجاتی ہے۔خیالات میں کیسوئی نہیں رہتی۔ سرمیں شدید درد کے ساتھ ببیثانی میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔شدید بیاس

لگتی ہے، بھوک ختم ہوجاتی ہے۔ معدے میں سکڑن اور شدید درد، اسہال سبزی مائل اور پانی کی طرح پتلے ہوتے ہیں جن کے ساتھ پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے۔
لاروسیر اسس کی تکلیفیں بیٹھنے سے کم ہوجاتی ہے۔ لیٹنے سے کھانسی شروع ہوجاتی ہے۔ معدے سے کمرتک گولہ سا اتر نے کا احساس ہوتا ہے۔ جھکنے سے اور حرکت سے بھی ہرتکلیف بڑھ جاتی ہے۔

طاقت: 30

ليرم 559

134

ليرم

LEDUM

(Marsh Tea)

لیڈم ایک یودے سے تیار کی جانے والی دواہے جس میں ایک خاص قتم کی تیز ہویا ئی جاتی ہے۔روایتی طب میں اس بودے کے عرق کوسر درد، دل کے دوروں اور بلغم کے اخراج کے لئے استعال کیا جاتا رہاہے۔ ہومیو پیتھی میں اس سے تیار کی جانے والی دوا کیڑوں مکوڑوں کے ڈنک لگنے کی صورت میں یا جوڑوں کی تکلیفوں میں بہت فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ لیڈم کا زہر کئی پہلوؤں ہے سانپ کے زہر سے مشابہ ہوتا ہے۔لیکیسس کی طرح اس کی بیاریاں بائیں طرف سے شروع ہونے کا زیادہ رجحان رکھتی ہیں۔ تکلیفیں اوپر کے دھڑ کی نسبت نیلے دھڑ میں زیادہ شدت سے اپنااثر دکھاتی ہیں۔ تکلیف اکثریاؤں یا ٹائکوں کے نیلے حصہ سے شروع ہوتی ہے اور نیچے سے اوپر کی طرف پھیلنا شروع ہوجاتی ہے۔ آ رنیکا کی طرح لیڈم کا بھی چوٹول سے گہراتعلق ہے اوربعض اعضا کی چوٹوں میں اسے آر زیکا اور ہائی پیر کیم (Hypericum) وغیرہ سے ملا کر دیا جائے تو بہت مفید ٹا بت ہوتی ہے۔ وہ چوٹیں جو گہراا ثر حچوڑ جائیں یا ایسے زخم جونو کدار چیز مثلاً کیل یا کا نٹا وغیرہ چھنے سے پیدا ہوں ،ان میں لیڈم بطور خاص مفید ہے۔بعض دفعہ اس کے زخموں میں بظاہر مندمل ہو جانے کے بعد سالہا سال تک در د کی لہریں بجلی کے کوندوں کی طرح اٹھتی رہتی ہیں۔ایسی صورت میں اگر تشنج ہو جائے تو لیڈم اس کا بہترین علاج ثابت ہوسکتی ہے۔ گھوڑے کی لید تشنج پیدا کرنے میں مشہور ہے لیکن اگر گھوڑا خود کسی کیل وغیرہ

پرپاؤں رکھ دے اور اس کے سم میں گہرا زخم بن جائے جو ہڈی کے کنارے تک جا پنچ تو اس کا تشخ اور ٹیٹنس لیڈم 200 دینے سے آنا فانا ٹھیک ہوسکتا ہے۔ لیڈم میں شخ رو کنے کار بھان عموم الیسے شخ میں ملتا ہے جونو کیلی چیزیں چھنے کے نتیجہ میں پیدا ہوخواہ وہ سالوں بعد ہی کیوں نہ ہو۔ ہڈیوں کے گرد کوئی نو کدار چیز گئے سے اگر ہڈیوں کا انیمل زخمی ہوجائے تو اس میں لیڈم بہت مفید ہے۔ اس تکلیف میں ہائی پیر کیم ہڈی کے گرد لیٹی ہوئی نسوں کو نقصان چہنچنے کی صورت میں مفید ہے۔ اس تکلیف میں ہائی پیر کیم ہڈی کے گرد لیٹی ہوئی نسوں کو نقصان چہنچنے کی صورت میں ہوجائے لیکن درد باقی رہے تو اس کے خلاف بھی ہائی پیر کیم مفید ہے جبکہ لیڈم نشر کے زخموں کے ہوجائے لیکن درد باقی رہے تو اس کے خلاف بھی ہائی پیر کیم مفید ہے جبکہ لیڈم نشر کے زخموں کے لیے زیادہ فائدہ مندنہیں ہے۔ ایرٹ کی میں موج آ جائے تو آ ر نیکا اور نیک کام نہیں کرتی ۔ ان میں روٹا اور بیلس زیادہ اچھا اثر دکھاتی ہیں۔ ہار بار موج آ نے کی وجہ سے گخنہ متورم ہو جائے اور مسلسل اس میں تکلیف رہے تو ایکوئی زیٹم (Equisetum) بہت مفید ہے۔ لیڈم بھی خفنے کی اس تکلیف میں بہت کارآ مد ثابت ہوتی ہے لیکن اس کی سوزش کا عموماً جوڑوں کے درد عن ایک تھوں کے چوٹوں کے بدائر ات کے لئے روٹا، بیلس اورا یکوئی زیٹم مفید دوائیں ہیں۔

بعض ادویات کا ذکر کتب میں نہیں ملتالیکن تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مفید ہیں۔
اسے Clinical Evidence کہا جاتا ہے لینی بار ہا تجربہ کے نتیجہ میں کسی دواکی افادیت ثابت ہو۔ ہومیو پیشی کے فروغ میں پرودنگ کے علاوہ Clinical Evidence نے بہت ثابت ہو۔ ہومیو پیشی کے فروغ میں پرودنگ کے علاوہ Proving) لینی طریقہ آزمائش کے ذریعہ دواؤں کا حال معلوم کیا جاتا تھا۔ یہی بہترین طریق ہے لیکن اب اس طریقہ آزمائش کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنے والے لوگ بہت کم ملتے ہیں جو خالی الذہن ہوکر اور ہر شم کے تعصّبات سے پاک ہوکرا ہونے والی عارضی تکالیف بخوشی برداشت کریں۔

بسااوقات مخنے کی چوٹ صرف مخنے تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ پنڈلی کے شنج میں بھی تبدیل ہوجاتی ہے۔ چلنے یا زیادہ حرکت کرنے سے شنج شروع ہوجاتا ہے اور شدید بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ بعض دفعہ بیشنج گھٹنوں یا کولہوں میں منتقل ہوجاتا ہے اور کسی علاج سے آرام نہیں آتا۔ اگر صبح علاج کیا جائے تو تکلیف اوپر سے نیچے کی طرف منتقل ہونے لگے گی اور جہاں پہلی چوٹ گئی تھی وہیں جا کر تھم ہر جائے گی۔ اگر وہیں اس کا بالمثل علاج کیا جائے تو پھر تکلیف کہیں اور منتقل نہیں ہوگی۔

لیڈم میں جوورم پائے جاتے ہیں وہ اکثر پاؤں کے جوڑوں میں نقرسی مادہ کی وجہ سے ہوتے ہیں جس کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے۔اس کی پیجان بہت آ سان ہے۔اگر سر دی سے یا ٹھنڈے یانی سے آرام آئے اور گرمی سے مرض بڑھے تو یاؤں کے جوڑوں کا ایبا در دلیڈم سے جلد ٹھیک ہوجاتا ہے۔لیڈم سے متاثر ہونے والی ہرسوزش کو ٹھنڈی ٹکورسے آرام آتا ہے۔ وہ درد جوجسم کے سی ایسے عضو کی خالی جگہ برمحسوس ہو جسے بیاری کی وجہ سے کا اور دیا گیا ہو، بہت نکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں سے عضوتو کٹ چکا ہوتا ہے اور کوئی چ<u>ز</u>موجو دنہیں ہوتی کیکن نکلیف بدستورمحسوس ہوتی ہے۔ بسااوقات ٹا نگ تو کٹ جاتی ہےمگراسی ٹا نگ کے یاؤں کےانگو ٹھے کی جگہ پرمریض ایسا در دمحسوس کرتا ہے گویا واقعی وہاں کوئی انگوٹھا موجود ہوجو در دکرر ہا ہو۔ایسے دردمیں آرنیکا اورلیڈم بہت کام آتی ہیں۔اگریدیتہ چل جائے کہ وہ عضو کٹنے سے پہلے کیا بیاری تھی تواسی بیاری کاعلاج ہونا چاہئے کیونکہاعصاب اور ذہنی ریشوں نے اس بیاری کواینی یا دداشت میں محفوظ رکھا ہوا ہے اور بید دراصل یا دداشت کا درد ہے۔ جب اس بیاری کا علاج کریں گے تو سارے اعصاب کو پیغام مل جائے گا کہ ایسے درد کے خلاف انہیں کیا ردمل دکھانا جاہئے۔ یہ یا در کھیں کہ عموماً عضو کے کاٹنے کے بعد جو در درہ جاتا ہے اس میں آرنیکا، لیڈم، ہائی پیریکم، سمفائٹم وغیرہ مفید ہوسکتی ہیں مگر شرط یہی ہے کہ عضو کاٹنے سے پہلے والی بیاری ان دواۇل سےمما ثلت رھتی تھی۔

لیڑم میں جوڑوں کے درد کو تھنڈک پہنچانے سے آرام آتا ہے باوجوداس کے کہ

مریض شخنڈا ہوتا ہے اور بیرونی اور اندرونی طور پر سردی بہت محسوں کرتا ہے۔ شخنڈک کے احساس کے باوجو دسردی سے آرام اور گرمی سے تکلیف ایک عجوبہ ہے۔

لیڈم کی بیار یوں میں مریض کا چہرہ لیکیسس کے مریض کی طرح سوجا ہوا اور متورم دکھائی ویتا ہے۔ دل کے مریض میں بھی سے علامت پائی جاتی ہے۔ لیڈم کے مریض کے چہرے کی رنگت نیلگوں ہوتی ہے۔ پاؤل اور پنڈلیوں میں بھی پھلپھلی سی ورم ہوتی ہے اور رنگت میں نیلا ہے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیڈم کا مریض مضبوط، تنے ہوئے جسم کا مالک ہوتا ہے۔

ٹخنے کے علاوہ گھٹنول کے جوڑول میں بیٹھر ہنے والی تکلیفوں میں بھی لیڈم کام آسکتی ہے بشرطیکہ ایسے گھٹنے کوٹھنڈی ٹکور سے آرام آئے۔اس میں بیبیثاب کی ایک علامت جلسیمیم سے ملتی ہے۔کھلا اور بے رنگ بیبیثاب ہوتا ہے۔

لیڈم کی مریض خواتین میں جیض بہت جلد، بہت زیادہ اور گہرے سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ اگر یہ علامتیں موجود ہوں تو لیڈم رحم کی اکثر بیار یوں میں مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن لیڈم کی اس علامت کوفراموش نہ کریں کہ ہر تکلیف کوٹھنڈ پہنچانے سے آرام آتا ہے۔

لیڈم کی ایک علامت پلسٹیلا سے ملتی ہے لیکن دونوں میں فرق کرنا مشکل نہیں۔ پلسٹیلا میں اگر کسی عضو میں دہر تک دردر ہے تو وہ عضو سکڑنے لگتا ہے اور کمز ورہو جاتا ہے۔ لیڈم میں بھی اگر ایک ٹانگ میں تکلیف ہو تو وہ ٹانگ دوسری ٹانگ کی نسبت سکڑ کر بچھ چھوٹی ہو جاتی ہے۔ دونوں میں امتیازیہ ہے کہ پلسٹیلا کا مریض گرمی محسوس کرتا ہے اور سردی سے آرام جبکہ لیڈم کا مریض سردی ہی سے اسے آرام آتا ہے۔

لیڈم آئکھوں کی تکلیفوں میں بھی مفید ہے۔ اگر آئکھ میں چوٹ لگ جائے اور خون اتر آئے اور نقر س اور موتیا کی تکلیفیں بیک وقت شروع ہو جائیں تو لیڈم سے نمایاں افاقہ ہوگا۔ لیڈم میں پیشانی اور گالوں پرسرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے

ہیں جن کوچھونے سے در دہوتا ہے، ناک اور منہ کے قریب کیل نکلتے ہیں۔ ناک میں جلن ہوتی ہے، کھانسی کے ساتھ دم گھٹتا ہے، بلغم کے ساتھ خون کی آ میزش ہوتی ہے، سانس کی نالی میں در داور تشنجی کیفیت بیدا ہوجاتی ہے اور سانس لینے میں دفت محسوس ہوتی ہے۔ لیڈم کے مریض کے جسم میں حرارت غریزی کم ہونے کی وجہ سے جسم ٹھنڈ ار بہتا ہے لیکن اس کے باوجو داس کا مریض بستر کی گرمی بر داشت نہیں کر سکتا۔ گور کرنے سے بھی در دمیں اضافہ ہوجاتا ہے۔ مریض ایپنیا وی میں رکھنا پیند کرتا ہے۔

طاقت: 30سے 200 تک

لليُم نُّكُ 565

135

لليئم تگرينم

LILIUM TIGRINUM

(TigorLily)

للیئم ٹگ عورتوں کی دوست دوا مجھی جاتی ہے۔ یہ خصوصاً ان عورتوں کے لئے بہت مفید ہے جو ہسٹریائی مزاح رکھتی ہوں اور بہت پر جوش ہوں، رخم اور دل کی بیاریوں میں مبتلا رہتی ہوں، طرح طرح کے وہم،خوف اورخد شات انہیں گھیرے رکھتے ہوں، یہ خدشہ محسوں کریں کہ رخم اور دیگر اندرونی اعضاء گویا باہر نکلنا چاہتے ہیں اوریوں لگتا ہو جیسے اعضاء نیچ گررہے ہیں اس لئے مریضہ لاشعوری طور پر ہاتھ کے دباؤ سے انہیں اوپر کرنے کار جحان رکھتی ہو۔ ایسی مریضا وُن میں حضون بیاں اوری کا خون قبل از وقت جاری ہوجاتا ہے، مقدار میں کم لیکن نہایت بد بودار ہوتا ہے، سیاہ خون کی کو تھا ہے اور لیٹنے اور آرام کرنے سے کوئی خوات ہے۔ اور کی بھوجاتا ہے۔ مقدار میں کم لیکن نہایت بد بودار ہوتا ہے، سیاہ خون کی خوات ہے۔ سیاہ خون کی بھوجاتا ہے۔ مقدار میں کم لیکن نہایت بد بودار ہوتا ہے، سیاہ خون کی خوات ہے۔ اور کی بھوجاتا ہے۔ مقدار میں کم لیکن نہایت بد بودار ہوتا ہے۔ سیاہ خون کی جو باتا ہے۔

رک جاتا ہے۔ للیئم ٹگ کا مریض متشدد مذہبی خیالات کا مالک ہوتا ہے۔ اگر وہ اذیت پسند ہواور ہسٹریائی مزاج بھی رکھتا ہوتو بیدوااس کے لئے بہترین ہے۔

للیئم ٹگ کی علامات رکھنے والا مریض جب ضد میں آ جائے اور ہسٹریائی مزاج عالب ہوتو غیر منطقی باتیں کرتا ہے حالا نکہ اپنی روز مرہ زندگی میں وہ بالکل معتدل ہوتا ہے لیکن بیاری کا اثر غالب ہوتو فضول بحثیں کرتا ہے۔ عام طور پرنو جوان بچے اور بچیاں کسی تکلیف کی وجہ سے ضد میں آ جا ئیں تو جان بو جھ کر اور اس علم کے با و جود کہ ان کی بات غلط ہے، پھر بھی دلیل دیتے چلے جاتے ہیں۔ وزن کم کرنے کے شوقین للیئم ٹگ کے مرافن نہ بھی ہوں تو اکثر اس بیاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ضرورت سے زیادہ ڈائیٹنگ مرافن نہ بھی ہوں تو اکثر اس بیاری میں سوچنے شمجھنے کی صلاحیت مفقو د ہونے لگتی ہے۔ (Dieting) کرنے کی وجہ سے ان میں سوچنے شمجھنے کی صلاحیت مفقو د ہونے لگتی ہے۔

یہ کیفیت عموماً عارضی ہوتی ہے لیکن غیر محتاط ڈائیٹنگ کرنے کے جومستقل اثرات اعصاب پر بڑ جاتے ہیں۔اس لئے شدید جاتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے اور ساری عمر کے لئے مصیبت بن جاتے ہیں۔اس لئے شدید ڈائیٹنگ سے پر ہیز لازم ہے۔ متناسب غذااور مناسب ورزش اچھی صحت اور ملئے جسم کا بہترین نسخہ ہیں ورنہ فاقوں سے وزن گرانے کی کوشش سے مریض للئم ٹگ کے مریض کی طرح ضدی ہوجا تا ہے اور بے دلیل باتیں کرنے لگتاہے۔

للیئم ٹگ میں ہائیومس اور کینتھر س کی طرح جنسی اعضاء میں ہیجان ماتا ہے کین ایک واضح فرق رید ہے کہ کیکٹ میں ان دونوں دواؤں کے مزاج کے برعکس زور دارنفسانی خواہش ایک مستقل بیاری بن جاتی ہے جس پر قابویانا مشکل ہوتا ہے۔

برمی اور سردی کے احساس کے لحاظ سے اس کی علامت پلسٹیلا سے ملتی ہے۔ گرمی تکلیف دیتی ہے اور ہاتھ یا وُل بھی جلتے ہیں۔

سردرد عموماً ماتھے پر رہتا ہے، روشی نا قابل برداشت ہوتی ہے اور نظر کمزور ہوجاتی ہے۔ وقتی اندھرا کیا ہے۔ آنگھوں کے سامنے سائے سے ناچنے لگتے ہیں۔ آنکھوں میں سوزش ہوجاتی ہے جومزمن ہوجائے تو آنکھ ہمیشہ سوجی رہتی ہے۔ لیئم مگ میں ایک علامت مرک کارسے ملتی ہے مثلاً بیچین ایسی کہ فارغ ہونے کے بعد بھی بے چینی اور در دجاری رہیں۔ مرک کارمیں جب تکلیف ہوتو بیا حساس رہتا ہے کہ فارغ ہونے ہونے کے باوجود کچھا جابت باقی رہ گئی ہے۔ لیکن للیئم مگ میں اجابت کے بعد بھی ہروت سے احساس رہتا ہے کہ اسے حاجت کے لئے ٹائلٹ جانے کی ضرورت ہے۔ مرک کار کی طرح اس میں بھی پیشا ہے کہ اسے حاجت کے لئے ٹائلٹ جانے کی ضرورت ہے۔ مرک کار کی طرح اس میں بھی پیشا ہے کہ اوجود جانی محسوس ہوتی ہے۔

اگر کسی مریض کو بیه خیال ہو کہ میں پاگل ہو جاؤں گا یا جھے پچھ ہو جائے گا،
د ماغ میں بیہ خیال ایک بارراہ پالے تو ٹکتا نہیں۔ اگر وہ ہجھنے گئے کہ میں فلاں چیز ہوں
تو بیہ وہم بھی ہٹنے کا نام نہیں لیتا۔ بیالیئم ٹگ کی خاص علامت ہے۔ اس کے ساتھ گہری
اداسی اور ڈیریشن (Depression) کے دور ہے بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کئی ایسے

مریضوں کاعلاج کیا ہے جوا کڑنو جوان تھے،خدا کے فضل سے سبٹھیک ہوگئے۔ایسے مریضوں کو صرف دوائی نہیں بلکہ پیار سے سمجھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔عموماً نفسیاتی اور جسمانی بیاریوں کا آپس میں گہراتعلق ہوتا ہے۔ایک کو دوسرے سے جدانہیں کیا جاسکتا۔اس لئے اگر ہومیو پیتھک طریقہ علاج میں بیام ہوجائے کہ کیا نفسیاتی بیاری ہے تواس کا جسمانی بیاری کے ساتھ پہلو بہ پہلو علاج دونوں نکلیفوں کے لئے مفید ہوتا ہے کیونکہ جہاں ذہن کو آرام آتا ہے جسم کو بھی خود بخو د آرام محسوس ہوتا ہے۔لیئم بگل کے بعض مریض محسوس کرتے ہیں کہ انہیں سمجھا ہی نہیں گیا۔ ایسے مریضوں سے پیچھا چھڑوانا بہت مشکل ہوتا ہے، سمجھانے کا اثر نہیں ہوتا۔ انہیں صرف دوا دینی عراضوں سے پیچھا چھڑوانا بہت مشکل ہوتا ہے، سمجھانے کا اثر نہیں ہوتا۔ انہیں صرف دوا دینی عراض کے ۔اگر دوا میں اثر ہوگا تو خود ہی ٹھیک ہوجا ئیں گے۔ورنہ ہمیشہ یہی دہراتے رہیں گے کہ ہمیں کوئی نہیں شمجھ کا کہ ہم کہنا کیا جا سے بیں اور کرنا کیا جا سے بیں۔

للیئم ٹک میں دل کی تکلیف بھی پائی جاتی ہے۔ایسے محسوں ہوتا ہے کہ دل اچا تک طعی میں آ کر جکڑا گیا ہے جیسے شنجہ پڑ گیا ہو۔ یہ علامت کیکٹس میں بھی بہت نمایاں ہوتی ہے۔ نبض بہت تیز اور بے قاعدہ ہوتی ہے۔ دل کے مقام پر ٹھنڈک اور بوجھ کا احساس رہتا ہے۔ جموم میں اور گرم کمرے میں دم گھٹتا ہے۔

للیئم ٹگ میں معدہ میں ہوا بھی ہوتی ہے، بوجل بن کا حساس مگر بھوک بہت گئی ہے۔ مریض گوشت کھانے کی خواہش زیادہ محسوس کرتا ہے۔ شدید بیاس گئی ہے۔ بار بار بیشاب آتا ہے جومقدار میں کم ،گرم اور دودھیارنگ کا ہوتا ہے۔

للیئم ٹگ کے مریض کی تکلیفیں گرم تمرے میں اور سی تسلی اور تشفی دینے سے بڑھ جاتی ہیں۔ تازہ ہوامیں بہترمحسوں کرتا ہے۔

وافع اثر دوائیں: بیلونیس طافت: 30سے 200 تک ميَّنيشيا 569

136

ميگنيشيا كارب

MAGNESIA CARBONICA

(Carbonate of Magnesia)

میگنیشیا کارب کوایلو پیتھک طریقہ علاج میں معدے کی تیز ابیت کم کرنے اور اسہال کی تکنیشیا کارب کوایلو پیتھک طریقہ علاج میں معدے کی تیز ابیت کم کرنے اور اسہال کی تکلیف یا تکلیف دور کرنے کے لئے ہومیو پیتھی پڑینسی میں میگنیشیا کارب اونچی بدا ترات پیدا ہوجاتے ہیں انہیں دور کرنے کے لئے ہومیو پیتھی پڑینسی میں میگنیشیا کارب اونچی طاقت میں استعال کی جاسکتی ہے۔

میگنیشیا کارب میں بیاریاں اکیس دن کے بعد دوبارہ واپس آتی ہیں۔علامتیں ٹھیک بھی ہورہی ہوں تو وہ اکیس دن کے بعد دوبارہ کچھ جوش دکھانے گئی ہیں۔ مریض کو کھلی ہوا کی خواہش ہوتی ہے خواہ ٹھنڈی ہی ہو حالانکہ سردی اس کے لئے مضر ہوتی ہے۔ مریض اپنے آپ کوہر وقت ڈھانیے رکھتا ہے۔ گرم مشروب سے پسینہ آتا ہے۔ دانت کے اعصابی ریشوں میں شدید درد ہوتا ہے۔

حمل کا دانت درد جووضع حمل تک جاری رہتا ہے اس میں یہ بہت مفید دواہے۔اس درد کا حیض سے بھی تعلق ہوتا ہے۔چیض کے دوران دانت میں در دہوتا ہے اور حیض ختم ہونے سے دانت کا در دٹھیک ہوجا تا ہے۔

میگنیشیا کے تمام اعصابی دردوں کو ہلکا ہلکا چلنے سے آرام آتا ہے۔ ہلکی حرکت سے خصوصاً دانت کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ میگنیشیا کارب کی اعصابی تکلیفوں کا دورہ عموماً رات کو ہوتا ہے۔ کیکیسس میں حرکت سے آرام نہیں آتا جبکہ میگنیشیا کارب میں حرکت آرام نہیں آتا جبکہ میگنیشیا کارب میں خرکت آرام دیتی ہے۔ میگنیشیا کارب میں نیٹرم میور کی طرح ناخن اور بال خراب ہوجاتے ہیں اور دانت اور اس کے اردگرد کا حصہ بہت حساس ہوجاتا ہے۔ بیعلامت اینٹی مونیم کروڈ

میں بھی ہے۔ایسی صورت میں اینٹی مونیم کروڈ اور میگنیشیا کارب کے علاوہ جیا ئنا بھی مفید ہے۔ ا پسے مریض جن میں سل کی علامات ظاہر ہونےلگیں۔ چیرہ زرد ہوجائے۔اگر دیگر علامتیں کسی معین دوا کی طرف اشارہ نہ کرس تو میآئیشا کارب استعال کرس۔میگنیشا کارب کی ایک خاص علامت بیہ ہے کہ فضلے کارنگ مٹی کی طرح ہوجا تا ہے اوراس میں سخت بد بوہوتی ہے۔ بہ جگر کی خرابی کی علامت ہے۔ بہت کھل کراجابت ہوتی ہے جوٹکڑوں کی صورت میں ہوتی ہے اور یانی پر تیرتی ہے۔معدےاورانتر یوں کے کینسر میں بھی اجابت یانی پر تیرتی رہتی ہےاور ڈوبتی نہیں کیونکہاس میں گیس ملی ہوئی ہوتی ہے مگرضروری نہیں کہ جس شخص کی اجابت ہلکی ہوکر تیرےاسے ضرور كينسرى ہوگا۔اس كئے خواہ مخواہ وہموں ميں مبتلانهيں ہونا جا ہيئے - كينسركي دوسري علامتيں ہوں توعلاج كى فكركرنى حائية مسكنيشيا كارب مين اجابت كارنك بعض دفعه سنرى مأئل موجاتا ہے۔ اس کی سب بیار یوں میں خشکی بھی یائی جاتی ہے اور معدے میں کھٹا<u>س</u> ہوتی ہے۔ کھانسی بھی خشک ہوتی ہے۔ گلے میں خراش ہوتی ہے۔ چہرے پر دق کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔بعض دفعہ کھانسی کے خشک ہونے کے باوجود معمولی سی بلغم بھی نکلتی ہے۔ میگنیشیا کارب میں کندھوں میں بھی دردہوتا ہے۔خصوصاً دائیں کندھے میں۔سارے جسم میں تھکاوٹ کا حساس رہتا ہے۔جلد بے رنگ،زرداور مرجھائی ہوئی۔سردی نا قابل برداشت

ہوتی ہے۔بستر کی گرمی میں بھی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔اسی طرح بدلتے ہوئے موسم میں اور کھلی ہوا میں سکون محسوس ہوتا ہے۔

> دافع اثر دوائیں: آرسنگ مرکری 30

ميلنڈريٽم

137

ميلنارينم

MALANDRINUM

میلنڈ رینم گھوڑ وں کی ایک بہاری Horse Grease کے مادہ سے تیار کی جانے والی دوا ہے۔حیوانات کی بیاریوں کے ایک ماہر نے بیمعلوم کیا کہ وہ علاقے جہاں گھوڑے اس بیاری میں مبتلا ہوں وہاں اگر گائیں وغیرہ گھاس پر بیٹھیں تو ان میں چھک کی بیاری تھیلنے لگتی ہے۔ بدایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ہومیو بیتھی طریقیۂ علاج میں میلنڈ رینم چیک کے توڑ میں بہت مؤثر ثابت ہوئی ہے۔اسے چیک سے بحاؤ کے لئے بطور Preventive بھی شہرت حاصل ہے۔ نیز چھک کے ٹیکے کے بدا ثرات کوزائل کرنے میں بھی یہ مفید ثابت ہوئی ہے۔ بعض ڈاکٹروں نے تجربے کئے۔ حیار بیچے لئے گئے۔ان میں سے تین کومیلنڈرینم کی ایک ایک خوراک استعمال کروائی گئی۔ چوتھے بچے کو بہ دوائی نہیں دی گئی پھران سب کو چیک کے حفاظتی ٹیکے لگوائے گئے۔جس بیچ کو بیدوانہیں دی گئی اس میں چیک کے ٹیکہ کا سخت رقمل ظاہر ہوا جبکہ باقی بچوں کو پچھنہیں ہوا۔ ایک اور معالج نے بہتجر بہ کیا کہ ایک بیچے کو ٹیکہ ہیں لگوایا گیا، صرف میلنڈ رینم دی گئی، اسے بچھنہیں ہوا جبکہ دوسرے بیجے کوحفاظتی ٹیکہ لگوانے کے باوجود چیک ہوگئی۔ ایک اور ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ جن دنوں چیک کی وباء پھیلی ہوئی تھی اس نے میلنڈ رینم 30 طافت میں بار باراستعال کی اورایسے علاقوں میں چیک کے مریضوں کاعلاج کرتا ر ہاجہاں بیروباعام تھی مگراہے کچھنہیں ہوا۔اور جن لوگوں نے بید دوااستعال کی وہ بھی اس وباسے محفوظ رہے۔

اگر میلنڈرینم کو چیک کے حملہ کے بعد استعال کیا جائے تو مریض بہت جلد بغیر کسی گرے نقصان کے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر برنٹ (Dr. Burnett) نے مشورہ دیا

ہے کہ یہ بہت گہرااثر کرنے والی دوا ہے اس لئے اسے بلاضرورت بار بارنہیں دہرانا جا ہئے۔ حاد یعنی فوری نوعیت کی بیاریوں میں اسے دہرایا جا سکتا ہے لیکن حفاظتی مقاصد کے پیش نظر اسے لمبے وقفہ سے استعال کرنا جا ہئے۔

چیک کے ٹیکے کے رڈمل کے طور پرجسم پرا نگزیما ظاہر ہوجائے تواس میں بھی میلنڈرینم مفید ہے گرچیک کے ٹیکے کے بدا ثرات دورکرنے کے لئے زیادہ مشہور دوا تھوجا ہے۔

میلنڈرینم کاہڈیوں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اگر مڈیوں میں نقص پیدا ہوجائے اوروہ ٹیڑھی ہو جائیں اور ٹانگوں کی ہڈیاں اندر کی طرف مڑنے لگیں اور چلتے ہوئے گھٹنے کی ہڈیاں آپس میں کرانے لگیں تومیلنڈرینم سے فائدہ ہوگا۔ کمزور ہڈیوں کے لئے کلکیریا کارب بہت مفید دوا ہے بلکہ اصل دوا ہی یہ ہے کیکن میلنڈرینم بھی اچھا کام کرتی ہے۔

میلنڈرینم جلدی امراض میں بھی مفید ہے۔ ہوشم کے ایگزیما، آبلوں اور چھالوں میں اچھااثر دکھاتی ہے اس کے آبلے اور چھالوں کی ستہ آ ہستہ نکلتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا اور چھرایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوجاتا ہے اور چھالوں کی فصلیں اگنے گئی ہیں۔ جانوروں کی بیاریوں میں بھی اس کا استعال مفید ہے۔ ایک ڈاکٹر نے ایک ایسے کتے کومیلنڈرینم دی جس کی گردن میں خطرناک حھالے نکلے ہوئے تھے وہ فوراً ٹھیک ہوگیا۔

میلنڈرینم وجع المفاصل اور جوڑوں کی اندرونی کی جھلیوں کی سوزش میں بھی مفید ہے۔
عموماً بیددواجسم کے نچلے حصوں میں زیادہ اثر کرتی ہے۔ ٹاگلوں پر گھٹنوں سے لے کر گخنوں تک اس کا
اثر زیادہ ہوتا ہے۔ کمر میں دکھن اور چوٹ لگنے کی طرح کا درد ہوتو بھی میلنڈرینم مفید ہے۔
میلنڈرینم عورتوں کے رحم کی تکالیف کے لئے بھی اچھی بتائی گئی ہے۔ اندرونی اعضاء میں خارش،
سوزش اور سبزی مائل کیکوریا کے اخراج میں اچھا اثر دکھاتی ہے۔

اگر مسوڑ هول سے خون آئے۔ ذرا سا دبانے سے بھی خون جاری ہو جائے تو میلنڈ رینم بھی دوا ہوسکتی ہے اور اس لحاظ سے اس کی علامتیں کرئیوز وٹ

ميلنڈرينم

(Kreosotum) سے ماتی ہیں۔

وہ بچے جو پڑھ کرسب کچھ بھول جائیں تو ان کے لئے بھی میلنڈرینم بہت مفید ہے۔چھوٹی طاقت میں ہفتہ میں دوتین بار چند ماہ تک استعال کرانی چاہئے۔

طاقت: 30اوراونچی

138 مليريا آفيشي نيلس

MALARIA OFFICINALIS

ید دوا ملیر یا بخار اور اس کے بدا ترات میں مفید ہے۔ سردرد، متلی، جسم میں دردیں۔
معدے میں بے چینی اس کی خاص علامات ہیں۔ بیصرف ملیر یا میں ہی نہیں بلکہ اس سے ملتے جلتے
بخاروں کے لئے بھی استعال کی جاتی ہے۔ مریض کا جسم گرم ہولیکن وہ سردی اور کیکیا ہے محسوں
کرے اور اعضا چینی کی علامت پائی جائے تو ملیریا آفیشی ٹیلس استعال کرنی چاہئے۔
ملیریا آفیشی نیلس جگر کے لئے بھی اچھی ہے۔ جگر کے مقام پر درد اور اپنٹھن محسوں ہو۔ جگر کے مقام پر درد اور اپنٹھن محسوں ہو۔ جگر کے مقام پر درد اور اپنٹھن محسوں ہو۔ جگر، تلی اور گردے کام کرنا چھوڑ دیں۔ جسم میں خون کی کی واقع ہو۔ سارا نظام صحت جواب دے جائے، جلد اور چرہ زرد ہو اور مریض بہت کمزوری اور سردی محسوں کرنے تو اسے جواب دے جائے، جلد اور چرہ درد ہو اور مریض بہت کمزوری اور سردی محسوں کرے تو اسے استعال کرنا چاہئے۔ ضدی قتم کے ملیریا بخار جو کسی دواسے ٹھیک نہ ہوں ان میں بھی می مفید ہے۔ اس کے استعال سے چند دنوں میں ہی مریض کی صحت بہتر ہونے گئی ہے یا مرض کی علامات واضح ہوکر سامنے آجاتی ہیں جن سے چے دواکی شخیص میں مدد ماتی ہے۔ اس دواکا اثر برائیونیا بکس وامیکا، آرسنگ اور رسٹاکس سے ذائل ہوتا ہے۔

طاقت: 30

مینلین م

139 مینگینم

MANGANUM ACETICUM

(Manganese Acetate)

ید دواایک دھات' مینگینم" کے ایس ٹیٹ (Acetate) سے بنائی گئی ہے۔ ڈاکٹر ہائیمن نے اس کی آ زمائش کی تھی۔ یہ خون پر اثر انداز ہوتی ہے بہت گہری اور وسیح الاثر دوا ہے کین بوجوہ اس کا استعال ہو میوبیت تھی میں بہت کم ہوا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ اثر گلے کی نالی پر ہوتا ہے جس کا بولنے سے تعلق ہے۔ سلی مادول کے اجتماع سے آ واز رفتہ رفتہ کم ہو جائے اور مسلسل کھانسی رہتے مینگینم بہت مفید دوا ہے۔ یہ دیگر سلی اثر ات کو بھی دور کر دیتی ہے۔ مینگینم میں ظاہری علامات کی تصویر بہت بھیا نک بتائی گئی ہے۔ اس لئے اکثر ڈاکٹر اس وجہ سے بھی مینگینم کے فوائد سے محروم رہ جاتے ہیں کہ جب تک یہ علامتیں اتنی شدت سے موجود نہ ہوں وہ اسے استعال نہیں کرتے۔

مین بی بیسب علامات ظاہر نہیں ہوتیں۔ جب انتہائی علامات ظاہر ہوجا کیں تواس وقت علاج بہت میں ہی بیسب علامات ظاہر نہیں ہوتیں۔ جب انتہائی علامات ظاہر ہوجا کیں تواس وقت علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ شروع میں ہی کوئی علامت مینگینم کا تقاضا کرے تو ضرور استعال کروائی علامت عینگینم کا تقاضا کر نو ضرور استعال کروائی علامت عینگینم کا حصہ ماؤف ہور ہا ہواور سلی اثرات ظاہر ہوں تو مینگینم بلاتا خیر شروع کروا دین چاہئے۔ اگر مریض مینگینم کا ہوتو دوسری دواؤں سے بیکھائی کم تو ہوسکتی ہے کین وہ گہراا تر نہیں کریں گی۔ مینگینم کا ہڈیوں کی جھلی سے بھی گہراتعلق ہے۔ اسی طرح ہڈیوں میں پیدا ہونے والے ناسوروں میں بھی بیمنگینم کی مینگید ہے۔

اس میں حیض کی خرابیاں بھی ملتی ہیں۔ قلت حیض جووفت گزرنے کے بعدایک آ دھ دن کے لئے آتا ہے۔خون کی رنگت پھیکی، یانی کی طرح ہوتی ہے ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ چیض جاری کرنے والی دوادی جائے مینگینم دینی چاہئے کیونکہ ایسے مریض میں خون کی شدید کمی ہوتی ہے اس لئے چیض کا خون جاری کرنے والی دواسے رہا سہا خون بھی نکل جائے گا۔ میرا تجربہ ہے کہ علامات کے مطابق صحیح دوا دی جائے تو حیض کا خون جاری ہونے کی بجائے بچھ محرصہ کے لئے رک جاتا ہے لیکن کئی مہینے چیض بندر ہنے کے بعد جب جسم میں خون کی کمی بوری ہوجائے اور طافت آ جائے تو پھر چیض ناریل ہوجائے گا۔ اگر خون کی کمی نہ ہونے کے باوجود چیض بندر ہوجائے اور طافت آ جائے تو پھر چیض ناریل ہوجائے گا۔ اگر خون کی کمی نہ ہونے کے باوجود چیض بند ہوجائے وبندش چیض کی دوسری دوائیں سوچنی جائیں۔

ایسے مریض جن کی پیڈلیوں میں اینٹھن ہوتی ہے۔ٹانگوں کے پٹھوں میں تختی محسوس ہوتی ہے اورٹانگیں بے حس ہو جاتی ہیں۔ان کی پنڈلیوں کے سامنے کی مڈی کی دکھن میں مینگینم بہت مفید دواہے۔

مینگینم میں جلدی علامتیں بھی ماتی ہیں۔ زخموں اور ناسور کے کنار ہے موٹے ہوجاتے ہیں۔ اکثر زخم لمباعرصہ چلتے ہیں اورٹھیک نہیں ہوتے۔ سورائسس (Psorisis) میں بھی اسے مفید بتایا گیا ہے۔ اگر سورائسس لیعنی چنبل دب چکا ہوتو مینگینم سے فائدے کی صورت میں پہلے بہت زور سے جلد پر اجرے گا اور لمباعرصہ وقفہ وقفہ سے استعال کے نتیجہ میں کم ہونا شروع ہوجائے گا۔ لہذا مینگینم دینے کے بعد سورائسس لیعنی چنبل ظاہر ہوتو گھرانا نہیں چاہئے۔ ڈاکٹر کینٹ اس بات کے سخت خلاف سے کہ سورائسس کو دواؤں سے دبا دیا جائے کیونکہ اس کے نتیجہ میں انتر پوں میں یاکسی اورعضو میں کینسر ہوسکتا ہے۔ ان کے اکثر بیانات درست ہوتے ہیں اس لئے بعیر نہیں کہ بیجی درست ہوتے ہیں اس لئے بعیر نہیں کہ بیجی درست ہوتے ہیں اس لئے بعیر نہیں کہ بیجی درست ہوتے ہیں اس لئے بعیر نہیں کہ بیجی درست ہو۔ نہیں اور قسو میں گیس میں سورائسس کی علامات فاسفور س اور ڈ لکامارا سے ملتی ہیں۔

مینکینم کے زہر سے خون کے ذرات اور خون کے خلیے متاثر ہو جاتے ہیں۔ نرخرہ (Larynx) بعنی سانس کے لوچ دار چھلوں پرمشمل نالی جو گلے سے شروع ہو کر نیچے پھیپھڑوں کی جانب اترتی ہے اور گلے میں اس کے اندر آ واز پیدا کرنے کا آلہ ہوتا ہے، مینگینم میں اس کے اندر ورم پیدا کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے جس کا ہر حملہ پہلے سے بڑھ

المينايين 579

کر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ یہی بڑھتی ہوئی بیاری بالآخر چھپچر وں میں دیے ہوئے سل کے مادے کوابھار دیتی ہے۔ مینگینم سے بروقت ایسے مریض کاعلاج بعد میں پیدا ہونے والی سنگین پیچید گیوں سے بچالیتا ہے۔

سے بچالیتا ہے۔

مینگینم کے مریض کے زخم اور ناسور ٹھیک نہیں ہوتے اور مسلسل ہرے رہتے ہیں۔ یہ کیفیت جزوی کینسر کی ہے اگر اسے زبردسی ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ پورے کینسر میں تبدیل ہوسکتی ہے۔ اس کے مریض کو معمولی سالمس بھی سخت تکلیف دیتا ہے۔ اگر چلنے سے ہڈ پول میں در د ہواور آرنیکا، برائیونیا سے فائدہ نہ ہوتو مینگینم فائدہ دیتی ہے۔ بیان دواؤں کی نسبت زیادہ گہراا تر رکھتی ہے۔ اسی طرح مینگینم میں بیٹیشیا سے ملتی جاتی در دیں ہوتی ہیں جو معدے کی خرابی اور ٹائیفائیڈ کے تعفن سے اسی طرح مینگینم میں بیٹیشیا کچھوائد دے کرچھوڑ دیتو مینگینم کویا در کھنا چاہئے۔

بیدا ہوتی ہیں۔ اگر بیٹیشیا کچھوائدہ دے کرچھوڑ دیتو مینگینم کویا در کھنا چاہئے۔

مینگینم میں گہری اداسی پائی جاتی ہے۔جس کے ساتھ یہا حساس ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔عورتیں اکثر اس نم میں مبتلار ہتی ہیں۔ اپنے عزیز وں کے متعلق تو ہمات کا شکار رہتی ہیں۔ اگر ذہنی علامات بڑھ جائیں تو سوچنے ہمجھنے کی طاقت ماؤف ہونے لگتی ہے۔ کسی بات کا شعور نہیں رہتا۔ بدینائی کم ہوجاتی ہے۔ سیبائی مان علامات کو دور کرنے کے علاوہ مریض کی دوسری بیاریوں میں بھی اچھا اثر دکھائے گی۔

مینگینم میں حرکت سے اور چلنے پھرنے سے تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں لیکن بیٹے سے بھی آ رامنہیں آتا۔ ہاں اگر مریض لیٹ جائے تو سب تکلیفیں یوں ختم ہوجاتی ہیں گویاتھیں ہی نہیں۔ وہ عور تیں جو موٹا پے کا شکار ہوں۔ ہر وقت جسم میں دردیں ہوں اور وہ ہر وقت لیٹی رہیں ان کی دوا مینگینم بھی ہوسکتی ہے بشرطیکہ اس کی دوسری اہم علامتیں موجود ہوں۔ بعض دفعہ بیٹھے گھبرا ہٹ کی وجہ سے حرکت کرنے اور چلنے پھرنے کودل جا ہتا ہے لیکن چلنے پھرنے سے دردوں کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اس علامت میں آ رسنگ اور رسٹاکس کا خیال آ سکتا ہے گران دونوں کی علامتیں بالکل مختلف ہیں۔

۔ سل کی علامتوں میں ارجنٹم مٹیلیکم، فاسفورس اور گریفائٹس کی علامتیں مینگینم سے لىنىلىغ م 580

مشابہت رکھتی ہیں۔ اگرسل کے مریض میں خون کی کمی کی وجہ سے سر میں درد ہوتو ایسے سر درد میں بھی میں بھی میں بھی میں بھی میں بھی ہے۔ اس میں دردیں سوئی کی چیمن کی طرح ہوتی ہیں جیسے سی نے ٹائکہ بھر دیا ہو۔ نیز سرکی جلد میں سرخ رنگ کے داغ بن جاتے ہیں اوران جگہوں میں دردہوتا ہے۔ آئکھ کے چھپر اور پر دوں میں سوزش ہوتی ہے۔ روشنی سے زودسی پائی جاتی ہے۔ قریب کی چیزیں دیکھنے سے آئکھوں میں دردہوتا ہے۔ اس وجہ سے کتاب نزدیک رکھ کر پڑھنے یا سلائی کا کام کرنے سے آئکھیں دکھنگتی ہیں۔ بیعلامت روٹا (Ruta) سے ملتی جلتی ہے۔

مینگینم میں کانوں سے بد بودار مواد نکاتا ہے۔ اس بیاری میں امونیم کارب بھی بہت نمایاں مقام رکھتی ہے۔ مینگینم میں کانوں میں بھاری بن پیدا ہوجا تا ہے لیکن یہ کیفیت مستقل نہیں ہوتی۔ ناک صاف کرنے سے جب ہوا کا دباؤ پڑتا ہے تو قتی طور پر شنوائی ٹھیک ہوجاتی ہے۔ کان کے بیرونی حصہ کو ہاتھ لگانے سے در دہوتا ہے نزلہ، زکام اور گلے کی خرابی کان پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور کان میں در دہوتا ہے۔ حتی کہ دانتوں کا در دبھی کانوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ پس وہ نزلاتی ہے اور کان میں در دہوتا ہے۔ حتی کہ دانتوں کا در دبھی کانوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ پس وہ نزلاتی بیاریاں جن کے بیجہ میں کان سلسل بھاری رہنے لگیں اور قوت شنوائی متاثر ہوتی ہواور بیاریاں جن کے بیٹی شنوائی متاثر ہوتی ہواور مریض اونے اپنے گے میں بھی شروع ہو مریض اونے اپنے گے میں بھی شروع ہو جائے اور چھینکیں میں بھی آئیں تو مینگینم سے افاقہ ہوسکتا ہے۔ عموماً یہ علامتیں بھیکے ہوئے ٹھنڈ ب

چېره بالکل پهيکا، بے رونق اور زرد ہوجا تا ہے۔ايسے چېره ميں مينگينم بہت نمايال حثيت رکھتی ہے۔

' بخار کے ساتھ پھوڑ ہے نکلیں تو بھی مینگینم مفید ہے۔ معدے کی ہرقتم کی تکلیفوں میں کام آتی ہے۔خصوصاً اگر بھوک مٹ جائے اور کھانے پینے کی خواہش بالکل ختم ہو جائے تو اسے بحال کر دیتی ہے۔اس کے پیٹ درد میں آگے جھکنے سے آرام آتا

ہے۔ یہ کولوسنتھ (Colocynthis) کی بھی علامت ہے۔ اس کے مریض میں معدے کی کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور رہتی ہے۔ قبض ہوگی یا اسہال لگ جائیں گے یا پیچیش ہوجائے گی۔ معتدل حالت نہیں رہتی۔ عورتوں کو حیض کے فتم ہونے کے زمانے میں یا ویسے ہی خون کی کمی سے چہرہ پر متماہ شاور گرم ہوا کے جھونے محسوس ہوتے ہیں۔ اس میں سلفر، گریفائٹس اور کیکیسس وغیرہ بھی کام کرتی ہیں لیکن مینگینم بھی اچھی دوا ہے۔

جگر میں چر بی بڑھنے کے رجحان کو بھی مینگینم روکتی ہے۔ برقان اور پتے کی بیچھر یول میں بھی مفید ہے۔ ناف کے نیچے ہاکا سا تھچاؤ محسوس ہوتا ہے۔اگر بیشد ید ہوتو یہ پلمیم کی علامت ہوتی ہے۔

اگرگلاصاف کرنے کے لئے بار بار کھنکارنا پڑے تو مینگینم مفید ہوسکتی ہے۔ بیعلامت اور بھی بہت می دواؤں میں ملتی ہے۔ مثلاً ودھیا (Wythia)، ارجنٹم میٹ ،سلیشیا، فاسفورس وغیرہ مینگینم میں اس کی دیگر تکلیفوں کی طرح کھانسی بھی لیٹنے کے بعدختم ہوجاتی ہے۔ ہائیوس میں اس سے بالکل برعکس علامت ملتی ہے تینی لیٹنے پر کھانسی شروع ہوجاتی ہے۔ وہ بچیاں جو بہت زود حس ہوں ان میں بیعلامت بہت نمایاں ہوتی ہے۔ ارجنٹم مٹیلیکم میں بھی لیٹنے سے کھانسی کوآ رام آتا ہوں ان میں بیعی لیٹنے سے کھانسی کوآ رام آتا ورخت رفتہ رفتہ رفتہ کر در ہور ہے ہوں ان کی طاقت کو بحال کرنے کے لئے بھی مینگینم کارآ مد ہے۔ رفتہ رفتہ رفتہ کر در ہور ہے ہوں ان کی طاقت کو بحال کرنے کے لئے بھی مینگینم کی تکلیفیس بڑھ جاتی ہیں۔ مطوب موسم میں اور طوفان آنے سے پہلے مینگینم کی تکلیفیس بڑھ جاتی ہیں۔

دافع انژ دوائیں: کافیا۔مرکری طافت: 30سے 200 تک

140

ميڈورائينم

MEDORRHINUM

(The Gonorrhoeal Virus)

میڈورائینم سوزاک کے زہر سے تیار کی جاتی ہے۔ یہ دبی ہوئی موروثی سوزاک بیار یوں میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ موروثی سوزاک میں جومقام میڈورائینم کا ہے وہی موروثی سلفس میں سیفیلینم (Syphilinum) کا بیان کیا جاتا ہے۔ اگر یہ دوائیاں استعال نہ کی جائیں تو یہ بیاریاں زندگی کامستقل حصہ بن جاتی ہیں اور پیچھانہیں چھوڑتیں، بار بار جملہ کرتی ہیں۔ بعض بہت قابل ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ سلفس (آتشک) اور سوزاک بار بار جملہ کرتی ہیں۔ بعض بہت قابل ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ سلفس (آتشک) اور سوزاک فضروری نہیں ہے کہ کسی انسان کوخود یہ بیاریاں لاحق ہوئی ہوں، موروثی طور پران میں یہ علامتیں یائی جاسکتی ہیں۔

پہلے سفلس کا علاج بہت مشکل سمجھا جاتا تھا اور عموماً مرکری دے دی جاتی تھی مگر اب البرا مسلسل ایک مہینہ پینسلین (Penicillin) دی جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بیاری جڑوں سے اکھڑ جاتی ہے۔ ہومیو پیچھک نظریہ یہ ہے کہ سفلس جڑوں سے بھی نہیں اکھڑتی ، بلکہ مختلف بھیس بدل لیتی ہے اور جب اسے سازگار حالات میسر آئیں تو پھر اصلی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ جدید ترین ایلو پیچھک ریسر چ سے بھی یہ ہومیو پیچھک نظریہ درست ثابت ہوا ہے۔ ایڈز پرامریکہ میں ہونے والی ریسر چ کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایڈز کے بہت سے مریضوں کو اچا نک سفلس بھی ہوگیا حالا تکہ پہلے سفلس کا کوئی نشان موجود نہیں تھا۔ جب ان کے خاندانی حالات معلوم کئے گئے تو بعضوں کے متعلق تھنی طور پر علم ہوا کہ ان کے باپ دا دا میں سے کسی کوسفلس کی بیاری ہوئی تھی

اورمرکری کے استعال سے اسے دبادیا گیا تھا مگر بظاہر بینا پید بیاری مختلف عوارض کے بھیس میں موجود رہتا ہمیشہ جسم میں موجود رہت ہمیشہ جسم میں موجود رہتا ہمیشہ جسم میں موجود رہتا ہوئے ہیں جا گرا سے جڑ سے نہا کھیڑا جائے تو اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی بیار یوں کے علاج بھی سطحی ثابت ہوتے ہیں۔ ان دواؤں میں جو دبے ہوئے سوزاک کا قلع قمع کر سمتی ہیں ایک میڈورائینم ہے جس کی بہت تعریف کی جاتی ہے اور بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہر علاج میڈورائینم میٹر و حاکینہ کی بہت سے شروع کرنا چاہئے۔ اگر سوزاک کی دبی ہوئی علامتیں موجود ہوئیں تو میڈورائینم کی بہت او نجی طاقتیں انہیں اچھال کر باہر لے آئیں گی۔ اس کے نتیجہ میں بیاری کی جوشکل بھی ظاہر ہوگ اس کا علاج دراصل دبے ہوئے سوزاک کا علاج ثابت ہوگا اور اس کے بداثر ات ہمیشہ کے اس کا علاج دراصل دبے ہوئے سوزاک کا علاج ثابت ہوگا اور اس کے بداثر ات ہمیشہ کے لئے ختم ہوجائیں گے۔

دمہ کا بھی میڈورائینم سے بہت تعلق ہے۔ بچوں کا سوکھا بین، دمہ، دائمی نزلہ، داو اور خاص قسم کے مسے، وہ عمومی بیاریاں ہیں جوسوزاک کے دب جانے سے جسم میں زہر یلے رجحانات کے طور پر چھپی رہتی ہیں اور حسب حالات بھی بھی ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ ہرقتم کے مسے جوتھوجا کے قابو میں نہیں آتے ان میں میڈورائینم دینا ضروری ہوجا تا ہے۔

بعض عورتوں کوشادی کے بعد بعض تکلیفیں آگیرتی ہیں۔ مثلاً حیض کے ایام میں ہے۔

یا قاعد گی ، درداور اعصابی کمزوری وغیرہ ، انہیں بھی میڈورائینم کی ضرورت پڑسکتی ہے۔
میڈورائینم کا مریض شخت ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اسے بہت پسینہ آتا ہے اوراسی طرح بعض دفعہ اس کی ہتھیایاں جلتی ہیں مگر اس کے باوجود ہاتھ باری باری ٹھنڈ ہے بھی ہو جاتے ہیں۔
ہیں۔ بھی دایاں ، بھی بایاں اور بعض دفعہ دونوں ہاتھ شخت ٹھنڈے ہوجاتے ہیں۔

وجع المفاصل اور بائی کی عمومی در دول میں اگر علامتیں ملتی ہوں تو اسے بہت مفید بتایا جاتا ہے۔ اگر چہاس کی بہت ہی علامتیں عموماً سورج چڑھنے کے بعد سے سورج کے خروب ہونے تک رہتی ہیں کیکن بعض دوسری علامتیں رات کے وقت بہت بڑھ جاتی

ہیں۔ رات کو بڑھنے والی تکلیفوں میں بھوتوں یا مردہ لوگوں کا خوابوں میں آنا اور ساری رات ڈراؤنی خوابیں آتے رہنااس کی نمایاں علامت ہے۔ اسی طرح بیشاب کی تکلیفیں بھی رات کو بہت بڑھ جاتی ہیں۔ مریض کو بار باراٹھنا پڑنا ہے اور بعض دفعہ اس شدت سے بیشاب آتا ہے کہ کموڈ (Commode) تک پہنچنا بھی مشکل ہوجا تا ہے۔ ایسے مریضوں کے پراسٹیٹ گلینڈز لیخنی غدہ قدامیہ میں بھی ہرقتم کے ورم اور سوزش کی علامتیں ملتی ہیں۔

تھوجا بھی میڈورائینم سے ملتی جلتی دوا ہے اوراس میں بھی اکثر تکلیفیں آ دھی رات کے بعد بڑھتی ہیں۔ وجع المفاصل میں اگر پہلے میڈورائینم دیا جائے تو اصل علامتیں کھل کر باہر آ جاتی ہیں اورعلاج میں آسانی پیدا ہوجاتی ہے۔

میڈورائینم کی ایک علامت جسم میں سوئیاں چھنااور چھپا کی نکلنا ہے جس کا شور سے بھی ایک خاص تعلق ہے۔ اگر شور زیادہ ہواور اعصاب پر دباؤ ہوتو چھپا کی نکل آتی ہے۔ میڈورائینم میں پاؤں اور ٹانگوں کے ورم بھی ملتے ہیں۔ گھٹنے تک ٹانگیں بے صد ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسے مریضوں کے تلوے اتنے زود حس ہو جاتے ہیں کہ مریض تلوؤں کے بل چل ہی نہیں سکتا اور اسے گھٹنوں کے بل اپنے آپ کو گھٹٹنا پڑتا ہے یا پھر بہت احتیاط سے آہتہ آ ہتہ آہتہ تلووں پر دباؤ ڈالتے ہوئے چلنا شروع کرتا ہے اور چلنے سے جو گرمی بیدا ہوتی ہے اس سے پچھ دیر کے لئے چلنا آسان ہو جاتا ہے مگر بعد میں تلوؤں کی تکلیف پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

میڈورائینم کی علامات میں ہے بات بھی نمایاں ہے کہ وقت بہت آ ہستہ گزرتا ہے۔ بچوں یا لڑکیوں وغیرہ کو بیاحساس ہوتا ہے کہ ان کے بیچھے کوئی کھڑا ہے۔ ایک دم ڈر کے بیچھے د میکھتے ہیں جیسے کوئی بیچھے سے دیے پاؤں آ گیا ہو۔ یوں لگتا ہے جیسے بچھے چہرے انہیں جھا نک رہے ہیں۔ اس احساس کو دور کرنے کے لئے میڈورائینم کے علاوہ فاسفورس بھی اچھی دوا ہے۔ فاسفورس میں بھی بیاحساس پایا جاتا ہے کہ کوئی شخص چیزوں کے بیچھے چھیا ہوا مریض کوجھا نک رہا ہے۔ بیاریوں کے بعض زہروں کے اثر سے چیزوں کے بیچھے جھیا ہوا مریض کوجھا نک رہا ہے۔ بیاریوں کے بعض زہروں کے اثر سے

یاحساس پیدا ہوتا ہے۔

میڈورائینم میں اندھیرے سے ڈرنے اور گرنے کا خوف نمایاں ہوتا ہے۔ سرکی جلد میں تناؤ ہوتا ہے جیسے پٹی بندھی ہوئی ہو۔ میڈورائینم جلدی امراض اور سرمیں سخت سکری کی تکلیف میں بھی کامیاب علاج ہے۔ سکری کوانگریزی میں ڈینڈرف (Dandruff) کہتے ہیں۔ تکلیف میں بھی کامیاب علاج ہے۔ سکری کوانگریزی میں اور دونوں کا تعلق سوزا کی بیاریوں سے ہے۔ میڈورائینم کی بالوں کی علامات نیٹر م میور سے ملتی ہیں اور دونوں کا تعلق سوزا کی بیاریوں سے ہے۔ نیٹرم میور میں بال خشک اور بھر بھر سے ہوجاتے ہیں اور بہت شدت سے سکری پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات صرف میڈورائینم دینے سے ہی ان بیاریوں کا شافی علاج ہوجاتا ہے۔

بعض لوگوں میں معمولی سے وہی تناؤ سے بھی آنکھوں کے سامنے چیزیں تقرکنے لگتی ہیں اورنظر دھندلاس جاتی ہے اورا کی جگہیں گھہرتی ۔ کالے یا بھورے دھے بھی نظر آنے لگتے ہیں اور بعض دفعہ دودو چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ اگر بیعلامتیں مزمن ہوجا ئیں تو میڈورائینم بہت اچھی دوا ہے۔ اگر وہمی اور خیالی چیزیں نظر آنے لگیں، آنکھوں میں تناؤ ہو، اعصاب تھنچے ہوئے محسوس ہوں اور آنکھوں کی پلکیں جھڑ جائیں تو بھی میڈورائینم سے علاج ہوسکتا ہے۔ ایپس کی طرح میڈورائینم میں بھی آنکھوں کے نیچسوجن ہوتی ہے۔ ایپس میں بے حصہ سوج کرنے چلئک جاتا ہے۔ آنکھوں کے نیچ تھیلیاں سی بن جانا ایپس کا خاص نشان ہے جبکہ میڈورائینم میں عام سوجن یائی جاتی ہو۔

میڈورائیم مزمن نزلم کے لئے بھی مفید ہے لیکن یہ بہت اونچی طاقت میں دی جائے تو کام کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوزا کی اثر اندر بہت گہرائی تک موجود ہے اور عام دوائیوں کی پہنچ سے باہر ہے۔ اگر مزمن نزلہ اس وجہ سے ہوتو میڈورائینم CM میں یا کم از کم دس ہزار طاقت میں دی جائے۔ ایسے پرانے بہنے والے نزلہ میں بیاعلی میں یا کم درجہ کی دواہے۔ اگر اعصائی تناؤ کی وجہ سے غیر معمولی بھوک لگے اور گھبرا ہے کی وجہ سے کیے کھانے کو دل جا ہے لیکن کھانا کھا کر مریض کو تسکین نہ ہو، کچھ نہ کچھ اور کھانے کو دل جا ہے۔ اسی طرح ایسی پیاس محسوس ہو جو یانی پینے کے باوجود نہ نجھے تو ایسی کیفیت جا ہے۔ اسی طرح ایسی پیاس محسوس ہو جو یانی پینے کے باوجود نہ نجھے تو ایسی کیفیت

میں بھی میڈورائینم مفید ہے۔ غیر معمولی بھوک کی علامت سورائینم میں بھی ملتی ہے لیکن سورائینم کی بھوک رات کے وقت زیادہ بے قرار کرتی ہے۔

حبگر کی خرابی کی وجہ سے پیٹ میں پانی بھرجائے تو میڈورائینم مفید ثابت ہوتی ہے۔ بن ران کے گلینڈز کی خرابی اور سوزش میں بھی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔

اس کی قبض کی علامت ہے کہ گول اور سخت اجابت ہوتی ہے اور پیشاب گہرے رنگ کا، کم مقدار میں اور سخت بد بودار ہوتا ہے اور بہت کم آتا ہے۔ امکان ہے کہ ایسے مریض جن کے جوڑوں میں درد کی وجہ سے چلنے پھرنے میں دقت ہواوروہ لنگڑے سے ہوجا کیں، ان میں بھی میڈورا کینم مفید ثابت ہو۔ کثرت پیشاب جوشوگر کی وجہ سے نہیں بلکہ اعصابی تکلیف کی وجہ سے ہو،اس میں بھی بددوا بہت مفید ہے۔

گردے کے درد کا شدید دورہ پڑے تواس میں اولین نسخدا کیونا ئٹ اور بیلا ڈونا ملا کردیا ہے۔

گردے کے درد کا شدید دورہ پڑے تواس میں اولین نسخدا کیونا ئٹ اور بیلا ڈونا ملا کردیا ہے۔

اگر دونوں کو 1000 کی طاقت میں ملا کر دس دس کے وقفہ سے دوخورا کیس دیں تواللہ کے فضل سے بہت سے مریضوں کوفوری آرام آجا تا ہے۔ اگر ایسے مریض کی تکلیف گری کی بجائے سردی سے بڑھتی ہوتو پھرمیگ فاس 6x بار بار دینے سے یا کولوسنتھ ایک لاکھ کی طاقت میں صرف ایک خوراک دینے سے بعض دفعہ جادو کی طرح اثر ہوتا ہے۔ درد کے اس دورہ کے رفع ہونے کے بعد گردے کی پھریوں کا مستقل علاج ہونا چاہئے۔ اگر گردے کا درد پھریوں کی وجہ سے نہ ہو بلکہ سوزش کی وجہ سے ہوتواس کی مستقل دوا تلاش کرنی چاہئے جومیڈ ورائینم بھی ہوسکتی ہے۔

میڈ ورائینم کا بہرے بن سے بھی تعلق ہے۔ بعض اوقات کان میں ایسی خرابی ہوتی ہے جس کا اعصاب سے تعلق ہوتا ہے اور بظا ہر کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ۔ ایسا بہرہ بن جو مزمن ہوجائے اور بڑھتا چلا جائے اس میں میڈ ورائینم استعال کر کے دیکھنا چاہئے ۔ میڈ ورائینم بروفت دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ سلفر کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہئے ۔ میٹ نے بعض مریضوں کو جن میں کان کی ہڈی کی خرابی کی وجہ سے تیزی سے چاہئے ۔ میں نے بعض مریضوں کو جن میں کان کی ہڈی کی خرابی کی وجہ سے تیزی سے

بہرہ پن بیدا ہور ہا تھاسلفر CM استعال کروائی۔اس سے ہڈی کی بیاری ختم ہوگئی اور بہرہ پن جہاں تک پہنچاتھاو ہیں رک گیا۔

میڈورائینم میں کھانا چباتے وقت دانت بہت حساس ہو جاتے ہیں۔اس طرح منہ میں زخم جو کئے بھٹے موٹے کناروں والے ہوں، بننے لگتے ہیں۔ ٹخنوں کی مزمن تکلیفوں میں بھی میڈورائینم کارآ مدثابت ہوتی ہے۔

بعض اوقات اندرونی اعضاء کی مردانه اور زنانه بیماریوں میں جو د بے ہوئے سوزاک کی آئینه دار ہوں بالکل متضاد علامات واقع ہوتی ہیں۔ جذبات میں یا تو غیر معمولی ہیجان پیدا ہوجا تا ہے یا پھر جذبات بالکل ختم ہوجاتے ہیں بلکہ جنسی تصور سے ہی نفرت ہوجاتی ہے۔مریض درمیانی حالت میں نہیں رہتا، یا ایک انتہا پر یا دوسری انتہا پر۔

دمہ سے بھی اس دوا کا گہراتعلق ہے۔ دمہ کے لئے عموماً نیٹر مسلف بہت اہم دواہم جی جاتی ہے۔ جن بچوں میں سوزاک کی علامتیں موروثی طور پر پائی جائیں ان کے دمہ میں اکثر نیٹر م سلف مفید ہے لیکن علامتوں کو واضح کرنے کے لئے میڈورائینم بھی دینی پڑتی ہے۔ بعض اوقات نیٹر مسلف اثر نہیں کرتی اور میڈورائینم بہتر کام کرتی ہے۔ کلکیر یا سلف بھی دمہ میں ایک بہت نمایاں اثر دکھانے والی دوابتائی جاتی ہے۔ اگر بلغم بہت گہراجم جائے اور نکا لئے میں سخت دفت پیش آئے اور دوسری علامتی دوائیں کام نہ کریں تو میڈورائینم بھی شفا کا موجب ہوسکتی ہے۔ اگر بلغم بھی شفا کا موجب ہوسکتی ہے۔ اگر بلغم کے لئے کالی آئیوڈ ائیڈ اور آرسنگ آئیوڈ ائیڈ بھی فائدہ مند ہیں۔ اگر بلغم اکھڑ نے سے زخم ہوجائیں اور رسنے والے ناسور کی شکل اختیار کرلیں تو کالی آئیوڈ ائیڈ زیادہ مفید ہے۔ اگر زخم بہت گہرانہ ہواور سطی ہوتو آرسنگ آئیوڈ ائیڈ اچھا کام کرتی ہے۔

جوڑوں کی تکلیف میں جس میں بجلی کے کوندوں کی طرح درد کی لہریں اٹھیں اور چھاتی میں زیادہ شدت سے درد محسوس ہو، میڈورائینم مفید بتائی جاتی ہے۔ لیکیسس کی طرح میڈورائینم میں بھی سینہ کے بائیں طرف جلن کا حساس ہوتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے منگ ایک طرف ہو جائیں اور اعصاب دب جائیں، ٹائلوں کی طرف اتر نے والی

دردی ہوں یا شیاٹیکا (Sciatica) ہوجائے توان سب تکلیفوں میں گہری چھان بین سے علامتی دواکی تلاش کرنی چاہئے۔ اگراس طرح تشخیص نہ ہوسکے یا تشخیص کام نہ کرے تو پھر میڈ درائینم کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ اونچی طافت میں دے کر ہفتہ دس دن تک اس کا اثر دیکھنا چاہئے۔ ایک دفعہ ایک مریض کومیں نے اس کی علامات کے لحاظ سے دواد یخے کی کوشش کی ۔ وہ کولوسنتھ کا مریض تھا۔ اسے بہت اچھا فائدہ ہور ہا تھا لیکن ایک مقام پر مزید فائدہ رک گیا تو میں نے کولوسنتھ اونچی طافت میں دینے کی ہوش کی جائے اسے میڈ ورائینم دے دی۔ اس کی پہلی علامتیں فوراً کولوسنتھ اونچی طافت میں دینے کی بجائے اسے میڈ ورائینم دے دی۔ اس کی پہلی علامتیں فوراً رکھتا تو ہوسکتا ہے کہ اس سے بی علاج جاری رکھتا تو ہوسکتا ہے کہ اس سے اس کی بیاری جڑ سے اکھڑ جاتی مگر اس مریض میں بھی صبر کی کمی تھی۔ اس کئے میڈ ورائینم کے بعد پھر کولوسنتھ دینا زیادہ مناسب سمجھا اور اس دفعہ اس نے اثر بھی پہلے اس کے میڈ ورائینم کے بعد پھر کولوسنتھ دینا زیادہ مناسب سمجھا اور اس دفعہ اس نے اثر بھی پہلے سے بہتر دکھایا۔ بعد کا مجھے علم نہیں کہ اس سے اسے کمل شفا ہوگئ تھی یا نہیں۔

جب کمرکی تکلیف کا ٹانگوں پر اثر ہوتو ایسا بھاری پن پیدا ہوجا تا ہے کہ لگتا ہے کہ ٹانگیں ککڑی کی بنی ہوئی ہیں۔ یہ بھی میڈورائینم کی ایک پہچان ہے۔ بعض اوقات شنجے سے بھی دوران خون بند ہوجا تا ہے اوراس دوا میں بھی شنج پایا جا تا ہے، خاص طور پر بینڈ لیوں میں۔ اگر زیادہ در کھڑے رہنے سے شنج ہوجائے تو میگ فاس بھی مفید ہے لیکن میڈورائینم میں شنج تلووں میں بھی ہوتا ہے اور ایا واں مڑنے اوراندر کی طرف سکڑنے کا احساس ہوتا ہے۔

میڈورائینم کی کئی تکالیف سورج کی تمازت سے بڑھتی ہیں۔مرطوب موسم میں اور سمندر کے کنارے آ رام آتا ہے۔لیکن بعض تکلیفیں رات کو بڑھتی ہیں جن کا اوپر تفصیلی ذکر آچکا ہے۔

طانت: 30 شے CM تک

مرکری 591

141

مرکری کے مرکبات

MERCURIUS

مرکری (پارہ) بہت اہم اور گہرااثر رکھنے والی دواہے جوجسم کے ہر حصہ اور خلیہ پراثر انداز ہوتی ہے۔ اگر مرکری کا زہرایک دفعہ جسم میں داخل ہوجائے تو اس کے بداثر ات سے خوات حاصل کرنا اگر ناممکن نہیں تو امر محال ضرور ہے۔ یہ بھی آ رسنک کی طرح بہت گہرے اور دائمی اثر ات کا حامل ہے لیکن آ رسنک کا زہرا ہے بداثر ات کو آئندہ نسل میں منتقل نہیں کرتا بلکہ تمام تر اثر ات اس ایک وجود میں سمیٹے رکھتا ہے جسے آ رسنک دیا گیا ہو۔ وہ جب تک زندہ رہے گا آرسنک کے اثر ات کے ساتھ زندہ رہے گا۔ جب مرجائے گا تو ان کے سمیت مٹی میں وفن ہو جائے گا اور اس کا ایک ذرہ بھی بداثر کے طور پر اگلی نسل میں منتقل نہیں ہوگا۔ مگر مرکری الیمی خطرناک چیز ہے کہ اس کے بداثر ات نسل درنسل جاری رہتے ہیں۔

آ تشک کی بیاری کا بھی بعینہ بہی مزاج ہے اس کئے مرکری آ تشک کی چوٹی کی دواہمجھی جاتی ہے۔ آ تشک کے لئے ایک اور دواسیفیلینم (Syphilinum) بھی بہت مفید ہے جوسفلس (آ تشک) کے مادہ سے ہی تیار کی جانے والی دوا ہے۔ اگر یہ بہت اونچی طاقت میں دی جائے تو فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اگر براہ راست فائدہ نہ بھی پہنچائے تو دوسری دواؤں کومؤثر کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اگر براہ راست فائدہ نہ بھی پہنچائے تو دوسری دواؤں کومؤثر کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور مرکری جیسی دواؤں کے ذریعہ علاج کوآسان بنادیتی ہے۔ مرکری کی اس بنیادی صفت کو ذہن شین کرلیں کہ یہ وہ وہ رہے جو عمر بھرساتھ دیتا ہے اور اگلی نسل میں بھی چاتا ہے۔ بنیادی صفت کو ذہن شین کرلیں کہ یہ وہ کھا گیا ہے۔ تمام زہروں میں منفی اثر ات کی گہرائی کے لحاظ سے یہ سب سے خطرنا کے ہے۔ اس کا اثر ہڈیوں اور اعصابی خلیوں پر بھی پڑتا ہے۔ خون ، جلد ، دل ،

اندرونی جھلیوں اوراعصابی ریشوں کو متاثر کر کے ہڈیوں میں اتر جاتا ہے اور پھر دماغ پر بھی حملہ کرتا ہے۔ زمانہ قدیم میں ایلو پیتھک ڈاکٹر مرکری سے براہ راست آتشک کا علاج کرتے تھے جس سے عارضی فائدہ اور دائمی نقصان پہنچنا تھا اور آتشک دب کر نظام تولید کے ذریعہ آئندہ نسلوں میں منتقل ہونے گئی تھی۔ علاوہ ازیں پرانے اطباء بھی مرکری کو مختلف بھاریوں کے علاج میں بدھڑک استعمال کرتے تھے۔ مرکری کا بے جااور زیادہ مقدار میں استعمال آتشک کی علامتیں پیدا کر دیتا ہے۔ مرکری اعصاب کے خلیوں کو کھا جاتا ہے اور ناک کی ہڈیاں اور انگلیاں وغیرہ گئے سڑنے لگتی ہیں۔ کوڑھ کی علامات بھی ظاہر ہوجاتی ہیں جبکہ اس کا ہومیو پیتھک استعمال شفاد ہے کی طاقت رکھتا ہے۔

مرکری کی عام حالات جوہومیو پیتھک ڈاکٹروں کے زیادہ زبان زدعام ہیں ان میں منہ سے رال کا بہنا، بہت پسینہ آنا، گلے کی خرابی اورخوفنا ک بد بو وغیرہ ہیں۔ مرکری کا مریض ہمیشہ متعفن ہوتا ہے اس سے ایسی خطرنا ک اور تیز بو آتی ہے کہ اس کا بیان کرنا بہت مشکل کام ہے، صرف تجربہ سے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اگر مرکری کا صحیح استعال کیا جائے تو اس کی بیاریاں اندر سے اچھل کر باہر جلد پر نمودار ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات شدید خارش اور رسنے والے زخم اور ناسور بیدا ہو جاتے ہیں جن کی سطح سفیدی مائل ہوتی ہے۔ عموماً جلد پر سفید رنگ کے چٹاخ بن جاتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک ایسا مریض آیا جس کی رانوں کے اردگر دنہایت گہرے اور تکلیف دہ سفید رنگ کے ناسور تھے۔ سی دواسے آرام نہ آرہا تھا۔ میں نے اسے مرکری استعال کروائی۔ اللہ کے فضل سے ایک ماہ سے بھی کم عرصہ میں بالکل ٹھیک ہوگیا۔

مرکری کی ایک علامت یہ ہے کہ جسم پر سفید رنگ کے چٹاخ پڑ جاتے ہیں جو پھلبہری کی طرح ہوئے ہیں جو پھلبہری کی طرح ہوئے ہیں ہوتے اور پھلبہری کی طرح ہوئے اور پھلبہری کی طرح ہوئے اور پھلبہری کی طرح ہوئے اور پھلبہری کی جی پھیلئے نہیں ہیں۔اگر مرکری کی مزاجی علامتیں ملتی ہوں تو بعض دفعہ یہ ہے پھلبہری کی بھی بہت مؤثر دوا ثابت ہوتی ہے۔ایک مریض کا ساراجسم پھلبہری کے داغوں سے بھر گیا تھا۔ اس میں چونکہ مرکری کی دوسری علامات موجود تھیں میں نے ایک ہزار کی طاقت میں مرکری

استعال کروائی۔ایک ہفتہ میں اتنا نمایاں فرق پڑا کہ جبوہ مجھے ملنے آیا تو میں اسے پہچان بھی نہ سکا، سب داغ غائب ہو گئے اور دوبارہ بھی اسے بیم مرض نہیں ہوا۔ جب مرکری جلد پر اثر دکھاتی ہے تو اندرونی طور پر غدودوں پر کوئی بدا ثر ظاہر نہیں ہوتا لیکن جب غدودوں پر اثر کرتی ہے تو جلد پر ضرور کوئی بیماری ظاہر ہوتی ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ غدودوں کوٹھیک کر کے بیماری کو باہر دھکیلا گیا ہے۔ جماعت احمد ہے کہ بانی جن کو جماعت احمد ہے کمشیلی طور پر پہلے ہے کا فانی کو باہر دھکیلا گیا ہے۔ جماعت احمد ہے کہ بانی جن کو جماعت احمد ہے کا فانی لیمین کرتی ہے، انہوں نے اپنے وقت میں ایک ایسا اہم انکشاف فر مایا جس سے ہومیو پیتھک طبیبوں کا ہومیو پیتھی پر ایمان بڑھ جانا چا ہئے۔ آپ نے فر مایا کہ مجھے روحانی ذریعہ سے بیمعلوم ہوا ہے کہ اگر غدودوں کی بیماریوں کو کسی دواسے جلد کی طرف دھیل دیا جائے تو غدودوں کو بعض ہوا ہے کہ اگر غدودوں کی بیماریوں کو کسی دوا سے جلد کی طرف دوائیں ہیں جو اس مقصد کے لئے اختراکی خطرناک بیماریوں ہوئی ہیں۔ آپ نے مزید کھی دودوائیں ہیں جو اس مقصد کے لئے مکمر کری اور سلفر کا ذکر کیا ہے اور ہومیو پیتھی میں بھی یہی دودوائیں ہیں جو اس مقصد کے لئے مکمر سے استعال کی جاتی ہیں۔ آپ نے مزید کیما کہ میرے دل میں بہت سے شفا کے داز مضمر ہیں۔

مڑیوں کی دردیں جومستقل بیاری کی شکل اختیار کرلیں ان میں مرکری مفید ہے کین اس کی پہچان میہ ہے کہ ان مڈیوں میں جہاں جلد اور مڈی کے درمیان گوشت کی زیادہ تہیں نہ ہوں وہاں دردیں نمایاں طور پرمحسوں ہوتی ہیں یعنی جلد سے چمٹی ہوئی مڈیوں میں درد کا احساس ہوتا ہے۔

غدودوں اور ہڈیوں میں اگر ناسور مزمن ہو جائیں تو مرکری کوفراموش نہیں کرنا چاہئے۔ مرکری کی خاص علامت یہ ہے کہ جوڑوں میں درد کے ساتھ پیپ بننے کا رجحان بھی ہوتا ہے۔ چونکہ مرکری کے مریض کا مزاج آتشک کے مریض کے مشابہ ہوتا ہے اس لئے ہڈیوں میں ناسورا ورسوزش کے علاوہ پیپ بھی بنتی ہے۔ ڈاکٹر عموماً اس پیپ کو پچکاری کے ذریعہ باہر نکالتے ہیں۔ اگر مرکری کوچھوٹی طاقت میں شروع کر کے آہستہ آہستہ طاقت بڑھائی جائے تو بہت مفید نتائج ظاہر ہوں گے۔ایک دم شروع میں اونچی طاقت

میں مرکری دینا خطرناک ثابت ہوسکتا ہے۔ مزمن بیاریوں میں دواکی طاقت کورفتہ رفتہ اونچا کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کیکن علاج کا آغاز چھوٹی طاقت سے کرنا چاہئے۔ یہی محفوظ طریق علاج ہے۔

مرکری کا ایک خاصہ بیہ ہے کہ جوڑوں اور بائی کے در دوں میں ورم اور سوزش ضرور ملتے ہیں۔بستر کی گرمی اور پسینہ آنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ پسینہ بہت آتا ہے کیکن اس سے مریض بہتر محسوس نہیں کرتا۔ بار بار بسینہ آتا ہے لیکن بے چینی اسی طرح قائم رہتی ہے۔ اگر گلے کےغدودمتورم ہوں اور بخار ہوجائے توپیینہ آنے سے بخارٹوٹنے کی بجائے مرض اور بھی گہرائی میں اتر جاتا ہے۔مرکری کی دوتین خوراکیں دینے سے دبا ہوا بخار پہلے ابھرتا ہے اور پھرٹوٹے لگتا ہے۔باربارکاپسینہ آنابندہوجاتا ہےاورایک ہی دفعہ بہت کل کرپسینہ آتا ہے۔اس بخارمیں جس کا ایک علاج مرکری بھی ہے بچوں کی آئکھیں ایسی چیکیلی ہوجاتی ہیں جیسے وارنش کر دیا گیا ہو۔ایسی ہی آ تکھیں خسر ہ اور کا کڑالا کڑا وغیرہ میں بھی ملتی ہیں جب تک ان کے دانے یا چھالے کھل کرا بھرنہ آئیں آنکھوں کی بیہ چمک باقی رہتی ہے۔ بچوں کے سانس میں سخت بوآنے لگتی ہے اور انہیں سرسام بھی ہوجا تا ہےاورمختلف نظار نظر آتے ہیں۔اگر مرکری کام نہ دیتو ہیپر سلف دینی جاہئے۔اگروہ بھی کام نہآ ئے تو پھرسلیشیا خدا تعالیٰ کے فضل سے ضرور شفا کا موجب ہوجاتی ہے۔ ان تین دواؤں کے دائر ہے میں عموما مرض قابومیں آجا تا ہے۔ میں اس قشم کی بیاریوں میں ایک بائيوكيمك نسخه بھى استعال كرتا ہوں۔ نيٹرم فاس، فيرم فاس، سليشيا، كالى ميور، كلكيريا فاس اورا گر گلے پھولے ہوئے ہوں تو کلکیریا فلور ملا کراس مسچر کی خوراک باربار دینی جاہئے۔ یہ نسخدا کثر مرکری ضرور دی جائے مگر ہیر سلف کے بعد۔

اگرجلد پرزخم بنخ لگیں جو ناسور کی شکل اختیار کرلیں اور ان کے کنارے ابھرے ہوئے ہوں اور خدشہ ہو کہ گینگرین نہ ہو جائے تو اس صورت میں مرکسال کی بجائے

مرک کارزیادہ بہتر دوا ہے۔ان دونوں کی علامتوں میں نمایاں فرق یہ ہے کہ مرکسال نسبتاً نرم لکی مزمن دوا ہے۔مرک کار کی بیار یوں میں شدت پائی جاتی ہے اور یہ مقابلتاً زیادہ تیزی سے اثر کرتی ہے۔ حاد اور مزمن دونوں بیار یوں میں اس کا تیز اثر کرنا ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔لبی چلنے والی پیچیش جس میں آؤں اور خون آر ہا ہو، مرکسال دیں۔مگر مرک کاراس وقت فائدہ دیتی ہے جب پیچیش کا فوری نوعیت کا حملہ ہوا وراجابت کے با وجود در دختم ہونے میں نہ آئے اور خون کا اخراج مسلسل ہونے گئے۔

مرکری کا مزاج بدلتا رہتا ہے۔ بیاریوں کی شدت میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ بلڈ پریشر بھی زیادہ ہوجاتا ہے اور بھی کم ۔ایسا بخار جواجا تک زیادہ ہوجائے اوراجا نک کم ہو جائے بعنی کسی ایک جگہ قرار نہ پکڑے تو اس کے لئے مرکسال بھی ایک امکانی دواہے جس کا جائزہ لیناچاہئے۔

مرکزی میں گینگرین کی علامت ہونٹوں، گالوں اور مسوڑھوں پر ظاہر ہوتی ہے۔ جلد سیاہ ہوکر بھیا نک شکل اختیار کر لیتی ہے۔ آتشک میں بھی انہی جگہوں پر بیاری کی علامتیں بھیا نک رنگ میں ظاہر ہوتی ہے۔ناک بھی متاثر ہوتا ہے اور اس کی ہڈیاں اندر سے کھائی جاتی ہیں۔ منہ کے ناسور بھی مرکزی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

جب مرکری کی علامات بڑھ جاتی ہیں توعمومی نقامت سے ہاتھ کا پینے لگتے ہیں اور پچھ اٹھانے کی طاقت نہیں رہتی ۔ چائے کی پیالی اٹھانی بھی مشکل ہوجاتی ہے۔ اور جات

مرگی سے ملتی جلتی بچوں کی بیاریوں اور اعضاء کی بے اختیار حرکت میں جو بلاارادہ شروع ہوجائے،مرکری ایک امکانی دواہے۔

مرکری کے مریض کی طبیعت میں جلد بازی پائی جاتی ہے اور گفتگو میں تیزی آ جاتی ہے۔ صبر کا فقدان ہوتا ہے اور وہ ہر کام بہت جلد کرنا چا ہتا ہے۔ اس کا غصبے بھی آ جاتی ہے۔ اگر پاگل بن کا رجحان ہوتو بہت خطرناک ثابت ہوسکتا ہے کیونکہ ایسے مریض کسی جذبے سے مغلوب ہوکر فوراً کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں یا خودکشی کر لیتے ہیں۔ یے حدید پیشان اور بے چین رہتے ہیں۔ یا گل ہونے یا مرنے کے وہم میں مبتلا

ہوجاتے ہیں۔ حوصلہ کمزورہوجاتا ہے۔ شکی مزاج ہوتے ہیں۔ زندگی سے تھک جاتے ہیں۔ ان
سے کوئی بات پوچھی جائے تو بہت آ ہسگی سے اور گھہر کر جواب دیتے ہیں۔ بیا دداشت کمزور ہو
جاتی ہے اور سر میں کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ مرکری کے سر درد کا تعلق دیے ہوئے اخراجات
سے ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر پاؤں کا پسینہ بھی بند ہوجائے یا نزلہ اچا نک خشک ہوجائے تو سر درد
شروع ہوجائے گا۔ حیض کا خوان رک جائے تو سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ کمر کے بل لیٹنے سے
سر میں چکر آنے گئے ہیں۔ سرکے گرد پٹی ہی بند ھے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ بائیں کنیٹی میں درد
ہوتا ہے۔ کھویڑی میں دباؤاور گھٹن محسوس ہوتے ہیں۔ جلن اور خارش بھی یائے جاتے ہیں۔

مرکری کی بیاریاں سردی اورگرمی دونوں موسموں میں بڑھ جاتی ہیں۔ ہوا کا جھونکا بھی نا قابل برداشت ہو جاتا ہے۔ اگر خسرہ وغیرہ کے بعد بچوں میں سر بڑھنے کی علامت نظرآ ئے تو مرکری اس رجحان کوفوراً ختم کردیتی ہے۔

مرکری کے مریض کی جلد کا رنگ مٹیالا ہو جاتا ہے۔ خارش اور ایگزیما کے اخرات اور ایگزیما کے اخراجات میں بوکی علامت نمایاں ہوتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے۔ زخموں کے کنارے اٹھے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان پر سفید جھلی ہی آ جاتی ہے۔ رات کو جلد کی تکلیفیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ بسترکی گرمی بیاریوں کو بڑھا دیتی ہے۔

آ تکھوں میں سوزش ، جلن اور سرخی پائی جاتی ہیں۔ پانی بہتا ہے۔ آتکھوں کے سامنے سیاہ و ھے نظر آتے ہیں۔ آگ کی روشنی کی طرف دیکھنے سے آشوب چٹم کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ آتکھوں کے گرداور کنیٹیوں میں در دہوتا ہے۔ نظر دھندلا جاتی ہے۔ آتکھ کے پردہ (کورنیا) پر سوزش ہو جاتی ہے۔ روشنی سے بہت زود حسی پائی جاتی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں آئکھ دکھنے کی سب علامتیں مرکری میں ملتی ہیں۔ اگر کوئی خاص علامت کسی اور دواکو واضح کرنے والی نہ ہوتو مرکسال کو آزمانا چاہئے۔ اگر سورج گرئین کے دوران سورج کو دیکھا جائے تو آئکھ کا بردہ ریٹینا (Retina) سخت متاثر ہوتا ہے جس کاعلم فورا نہیں ہوتا۔ گی سالوں میں آ ہستہ آ ہستہ آرات ظاہر ہوتے ہیں۔

جگہ جگہ کا لے دھے نظر آنے لگتے ہیں۔ بھی دائیں آنکھ کی نظرختم ہوجاتی ہے اور بھی بائیں گی۔ مریض رفتہ رفتہ بالکل اندھا ہوجاتا ہے اور ایسے اندھے بن کا کوئی علاج معلوم نہیں۔ آج کل شعاعوں کے ذریعہ علاج کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اس سے عارضی فائدہ ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں مرک کا رایک لا کھ طاقت کی دوئین خوراکیں ایک ایک ماہ کے وقفہ سے اللہ کے فضل سے بہت فائدہ پہنچاتی ہیں۔ مرض جہاں تک پہنچ چکا ہو وہیں گھہر جاتا ہے۔ لیکن اکھڑے ہوئے ریٹینا کو دوبارہ جوڑنا ممکن نہیں اس لئے لیزر (Laser) کے اپریشن کی لازماً ضرورت پڑتی ہے۔ بعض ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ اگر ایسے مریضوں کو مرکسال جھوٹی طاقت میں دیا جائے تو ریٹینا کی بہت تی بیاریاں ٹھیک ہوجاتی ہیں۔ اس سلسلہ میں مزید تجربات کرنے چاہئیں۔ جھے اس کا کوئی تجربہیں۔

کانوں کی بیار بول میں مرکری کی خاص علامت پیپ کی بد بواوراس کا رنگ ہے جو سفید ہوتا ہے یا گہرے سبزرنگ کا گاڑھا مواد کان سے نکلتا ہے۔اندرونی اور بیرونی کان میں ورم ہوتا ہے۔اس سے کان کے پردہ میں شگاف ہوجائے تو قوت سامعہ متاثر ہوتی ہے۔

بعض اوقات عام نزلیم میں بھی مرکسال سے فوری فائدہ ہوتا ہے لیکن یہ دوانزلہ کا سطحی علاج کرتی ہے، مزمن دوانہیں ہے اس لئے اس پر بنانہیں کرنی چاہئے ۔ اس کی بجائے عام نزلہ کے رجحان میں، جس کو مرکری سے آرام آئے، مستقل طور پر کالی آئیوڈ ائیڈ دینی چاہئے ۔ کالی آئیوڈ ائیڈ کا ان گہری وجوہات سے تعلق ہے جو نزلاتی بیاریاں بیدا کرتی ہیں لیکن نزلاتی بیاریوں میں صرف یہی ایک دوا کافی نہیں ہے اور بھی متعدد دوائیں کام آسکتی ہیں۔

ڈاکٹر کینٹ نے مرکزی کے بارے میں متنبہ کیا ہے کہ اسے جلدی بیاریوں میں بارباراستعال نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اگر ایسی بیاریوں میں اس کا زیادہ استعال کیا جائے تو یہ باقی رہ جانے والے بدا ثرات چھوڑ جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ مرکزی کا صرف ان مخصوص جلدی امراض سے تعلق ہو اور مریض کے سارے مزاج سے مطابقت نہ رکھتی ہو اس لئے

ملتی جلتی امراض تو ٹھیک ہوجا ئیں مگرجسم کے باقی عوارض کی علامتیں مبہم ہوجا ئیں۔ دانتوں کی بیار بول میں بھی مرکری بہت مفید ہے۔ دانت بھر بھرے ہوکر مسوڑھوں سے الگ ہوجاتے ہیں اور ان کے درمیان بدبودار مادہ جمع ہونے لگتا ہے۔ لہذا یا ئیوریا میں مرکری مفید ثابت ہوتی ہے۔ دانتوں کا سیاہ پڑ جانا اور جڑوں سے کھایا جانا کرئیوزوٹ کےعلاوہ مرکسال کے دائر ہ میں بھی ہے۔اگر دانتوں کی جڑیں کالی ہور ہی ہوں توسٹفی سیگریا، مرکسال ہے بہتر کام کرتی ہے۔وہ بیج جنہیں آتشک کا مادہ وراثت میں ملا ہوان کے دانت شروع میں ہی گل کر کالے ہوجاتے ہیں۔زبان موٹی اور پھیلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔اس کےاطراف میں دانتوں کے نشان بن جاتے ہیں۔ منہ میں گہرے ناسور بننے کار جحان یایا جاتا ہے۔ چبانے اور چھونے سے مسوڑ ھوں میں در دہوتا ہے۔ منہ سے انتہائی خطرناک بدبو آتی ہے۔ جو سارے کمرے میں محسوں کی جاسکتی ہے۔مرکر <mark>ی میں منہ کا مزہ دھات کی طرح کا</mark> ہوجا تا ہے۔ گلے میں سرخی اور سوزش یائے جاتے ہیں۔ ہروقت نگلنے کی طلب رہتی ہے کیونکہ منہ میں بہت رطوبت بنتی رہتی ہے۔موسم میں جوبھی تبدیلی واقع ہو،اس سے گلے میں سوزش اورجلن شروع ہوجائے، گرم چیزیینے سے تکلیف بڑھ جائے، مائع چیزوں کے نگلنے میں دفت محسوں ہواور ہر وفت گلے میں کچھ تھنسے ہونے کا احساس رہے جیسے ہیپر سلف میں پایا جاتا ہے تو بیسب علامتیں مجموعی طور پرمرکری کا مطالبه کرتی ہیں۔

مرکری کے مریض کی بھوک یا تو بہت بڑھ جاتی ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے۔
گوشت، کافی اور چکنائی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ مسلسل بھوک کے ساتھ کمزوری کا احساس
بھی بڑھتا جاتا ہے۔ دودھاور میٹھی چیزوں سے معدے کی تیز ابیت بڑھ جاتی ہے۔ ٹھنڈی
چیزیں پینے کی بہت خواہش ہوتی ہے۔ معدہ میں جلن ، سوزش اور چھونے سے درد
نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں بیجی لگ جاتی ہے۔ ڈکار بھی آتے ہیں۔ معدہ میں تناؤ پیدا
ہو جاتا ہے۔ جگر کے مقام پر سوئیاں سی چھتی ہیں۔ دائیں طرف لیٹنے سے تکلیف بڑھتی

ہے۔ پیچش اور پیٹ در د جس میں ڈنک مار نے کا احساس ہو، یہ سب علامتیں مرکری میں پائی جاتی ہیں۔مرک کارمیں مثانے پر بھی اثر پڑتا ہے۔ دکھن اور جلن کا احساس اور پیشاب مقدار میں بہت تھوڑا، پیشاب میں رکاوٹ پیدا ہوجاتی ہے اور جلن ہوتی ہے،ساتھ ہی پیچش بھی شروع ہوجاتی ہے۔ یہ علامتیں اکٹھی ہوجائیں تو مرک کارکوتقریباً بیشی دوا ہجھنا چاہئے۔

گرمیوں میں اچانک پیچیش شروع ہوجائے ایکونائٹ اورا پی کاک کے علاوہ مرکری محمولی ہی مفید ہے۔مرکری کی ایک علامت یہ ہے کہ معمولی ہی مخت سے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے۔دل کے مقام پر کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔دات کے وقت تکلیف میں اضافہ ہوجاتا جاتی ہے۔ تمام اعضاء کا نیتے ہیں خصوصاً ہاتھ اور پاؤں۔اعضاء میں جھکے بھی لگتے ہیں۔غیر معمولی میں بوتا ہے جورات کو بستر کی گری بھاری بین، تھکا وٹ اور کمزوری محسوس ہوتی ہے اور کھچاؤ محسوس ہوتا ہے جورات کو بستر کی گری میں بڑھ جاتی ہے۔

عورتوں کی بیاریوں میں اگر بیضۃ الرحم یعنی (Ovary) میں ڈک داردر دہوں اور جلن کا حساس ہو، حیض کا خون مقدار میں بہت زیادہ، پیٹ میں در داور کیکوریا جورات کوزیادہ ہوجائے، چھیلنے والامواد خارج ہو، شج کے وقت متلی کار جمان، پیشاب کرنے کے بعد خارش اور جلن جسے ٹھنڈے پانی سے دھونے سے آرام آتا ہوتو بیٹمومی علامتیں ہیں جن میں مرکسال مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر محض کمزوری کی وجہ سے ابتدائی مہینوں میں حمل ضائع ہوجائے تو مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر محض کمزوری کی وجہ سے ابتدائی مہینوں میں حمل ضائع ہوجائے تو جنین کا بوجھا ٹھا سکے۔

رحم اور چھاتی کے کینس میں اگر چہ مرکری مکمل شفا بخشنے کی صلاحیت نہیں رکھتی مگر تکایف کو کم کر دیتی ہے اور آرام پہنچاتی ہے۔ ہاں وہ گلٹیاں جو کینسر نہ ہوں مرکری سے شفا پاجاتی ہیں۔مرکری کی ایک قسم پروٹو آئیوڈ ائیڈ (Proto iodide) سینے کے کینسر میں بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔ڈاکٹر کینٹ سینے کے کینسر کی وجہ سے بیدا ہونے والے در دمیں پروٹو آئیوڈ ائیڈ 100 کی طاقت میں استعال کرواتے تھے۔ جب بھی دردا تھے اسے استعال

کیا جا سکتا ہے۔ ان کے تجربہ میں آیا ہے کہ انڈے کے برابر رسولی اس دوا کے استعال سے بالکل ختم ہوگئی۔ بیدوا دائیں طرف کی تکلیف میں زیادہ اثر دکھاتی ہے جبکہ اس کی دوسری قتم Bin iodide بائیں طرف کی تکلیفوں میں مفید ہے۔

بعض لوگوں کی گردن سردی لگنے سے اکڑے جاتی ہے۔اس میں مرکسال مفید ہے۔ اگر صبح اٹھ کر اکڑاؤ کا احساس ہوتو سب سے پہلے بیلا ڈونا دینا چاہئے۔اگریہ کام نہ کرے تو مرکسال کام آسکتا ہے۔

بعض الیی بیماریاں ہیں جن میں فالج کے ساتھ جھٹکے بھی لگتے ہیں اور اعضاء مڑنے لگتے ہیں۔ ان میں بھی مرکسال امکانی دوا ہو سکتی ہے۔ اس کے اسکیزیما اور زخموں میں جلن اور چین کا احساس نمایاں ہوتا ہے اور نا قابل برداشت بو ہوتی ہے جس سے دل متلاتا ہے۔ یہ علامتیں کسی مریض میں اکٹھی ہو جائیں تو ہر ہومیو پیتھک دوا جس کا جزواعظم مرکری ہوکار آمد ثابت ہو سکتی ہے۔ الا ماشاء اللہ۔

مرکری کے مریض کی تکلیفیں رات کو بڑھ جاتی ہیں۔ سیفیلینم اور سلفر میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے مگر سلفر میں بستر میں لیٹنے سے تکلیفیں بڑھتی ہیں۔ یعنی بستر کی گرمی تکلیف کو بڑھا دیتی ہے جبکہ مرکری کی تکلیفوں کا رات سے تعلق ہے۔ مریض بستر میں داخل ہو یا نہ ہو، رات مصیبت بن جاتی ہے۔

> دافع انژ دوائیں: میپرسلف-آ رم-میزریم طاقت: 30سے ی-ایم(CM) تک

142

ملى فوليم

MILLEFOLIUM

(Yerrow)

ملی فولیم کا جربیان خون سے خاص تعلق ہے اور بالعموم اس کا جربیان خون سرخ ہوتا ہے گر بورک (Dr. Boericke) نے بھی اسے صرف سرخ خون کے جربیان تک محدود رکھا ہوا ہے اور وریدوں (Veins) سے اس کا کوئی تعلق نہیں جوڑ الیکن کینٹ (Dr. Kent) اس کے متعلق پہلے فقرہ میں ہی اس کو ویری کوزونیز (Veins) میں چوٹی کی دوا بتا تا ہے۔ اس لئے وہ اس کے اخراج خون کو جمیشہ سرخ نہیں بلکہ عموماً سرخ بیان کرتا ہے۔ بہر حال اگر چہ سرخ خون ہی نکلتا ہے مگر جربیان خون کی خواہ وہ کالا ہی ہویہ اولین دوا ہے۔ اس سے بڑھ کرجریان خون کی علامات شاید ہی کسی اور دوائی میں پائی جاتی ہوں۔ اگر کینسر کے زخموں سے خون کا جربیان زیادہ ہوتو اس کی روک تھام میں بھی یہ مفید ہوسکتی ہے۔ کینسر کے زخم پرخالص شہد کا لیے بار بار الگانے سے بھی افاقہ ہونا ایک طے شدہ حقیقت ہے۔

ملی فولیم میں ایک علامت بہے کہ آئکھیں سرخ ہوجاتی ہیں اور بیا حساس نمایاں ہوتا ہے کہ آئکھوں میں بہت زیادہ خون اکھا ہو گیا ہے۔ سردرد شروع ہونے سے پہلے آئکھیں خون سے بھر جاتی ہیں۔ بعض دفعہ ذرا سا پڑھنے سے بھی بہ کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ ان سب عوارض کا علاج ملی فولیم ہے۔

خون کا دوران زیادہ ہونے کی وجہ سے آئکھیں سرخ ہوں اورنظر دھندلا جائے اورساتھ ہی تکسیر پھوٹے کا بہت رجحان ہوتو اس میں بھی بیافائدہ مند ہے۔اس بیاری میں عام طور پرملی فولیم 30 کوفاسفورس30 سے ملاکر دیا جائے تو بیدونوں اکٹھی بہت

مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔

عورتوں میں جیض کا خون لمباعرصہ جاری رہے، رتم اور پیٹ میں تشنج ہوجائے اور بہت زیادہ مقدار میں خون بہدر ہا ہوتو یہ خاص ملی فولیم کا نشان ہے۔ یہ تینوں علامتیں اکھی ہو جا کیں تو ملی فولیم خدا کے فضل سے فوری فائدہ دیتی ہے۔ الاما شاء اللہ۔ اسی طرح اگر حمل ضائع ہونے کا خدشہ لاحق ہوجائے، معمولی حرکت سے خون جاری ہواور آرام کرنے سے رک جائے تو اس صورت میں بھی ملی فولیم مفید ہے۔ جس عورت کو حمل کے آغاز سے ہی سرخ خون کے جریان کی شکایت ہوجس سے اکثر بچے ضائع ہوجا تا ہوتو اس کو چاہئے کہ متو قع حمل سے بچھ پہلے ملی فولیم کی ایک لاکھ طاقت میں ایک خوراک کھالے۔ بعض دفعہ ایک ہی خوراک اس بھاری سے ہمیشہ کے لئے نجات دے سکتی ہے۔ اسی طرح ایک لاکھ طاقت میں اس کا جرت انگیز اثر ایک ایسے خوراک سے اثر ایک ایسے خون تھو کتار ہا۔ ملی فولیم ایک لاکھ طاقت میں ایک ہی خوراک دینے سے خدا کے فضل سے اسے خدا کے فضل سے اسے محمل شفا ہوگئی۔

جن لوگوں میں جریان خون کار جمان ہواگر انہیں اپریشن سے پہلے ملی فولیم کی ایک ہزار طاقت میں ایک خوراک دے دی جائے تو وہ اپریشن کے دوران پیدا ہونے والی جریان خون کی پیچید گیوں سے محفوظ رہیں گے۔ ملی فولیم کی ایک اورخو بی ہے کہ بیخون کو جمنے ہیں دین اور Clot نہیں بنتے ۔ وہ ایلو پیتھک دوائیں جوخون کے جریان کورو کئے کے لئے استعال ہوتی ہیں عموماً خون کو گاڑھا کردیتی ہیں جبکہ ہومیو پیتھک دوائیں خون کوصحت مندر کھتے ہوئے بہنے سے روکتی ہیں۔ ملی فولیم اس لحاظ سے بہت اچھی دوا ہے اور جریان کو روکتی ہے مگر خون کے ضرورت کا ڈھانہیں کرتی۔

دل کی طرف خون کا دوران زیادہ ہوجائے تواس میں بھی ملی فولیم اچھی ہے۔ عموماً پیجانی کیفیت میں ایسا ہوتا ہے۔ عام طور پرا یکونائٹ فائدہ مند ہوگی لیکن ملی فولیم بھی اچھااڑ دکھاتی ہے۔ ملی فولیم عمو ما بوڑھ اور کمزورلوگوں نیزعورتوں اور بچوں کی بیاریوں میں مفید ہے۔ عمو ما مرکی طرف خون کے دوران کا احساس ہوتا ہے، سرکے دائیں جانب دباؤ، پوٹوں اور پیشانی کے عضلات میں ایکھن ہوتی ہے، حرکت سے چکر آتے ہیں اور کان بند ہونے کا احساس ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی ان سے ٹھنڈی ہوانگلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ دو پہرکوسونے کے بعد سر بھاری ہوجا تا ہے۔ مریض کو ہروقت بیا حساس بتا ہے کہ وہ کچھ بھول گیا ہے۔ چہرے پر گری اور حدت محسوس ہوتی ہے۔ مند بہت خشک رہتا ہے۔ مسور ٹھوں میں زخم کی علامت بھی ملی فولیم میں پائی جاتی ہے۔ حلق میں بھی زخم بن جاتے ہیں اور بائیں جانب در دہوتا ہے۔ معدہ میں جلن اور کھر چن کا احساس بتا ہے۔ جگر کے مقام پر در دہ متعفن رہا ہی، آئتوں معدہ میں جلن اور کھر چن کا احساس بتا ہے۔ جگر کے مقام پر در دکا احساس ہوتا ہے۔ آئیں یا سخت محنت آتے ہیں۔ بیشاب میں بھی خون کی عرب سے جون جاری ہوجائے تو ملی فولیم اس کے لئے مفید دوا ہے۔ سرخ عورتوں میں جیض رک جانے سے تون جاری ہوجائے تو ملی فولیم اس کے لئے مفید دوا ہے۔ سرخ خون کی بواسیر میں بھی ملی فولیم کو استعال کرنا چاہئے۔

پھیپھڑ وں میں بلغم جم جائے اور دق کا مرض مزمن ہوجائے ، کھانسی کے ساتھ خون آنے گے اور سینہ میں تنگی محسوس ہوتو بھی ملی فولیم معاون دوا ہوسکتی ہے۔

ہرنیا (Hernia) جو طاقت سے بڑھ کر بوجھ اٹھانے سے پیدا ہو۔ پتھر یوں کے اپریشن کے بعدخون رو کئے کے اورایسے بہت او نچے بخار میں جس کی کوئی وجہ مجھ نہ آئے اور مسلسل ہوجب دوسری دوائیں کام نہ کریں تو ملی فولیم اعجازی اثر دکھا سکتی ہے۔

اگر مرد کے بیوی سے تعلقات ہر لحاظ سے درست ہوں۔ جرثو مے صحت مند ہوں مگر مادہ منوبہ خارج نہ ہوت ہوں مگر مادہ منوبہ خارج نہ ہوتو بعض دفعہ اس وجہ سے بھی بچوں کی پیدائش رک جاتی ہے۔اس غیر معمولی علامت میں ملی فولیم بہت اہمیت رکھتی ہے۔

ملى فوليم

30 سے 200 تک بلکہ 1000 تک

طاقت:

مورگن کو

143 مورگن کو MORGON CO

''مورگن کو'' انتر ایوں میں پیدا ہونے والے گندے مادے سے تیار کی جانے والی ایک نئی دواہے۔ یہ انتر ایول کی مزمن بیماریول میں بہت مفید بتائی جاتی ہے۔ اگرانتر ایول کی مزمن بیماریول میں بہت مفید بتائی جاتی ہے۔ اگرانتر ایول کی مزمن اور ورم ہو، جلد بھی متاثر ہو، ذراسا رگڑ لگنے سے خراش پیدا ہوجائے اور زخم بن جائے تواس دوا کے مداح ڈاکٹر اس تکلیف میں بھی اسے بہت زوداثر اور مفید بتاتے ہیں۔

طاقت: 30 يااونجي طاقتين حسب تجربه استعال کرنی چاهئيں۔

144

ميوريثيكم ايسڈم

MURIATICUM ACIDUM

میوریک ایسڈیعنی ہائیڈروکلورک ایسٹر (HCI) ایک عام تیزاب ہے جو ہمارےجسم کے نظام ہضم سے گہراتعلق رکھتا ہے۔میوریٹک ایسٹر کے بارے میں اکثر ہومیو پیتھک ڈاکٹر بہت خوفنا ک تصویر تھینچتے ہیں کہ ایسا مریض جس کے عضلات مکمل طور پر جواب دے میکے ہوں، سربستر سے ڈھلک ڈھلک جائے اورموت میں صرف چندساعتیں باقی رہ جائیں تواہیا مریض میورینک ایسڈ کا مریض ہوتا ہے حالا نکہ بیمعدہ میں روز مرہ پیدا ہونے والا ہائیڈ روکلورک ایسڈ ہی ہےجس سے ہمیں ہروقت واسطہ پڑتا ہے اورجسم میں اس کی مقدار میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ جب معدہ میں تیزابیت بڑھے تو اس بات کا امکان ہے کہ میوریٹک ایسڈ بڑھ گیا ہویا اس کے بالکل برعکس صورت حال بھی ہوسکتی ہے۔معدہ میں ہائیڈروکلورک ایسڈ کم ہوجائے تواس سے بھی تیزاب کی زیادتی کی علامات پیدا ہوسکتی ہیں کیونکہ اگر گلینڈ زیائیڈروکلورک ایسڈ بنانے کی رفتار کم کر دیں تو غذامعدہ میں ہی گلنے سڑنے گئی ہےاورا یسے فاسد تیزاب بننے لگتے ہیں جن سے پیپے میں ہوا ئیں بنتی ہیں۔روزمرہ کی معمول کی تیزابیت کمزوری پیدانہیں کرتی لیکن اگراس کا توازن بگڑ جائے یعنی ضرورت سے کم یا زیادہ ہوجائے تو وہ تکیفیں پیدا ہوتی ہیں جنہیں ہم تیزابیت کہتے ہیں۔ بہرحال علامتیں دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا۔ نظام ہضم کے بگڑتے ہی ہومیو پیتھک طاقت میں میوریٹک ایسڈ دینا چاہئے کیونکہ بیرندکورہ عدم توازن کو درست کرتا ہے۔

جن مریضوں میں ہومیو پیتھک میوریٹک ایسڈ کی ضرورت پڑتی ہے ان کے اعصاب اورعضلات تیز ابیت سے خواہ کتنا ہی متاثر ہوجا ئیں، ان کا د ماغ بالکل صاف اور شمیک رہتا ہے۔ لیکن ایسڈ فاس جن مریضوں میں کارگر ثابت ہوتا ہے ان کی علامتیں

میوریٹ ایسٹر کے برعکس ہوتی ہیں۔ میوریٹ ایسٹر میں جسم پہلے بگڑتا ہے۔ دماغ کی سب سے
آخر پر باری آتی ہے جبکہ ایسٹر فاس کے مریضوں کی دماغی علامتیں پہلے بگڑتی ہیں اور دہنی کمزور ک
کے نتیجہ میں جسمانی بیماریاں بعد میں پیدا ہوتی ہیں۔ مریض کی سوچنے ہجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو
جاتی ہے، دماغی طاقت رفتہ کم ہونے لگتی ہے اور یا دداشت خراب ہو جاتی ہے۔ اس قتم کی
علامتیں بچھ عرصہ کے بعد آ ہستہ عضلاتی کمزوریوں میں تبدیل ہونے لگتی ہیں۔ ایسٹر فاس کا
مریض عضلاتی مریض بننے میں بہت وقت لیتا ہے۔ اگر اس دواسے اس کی دماغی علامات کا علاج
جلد کہا جائے تو عضلات پر بدائر بڑے گاہی نہیں۔

میوریک ایسڈ کے مریض کوسنجالنانسبٹا آسان ہے کیونکہ اگر دماغ موت کے قریب بھی صحیح رہے اور نفسیاتی کیفیات پرکوئی بدائر ظاہر نہ ہوا ہوتو ایک دوخورا کوں سے اسے آرام آجائے گا کیونکہ تیز ابیت کے تیجہ میں بیدا ہونے والاضعف جتنا خطرناک ہوتا ہے اتنا ہی جلدی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اور لمبا گہرا اثر باقی نہیں چھوڑتا۔ یہی حال سلفیورک ایسڈ کا ہے۔ پس سب تیز ابول کے مزاج کو سمجھنا اور ان کا آپس میں موازنہ کرنا بہت ضروری ہے۔

میوریئک ایسڈ میں سر در دیہت شدید ہوتا ہے جس سے نظر بھی دھندلا جاتی ہے اور نظر پرزیادہ دباؤڈ الا جائے تو در دمیں اضافہ ہوجاتا ہے۔ چہرہ پر دانے نکلتے ہیں، ہونٹ خشک ہوکر بھٹ جاتے ہیں، زبان پیلی پیلی اور سوجی ہوئی اور بالکل خشک ہوتی ہے اور کئی دفعہ زبان اور منہ میں السر بھی ہوجاتے ہیں۔ مسوڑ ھے بھی سوجے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سے خون بھی فکاتا ہیں۔

میوریٹ ایسٹر کے بعض مریض گوشت دیکھنا بھی پیند نہیں کرتے لیکن اکثر مریض شوق سے گوشت کھاتے ہیں۔ بعض دفعہ شدید بھوک اور پیاس محسوس ہوتی ہے۔ بعض مریضوں میں چھونے سے زود حسی اتنی ہڑھ جاتی ہے کہنا قابل برداشت ہوجاتی ہے ختی کہ مریض ایٹ آپ کو چا در سے ڈھانیٹا بھی پیند نہیں کرتا۔ اس کی تکلیفیں مرطوب موسم

میں بڑھ جاتی ہیں۔ آ دھی رات سے ذرا پہلے بیاری میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ بائیں طرف لیٹنے سے آ رام محسوس ہوتا ہے۔

سردرد پیچے گدی سے شروع ہوتا ہے اور نظر دھندلا جاتی ہے۔ بعض دفعہ نظر آدھی رہ جاتی ہے۔ اوپر کا آدھایا نیپی کا آدھا حصہ نظر نہیں آتایا دائیں کا نصف یابائیں کا نصف نظر نہیں آتا۔ مؤخر الذکر بیاری میں میوریٹک ایسٹر بہت مفید ہے۔ اگر ایک طرف کی نظر میں تھر تھراہٹ بیدا ہو جائے تواس میں رسٹاکس کام آتی ہے اورکئی خطرناک بیاریوں سے بچالیتی ہے۔

میورینگ ایسڈ کی ایک علامت ہے ہے کہ بچہ حاجت کے لئے جائے تو ساتھ آنت کا ایک حصہ باہر آجا تاہے۔

منہ میں آ بلے اور زخم بنتے ہیں اور زبان کٹ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں گہرے ملاج کی ضرورت پیش آ تی ہے۔ جس سے صرف منہ بی نہیں بلکہ اصل بخار اور اس کے تمام بدا ثرات کو دور کیا جا سکے۔ میور یک ایسٹر میں بعض دفعہ زبان کا فالح بھی ہوجا تا ہے۔ گلاٹھیک ہوتا ہے کین زبان کام نہیں کرتی۔ ایسے فالح میں میور یک ایسٹر بہت مفید ہے۔ اس میں زبان عموماً خشک رہتی ہے۔

میوریٹک ایسڈ میں باوجوداس کے کہ جلد حساس ہوتی ہے، اندرونی طور پرفالج کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ اس قتم کے تضادات دواکو پہچانے میں مدددیتے ہیں۔ جسم بے جان محسوس ہوتا ہے گر جلد کے او پر ملکے سے جھونے سے بھی جھر جھری آ جاتی ہے۔ ایگیر کیس ، شفی سیگریا اور اوگزیلک ایسڈ میں بھی احساس کی تیزی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پکرک ایسڈ بھی بہت حساس دوا ہے۔ اگران دواؤں میں دباؤ مضبوط ہوتو قابل برداشت ہوتا ہے لیکن ہلکا ہاتھ برداشت کرنا مریض کے لئے مشکل ہوتا ہے اور وہ ہاتھ جھٹک دیتا ہے۔

میوریک ایسڈ میں بازواورٹائگیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اوران میں بوجھل پن محسوں ہوتا ہے۔ سے۔اکثر اخراجات غیراختیاری ہوتے ہیں، نبض تیزاور کمزور ہوتی ہے۔

اینٹی ڈوٹ: برائیونیا طاقت:عموماً 30 تک

145

نيثرم كاربونيكم

NATRUM CARBONICUM

(Carbonat of Sodium)

نیٹرم کارب سوڈ یم اور کاربن کا مرکب ہے اور ان دونوں کی علامتیں اس میں پائی جاتی
ہیں۔ نیٹرم کارب کے مریض کو ملکے شور سے بھی جسم پر کپکی ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ کاغذ کی
سرسراہٹ سے بھی دل کی دھڑکن بے تر تیب ہوجاتی ہے۔ نیٹرم کارب کامریض ان خاص علامتوں
سے بہچانا جاتا ہے۔ بجیب بات ہے کہ شورخواہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہواگر ایک ہی سطح پر جاری رہے تو
اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی گر آ وازوں کا زیرو بم اعصاب پر سخت برا اثر ڈالتا ہے۔ شور کی
اور نی خی نا قابل برداشت ہوتی ہے۔ اچا نک کوئی دھا کہ ہویا شور پڑ جائے تو یہ نیٹرم کارب کے
مریض کے لئے بہت مضر ثابت ہوتا ہے۔ ایسے مریض کواچا تک ڈرایا جائے تو دل بند ہونے کا
خدشہ ہوتا ہے۔ اس لئے اس بارہ میں مختاط رہنا چاہئے۔

نیٹرم کارب کے مریض کی بیاریاں مزمن ہوجا کیں تو وہ اپنے گھر والوں سے بھی اجنبیت محسوس کرنے لگتا ہے۔ اسے ہرایک سے دوری کا احساس ہونے لگتا ہے۔ صحبت اور تعلق میں کی آجاتی ہے۔ یہ کیفیت بڑھتے بڑا مے بڑا سے بیزاری اور بے تعلقی کے رنگ میں ظاہر ہونے لگتی ہے اوروہ کسی کو برداشت نہیں کرسکتا۔ خوف کی بجائے بیزاری نمایاں ہوتی ہے۔ نیٹرم کارب کے مریض کے بیشاب میں گھوڑے کے بیشاب جیسی بو ہوتی ہے۔ یہ علامت بینزوئیک ایسٹر (Benzoic Acid) میں بھی پائی جاتی ہے۔ بیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے۔ رات کے وقت خود بخو دنکل جاتا ہے۔ بیشاب کرتے ہوئے جلن بھی حاجت ہوتی ہے۔ رات کے وقت خود بخو دنکل جاتا ہے۔ بیشاب کرتے ہوئے جلن بھی حاجت ہوتی ہوئے جلن بھی

محسوس ہوتی ہے۔

نیٹرم کارب کی جلدی بیاریوں میں انگیوں کے کناروں یا پاؤں کے بنجوں کے کناروں اور انگیوں کے جوڑوں کے کناروں اور انگیوں کے جوڑوں پر خصوصیت کے ساتھ ابھار پیدا ہوتے ہیں۔جسم کے دوسر بے حصوں پر جگہ جٹاخ سے بن جاتے ہیں۔خارش گول گول گلڑوں کی شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ ہر پیز کی علامتوں سے اس دوا کو امتیازی طور پر بہچانا آسان نہیں ہے۔اگر مریض میں نیٹرم کارب کی علامتیں موجود ہوں اور دوسری دواؤں بہچانا آسان نہیں ہے۔اگر مریض میں نیٹرم کارب کی علامتیں موجود ہوں اور دوسری دواؤں سے ہر پیز کو فائدہ نہ ہوتو نیٹرم کارب کو بھی استعال کر کے دیکھنا چاہئے۔سوڈیم اور کار بونیٹ دونوں اعصاب سے تعلق رکھتے ہیں اور اس پہلوسے ہر پیز جو بنیا دی طور پر اعصا بی تکلیف ہے اس کامریض اس دواسے فیض یا بہوسکتا ہے۔

نیٹرم کارب لو گئے کے باقی رہنے والے بدائرات میں نمایاں کام کرتی ہے۔ لو

گئے کے بعد بعض دفعہ نزلہ گلے میں گرنے گئا ہے اور مستقل بیاری بن کر چٹ جاتا ہے۔
اس میں نیٹرم کارب بہت مفید ہے۔ سردرد کے دورے اور گری سے زود حی میں بھی ہے بہت
اچھااٹر دکھاتی ہے۔ نیٹرم کارب میں ناک کے سر پر کیچے کیچے ناسور ظاہر ہونے لگتے ہیں۔
اچسال کی خاص علامت ہے کہ ناک کی چوٹی کسی نہ کسی جلدی بیاری میں مبتلا رہتی ہے۔ اگر

یاک پر پھوڑے بن جا ئیں تو اس میں بھی مفید ہے لیکن ایک دفعہ ایک مریض کو نیٹرم کارب
سے فائدہ نہیں ہور ہا تھا، جب میں نے اسے پر وہلس (Propolis) کی مرہم بنا کردی جوشہد
کی مجھی خودا پنے لئے جراثیم کش دوائے طور پر بناتی ہے توایک ہفتہ سے بھی کم عرصہ میں اس کا زخم
بالکل ٹھیک ہوگیا۔ شہد کینسر کے زخموں اور آئھوں کے ناسور وغیرہ میں بھی غیر معمولی اثر دکھا تا
بالکل ٹھیک ہوگیا۔ شہد کینسر کے زخموں اور آئھوں کے ناسور وغیرہ میں بھی غیر معمولی اثر دکھا تا
سے بہ پر وہلس بہت طاقتو ردوا ہے لیکن کیمیائی کی ظاسے بہت ہلکی ہے۔ ایک دفعہ فرانس میں سیہ سے سے پر وہلس بہت طاقتو ردوا ہے لیکن کیمیائی کی ظاھ سے بہت ہلکی ہے۔ ایک دفعہ فرانس میں سیہ سے سے بی کھی نہ کھی جو جراثیم (Bacteria)
سے تعلق ہے۔ جس سائنس دان نے شہد کی کھی پر شخص کے کیڑے مکوڑ نے کا کس خاص بیکٹیر یا
سے تعلق ہے۔ جس سائنس دان نے شہد کی کھی پر شخص کے کیڑ ہے کوڑ کے کاکس خاص بیکٹیر یا
سے تعلق ہے۔ جس سائنس دان نے شہد کی کھی پر شخص کے کیڑ ہے کوڑ کے کاکس خاص بیکٹیر یا

کھی کے بدن پرکسی بیکٹیریا کا کوئی نشان نہیں ملتا اور وہ ہرقتم کے جراثیم سے کلیٹا پاک ہے۔ یہ ایک جیرت انگیز دریافت تھی جس سے ایک بی تحقیقی دور کا آغاز ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ شہد کی کھی ہر فتم کے جراثیم سے پاک ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا پیفر مانا کہ فیٹ بوشفاءٌ لّہ لنّاسِ بڑی اُہرائی محتیا ہے۔ جب فرانس میں بی تحقیق کی گئی تو پیہ چلا کہ شہد کی کھی اتی صفائی پند ہے کہ شہد کے ہر چھتے کے کنارے پر بیدایک کیمیکل لگاتی ہے جس کا نام پروپلس (Propolis) ہے۔ کھی پروپلس کوسفیدے اور دوسرے درختوں سے رسنے والے موم سے تیار کرتی ہے اور اپنے چھتے کے کناروں پر ہر طرف مل دیتی ہے۔ جب بھی اندرجاتی ہے پہلے کنارے پر پاؤں رکھتی ہے۔ جب بھی اندرجاتی ہے پہلے کنارے پر پاؤں پروہ مادہ لگ جب باہر آتی ہے پھر بھی اس پر پاؤں رکھ کر با ہر نگلتی ہے جس سے اس کے پاؤں پروہ مادہ لگ جا تا ہے جو اسے جراثیم سے پاک رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے شہد کے چھتے میں کوئی جراثیم داخل نہیں ہو سکتے۔ اس تحقیق کے بعد ڈنمارک میں ایک قابل زمیندار نے خصوصی فارم تیار کر کے شہد کی محمول کی اور اکثر کی جہاں سے وہ بڑی مقدار میں پروپلس حاصل کرتا تھا۔

پروپلس کوگلیسرین یا وٹامن ای کریم میں ملا کر استعمال کیا جائے تو روز مرہ کے پھوڑے پھنسیوں میں بہت مفید دواہے۔

نیٹرم کارب میں ناک کی بیرونی سطح پر ہی نہیں بلکہ ناک کے اندر بھی زخم بننے کار جحان پایا جاتا ہے۔ سخت بد بودار نزلیہ ہوتا ہے جو دائی شکل اختیار کرلیتا ہے اور گلے میں ہروقت خراش پیدا کرتا ہے۔ قوت شامہ بھی ختم ہوجاتی ہے۔

عام طور پر چہرہ زرد ہوتا ہے۔ آئھوں کے گرد حلقے ، منہ میں زخم اور چھالے بن جاتے ہیں۔خصوصاً دودھ بلانے والی عورتوں کے منہ کے چھالوں میں نیٹرم کارب بہترین دواہے۔ جن عورتوں کودائی کیکوریا کی تکلیف ہوتی ہے ان کے بانجھ بن کے لئے بہترین دواہے۔ یہ علامات تو اور بھی بہت ہی دواؤں میں پائی جاتی ہیں کیکن نیٹرم کارب کی خاص علامت یہ ہے کہ مریضہ کا مزاج ٹھنڈا ہوگا ، دائی بانجھ بن کا شکار ہوگی اور مسلسل جاری رہنے والا کیکوریا ہوگا۔ اگریہ سب علامتیں اکٹھی ہوجا کیں تو خدا کے فضل سے یہ

دوابا نجھ بن کودور کرنے میں بہت مؤثر ہے۔

نیٹرم کارب میں گخنوں کی مستقل کمزوری کار جمان پایا جاتا ہے۔ایسے لوگوں کے پاؤں اکثر ریٹ جاتے ہیں۔ایسی مستقل کمزوری جو کسی کے مزاح میں داخل ہواور کسی حادثی یا وک انتیجہ نہ ہو،اس میں نیٹرم کارب بہت مفید ہے۔ویسے گخنوں میں موج کے لئے سب سے مؤثر دوائیں روٹا (Ruta) یا بیلس (Bellis) ہیں۔ سخت موج کے بداثر ات کے لئے آر نیکا کی اونچی طاقت بیلا ڈونا سے ملاکر دی جائے تو فوری طور پر فائدہ مند ہوتی ہے اور مرض کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا۔لیکن اگر شروع میں بید دواند دی جائے تو باقی رہ جانے والے اثر ات میں روٹا مفید ہے۔ بعض دفعہ بلس یا رسٹاکس کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ نیٹرم کارب گخنوں کی اندرونی کمزوری کی وجہ سے موج آتے رہنے کے دبجان کو دورکرتی ہے۔

نیٹرم کارب کا مریض زیادہ ترخمگین اور پریشان رہتا ہے۔ مسلس غم کے خیالات میں والو بہتا ہے۔ وہان ہے۔ وہان ہے۔ وہان وری محسوں کرتا ہے۔ موسم کی تبدیلی اور سردی نا قابل برداشت ہوتی ہے۔ بادلوں کی گئیں۔ کمزوری محسوں کرتا ہے۔ موسم کی تبدیلی اور سردی نا قابل برداشت ہوتی ہے۔ بادلوں کی گئیں۔ گرج کے دوران بہت ہے آرامی محسوس کرتا ہے۔ موسیقی سے تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ پچھ مخصوص لوگوں کو برداشت نہیں کرسکتا۔ کھانا کھانے کے بعد بدمزاجی اور چڑ چڑا بن بڑھ جاتا ہے۔ ذراسی بھی ذہنی تھکاوٹ سے سرمیں درد ہوتا ہے جوسورج یا گیس کی روثنی میں بڑھ جاتا ہے اور چکر بھی آتے ہیں۔ جسمانی یا ذہنی محنت سے تکلیفیں بڑھتی ہیں اور بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ فیلودوں میں ورم یا ہوتی ہے۔ بیانی جاتی ہوئے کڑکھڑا تا ہے۔ عضلات میں اینٹھن محسوس ہوتی ہے۔ بیامات لو لگنے کے نتیجہ میں مہنی پیدا ہونی چا ہئیں لیکن بعض انسانوں پرلو لگنے کے یہی دائی اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ یاد نہیں پیدا ہونی چا ہئیں لیکن بعض انسانوں پرلو لگنے کے یہی دائی اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ یاد شہیں پیدا ہونی چا ہئیں لیکن بعض انسانوں پرلو لگنے کے یہی دائی اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ یاد مرباح کے کاظ سے نیٹرم کارب ٹھٹڈی دوا ہے۔

نیرم کارب میں آئکھوں کے سامنے سیاہ رنگ کے دھیے آتے ہیں۔ آئکھ کھلنے پر

نظر دھند کی محسوں ہوتی ہے۔ آئھوں میں سوئیاں چھتی ہیں اور جلن ہوتی ہے۔ کانوں میں تیز چھنے والا در دہوتا ہے۔ منہ پر بھورے تل، پیلے دھبے اور کیل بن جاتے ہیں۔ اوپر کا ہونٹ سوجا ہوا محسوں ہوتا ہے۔ چہرے کا رنگ زر دہوتا ہے، آئھوں کے گرد نیلے حلقے پڑجاتے ہیں اور پیوٹے متورم ہوجاتے ہیں۔

نیٹرم کارب کے مریض کا معدہ بہت حساس ہوتا ہے اور چھونے سے متورم محسوں ہوتا ہے۔ ٹیٹرم کارب کے مریض کا معدہ بہت حساس ہوتا ہے اور چھوٹ ہوتی ہے۔ نظام ہضم ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ ضبح پانچ بج بھوک محسوں ہوتی ہے۔ نظام ہضم بہت کمزور بڑجا تا ہے۔ کھانا کھانے کے بعداداس کا دورہ بڑتا ہے۔ منہ کا ذا کقہ کڑوا محسوں ہوتا ہے۔ دودھ پینے سے اسہال شروع ہوجاتے ہیں اور یکا یک حاجت محسوں ہوتی ہے۔

نیٹرم کارب کی کھانسی خشک ہوتی ہے جوگرم کمرے میں داخل ہونے سے بڑھ جاتی ہے اور سینے میں بائیں جانب سردی کے احساس کے ساتھ بھی کھانسی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رات کو بائیں جانب لیٹنے سے اور سیٹر ھیاں چڑھنے سے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہوتا ہے۔ مریض جہت جلد اٹھ جاتا ہے اور صبح پانچ بج ہی اس کی تکلیفیس زیادہ ہوتی ہیں۔ صبح کے وقت پسینہ بھی بہت آتا ہے۔ یاؤں کے تلووں میں جلن محسوس ہوتی ہے۔

دافع اثر دوائیں: کیمفر۔آرسنک طاقت: 30سے 200 تک البتہ بورک نے صرف 6 تک میر

146

نيثرم ميوريثيكم

NATRUM MURIATICUM

(Sodium Chloride)

ہومیو پیتھک ادویہ میں نیٹرم میورایک وسیع الاثر دوا ہے حالا نکہ بیروزمرہ عام کھانے والے نمک کی ہومیو پیتھک ادویہ میں نیٹرم میورائیڈ انسانی جسم میں وافر مقدار میں موجودر ہتا ہے اور زندگی کے نظام کو فعال اور متوازن بنانے کے لئے اہم کر دارادا کرتا ہے۔اس کی کمی سے کئی قشم کی بیاریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے منہ میں ہر وقت کئی قشم کے نمکیات موجودر ہتے ہیں جن میں سوڈ یم کلورائیڈ غالبًا سب سے زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجوداس کی ہومیو پڑینسی کی انتہائی خفیف مقدار بھی منہ میں ڈالی جائے تو فوری ردمل ہوتا ہے اور منہ میں موجود رخمی سے درمنہ میں موجود رخمی سے درمنہ میں موجود رخمی سے درمنہ میں موجود رخمی کی راہ میں حائل نہیں ہوتا۔

جو بیاریاں زیادہ نمک کھانے سے پیدا ہوتی ہیں ان میں سے ایک خون کے دباؤ کا زیادہ ہونا بھی ہے اس لئے عموماً میکہا جاتا ہے کہ بلڈ پریشراوردل کی بیاریوں سے بیخ کے لئے زیادہ نمک کا استعال نہیں کرنا چاہئے ۔ انگلتان اورامریکہ میں دل کے ماہرین نے جونئی تحقیق کی ہے اور اس کی روسے بیتا ثر درست نہیں کہ نمک کم کھانے والوں کو بلڈ پریشر نہیں ہوتا ہے۔خون کا دباؤ ایک بلڈ پریشر نہیں ہوتا ہے۔خون کا دباؤ ایک الگ بیاری ہے جس کے موجبات الگ ہیں ۔ البتہ اگر کسی کوخون کا دباؤ برا سے کی بیاری ہوتو ایسے مریض کے لئے زیادہ نمک کھانے سے پر ہیز ضروری ہے اور جس کوخون کا دباؤ رئینے دباؤ کیاری کے ذریعہ خون سے باہر نکل جاتا ہے۔ جن لوگوں کے گردے خراب ہوں یا کسی بیاری کے ذریعہ خون سے باہر نکل جاتا ہے۔ جن لوگوں کے گردے خراب ہوں یا کسی بیاری

کے باعث پسینہ آنا بند ہوجائے ان کوزیادہ نمک کھانے میں احتیاط کرنی چاہئے۔اگرخون میں ضرورت سے زائد نمک موجود ہے توبہ پانی جذب کر کے خون کا جم بڑھادیتا ہے۔جس سے دباؤ کا بڑھنا طبعی امر ہے۔

نمک انسانی زندگی کالازمی جزوہے جس کا توازن بگڑنے سے بیاریاں پیدا ہوتی ہیں جولوگ روزانہ ورزش کے عادی ہوتے ہیں اورانہیں کھل کر پسینہ آتا ہے اور پییثاب کے ذریعہ بھی نمک خارج ہوتا رہتا ہے انہیں زیادہ نمک کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔

نیٹرم میور بہت گہری اور دریا پالٹرات کی حامل دوا ہے۔انسانی بدن کا کوئی بھی ایسا جزو نہیں جس پر بیاٹر انداز نہ ہو۔ عام طور پر نیٹر م میور کی علامات رکھنے والے مریض کی جلد چبکدار ہوتی ہے۔ نمک کی زیادتی کی وجہ سے خون میں پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے جلد پر چکنا بن آ جاتا ہے جیسے تیل مل دیا گیا ہو۔ لیکن یا در کھیں کہ بیضروری نہیں کہ ہر مریض اپنی تمام علامات کو ظاہر کرے یا اس کے ہر عضو میں دوا کی ہر علامت ظاہر ہو۔ کسی دوا کے بالمثل ہونے کے لئے اس کی بنیادی اور امتیازی علامات مریض میں ملنی چاہئیں۔ ہر تفصیلی علامت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔

نیٹرم میور کے مریض میں سخت تھا کاوٹ اور نقابہت کے آثار پائے جاتے ہیں۔ یہ نقابہت خواہ جسمانی ہویااعصابی، نیٹرم میور کے مریضوں میں دکھائی دے گی۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ مریض میں ہائیڈروکلورک ایسٹر کا توازن بھی بگڑ جاتا ہے جس سے مریض کوا جا تک کمزوری کے دورے بڑنے لگتے ہیں۔

نیٹرم میور کا ملیریا سے گہراتعلق ہے۔ دلد لی علاقوں میں مجھر کی وجہ سے ملیریا پھیاتا ہے اور ملیریا سے خون میں بہت تو ڑ پھوڑ ہوتی ہے۔ سرخ ذرات کم ہوجاتے ہیں اور خون میں پانی زیادہ ہونے گتا ہے۔ ان وجو ہات کی وجہ سے نیٹرم میور کی ضرورت پڑتی ہے ورنہ نیٹرم میور کا نمدار دلد لی علاقوں سے کوئی خصوصی تعلق نہیں ہے۔ ملیریا کا اصل تعلق مجھر ہوں وہاں ملیریا ضرور ہوگا۔ اور عموماً مجھر الیی آ ب وہوا

میں پایا جاتا ہے جودلد لی اور ساحلی ہو۔ ایسے علاقوں میں طبعاً ملیریا کی وجہ سے نیٹرم میور کی ضرورت بڑتی ہے لیکن با وجوداس کے کہ یہ ملیریا کی بہتر بن دواؤں میں سے ہا سے ہرگز ملیریا کے چڑھتے بخار میں نہیں دینا چاہئے کیونکہ یہ نہایت خطرنا ک نتائج ظاہر کرتا ہے اور بہت شخت رقمل دکھا تا ہے۔ نیٹرم میور کو ملیریا میں استعال کرنے کے مختلف طریقے بیان کئے گئے ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ پہلے بخار کا دورہ کم ہونے کا انتظار کرنا چاہئے یا مزیدا نتظار کرے دو بخاروں کے درمیانی وقفہ میں نیٹرم میور اونچی طاقت میں دیا جائے۔ اگر یہ بخار پر اثر انداز ہوگا تو بخار کا وقت بدل جائے گا اور بخار جلدی یا دیر سے آئے گا۔ اگر محض وقت تبدیل ہواور بخار کا فوری طور پر مزیدا نظار کئے بغیر دوسری دوا تلاش کرنی چاہئے۔ اگر میچ دوائی شاخت کرلیں گو فوری طور پر مزیدا نظار کئے بغیر دوسری دوا تلاش کرنی چاہئے۔ اگر میچ دوائی شاخت کرلیں گو فوری طور پر مزیدا تو بخار کی دفعہ غائب ہوجائے گا اور پھر آئے گا ہی نہیں یا اگر بخار وقت سے پہلے آئے اور اس کی مدت بھی تھوڑی ہوتو عمو ما اگلا بخاریا تو آتا ہی نہیں یا گربیل سے بہت کم ہوتا ہے۔ اس صورت میں دوا کو بخار اتر نے کے بعد پھر دہرانا جاہے۔

نیٹرم میور کی دماغی علامات عجیب ہیں۔شروع میں جب زہنی علامات ظاہر ہونے گئی
ہیں تو مریض اپنے آپ کومظلوم سمجھے لگتا ہے اور ہروفت اسی خیال میں کھویار ہتا ہے کین اس
کے باوجود کسی کی ہمدردی کو برداشت نہیں کرسکتا۔ علاوہ ازیں نیٹرم میور کا مریض فرضی محبت
میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ بعض بوڑھی عمر کی عورتیں بھی ایسی فرضی محبت میں مبتلا ہوجاتی ہیں۔اگر محبت کاعلاج دواسے ممکن ہے تو ایسی عورتوں کا علاج نیٹرم میورسے ہوسکتا ہے۔

اگر کوئی بخار لمباعرصہ پیچھا نہ چھوڑے اور اس کا د ماغ پر اثر پڑے تو نیٹرم میور کو آثر مانا چاہئے کیکن خاص طور پر غم سے د ماغ پر برٹر نے والے اثر ات میں نیٹرم میور بہترین ثابت ہوئی ہے۔ غم کے ابتدائی مراحل میں فوری طور پر اثر کرنے والی دوائیں اگنشیا (Ignatia) اور ایمراگر بیا ہیں۔ اگنشیا اپنے اثر ات کے لحاظ سے نسبتاً سب سے تیز

مگرعارضی دواہے، بارباردینی پڑتی ہے۔ اگر گہرائم زندگی کا حصہ بن چکا ہوتو وہ اگنیٹیا کے دائرہ اثر سے نکل جاتا ہے۔ ایم راگر سا (Ambra Grisea) ایسے مریض میں بہتر کام دکھاتی ہے۔ اس کے بعد نیٹر میور کی باری آتی ہے جس کے بارے میں میرا بیذاتی تجربہ ہے کہ اس سے پورے پاگل مریض بھی ٹھیک ہوجاتے ہیں۔ نیٹر میور کے مریض تشدد پیند نہیں ہوتے بلکہ خاموثی سے بیٹے رہے ہیں یا دنیا سے کھوئے جاتے ہیں اور جسمانی لحاظ سے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ انہیں غصہ بہت آتا ہے کیکن مار دھاڑ نہیں کرتے۔ دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ مریض بات کرتے کرتے بھول جاتا ہے کہ میں کیا کہنے لگا تھا۔ خیالات کا سلسلہ منتشر ہوجاتا ہے۔ اگر کسی انسان کا بات کہتے کہتے اپنے خیالات سے تعلق ٹوٹ جائے تو بیعلامت نیٹر میور کی بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی بات سنتے سنتے بھے کی صلاحیت کھو بیٹھے اور پچھ دیر سے سمجھے تو اس کے کہمی ہے۔ لیکن اگر کوئی بات سنتے سنتے بھے کی صلاحیت کھو بیٹھے اور پچھ دیر سے سمجھے تو اس کے کہمی ہم بہتر دوا ہے۔

نیٹرم میور کا مریض اکثر <u>کمر درد</u> کا شکارر ہتا ہے۔ بازوؤں، ٹانگوں خصوصاً گھٹنوں میں کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ ہاتھ کے <mark>ناخنوں کے اردگرد کی جلدخشکی سے بچیٹ</mark> جاتی ہے۔ٹانگیں بے حس ہوجاتی ہیں۔

نیٹرم میورکا مریض ڈبل روٹی، چکنائی اور روغی غذا کو پیندنہیں کرتا۔ بھوک بہت گتی ہے لیکن کھانے کے بعد تھکا وٹ اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ سینہ میں جلن کا احساس، جگر کے مقام پر شختی اور سوئیاں چھتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد بھاری بن اور تناؤ کا احساس شروع ہوجاتا ہے۔ معدے میں شدید کمزوری کے دورے پڑتے ہیں۔

نیٹرم میور کے مریض کے اعصاب سنے ہوئے ہوتے ہیں اور اسے ذرا سا بھی شور بر داشت نہیں ہوتا۔اچانک کوئی آ واز آ جائے تو سر در د ہونے لگتا ہے۔ کاغذ کی سرسراہٹ بھی بری گتی ہے۔

نیٹرم میور کا مریض بالکل ٹھنڈا ہوتا ہے۔لیکن گرم کمرے میں تکلیفیں بڑھتی ہیں۔کھلی ہوا پیند کرتا ہے۔اس پہلو سے اس کا نصف مزاح پلسٹیلا سے ملتا ہے۔ٹھنڈا ہونے کے باوجود باہر نکلنا پیند کرتا ہے۔کھلی ہوا میں جسمانی تکلیفیں کم ہوجاتی ہیں لیکن ڈبنی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ دوا کے مزاج کی اس قسم کی باریکیوں کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔نیٹرم میور کے مریض کا مزاج جلد جلد بدلتا ہے۔ جب اسے پسینہ آتا ہے تو فوراً نزلہ شروع ہوجاتا ہے لیکن اس نزلہ کو کھلی ہوا میں افاقہ ہوتا ہے۔

نیٹرم میور کا اثر جلد پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ایگزیما، خارش اور سوزش بالوں کے کناروں پر زیادہ ملتے ہیں۔ یہ نیٹرم میور کی خاص علامت ہے۔ خشک دانے بھی نکلتے ہیں اور بہنے والے زخم بھی ہوتے ہیں۔ جلد میں خارش اور سوئیاں چھتی ہیں۔ خارش کے دانوں سے رطوبت بہتی ہے۔ مختلف ٹکڑوں میں کھر نڈ بن کر اتر نے لگتے ہیں۔ نیٹرم میور کی ایک علامت سارسا پر بلا (Sarsaparrila) سے ملتی ہے کہ چھوٹی عمر میں ہی بڑھا ہے گے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔

نیٹر م میور میں م<mark>ر کا در درا</mark>ت سونے کے بعد تیسرے پہر شروع ہوتا ہے یا پھر صبح نو بجے۔

اگرضی کے وقت شدید سردرد ہوتو وہ جلسیمیم کی علامت ہے۔ نیٹرم میور میں عام طور پرگری گئے کی وجہ سے اور ملیریا بخار کے دوران ہونے والی تکیفیں نو بجے سے لے کررات تک جاری رہتی ہیں۔ سردردعموماً گدی میں ہوتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی تک بھیل جاتا ہے۔ نیٹرم میورکا ریڑھ کی ہڈی تک بھیل جاتا ہے۔ نیٹرم میور شروع ریڑھ کی ہڈی کی بہت ہی بھاریوں سے تعلق ہے خصوصاً '' چک' پرٹر جائے تو نیٹرم میور شروع میں بہت اچھااثر دکھاتی ہے۔ نیٹرم میور کے مریض کی اکثر علامتیں نرم بستر میں بڑھ جاتی ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی نسبتاً بہت حساس ہوجاتی ہے۔ اعصاب میں بے چینی محسوس ہوتی ہے اور در دہوتا ہے۔ سخت جگہ پر لیٹنے سے آرام آتا ہے۔

نیٹرم میور میں پراسٹیٹ گلینڈ کی علامتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ مریض پیشاب کے لئے جاتا ہے لیکن اس کو بہت انتظار کرنا پڑتا ہے کہ پیشاب جاری ہو۔ قطرہ قطرہ آتا ہے اور بعد میں بے چینی اور بے اطمینانی کا احساس رہتا ہے جیسے پیشاب پوری طرح خارج نہ ہوا ہو۔ بعض اوقات پیشاب کرنے کے آخر پریا بعد میں در دبھی ہوتا ہے۔ چلتے وقت یا بہنتے وقت اور کھا نستے ہوئے از خود پیشاب خارج ہوجاتا ہے۔ رات کو پیشاب خود بخو دنکل جائے تو کالی فاس کے ساتھ ملاکر دینا مفید ہے۔ عموماً بچوں میں یہ تکلیفیں ہوتی ہے کہ وہ گہری نیندسوجا کیں تو پیشاب آنے کا پیشہیں چاتا اور بستر گیلا کردیتے ہیں۔

نیٹرم میور میں شدید قبض ہوتی ہے یا دست شروع ہوجاتے ہیں۔ نیٹرم میور میں بھوک
کی زیادتی کے باوجود مریض دبلا پتلا اور لاغر ہوتا ہے۔ معدہ کی جلن کے ساتھ دل بھی دھڑکتا
ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے پسینہ آتا ہے۔ نمک کھانے کی بے حدخواہش ہوتی ہے۔ خالی پیٹ بہتر
محسوس کرتا ہے۔ کھانے کے بعد جلن اور تیز ابیت زیادہ اور منہ سے پانی آنے لگتا ہے۔
جسیا کہ اوپر ذکر آچکا ہے نیٹرم میور ملیریا کی بہت اچھی دوا ہے۔ ہرشم کا ملیریا
اس میں شامل ہے جوروز آئے یا لیے وقفوں سے آنے والا ہو۔ سب سے زیادہ خطرناک
ملیریا وہ ہوتا ہے جودودن تک نہ ہواور تیسرے دن آن پکڑے۔ یہ بہت مشکل سے پیچھا

چھوڑ تا ہے۔اس میں نیٹرم میور بہت مفید ہے۔بار ہا تجربہ سے ثابت ہواہے کہ نیٹرم میوردینے پر بخار تیسرے دن کی بجائے دوسرے دن آنے لگتا ہے اور کم ہوتے ہوتے ہفتہ دس دن کے اندر بالکل ٹھیک ہوجا تا ہے۔

اگرنیٹرم میور کے مریضوں کی بیاریاں بہت الجھ گئی ہوں اور غلط علاج کے نتیجہ میں بہت کمبی ہوگئی ہوں توایسے مریضوں کی علامات صاف کرنے کے لئے سلفر 200 بہت اچھا کام کرتی ہے اور چونکہ بیر گہرااثر رکھنے والی دوا ہے۔اس لئے ان میں سے بعض بیار یوں کو شفا بھی دیتی ہے۔ نیٹرم میور بھی بگڑے ہوئے بخاروں میں مریض کی علامتوں کوخوب کھول کراور نتھار کر سامنے لے آتا ہے۔ بخار بگڑ کرکئی شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔ ملیریا بگڑ جائے تو علامات میں بہت پیچید گیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ کہیں در د کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور کہیں کوئی دوسراروپ دھار لیتا ہے۔ایک قابل انگریز ڈاکٹر نے ملیریا کے بارے میں کہا ہے کہ بچمل کے سواہر دوسری بیاری کا بھیس بدل سکتا ہےاورسب علامتوں میں اتناالجھاؤ پیدا کر دیتا ہے کہ ڈاکٹر بیاری کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔اس تعلق میں نیٹرم میوراورسیبیا دونوں بہت اہم کردارادا کرتی ہیں۔ ملیریا بخار کے عمومی رجحان کودور کرنے کے لئے صحت کی حالت میں اونچی طاقت میں نیٹرم میوربعض دفعہ بہت کارآ مد ثابت ہوتی ہے۔اس طرح حفظ ما نقترم کے طور برعموماً آرنیکا ایک ہزاریا اس سے اونچی طاقت میں اور آ رسنک 1000 یا اونچی طاقت میں ساتھ ملا کردیناا کثر مفید دیکھا گیا ہے۔ نیٹرم میور میں بعض اوقات ہیپر سلف کی طرح گلے میں کچھ کھنسے ہونے کا احساس رہتا ہے۔مریض بار بار پھنسی ہوئی چیز نکالنے کی بے سود کوشش کرتا ہے۔ حلق میں کانٹے جیھتے ہوئے محسوں ہوتے ہیں۔اگر واقعتاً گلے میں کوئی چیز تھینس جائے مجھلی کا کانٹا ہویا کوئی اور چیز توسلیشیا اسے باہر نکالنے کی خاصیت رکھتی ہے۔ نیٹرم میور میں بعض دفعہ گلابہت خشک ہوجا تا ہے اور زخم بننے لگتے ہیں۔ نیٹرم میور میں بھی چھٹپھلی سی ورمیں یائی جاتی ہیں جیسی شہد کی کھی کے کاٹنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس لئے شہد کی مکھی کاٹ لے تو نیٹرم میور بطور علاج بہت مؤثر دوا

ہے۔اگر آرسنک اورلیڈم کے ساتھ ملا کراستعال کی جائے تو جیرت انگیز سرعت کے ساتھ فائدہ دیتی ہے۔ علاوہ ازیں شہد کی مکھی کے زہر کا اثر فوری طور پر دور کرنے کے لئے کاربا لک ایسٹر بہت شہرت رکھتی ہے۔

نیٹرم میورایپس (Apis) کا مزمن ہے۔ مزمن سے مراد ہے کہ کسی الیمی دوا کے اثر ات جونسبتاً عارضی فائدہ پہنچا ئیں اور ختم ہوجا ئیں۔ اگر کوئی اور دواانہیں آگے بڑھانے میں مددد بے تو اسے پہلی دوا کا مزمن کہا جاتا ہے۔ ایپس کی ورم کو ایپس سے پوری طرح فائدہ نہ ہوتو وہ نیٹرم میورد سے سے ختم ہوجاتی ہے۔ اسی طرح بعض اور بیاریوں میں بھی ایپس کے بعد نیٹرم میور کارآ مدہوتی ہے اس کئے اسے ایپس کا مزمن کہا جاتا ہے۔

بچہ کی پیدائش کے بعد باقی رہ جانے والی کمزوریوں کو دور کرنے کے لئے بھی نیٹرم میور مفید ہے۔ اگر بچ کی پیدائش کے بعد عورت کی عمومی صحت خراب ہو جائے تو کالی کارب کے علاوہ نیٹرم میور بھی مؤثر دواہے جوصحت کو بحال کرتی ہے۔ اگر بچے کی پیدائش کے بعد کمر درد کالی کارب سے ٹھیک نہ ہوتو نیٹرم میور بہت مؤثر ثابت ہوگی۔

اگر ماں کے دودھ میں کوئی الی کمی پائی جائے کہ بچہ صحیح رنگ میں پرورش نہ پائے یا دودھ جلد سو کھ جائے تو نیٹر م میوراستعال کرنا چاہئے۔ نیٹر م میوراس اندرونی زہر کو دور کرتا ہے جو بچے کی پرورش کی راہ میں حائل ہواور بچے کی ضرورت کے مطابق دودھ بھی بڑھا تا ہے۔ نیٹر م میور بچول کے سوکھا بن کی بھی بہترین دوا ہے۔ یہ سوکھا بن جسم کے اوپر سے نیچے کی طرف اترتا ہے۔ یہ بیاری بعض دفعہ ماؤں کی کسی بیاری کا نتیجہ ہوتی ہے لہذا ماں کا علاج بھی ضروری ہے۔ موزش بیدا کر نے والا لیکوریا ہو جس سے خارش بھی ہوتی ہو، حیض سے قبل طبیعت میں سوزش بیدا کرنے والا لیکوریا ہو جس سے خارش بھی ہوتی ہو، حیض سے قبل طبیعت میں افسر دگی اور غمگینی بیدا ہو، نیچے کی طرف ہو جھا ور در دمجسوس ہوتا ہو جوشج کے وقت زیادہ ہو۔ یہ سب اجتماعی علامات نیٹر م میور کے مریضوں میں ملتی ہیں۔ مسوڑ ھے متورم

ہوجاتے ہیں اورخون بہتا ہے۔ دانت ملتے ہیں اور سردی اور شخنڈی ہواسے تکلیف میں اضافہ ہوجاتے ہیں اور سردی اور شخنڈی ہواسے تکلیف میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ کھانے کے بعد اور رات کے وقت دانتوں میں درد ہوتا ہے جو کانوں تک تھیل جاتا ہے۔ زبان پرمیلی سی جھاگ دارتہ جم جاتی ہے۔ سرسراہٹ کا احساس ہوتا ہے جیسے زبان پربال چیکا ہوا ہو۔

سٹر ھیاں چڑھنے سے اور بائیں کروٹ لیٹنے سے دل کی دھڑ کن تیز ہو جاتی ہے۔ دل میں ٹھنڈک کااحساس ہوتا ہے۔ سینے میں جکڑن اور گھٹن محسوس ہوتی ہے۔

کالی کھانسی کے ساتھ آئکھول سے پانی بہے، سر میں شدید در دہو ، حرکت ہے، گہرا سانس لینے سے اور بستر میں گرم ہونے سے کھانسی بڑھ جائے تو یہ نیٹرم میور کی علامات ہیں۔ساحلی علاقوں میں اس کی تکیفیں بڑھ جاتی ہیں۔

مددگاردوائیں: ایمیں۔سیپیا۔اگنیشیا دافع اثر دوائیں: آرسنک۔فاسفورس طاقت: ۵۵-6xسےسی ایم (CM) تک

147

نيثرم فاسفورتكم

NATRUM PHOSPHORICUM

(Phosphate of Sodium)

نیز انسانی جسم میں موجود رطوبتوں میں پایا جاتا ہے۔ بیشوگر کے توازن کومعتدل رکھتا ہے اور خون میں شکر کی زیادتی کے لئے بہت مفید ہے کیکن اس کی عمومی علامتوں میں اعصابی تاو اور خون میں شکر کی زیادتی کے لئے بہت مفید ہے کیکن اس کی عمومی علامتوں میں اعصابی تناو اور اس کے بداثر ات، ذہنی پراگندگی، خوف اور غصہ ملتے ہیں۔اس کے علاوہ نو جوانی میں ہونے والی میں ہونے والے اخلاقی تجاوز ات اور جنسی بے راہ روی کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی بیاریوں میں بھی نیٹرم فاس مؤثر دوا ہے۔عموماً اسے 6x میں دیا جاتا ہے۔اگر خاطر خواہ نتا گئر آمدنہ ہوں تو 30 کیا طاقت میں دفعہ اس سے بھی اونچی طاقت میں دینی بڑتی ہے۔

نیٹرم فاس کا خون کے سرخ ذرات سے گہراتعلق ہے حالانکہ خون میں سرخ ذرات کی کمی میں فیرم میٹ یا فیرم مالا لیس تو بیہ خون کی کمی کا بہت اچھانسخہ ہے۔خون کی کمی کے لئے آغاز میں کالی فاس، فیرم فاس اور کلکیر یا فاس دینی چاہئے۔ بیحا ملہ خوا تین کی خون کی ضرورت کو پورا کرنے والی بہترین دوائیں ہیں کیکن انہیں سلسل استعمال نہیں کرنا چاہئے۔ کچھ عرصہ استعمال کرکے وقفہ دیں پھر دوبارہ شروع کروا دیں۔اگریہ فارمولا کام نہ کرے اور حاملہ یا غیر حاملہ مریضاؤں یا مریضوں کے خون کی اصلاح کرنی ہوتو ساتھ نیٹرم فاس بھی ملالیں۔ بہخون کی کمی اور ذیا بیطس دونوں کے لئے بہت مفید ثابت ہوگی۔

نیٹرم فاس کی ایک علامت سے کہ مریض کھلی ہوا کو پیندنہیں کرتا۔اس کے مزاج میں سلفر کے مریض کی طرح نہانے سے نفرت پائی جاتی ہے اور مستقل نزلے کار جحان ملتا ہے۔ مجھوک نا قابلِ برداشت ہوتی ہے جسے زیادہ کھانے سے آ رام آتا ہے۔مریض چکنا کی ،مرغن غذا کیں ،سرکہ، پھل اور دودھ وغیرہ پیندنہیں کرتا۔ چکنائی سے نفرت کی علامت پلسٹیلا سے مشاہہ ہے۔

جب لمج عرصہ کی بیاریوں کے نتیجہ میں جسم کے لعاب خشک ہو گئے ہوں اور رطوبتوں میں کمی آگئ ہوتو انہیں بحال کرنے میں نیٹرم فاس بھی اچھا کام دکھاتی ہے مگر چائنا بہر حال نمایاں فوقیت رکھتی ہے۔

بعض اوقات جسم کا کوئی حصہ سن ہوجاتا ہے۔ ہاتھ، انگی یا کان کا ایک حصہ سوجائے تو اس میں نیٹر م فاس اچھی دوا ہے۔ اس طرح جسم کے کسی خاص حصہ کی طرف خون کا دباؤ بڑھ جائے تو اس میں بھی نیٹر م فاس مفید ہے۔ رات کو جاگتے ہوئے اچا تک جھکے گئے لگیں اور خون کی شریا نوں میں تیز چلتے ہوئے درد کا احساس ہوتو یہ بھی نیٹر م فاس کی علامات میں سے ایک ہے۔ مگران سب تکلیفوں میں نیٹر م فاس اسی وقت کا م کرے گی جب یہ مزاجی دواہو۔ ورنہ یہ بیاریاں تو بہت ہی دواؤں میں ملتی ہیں مگر ہر دوا بالمثل فابت نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ لیٹے لیٹے جسم پراچا نک زلزلہ سا آ جا تا ہے۔ اس کے جھکے زلزلہ کی طرح اچا تک اور سخت ہوتے ہیں۔ عضلاتی ریشوں کی کمز در یوں میں اورا عصابی تناؤخصوصاً آ نکھ کے اعصابی تناؤ میں نیٹر م فاس بہت مؤثر دوا ہے۔ اسی طرح یہ پھوں کے پھڑ کئے کے لئے بھی اچھی ہے۔ چونکہ نیٹر م فاس کے مریض کے معدہ میں تیز ابیت پائی جاتی ہے۔ اس لئے اس کے بسینہ اور بدن کی بومیس ہو جا تا ہے۔ اس میں دوسری معروف بومی کے علاوہ نیٹر م فاس سے فوراً فائدہ ہوتا ہے اور آ ئندہ خطرات سے نجات مل جاتی ہے۔ دواؤں کے علاوہ نیٹر م فاس سے فوراً فائدہ ہوتا ہے اور آ ئندہ خطرات سے نجات مل جاتی ہے۔

ہے ورنہ ایسا مریض یا گل بھی ہوسکتا ہے یا پھرا سے ہسٹیر یا کے دورے بڑنے لگتے ہیں۔سرمیں خارش ہوتی ہے اور زرد رنگ کے دانے بن جاتے ہیں۔ ماتھے کے ایگزیما میں بھی مفید ہے۔ سر بھاری ہوا اور بال جھڑتے ہوں تو نیٹرم فاس اچھی دوا ہے۔عمو ماً سُنجے بین میں کوئی دوا کافی نہیں سمجھی جاتی لیکن کسی کمزوری کی وجہ سے بال جھڑنے لگیس تواگروہ کمزوری دورکر دی جائے تو گنجا ین خود بخو دٹھیک ہونے گلے گا۔خصوصاً اگر ایلوپیشیا (Alopecia) ہوتو اس میں ہومیوپیتی کا نسخہ غیر معمولی کامیاب ہے اور حیرت انگیز طور پر کام کرتا ہے۔اس بیاری میں سارے سرکے بال کچھوں کی صورت میں اتر نے لگتے ہیں جو تیجے دوادیئے سے دیکھتے ہی دیکھتے دوبارہ اگنے لگتے ہیں۔ نیٹرم فاس میں سر درو د ماغی محنت سے بڑھتا ہے۔ آئکھوں، گدی اورکنیٹیوں میں درد ہوتا ہے۔سوئیاں سی چیجتی ہیں اور جلن کا احساس بھی رہتا ہے۔ آئکھول کے لئے بھی نیٹرم فاس بہت مفید دواہے۔اگر بڑھتے ہوئے دائیں آنکھ میں پھڑ کن ہوتو نیٹرم فاس خاص طور یر مفید ہے۔اگر دیگر علامتیں ملیں تو جھانگے بن میں بھی شافی ثابت ہوتی ہے۔دن میں تھ کاوٹ کی وجہ سے آئکھوں کے سامنے تا رے ناچنے کیس تواس میں رسٹائس اولیت رکھتی ہے مگر نیٹر م فاس بھی مفید ہوسکتی ہے۔نیٹر م فاس میں آئکھوں سے پیلے رنگ کی رطوبت نکلتی ہیں اور آئکھیں زردسی ہوجاتی ہیں۔آئکھوں کےسامنے دھندآ تی ہے۔ پیوٹوں میں خارش اورجلن ہوتی ہے۔ دور کی نظر کمزور ہوتی ہے۔

کاُنوں میں ہرطرح کی آوازیں آتی ہیں۔قوت شنوائی میں تیزی آجاتی ہے یا کمی واقع ہو جاتی ہے۔کان میں درد ہوتا ہے۔کا نوں کے پیچھےسوئیاں سی چھتی ہیں۔صرف ایک کان سرخ اورگرم ہوجا تا ہے اوراس میں خارش ہوتی ہے۔

نیٹرم فاس کا مریض عموماً نزلہ زکام کا شکار رہتا ہے۔ ناک میں گاڑھی رطوبت جم جاتی ہے۔ چینکول کا رجحان ہوتا ہے۔ قوت شامہ زیا دہ تیز ہوتی ہے۔ بائیں طرف کے نتھنے میں سرسرا ہٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے چینکیں آتی ہیں اور آئھول سے پانی ہنے لگتا ہے۔ گلے میں زردرنگ کی بلخم گرتی ہوتو نیٹرم فاس دوا ہو سکتی ہے۔ نیٹرم فاس میں

مسوڑ هوں سےخون بہتا ہے۔زبان پرزر درنگ کی تہ جم جاتی ہے۔تالومیں بھی زردی یائی جاتی ہے۔منہاور زبان خشک ہوتے ہیں۔ دانت گل جاتے ہیں۔ بیچے رات کو دانت پیستے ہیں۔ زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے دانتوں میں سوراخ ہوں تو نیٹرم فاس بھی اس کی ایک دواہے۔ تیزاب کی زیادتی کی وجہ سے معدے میں السر ہوں اور پھوڑے کا سا درد اور سوئیاں چھنے کا احساس ہوتو نیٹرم فاس کام آ سکتی ہے۔اسہال کا قبض سے بدلنا دواؤں میں بكثرت ياياجا تا ہے۔اگرا يسے مريض كا مزاج نيٹرم فاس سے ملتا ہوتو نيٹرم فاس بھی اس تكليف کاازالہ کرسکتی ہے۔ پیٹ کے کیڑے بھی اس کے دائر ہ کارمیں آتے ہیں۔ کئی بچے رات کو بستر میں پیشاب کردیتے ہیں،اس میں نیٹرم فاس کو کالی فاس اور نیٹرم میور کے ساتھ ملا کر دینا زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔اگریسینہ بہت آئے توپیشاب کی مقدار کم ہوجاتی ہے لیکن نیٹرم فاس میں پیجیب بات ہے کہ پسینہ بھی زیادہ اور بیشا بھی زیادہ آ تا ہے۔شوگر کی زیاد تی سے تعلق رکھنے والی زنا نہ ومردانہ جنسی بیاریوں میں نیٹرم فاس مفید ثابت ہوسکتی ہے۔اگر رحم اپنی جگہ سےٹل جائے اور اس وجہ سے حمل نہ تھہرتا ہوتو نیٹر م فاس حمل میں حائل روک کو دور کرسکتی ہے بشر طیکہ رحم کواینے اصل مقام کی طرف واپس لے جائے۔ نیٹرم فاس اس کھوکھلی کھانسی میں بھی مفید ہے جوسینداور حجرہ میں سرسراہٹ کے ساتھ بیدا ہو۔ نیٹرم فاس کی ایک خاص علامت سے کہ دل سے ایک بلبلہ سااٹھتا ہے جوخون کی شریانوں میں جاتا ہوامحسوس ہوتا ہے۔ سینہ میں تنگی اور جکڑن کا احساس ہوتا ہے۔ بے بینی ہوتی ہے اور سینہ کے اویر والے حصہ میں بھراؤ کا احساس ہوتا ہے۔ بعض اوقات در دبھی ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد اور گہرا سانس لینے سے نالیاں سکڑتی ہیں اور دل کی علامات ظاہر ہونے گئی ہیں۔ دل کی دھڑ کن تیز ہوجاتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ شور وغل سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ بائیں کروٹ لیٹنے سے بھی ان سب تکلیفوں میں اضافہ ہوجاتا ہے جودل کی بیاری کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ سپر ھیاں چڑھنے سے دل کی

دھڑ کن بڑھ جاتی ہے۔

حیض کے دوران پیٹھاور کمر میں درد ہوتو نیٹر م فاس اچھی دوانتھی جاتی ہے کین میرا تجربہ ہے کہاس کے ساتھ کالی فاس اور میگ فاس ملا کر دی جائے تو زیادہ اچھااثر ہوتا ہے۔

پیٹے میں تھچاؤ، درداور پسینہ کی علامت نمایاں ہوتو نیٹرم فاس اچھی دوا ہے۔ دل کی بیاری میں اگر گردن کے دونوں طرف در دہوتو اس میں نیٹرم فاس بھی دوا ہوسکتی ہے۔

حیض کے ایام میں خصوصاً دن کے وقت ہاتھ پاؤں ٹھنڈ ہوتے ہیں۔ لکھتے ہوئے ہاتھ میں اینٹھن ہوتی ہے۔ ہاتھ میں اینٹھن ہوتی ہے۔ ہاتھ پاؤں میں چیونٹیال رینگنے کا احساس بھی نمایاں ہوتا ہے۔ اعضاء کا بھاری بن اورس ہوجانا بھی نیٹرم فاس کی علامت ہے۔ جوڑوں میں در دہوتا ہے۔ عضلات میں خصوصاً پنڈلیوں میں تشنج اور کمزوری کا احساس جوڑوں میں کڑ کڑانے کی آوازیں، جوڑوں کا در دبالعموم دائیں کندھے سے شروع ہوتا ہے اور بعض اوقات یہاں تک ہی محدود رہتا ہے۔ سارے جسم میں رگڑ گئے سے بیدا ہونے والے در دکا سااحساس۔ چلتے چلتے اچا تک کوئی گاگ جواب دے دیتی ہے لیکن یہ کیفیت وقتی ہوتی ہے۔

جلد پرخشک، جلن والے دانے بن جاتے ہیں اور زردسنہری کھرنڈ ابھر آتے ہیں۔جسم پرسرخ یا زر درنگ کے داغ نمایاں ہوجاتے ہیں۔ فیرم فاس میں بھی سرخ دانے نکلنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ نیٹرم فاس میں جلد زردی مائل ہوجاتی ہے۔ ماؤف حصہ میں اور جلد میں ورم ہوتی ہے۔ چیونٹیاں رینگنے کا احساس ہوتا ہے۔ مہاسے بھی نکلتے ہیں۔

نیٹرم فاس کے مریض کو گوزیا دہ نیند آتی ہے مگر بہت گہری نیند نہیں آتی۔ پریشان کن خواب دیکھتا ہے۔ کرسی پر بیٹھے بیٹھے سوجا تا ہے۔ کھانے کے بعد نیند کا بہت غلبہ ہوتا ہے۔

طاقت: 6x اور 30 سے 200 تک

نیٹرم سلف

148

نيشرم سلفيور تكم

NATRUM SULPHURICUM

سوڈیم اورسلفر سے بنی ہوئی دوانیٹرم سلف اہم اندرونی تبدیلیاں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کا جگر سے گہراتعلق ہے۔ شوگر کے لئے بہت مفید دوا ہے۔ اگر نیٹرم سلف 200 طاقت میں ہفتے میں ایک دو بار اور کلکیریا فاس، کالی فاس اور نیٹرم فاس فیٹرم سلف 200 طاقت میں ہفتے میں ایک دو بار اور کلکیریا فاس، کالی فاس اور نیٹرم فاس 6x میں دن میں تین چار بار با قاعدگی سے دیں تو ذیا بیٹس کے علاج میں بیا یک وسیع الاثر نسخہ ثابت ہوا ہے۔ بعض اوقات ان چاروں دواؤں کو 6x میں بھی دیا جا تا ہے اور اچھے نتائے ظاہر ہوتے ہیں۔

نیٹر مسلف کی علامتیں آ دھی رات سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ بھیگے ہوئے موسم میں اس کی تکلیفیں بڑھتی ہیں۔ اس کے مریض زبنی اور جسمانی لحاظ سے بہت حساس ہوتے ہیں۔ درد کو بہت شدت سے محسوس کرتے ہیں لیکن حرکت سے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ تمام جسم میں دھن کا احساس رہتا ہے۔ اس کی نزلاتی تکلیفیں موسم بہار میں زیادہ نمایاں ہوجاتی ہیں۔ سرکی چوٹ لگنے پراندرونی بدائر ات سے بچانے کے لئے نیٹر مسلف نہایت اعلی درجہ کی دوا ہے۔ سرکی پرانی چوٹ کے مریضوں کو بھی آر نیکا کے ساتھ نیٹر مسلف ملا کر دیا جائے تو بہت ہی مفید نسخہ ہے۔ وضع حمل کے وقت بعض اوقات بچے کے سر پر دباؤ پڑتا ہے۔ ایسے بچوں کو ماں کے دودھ کے ذریعہ فوری طور پر نیٹر مسلف استعمال کروانی جا ہے تا کہ کوئی منفی نتائج ظاہر نہ ہوں اور بچہ نیم فیالی ہونے سے نے جائے۔

نیٹرم سلف دمہ کی بھی بہترین دوا ہے۔خصوصاً ان مریضوں کے لئے جنہیں مرطوب موسم میں دمہ میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ شروع میں نزلہ ہوتا ہے جوجلد بگڑ کر چھاتی کو

جگڑ لیتا ہے اور دمہ کی تکلیف شروع ہوجاتی ہے۔ بلغمی کھانسی کے ساتھ سانس لینے میں سخت دشواری پیش آتی ہے۔ سفیدرنگ کی لیس دار بلغم نکلتی ہے۔ معمولی حرکت کرنے اور چلنے سے سانس پھولتا ہے۔

نیٹرم سلف میں مریضوں کے جسم پر مہاس<u>ے نکلنے کا رجحان</u> عام ملتا ہے۔ تمام جسم پر مہاسے نکل آتے ہیں۔ سر کا ایگزیما بھی اس کی نمایاں علامت ہے۔ سرخ رنگ کے دانے بنتے ہیں۔

بنتے ہیں۔

اگرآ تھوں کو روشنی سے زود حسی ہوتو نیٹر مسلف اس میں بھی مفید ہے۔ آتھوں سے

پانی بہتا ہے۔ اگر ایک آتکھ سے پانی بہا اور اسی طرف گدی میں در د ہوتو یہ کالے موتیا کی

ابتدائی نشانی ہے۔ اس کے لئے کلکیر یافاس اور جلسیمیم بہترین دوا ئیں ہیں۔ لیکن اگر دونوں

آتکھوں سے پانی بہتا ہواور نظر کمزور ہوتو نیٹر مسلف بہتر دوا ہے۔ اگر آتکھوں میں زردی پائی
جائے اور انفیکشن اتن زیادہ گہری ہوجائے کہ پیپ کا رنگ سنری مائل ہواور پلکیں آپس میں
جڑنے لگیں تو بھی نیٹر مسلف موثر دوا ہوسکتی ہے۔ کا نول میں شور کی آوازیں آئیں اور دباؤ محسوس ہوتو یہ کارگر نابت ہوگی بشر طیکہ نیٹر مسلف کا مزاجی مریض ہو۔

نیٹر مسلف میں دائیں طرف کی تکلیفیں بائیں کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ حیض کے ایام سے پہلے یا بعد میں نکسیر پھوٹے کار جمان ہوتواس میں بھی نیٹر مسلف کوآ زمانا جا ہے۔ وبائی انفلوئنزا میں بھی اسے استعال کیا جاتا ہے۔ اگر مسوڑ سے دانتوں کو چھوڑ نے لگیں، گلے کی تکلیفیں جن میں گاڑھا چہٹے والا بلغم نکلے نیز تیز چلتے ہوئے دم گھٹے کا اور سانس پھولنے کا احساس ہوتو بھی نیٹر مسلف اچھی دوا ثابت ہوسکتی ہے۔ گلہڑ میں بھی مفید ہے۔ گلے کے غدودوں سے اس کا گہراتعلق ہے۔ اگر غدوداندر کو بڑھے ہوئے اور متورم ہوں اور کھٹی اور سبزر رنگ کی قے آتی ہوتو نیٹر مسلف بالمثل دوا ثابت ہوتی ہے۔

نیٹرم سلف با قاعد گی سے دی جائے تو بنتے کی پھر یوں کو بھی گھلا دیتی ہے۔اس مرض کی دوسری اہم دوالا نیکو پوڈیم 200 ہے جس کے ساتھ چیلی ڈونیم 30 طاقت میں دن میں تین بار دیں۔اگر معدے میں ہوا بند ہواور شدید بل پڑیں یا پیٹ کے غدود بڑے ہوکر گلٹیاں بن جائیں تواس میں بھی نیٹر مسلف مفید ہے۔

گرمی کی وجہ سے اچا تک اسہال شروع ہوجا ئیں جن کا رنگ سبزی مائل ہو، پرکپاری کی طرح آئیں اور مقدار میں بہت زیادہ اور متعفن ہوں تو اور بہت سی دواؤں کے علاوہ نیٹر مسلف بھی دوا ہوسکتی ہے۔

یہ حگر کی بہترین دواؤں میں شار کی جاتی ہے۔اگر شوگر کے بغیر بھی پیشاب بار بار آئے اور رات کوجلد جلد اٹھنا پڑے تو نیٹر مسلف کو بھی آز مائیں۔

بعض اوقات ذہنی دباؤیا موسم کے بدلنے کی وجہ سے رات کو بار بار پیشاب آتا ہے۔ اس میں آرسنک اور دیگر اعصابی دوائیں زیادہ مفید ثابت ہوسکتی ہیں۔ایک نسخہ کام نہ کریتو حسب حالات دوسرانسخہ استعال کر کے دیکھنا چاہئے۔

اگر پراسٹیٹ گلینڈ بڑھ جائے اور نیٹر مسلف کی دوسری علامتیں بھی موجود ہوں تو نیٹر م سلف اکیلی ہی کافی ہوتی ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ ساتھ نیٹر م فاس 30یا 200 طاقت میں دی جائے۔ سینہ میں کھڑ کھڑ اہٹ ہواور لیس دار بلغم نکلے نیز کھانسی آنے پر سینہ میں پھوڑ ہے کی طرح در دہواور کھانسی مزمن ہو جائے تو یہ دوا کام آسکتی ہے۔ مریض کو گہرا سانس لینے کی تمنا ہوتی ہے۔ سینے میں خصوصاً بائیں طرف در دہوتا ہے۔

نیٹر مسلف میننجا کٹس لیعنی گردن تو ڑ بخاریا دماغ کی سوزش میں بہت او نچا مقام رکھتی ہے۔ اگر کسی بچ کو میننجا کٹس ہو جائے تو سب سے پہلے فیرم فاس ، سلیشیا ، کا کی میور ، میگ فاس اور کا لی فاس 6x میں دیں۔ ساتھ ہی نیٹر م سلف 200 طاقت میں دو تیں۔ ساتھ ہی نیٹر م سلف 200 طاقت میں دو تین باردیں ۔ یہ بینجا کٹس کا بہت مؤ ثر نسخہ ثابت ہوا ہے۔ اگر فوری طور پر جھلیوں کے اس ورم کا علاج نہ کیا جائے تو بعض اوقات مستقل مرگی کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ خاص طور پر اگر اینٹی بائیونک دواؤں سے بخار دبا دیا جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ دماغ پر دائی اثر رہ جائے گا۔ اس لئے مذکورہ بالانسخہ اور نیٹر م سلف پر ہی اکتفاکرنا چاہئے۔ چند

دن کے اندراندر مینجائٹس سے کمل شفاہوسکتی ہے۔

مرطوب موسم میں اعضاء کے درد برط جاتے ہیں۔ نیٹر مسلف سردیوں میں جوڑوں کے درداور بخار میں اعضاشکنی کے لئے بھی مفید ہے۔ بازوؤں اور ہاتھوں پر مسول کے لئے بھی نیٹر م سلف کام آسکتی ہے۔ بتھیلی کے ایگزیما اور انگیوں کے درمیان نم دار ایگزیما میں نیٹر م سلف 8 غیر معمولی موثر ثابت ہوئی ہے۔ بیمرض پرانا بھی ہوتو چھوٹی طاقت ہے ہی دور ہوسکتا ہے۔ نیٹر م سلف میں سلفر کی طرح سر کی چوٹی پر گرمی اور حدت کا احساس ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد بیشانی میں شدید درد ہوتا ہے۔ سرمیں بھاری بن، گدی میں درداور چکر اس کی فناند ہی کرتے ہیں۔

نیٹرم سلف کی ایک علامت ہے ہے کہ ناخنوں کی جڑوں میں سوزش ہو جاتی ہے ایرٹیاں جلتی ہیں، گھٹنوں میں تختی اور اینٹھن کا احساس ہوتا ہے۔ کولہوں اور ہاتھ پاؤں کے جوڑوں کے دردوں میں مرطوب موسم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نیٹرم سلف جسم اورخون کی رطوبتوں کا توازن بحال کرنے میں اہم کردارادا کرتی ہے۔

مددگاردوائین: آرسنک تھوجا

طاقت: 6x اور 30سے بی ۔ایم (CM) تک تمام طاقتیں

149 نکس وامیکا NUX VOMICA

(Poison Nut)

تکس وامیکا ایک ایسے پودے کے بیجوں سے تیار کی جانے والی دوا ہے جو ہمیشہ سرسبر
رہتا ہے۔ اس کے بچولوں کی بوناخوشگوار اور پھل نارنجی رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کے بیج نرم نرم
بالوں میں لیٹے ہوتے ہیں۔ ان بیجوں کو پیس کر دوا بنائی جاتی ہے۔ روایت طب میں یہ بہت
خطرناک بیاریوں مثلاً پلیگ (طاعون)، ہسٹیر یا، وجع المفاصل اور پاگل کتے کے کاٹنے سے
پیدا ہونے والی تکالیف دور کرنے کے لئے استعال کی جاتی رہی ہے۔ چونکہ ان بیجوں میں بہت
سے زہر یلے مادے پائے جاتے ہیں اس لئے ان سے تیار کردہ ہومیو پیتھک دوا یعنی کس وامیکا
بہت وسیع بیانے پر زہروں کے تریاق کے طور پر استعال ہوتی ہے۔ ایسے مریض جو ہرفتم کی
دوائیں بہت زیادہ مقدار میں استعال کر چکے ہوں، ان کوکس وامیکا دینی چاہئے کیونکہ بیا کثر دواؤں کی پیدا کردہ علامتوں کو دور کرکے مریض کی تحقی صاف کردیتی ہے۔

کس وامیکا کاسلفرے گہراتعلق ہے۔سلفرزندگی کوتقویت دے کر جور ممل پیدا کرتی ہے۔ ہے وہ اکثر جلدی بیماریوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور بہت تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے۔ ککس وامیکا ان جلدی علامتوں میں جھاڑو کا ساکام دیتی ہے لیکن عوارض کو واپس اندر کی طرف نہیں دھکیاتی۔ اس لحاظ سے بیسلفر کی بہترین مددگار ثابت ہوتی ہے کیونکہ بیاس کے اچھے اندرونی اثر کو زائل کئے بغیر جلدی تکلیفوں کو زم کرتی ہے۔سلفر سے اگر بواسیر کے مسول کا علاج کیا جائے تو ساتھ کس وامیکا ضرور دینی چاہئے۔ بیان مسوں میں نرمی پیدا کرنے کے لئے بہترین معاون ثابت ہوتی ہے۔

تکس وامیکا مختلف قتم کی الرجیوں میں بھی مفید ہے۔ بعض لوگوں کو جاول یا گوشت کھانے سے الرجی ہوجاتی ہے۔ معدہ کی تیز ابیت میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ نکس وامیکا دینے سے اللہ کے فضل سے بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔ چاولوں کی الرجی دور کرنے کے سلسلہ میں نکس وامیکا کا کوئی ذکر کتابوں میں تو نہیں ملتالیکن میں نے اس کی بعض علامتوں کی وجہ سے اسے ایسے مریضوں پر استعال کیا ہے۔ الا ماشاء اللہ، یہ چاولوں سے پیدا ہونے والی الرجی کو اکثر دور کر دیتی ہے۔ حالا نامی کے دوا ہے جبکہ چاول کی الرجی مرطوب دواؤں سے تعلق رکھتی ہے۔

نظام ہضم میں خرابی کی وجہ سے معدہ میں تیز ابیت پیدا ہونے گئے تو مریض کا مزاج چڑ چڑا ہوجا تا ہے اوروہ جلد غصے میں آجا تا ہے۔ایسے مریض عموماً دیلے پہلے ہوتے ہیں۔بعض صور توں میں موٹے لوگ بھی معدہ کی تیز ابیت کا شکار ہوتے ہیں۔ان کے لئے گئی اور دوائیں مفید ہیں۔ نکس وامیکا ایسے دیلے پہلے نسبتاً نو کیلے مریضوں کی دوا ہے جو غصلے اور چڑ چڑے موتے ہیں۔ایسے مریضوں کی بعاریوں میں اضافہ کر دیت ہوتے ہیں۔ایسے مریضوں کی بعض خاص عادات ہوتی ہیں جوان کی بیاریوں میں اضافہ کر دیت ہیں مثلاً رات کو دیر تک جاگنا، لمبے عرصہ تک بیٹھ کر کام کرنا اور مناسب ورزش کا فقدان۔مغربی ہیں مثلاً رات کو دیر تک جاگنا، لمبے عرصہ تک بیٹھ کر کام کرنا اور مناسب ورزش کا فقدان۔مغربی تہذیب میں بہت زیادہ شراب کی عادت اور ہماری تہذیب میں مرغن غذاؤں اور چٹخورہ بن کی تجد سے جب معدہ جواب دے جاتا ہے تو بہت تیز اب پیدا کرتا ہے۔ایسے سب مریضوں میں کس وامیکا اچھااٹر دکھاتی ہے۔

نظام ہضم کے علاوہ نکس وامیکا کا اندرونی مرکزی اعضاء سے بہت گہراتعلق ہمیں ہے لیکن بیرونی عضلات، اندرونی جھلیول اور جلد سے اس کا تعلق ہے۔ اگر بہت زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے کمر کے عضلات میں درد ہوتو اکثر نکس وامیکا سے بیمرض دور ہوجا تا ہے۔ نکس وامیکا کا کمر در دایک ہی جگہ گھہرار ہتا ہے۔ اگر اس کی دیگر علامات ملتی ہوں اور معدے میں تیز ابیت بھی ہوتو ایسے مریضوں کی اچا تک پیدا ہونے والی کمزوری میں جس کے نتیجہ میں بعض دفعہ ہاتھ ہلانے کی طاقت بھی نہیں رہتی بیووری فائدہ دیتی ہے اور مریض میں فی الفور جان پڑنے گئی ہے۔ 30 طاقت میں چند منٹوں کے وقفہ سے دیں مریض میں فی الفور جان پڑنے گئی ہے۔ 30 طاقت میں چند منٹوں کے وقفہ سے دیں

تواللہ کے فضل سے غیر معمولی شفا ہوگی۔

نکس وامیکا کا زہرانتڑیوں کی طبعی حرکت کوست کر دیتا ہے۔ صحت مندلوگوں میں خوراک کھانے کے بعد معدہ سے لے کرانتڑیوں کے آخری کنارے تک ایسی حرکت مسلسل ہوتی وہ نئی چاہئے جو نیم ہضم خوراک کو آگے لے جائے ۔ خدا تعالی نے اس کی رفتار معین فرمادی ہے۔ اگر صحت ٹھیک ہوتو چودہ گھنٹے میں اس کا دور مکمل ہونا چاہئے ۔ اس کے بعد یہ فضلہ پچھ عرصہ بڑی آنت کے آخری حصہ میں موجود رہتا ہے جہاں بڑی آنت اس میں شامل زائد رطوبت کو چوتی رہتی ہے۔ اس طرح کل چوہیں گھنٹے میں ایک صحت مندانسان کو ایک بار اجابت ہوتی ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح کل چوہیں گھنٹے میں ایک صحت مندانسان کو ایک بار اجابت ہوتی ہوتی اسہال شروع ہوجائیں گے اور بھی اس نظام کے بگڑنے سے اسہال لگ جانے کی بجائے اسہال شروع ہوجائیں گے اور بھی اس نظام کے بگڑنے سے اسہال لگ جانے کی بجائے بندھی ہوئی اجابت بار بار ہوگی ۔ کئس وامیکا خصوصاً اس بیاری کا مؤثر علاج ہے۔

معدہ کی خرابی سے بسااوقات دمہ میں تیزی پیدا ہوجاتی ہے۔ جن لوگوں کودمہ ہو انہیں خاص طور پر الیمی چیزوں سے پر ہیز کرنا چاہئے جن سے نزلہ ہو جائے یا معدہ خراب ہو جائے ۔ان کے نتیجہ میں دمہ کے مریضوں کو ہمیشہ دمہ ہوجا تا ہے۔ بہت ٹھنڈی یا کھٹی چیزیں مثلاً اچار وغیرہ تو دمہ کے مریضوں کے لئے سخت مہلک ثابت ہوتی ہیں۔ تیزاب کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہونے والے دمہ میں نکس وامیکا بہت مفید ہے۔ نزلاتی دمہ کے لئے حفظ ماتقدم کے طور پرنزلہ کی روک تھام کی دوائیں با قاعد گی سے استعال کرنی چاہئیں تا کہ نہ نزلہ ہو نہدمہ کا خطرہ رہے جیسے اردومحاورہ ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔

نکس وامیکا بنڈ لیول کے تنفج میں بھی مفید ہے۔ آغاز ہی میں دے دی جائے تو بہت جلدا تر دکھاتی ہے۔ اگر تشنج میں بیلا ڈونا کی علامتیں پائی جائیں تو بھی نکس وامیکا ہی شافی ثابت ہو جاتی ہے۔ تشنج کے معاملہ میں نکس وامیکا میں کچھ تضاد بھی پایا جاتا ہے مثلاً کمر در د کو ٹھنڈ سے تکلیف مگر پیٹ در د کو گرمی سے تکلیف ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکس وامیکا میں متعدد کیمیائی عنا صرشامل ہیں جو مختلف او قات میں اپنے الگ الگ اثر ات ظاہر کرتے ہیں۔ نکس وامیکا میں بیلا ڈونا اور کیوپرم کے اجزاء شامل ہونے کی وجہ سے بعض تکلیفوں میں گرمی نقصاین پہنچاتی ہے۔

روزمرہ کے شنج کے ازالے کے لئے مکس وامیکا بہترین عمومی دوا ثابت ہوئی ہے۔ یہ بے خوالی کی بھی مؤثر دوا ہے۔مثلاً جولوگ نشہ کے عادی ہوں یا جنہیں نیند کی گولیاں کھانے _____ کی عادت پڑجائے ان کے لئے نکس وامیکا بہترین متبادل ہے۔ میں ڈرگ (Drug) کے عادی مریضوں کاعلاج اکثرنکس وامیکا سے ہی شروع کرتا ہوں اورالا ماشاءاللہ سب کوفا کدہ ہوتا ہے۔ ایک د فعدا یک نو جوان کو جونشہ کا عادی تھا،اس کے پریشان حال ماں باپ میرے پاس لائے۔ اس کی عادت کونیند کی گولیوں کے ذریعہ چھڑ وانے کی کوشش کی جار ہی تھی لیکن بھاری مقدار میں گولیاں کھا کربھی اسے بمشکل نیندآتی تھی۔ میں نے اسے نکس وامیکا 30، دن میں تین دفعہ استعال کرنے کے لئے دی اوراس کی نیندگی گولیوں کی شیشی اپنے پاس رکھ لی تا کہا گررات کو نیندنهآ ئے توضح آ کرواپس لے جائے۔رات کووہ کمبےعرصہ بعد پہلی دفعہ آ رام سے سویا اور مبح آ کراس نے مجھے بتایا کہ نیند کی گولیوں سے جو نیند آتی تھی وہ بے چین کرنے والی ہوتی تھی لیکن نکس وامیکا لے کروہ چین اور آ رام سے سوتا رہا ہے۔اس کی نیند کی گولیاں ایک مدت تک میرے پاس بطورنشانی پڑی رہیں ۔غرضیکہ کس وامیکا نشہ آور چیزوں کے منفی اثر ات کو دور کرنے اور نیند کی گولیوں سے پیچھا حیمٹر وانے کے لئے اکثر مفید ثابت ہوتی ہے۔اگر بیا کیلی کافی نہ ہوتو ساتھ کیمومیلا استعمال کروائیں۔ بید دونوں دوائیں نیندلانے کےعلاوہ بہت سی نشہ آ ورڈرگز (Drugs) کے بداثر ات کوختم کردیتی ہیں۔

اگر بہت سے کا موں کا بو جھ ہو، بہت بولنا پڑا ہو یا د ماغ میں کسی وجہ سے بیجان ہواور

نیند نہ آئے تو اس میں بھی تکس وامیکا بہترین دوا ہے۔ یہ کافی (Coffee) کے بدا تر ات کا بھی

بہت اچھاتریا تی ہے۔ کافی چینے سے جن مریضوں کی نینداڑ جاتی ہے اللہ کے فضل سے تکس وامیکا

کی ایک ہی خوراک سے انہیں بہت جلد نیند آجاتی ہے اور جب آتی ہے تو اچا تک آتی ہے اور نیند سے پہلے آنے والی غنود گی کا احساس نہیں ہوتا۔

صبح کے وقت چکر بھی نکس وامیکا کے مریض کی علامت ہیں۔اس کی بھی غالبًا یہی وجہ ہے کہ رات کو پرسکون نینز نہیں آتی اور صبح الحصنے پر سر میں تھکا وٹ کی وجہ سے چکر آنے لگتے ہیں۔ نکس وامیکا 30 طاقت میں دینے کی بجائے اگر 200 میں دی جائے تو بعض مریضوں کی نینداڑ جاتی ہے۔ جولوگ موٹی حس کے مالک ہوں ان کا حال الگ ہے۔ ان میں 30 طاقت فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ 200 طاقت مفید ثابت ہوتی ہے۔ پوٹینسیوں کا صبح استعال گہرے مشامدے اور تج بے ہی سے آسکتا ہے۔

ناک کی دونوں اطراف میں نزلہ جم جائے تو سر میں شدید درد ہوتا ہے اور آگے جھکنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے اور ہو جھ پڑتا ہے۔ ناک ہمیشہ بند رہتا ہے۔ اس کوسائینس (Sinus) کی تکلیف کہا جاتا ہے۔ اگرئنس وامیکا کی ایک ہزار کی خوراک رات کودی جائے تو وہ غیر معمولی اثر دکھاتی ہے اور سے کی چھینکیں وغیرہ آکرناک کھل جاتا ہے اور ریشہزم ہوکر بہہ جاتا ہے۔ اس تکلیف کے لئے اور دوائیں بھی ہیں لیکن علاج کا آغاز نکس وامیکا سے ہی کرنا چاہئے۔ ہے۔ اس تکلیف کے لئے اور دوائیں بھی ہیں لیکن علاج کا آغاز نکس وامیکا سے ہی کرنا چاہئے۔ بات تکس وامیکا کی ایک علامت ہے کہ اس میں خواتین کا ماہا نہ نظام بے قاعدہ ہو جاتا ہے۔ جب ماہواری وقت سے پہلے شروع ہو جائے تو لمبا چلتی ہے اور اگر وقت کے بعد شروع ہو تو معمول سے کم مدت میں ختم ہو جاتی ہے۔ یہی علامت برائیونیا کی بھی ہے۔ برائیونیا میں حرکت سے تکلیف کا بڑھنا اسے نکس وامیکا سے ممتاز کرتا ہے کیونکہ نکس وامیکا کی حیض کی میں حرکت سے نہیں بڑھتی۔

نکس وامیکا میں رحم نیچ گرنے کا احساس بھی پایا جاتا ہے۔ مثانے میں بے چینی ہوتی ہے اور بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے کین مقدار میں کم ہوتا ہے۔ قبض رہتی ہے جو اسہال سے ادلتی برتی ہے۔ اس میں بواسیر کے مسوں میں بہت خارش ہوتی ہے۔ تھوڑی تھوڑی اجابت ہوتی ہے۔ انتر یوں کی طبعی حرکت میں کمزوری واقع ہوجاتی ہے۔معدہ بہت زیادہ کھٹاس بنا تا ہے۔ لیکن پلسٹیلا کے برعکس نکس وامیکا کا مریض مرغن غذا وُں کوہضم کر لیتا ہے۔

نکس وامیکا بھوک لگانے کی بھی بہت اچھی دوا ہے اور بھوک مندمل کرنے کی بھی۔ جن مریضوں کو بھوک کے دورے پڑتے ہوں انہیں نکس وامیکا استعال کرنی چاہئے۔ا کثر ایسے مریضوں کو جن کو بھوک کے دوروں کے بعد دمہ شروع ہوجائے اگر انہیں ان دنوں نکس وامیکا شروع کروادیا جائے تو دمنہیں ہوتا۔

نکس وامیکامیں سر درد زیادہ تر آئکھوں کے اوپر سے شروع ہوجا تا ہے جوڈیلوں کی حرکت سے بہت شدید ہو جاتا ہے اورنشتر کی طرح چیجن محسوس ہوتی ہے۔ دھوپ میں جانے سے یا روشنی میں آئکھیں کھولنے سے در دمیں اضافہ ہوجا تا ہے۔ صبح کے وقت اور کھانے کے بعد تکلیف بڑھ جاتی ہے۔بعض اوقات سر درد کے ساتھ نکسیر بھی شروع ہو جاتی ہے،سخت قبض ہوتی ہے۔ سر در د کا بواسیری مسول سے بھی تعلق ہے۔ مریض شور بالکل بر داشت نہیں کرسکتا اور چھونے کے احساس کو بھی پیند نہیں کرتا۔ منہ کا مزہ خراب ہوجا تا ہے، صبح کے وقت مثلی ہوتی ہے کین الٹی نہیں آتی ۔ کھانے کے بعد یا کھانے کے دوران معدہ میں بو جھاور درد کا احساس ہوتا ہے۔معدہ کی جگہ پر ذراسا دباؤ بھی بر داشت نہیں ہوتا۔معدے کا نحیلا حصہ پھولا ہوااور پھر کی طرح بوجھل ہوتا ہے۔ دمہ کے آغاز میں برہضمی کے دورہ سے ایک دن پہلے کھالسی شروع ہوجاتی ہےاور سینے میں بلغم کھڑ کھڑانے کا احساس ہوتا ہے۔خشک بنگی پیدا کرنے والی کھانسی جس کے ساتھ کبھی خون کی آمیزش بھی ہوتی ہے اور کھانسنے پر سر اور کمر میں بھی درد ہوتا ہے۔ریڑھ کی ہٹری میں جلن کا احساس جوشج تین چار بجے بڑھ جاتا ہے، دو پہرکوآ رام کرنے سے تکلیفوں میں کمی ہو جاتی ہے اوراگر پسینہ بھی آ جائے تو طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ نکس وامیکا میں منہ میں جھوٹے جھوٹے زخم بن جاتے ہیں۔زبان کے کنارےزردی مائل یا سفیداور کٹے بھٹے، مسوڑ ھے بھی سوجے ہوئے اور سفید ہوجاتے ہیں جن سےخون بہتا ہے۔حلق میں گھٹن اور چیمن جو کا نوں تک جاتی ہوئی محسوں ہوتی ہے۔ نکس وامیکا کی ایک دلچیپ علامت بہ ہے کہ جوشخص بدطینت اور کبینہ پرور ہو،

ہروقت دوسروں کی عیب جوئی کرتا رہے اور ان میں نقص تلاش کرتے رہنے کا عادی ہوتو نکس وامیکا اونچی طاقت میں دینے سے ایسے مریضوں کی ذہنی حالت درست ہونے گئی ہے اور ان میں حسد کا مادہ کم ہوجاتا ہے۔لیکن ہرگز ضروری نہیں کہ کئس وامیکا کے ہر مریض میں حسد کا رجحان پایا جائے۔

تکس وامیکا کا مریض رات کے پچھلے بہراٹھ جاتا ہے اور دوبارہ سونہیں سکتا۔ صبح کے وقت غنودگی محسوس ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد مرض میں زیادتی ہوجاتی ہے۔ دماغی محنت، قیل اور مصالحہ داراشیاء کے استعمال اور خشک سردموسم سے تکلیف میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ شام کے وقت، آرام کرنے اور دبوانے سے اور مرطوب موسم میں طبیعت بہتر محسوس ہوتی ہے۔

مددگاردوائیں: سلفر۔ سپیا دافع اثر دوائیں: کافیا۔ اگنیشیا۔ کاکوس طاقت: 30 سے تی۔ ایم (CM) تک اوچیم

150

اوچیم

OPIUM

(Dried Latex of the Poppy)

اوپیم لیخی افیون کا پودامشرقی مما لک خصوصاً ترکی، ایران، افغانستان اور ہندو پاک
میں کشرت سے پایا جاتا ہے۔ اس کے پھول مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں جن کی پیتاں بہت
نرم ونازک ہوتی ہیں۔ ہوا کے معمولی سے جھو نکے اور ہلکی ہی بارش سے بھی بکھر جاتی ہیں۔ اس
پودے کے سبز ڈوڈ نے سے رس نکالا جاتا ہے جس میں دوطرح کے تیزاب اور مختلف عناصر پائے
جاتے ہیں۔ مارفین اسی پودے کے چھک کے رس سے بنتی ہے۔ مارفین، جواو پیم کاہی نچوڈ ہے
اسے ایلو پیتھی میں نیندلا نے کے لئے بکشرت استعال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ او پیم کوشد ید
دردوں کوفوری دورکر نے کے لئے استعال کیا جاتا ہے۔ او پیم کے بارے میں ڈاکٹر ہائیمن نے
کہا ہے کہ باقی سب دواؤں کی نسبت اس کے انثرات کو جانچنا زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس کی
علامات متضاد ہیں۔ مقدار کی کی بیشی سے متضاد انثرات نظاہر ہوتے ہیں مثلاً متلی اور قے میں
تھوڑی مقدار فاکدہ پہنچاتی ہے جب کہ زیادہ مقدار سے متلی شروع ہوجاتی ہے۔ او پیم کامریض
علاج میں ہوتا ہے لیکن اس کے برکس اس میں سخت زود حسی بھی پائی جاتی ہے۔ ایلو پیتھک طریقہ
علاج میں بھی او پیم کوابتدائی اور ڈافوی انثرات میں تقسیم کیا گیا ہے۔

او پیم کی ابتدائی علامت کے بارے میں بیہ کہا جاتا ہے کہ بیددرد کے احساس کومٹا دیتی ہے گئین کچھ عرصہ بعد وہی مریض جس کے درد کے احساس کومٹا دیا گیا تھا سخت زود حس ہوجاتا ہے اور بہت تکلیف محسوس کرتا ہے۔

او پیم میں آرنیکا کی کچھ علامتیں بھی پائی جاتی ہیں۔مزاج میں خشکی اورخون گاڑھا ہو

اوچیم

کر جمنے کا رجمان پیدا ہوجا تا ہے۔ ہومیو پیتھک اوپیم آ رنیکا کی طرح خون جمنے کے رجمان کو روک دیتی ہے بلکہ خون کے لوتھڑ وں کو بیٹھلا دیتی ہے۔ خصوصاً د ماغ میں خون جمنے کی صورت میں اوپیم ایک لازمی دوا ثابت ہوتی ہے۔ اگر اچا نک د ماغ کی رگ بھٹ جائے اور بہت اونچی طاقت میں آ رنیکا کے ساتھ اوپیم ملاکر دینے سے جہوتی طاری ہوجائے تو فوراً بہت اونچی طاقت میں آ رنیکا کے ساتھ اوپیم ملاکر دینے سے حیرت انگیز فائدہ پنچا ہے۔ آ رنیکا کیلی اتنی مفیز ہیں ہے لیکن اگر اس کے ساتھ اوپیم ملاکر دی جائے تو سارے خون میں طراوت ہی آ جاتی ہے، چستی پیدا ہوتی ہے، ٹھٹڈ اجسم گرم ہونے لگتا ہے اور مجمد خون خود بخو دہی پیلا ہوکر معمول کے مطابق گردش کرنے لگتا ہے۔

جیسا کہ ذکر گرزرا ہے او پیم ایک نیند آور دوا ہے۔ اس کا مریض اکثر سویار ہتا ہے یا اس پرغنودگی کا غلبر ہتا ہے کین اس کے برعکس بعض دفعہ اس کی نیند بالکل اڑ جاتی ہے۔ اس صورت میں او پیم کی کا فیاسے بہت مشابہت ہے کیونکہ کا فیا میں بےخوا بی اور زود حسی پائی جاتی ہے اور او پیم کی کا فیاسے بہت مشابہت ہے کیونکہ کا فیا میں بےخوا بی اور زود حسی پائی جاتی ہواور او پیم کے مریض کی نینداڑ جائے تو وہ بہت زود حس ہوکر ہے آرامی محسوس کرتا ہے اور خیالات کی فراوا نی اسے پریشان رکھتی ہے۔ پس اگر او پیم کی وجہ سے نینداڑ ہے تو کا فیامفید ہوتی ہے۔ اور اگر کا فی چینے کی وجہ سے نینداڑ ہے تو نکس وامیکا کے علاوہ او پیم بھی مفید ہے۔ جن مریضوں کو شد یونی ان کی شد یو جاتی ہوجاتی ہے اور اجابت محسوس ہی نہیں ہوتی ان کی دوا بھی او پیم ہوجاتی ہے۔ اس مورت میں قبض فیض نہیں رہتی ،مروڑ اٹھتے ہیں اور اجابت بھی نرم ہوتی ہے۔ اس صورت میں قبض فیض نہیں رہتی ،مروڑ اٹھتے ہیں اور اجابت بھی نرم ہوتی ہے۔

او پیم کا مثالی مریض بہت ڈرپوک ہوتا ہے۔ اندھیرے سے سخت ڈرتا ہے۔ ڈراؤنے خیالات آتے ہیں۔ سوچنے سجھنے کی صلاحیت سے عاری ہوکراپنی بیاری اور تکلیف کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ غنودگی اور بے ہوشی کی سی حالت میں رہتا ہے۔ کسی چیز سے خوفز دہ ہونے کے بعدا سے سرمیں چکر آنے لگتے ہیں۔

او پیم کی سلفر سے بھی مشابہت ہے۔سلفر مریض کے طبعی احساسات کو جگا دیتی ہے۔

اوچیم

وہ دوائیں جن کی تشخیص درست ہوتی ہے لیکن وہ کا منہیں کرتیں ،سلفر کی ایک دوخورا کول کے بعد کام کرنے گئی ہیں۔او پیم بھی مریضوں کے خوابیدہ دفاعی احساسات کو جگانے میں اہم کر دارا دا کرتی ہے۔اس پہلو سے بیسلفر سے مشابہ ہے۔سلفر کا مثالی مریض بھی بہت ست ہوتا ہے اور فلسفیا نہ مزاج رکھتا ہے۔

او پیم کے مریض کے نرخرے میں فالجی کمزوریاں پیدا ہوجاتی ہیں اور وہ عضلات جوخوراک کوغذاکی نالی میں دھکیلتے ہیں کمزور پڑجاتے ہیں اور بعض اوقات کھا ناناک یا سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے جو بہت خطرناک ہے۔اگر بیر جمان بڑھ جائے تو بعض دفعہ اس سے موت بھی واقع ہو کتی ہے۔او پیم اس رجحان کوختم کرنے میں اہم کرداراداکرتی ہے۔

او پیم کی بے حسی ایسی ہے کہ مریض کواپنے مرض کی شدت کا احساس نہیں ہوتا اور بیہ بے حسی اسے اپنے اندرموجود خطرات سے پوری طرح متنبہ نہیں ہونے دیتی اوراس کا زبردشی علاج کرنا پڑتا ہے۔

او پیم جسم میں خشکی پیدا کرتی ہے لیکن بخار میں او پیم کے ہم مزاج مریض کو بہت پسینہ آتا ہے جس سے درجہ حرارت کم نہیں ہوتا۔ بیاو پیم کی خاص علامت ہے۔ بار بار پسینہ آتا ہے جو گرم ہوتا ہے جیسے گرمیوں کی برسات کا پسینہ جوجسم کو گھنڈ انہیں کرتا بلکہ گرمی کے احساس کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہی حال او پیم کا ہے۔

او پیم کا مریض کھانے کا بہت شوقین ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے باوجود بھوک اور
کمزوری کا احساس باقی رہتا ہے۔ اس کے اکثر مریض زیادہ کھانے کے باوجود دبلے پتلے
ہوتے ہیں۔ او پیم کے مریضوں کو الٹیاں بھی بہت آتی ہیں۔ مارفین یا دیگر ٹیکوں کا اثر
ختم ہونے پرعموماً شدید تنگی شروع ہوجاتی ہے۔ ان مریضوں کو ہومیو پیتھک او پیم دینے
سے افاقہ ہوتا ہے۔ حمل کے دوران ہونے والی متلی جو کسی دواسے قابو میں نہ آئے،
اس میں بھی او پیم مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ او پیم کی متلی میں بھوک نہیں مٹی مگر کھانا کھاتے ہی
الٹی آجاتی ہے۔ نظام ہضم سست ہونے کی وجہ سے مریض کا کھانا معدے میں اکٹھا

اوچیم

ہوتا رہتا ہے اور متلی اور نے کا رجحان بہت بڑھ جاتا ہے۔ آخر بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے، مریض کچھ نہیں کھا سکتا اور خت کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس خصوصی علامت میں کیمومیلا بھی اوپیم کے برابر کی دوا ہے اور اس میں اس قتم کی مسلسل متلی کورو کنے کی حیرت انگیز طاقت ہے۔ سمندر کے سفر کے دوران متلی ہوتو بعض او قات اوپیم یا کیمومیلا یا دونوں ملا کرفوری اثر دکھاتی ہیں۔

او پیم میں سر، بازوؤں اور ہاتھوں میں تشنج ہونے کار بحان ہوتا ہے۔ ہاتھ کا نیتے ہیں اورسن ہوجاتے ہیں۔ اعضاء میں تشنجی جھکے لگتے ہیں اور کا نیتے ہیں۔ آئھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں جن پر روشنی اثر نہیں کرتی۔

او پیم کے مریض میں سر در دسر کے پچھلے حصہ بینی گدی سے شروع ہو کر گردن میں دونوں طرف پھیل جاتا ہے۔ ذراسی میں دونوں طرف پھیل جاتا ہے۔ ذراسی حرکت حتی کہ آئی کھیلنے کی حرکت بھی نا قابل برداشت ہوتی ہے۔ اس لئے مریض آئی کھیں بند کرکے بے ص وحرکت پڑار ہتا ہے۔

عُضلات کے تھیاؤ، ہاتھ پاؤں کے مڑنے اور ہرفتم کے تشخیات میں جبکہ دوسری تائیدی علامات بھی موجود ہوں اوپیم مفید ہے۔

گردن توڑ بخار یعنی Meningitis جس سے عموماً بچے متاثر ہوتے ہیں اوران پر بیاری کا حملہ زیادہ شدت سے ہوتا ہے، اس میں بھی اوپیم بہت اہم کردارادا کرتی ہے۔ اگر بروقت استعال کی جائے تو بچے بہت تنگلیفوں سے فی جاتا ہے۔ اس مرض میں ظاہری علامات کو مدنظر رکھ کردوا تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ طبیب کو پہلے ہی سے از بر ہونا چا ہئے کہ کون کون سی دوائیں اس مرض میں فوری اوراجھا کام کرنے والی ہیں۔

اگر خوف کے نتیجہ میں عضلات میں اکڑ اوکے پیدا ہو۔ ہاتھ پاؤں مڑنے لگیں اور ہسٹیر یا یا مرکی کے دور بے شروع ہوجا ئیں تو او کچی طاقت میں او پیم استعال کرنا چاہئے۔ اگر خوف کے نتیجہ میں مرگی کے دور بے مستقل صورت اختیار کرلیں تو بعض دفعہ او پیم کی او کچی طاقت میں ایک ہی خوراک مرض کا قلع قمع کر دیتی ہے۔ لیکن صرف اس صورت

اوچیم

میں جب خوف کی وجہ سے مرگی کا حملہ ہوا ہو۔ او پیم کے مرگی کے دور ے عموماً نیند کی حالت میں ہوتے ہیں اور دورہ چیخ سے شروع ہوتا ہے۔ مریض کو کالی چیزیں، شیطان، آگ اور تل وغارت کے نظار نظر آتے ہیں۔ دل میں خاص قتم کے خوف بیٹے جاتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اسے اٹھا کر لے جارہا ہے۔ خوف کے علاوہ اچیا نگ غیر معمولی خوشی پہنچنے سے اگر د ماغ پر اثر معمولی خوشی پہنچنے سے اگر د ماغ پر اثر معمولی خوشی پہنچنے سے اگر د ماغ پر اثر موجائے اور اس کے بداثر ات باقی رہ جائیں تو او پیم کے علاوہ کافیا بھی مفید دوا ہے۔

او پیم کے مریض کو پییں مارنے اور بلاوجہ جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے جسے وہ خود محسوس نہیں کرتا مگر بے مقصد پییں مارنے اور جھوٹ بولتے چلے جانے کی لاشعوری عادت میں مبتلا ہوتا ہے۔

مبتلا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو Lead Poisoning یعنی سکہ کا زہر چڑھ جائے تو اسے بعض اوقات شدید مروڑ والا درداٹھتا ہے۔ او پیم کی ایک ہی خوراک فوراً فائدہ دیتی ہے۔ سکے کے زہر کی زیادہ گہری اور کمبی علامتیں جسم میں سرایت کر چکی ہوں تو ان میں یہ مفید نہیں بلکہ فوری نوعیت کے زہر یلے اثرات میں کا م آتی ہے۔

اوپیم کا مریض ہروقت او گھتار ہتا ہے۔ کسی قتم کی ضرورت کا اظہار نہیں کرتا نبض بھی ست ہوتی ہے۔ عموماً سخت قبض ہوتی ہے۔ اگر خوف محسوں کر بے تو سیاہ بد بودار اسہال شروع ہوجاتے ہیں۔ مثانہ میں بھی کمزوری ہوجاتی ہے۔ پیشاب رک جاتا ہے یا بہت کم آتا ہے۔ مریض کی قوت سامعہ غیر معمولی طور پر تیز ہوجاتی ہے اور اسے دور کی آوازیں بھی سائی دیت ہیں۔ مریض بہت خرائے لیتا ہے اور اس کا سائس رکتا ہے۔ سوتے ہوئے تکلیفوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی چیزوں کے استعال اور چلنے پھرنے سے بیاری میں کمی ہوجاتی ہے۔ وضع حمل کے عور توں میں کسی خوف کے نتیجہ میں حیض کا خون بند ہوجاتا ہے۔ وضع حمل کے وقت در دیں رک جاتی ہیں ، مریضہ پرغثی طاری ہوجاتی ہے اور جھکے لگتے ہیں۔ اچا نک بہت مراقی کا دورہ پڑتا ہے۔ بعض اوقات خوف کی وجہ سے حمل ضائع ہونے ہوئے ہوئی اور غودگی کا دورہ پڑتا ہے۔ بعض اوقات خوف کی وجہ سے حمل ضائع ہونے

اوپیم

کابھی اندیشہ ہوتا ہے۔ مریض کوسانس لینے میں دفت پیش آتی ہے۔ سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے۔ کھانسی کے ساتھ چہرہ نیلا ہوجا تا ہے جس میں سرخ دھے نظر آتے ہیں۔

او پیم میں درد کے احساس کا فقدان پایا جاتا ہے۔ ماؤف عضو میں اعصاب کے کنارے مردہ ہوجاتے ہیں اور سیح پیغام نہیں پہنچا سکتے اس لئے ایسے زخم مندل نہیں ہوتے اور ان میں درد بھی محسوس نہیں ہوتا۔ او پیم تکلیف کے احساس کو جگادیتی ہے اور جسم کی دفاعی طاقت زخم مندل کرنے کاعمل شروع کردیتی ہے۔

دافع اثر دوائيں: اپي کاک پيکس واميکا طاقت: 30 سے سی۔ایم(CM) تک فاسفورس

151 **ف**اسفورس

PHOSPHOSRUS

فاسفورس کا عضر قدرتی طور پر کئی شکلوں میں پایا جاتا ہے۔سب سے زیادہ سفید فاسفورس ملتا ہے جوٹھوں شکل میں ہوتا ہے۔ بیاندھیرے میں چبکتا ہے اور بہت جلدآ گ پکڑلیتا ہے۔اسے گرم کیا جائے تو سرخ رنگ کے سفوف میں تبدیل ہوجاتا ہے جس سے ماچس بنائی جاتی ہے۔

فاسفورس حیوانی اور نباتاتی زندگی کا ایک انتہائی اہم جزو ہے جسے روایتی طب میں بھی مختلف بیاریوں کے علاج میں استعال کیا گیا ہے۔اس کے سفوف سے ہومیو بیتھی دوا تیار کی جاتی ہے۔

فاسفورس بہت گہرااثر رکھنے والی دواہے۔اندرونی جھلیوں ،اعصابی رگوں،غدودوں اور دماغ سے اس کا بہت گہراتحلق ہے۔ ہڈیوں اور ہڈیوں کے گودے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ سیار نون کی بہترین دواؤں میں سے ہے کین اس کا تعلق سرخ نظام خون سے ہے، سیاہ سینہیں۔اس کئے صرف سرخ خون کی بیاریوں میں اس کی طرف خیال جانا چاہئے۔

فاسفورس تپ دق اور د ماغ کے ٹیوم میں مفید ہے گراس کی پوٹینس کے چناؤ میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ علاج ہمیشہ 30 طاقت سے شروع کرنا چاہئے اور اسے حسب ضرورت رفتہ رفتہ بڑھانا چاہئے۔ ہڑیوں کے کینس میں اعلی درجہ کی دوا ہے۔ اسی طرح دممہ میں بھی بہت مفید ہے۔ اگر عام دواؤں سے دمہ قابو میں نہ آئے اور فاسفورس کی علامتیں موجود ہوں تو خدا کے فضل سے اس کے استعمال سے نمایاں فرق پڑتا ہے۔

عام طور پر ہومیو بیتھی کی کتابوں میں فاسفورس کے مریض کی ظاہری علامات پر اتنا

زور دیا گیا ہے کہ ہومیو پیتھک معالج انہیں غیر ضروری اہمیت دیۓ لگتا ہے حالا نکہ اندرونی علامتیں موجود ہوں تو ظاہری جسمانی علامتیں ملیس یا خلیس ہے کام دیتا ہے۔ فاسفورس کے مریض کے بارے میں عموماً پیکھا ہوتا ہے کہ دبلا پتلا، کمباانسان، نخر وطی انگلیاں اور فن کا رانہ مزاح رکھتا ہے۔ بہت سفیدرنگ اور سنہرے بال ہوں، آنکھوں میں بھی کچاپن پایا جائے، نازک اور حساس ہو، وغیرہ وغیرہ ۔ ایسے مریض کو ڈھونڈ نا تو بہت مشکل کام ہے اور دنیا کے بعض علاقوں میں تو بھی انسان شاذک طور پر ہی مل سکتے ہیں اور وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ فاسفورس کے مزاح سے پہچاننا ایسے انسان شاذک طور پر ہی مل سکتے ہیں اور وہ بھی ضروری نہیں بلکہ اس کے مزاح سے پہچانا جا سکتا ہے۔ ہوں۔ فاسفورس کو پہچانا جا سکتا ہے۔ چپانا باسکتا ہے۔ حاس کی زود حسی پر نظر رکھیں ۔ کئی بیاریوں کے دعمل میں فاسفورس کو پہچانا جا سکتا ہے۔ کی طاقت نہیں رہتی ۔ حرارت غریزی کم ہو جاتی ہے۔ یہ فاسفورس کی علامتیں ہیں۔ مریض کا کی طاقت نہیں رہتی ۔ حرارت غریزی کم ہو جاتی ہے۔ یہ فاسفورس کی علامتیں ہیں۔ مریض کا رئگ خواہ کالا ہو یا سفید، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ ہڑیوں، چھاتی اور گردے کی بیاریوں میں فاسفورس کو سلیٹیا کے ساتھ اول شخٹ ہے ہوں تو چونکہ بیعلامتیں سلیٹیا میں بھی پائی جاتی ہے اس لئے فاسفورس کوسلیٹیا کے ساتھ اول بول برل کردیئے سے فائدہ پہنچتا ہے۔

فاسفورس میں ہمیشہ سرخ رنگ کا خون بہتا ہے جبکہ سلفر میں کا لے رنگ کا خون بہنے کا ربخے کا ربخے کا ہوت ہے۔ عورتوں کے ماہا نہ ایام میں وقت سے پہلے سرخ چبکداررنگ کا خون آنے گئے تو یہ فاسفورس کی خاص علامت ہے۔ فاسفورس کے اخراجات میں تیز ابیت پائی جاتی ہے۔ لیکوریا بھی کا ٹیے اور حصلنے والا ہوتا ہے اور اسہال میں بھی اتنی تیز ابیت ہوتی ہے کہ جلد پر چھالے براجاتے ہیں۔

فاسفورس نیٹرم میور اور برائیونیا سے بھی مشابہت رکھتا ہے۔ برائیونیا میں ہونٹوں پر پیپڑ یاں جم جاتی ہیں اور کنار بے خشک ہوکر پھٹ جاتے ہیں۔ فاسفورس میں بھی یہ علامتیں بھی اس میں موجود ہوسکتی ہیں یعنی اس نے آپ کو دوسر بے لوگوں سے الگ کر لینا اور بہت او نیجا سمجھنا، یہ علامت بعض دفعہ

فاسفورس کے مریض میں بھی پائی جاتی ہے مگر شاذ کے طور پر۔ وہ اپنے مزاج کے صاف سھرا ہونے کی وجہ سے بھی علیحد گی پیند ہو جاتا ہے لین اس میں تکبر نہیں پایا جاتا جبکہ بلاٹینم کے مریض میں تکبر بہت ہوتا ہے اوراسے بیوہم ہوتا ہے کہ گویا وہ آسمان سے اتر اہوا ہے۔ ہرایک کو نیجی نظر سے دیکھتا ہے جبکہ فاسفورس کا مریض بہت ہمدرد اور نرم مزاج رکھتا ہے۔ مزاج کی نفاست کی وجہ سے اس میں غیر معمولی زود حسی بیدا ہوتی ہے جو کئی بیاریوں کا موجب بھی بن جاتی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جب اکیلا ہوتو اس پر موت کا خوف طاری ہوجاتا ہے۔ دماغ میں بیجانی کیفیت بیدا ہوجاتی ہے۔ دماغ میں بیجانی کیفیت بیدا ہوجاتی ہے۔ جسم میں کوئی چیز رئیگتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

فاسفورس کی بہت بیاریوں میں گرمی سے فائدہ پہنچتا ہے لیکن معدہ اور سر میں سردی سے آرام آتا ہے چونکہ سر میں خون کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے اگر مزیدگرمی پہنچائیں تو تکلیف میں اضافہ ہوجائے گا۔ فاسفورس اور بیلا ڈونا کے سردرد میں بیفرق ہے کہ بیلا ڈونا کا مریض لیٹے تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہوجاتا مریض لیٹے تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لیٹنے سے خون کا دوران ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لیٹنے سے خون کا دوران سرکی طرف اور بیٹھنے سے نیچ کی طرف ہوتا ہے۔ بیلا ڈونا میں شنج کی وجہ سے سرمیں درد ہوتا ہے۔ فاسفورس کے سردرد میں شنج نہیں ہوتا۔ معدہ کی تکلیف میں ٹھنڈی چیز سے آرام آتا ہے۔ اور گرم چیز سے قے ہوجاتی ہے۔ اگر بیچ کو دودھ بلائیں تو پیٹ میں جاکر دودھ گرم ہونے پر اور گرم چیز سے قے ہوجاتی ہے۔ اگر بیچ کو دودھ بلائیں تو پیٹ میں جاکر دودھ گرم ہونے پر اس کی قے ہوجاتی ہے بیا بیشوز اسے ملتی جاتی علامت ہے۔

اعصابی ریشوں کے ساتھ فاسفورس کا بہت تعلق ہے۔ یہ آئکھ کے بصری نظام پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی لئے طرح طرح کے رنگ دکھائی دیتے ہیں۔ شمع کے گر دسبز رنگ کا ہالہ نظر آتا ہے۔ سرخ اور کا لے دھے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اگر کسی صدمے سے کوئی اچا نک اندھا ہوجائے تو بھی فاسفورس کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔

فاسفورس شخیج بن اورسکری یعنی بالوں میں خشکی کا بھی علاج ہے۔ان بیاریوں میں

عموماً ایسٹر فاس استعال ہوتا ہے لیکن اگر اعصاب میں تیزی اور حدت ہوتو فاسفورس زیادہ مفید ہے۔ یہ بالوں کو گرنے سے روکتا ہے اور انہیں مضبوط بناتا ہے۔ پتلے اور سنہرے بال جو فاسفورس کی نشانی سمجھے جاتے ہیں وہ دراصل بالوں کی جڑوں کی کمزوری کی وجہ سے ایسے ہوتے ہیں۔ قدرتی صحت مند سنہرے بالوں کا فاسفورس سے کوئی تعلق نہیں۔ جلد کے وہ باریک غدود جن کا بالوں سے تعلق ہے Follicles کہلاتے ہیں۔ ان کی کمزوری کی وجہ سے بالوں میں ملائمت اور ریشی بین نظر آتا ہے جو بیاری کا نشان ہے اور فاسفورس کی نشاند ہی کرتا ہے۔ جلدی کمزوریاں Pigmentation کی کروری سے پیدا ہوتی ہیں۔ البینو (Albino) یعنی بالکل بے رنگ برص کی طرح سفید نظر آنے والے بچے فاسفورس کی نصور ہیں اس لئے ان بیوں کی بیاریوں میں بی کا م آسکتا ہے۔ فاسفورس کا اسی قسم کی جلد سے تعلق ہے جس میں کیا پن آ بیوں کی بیاریوں میں کمزوری ظاہر ہوتی ہے خواہ مریض کا رنگ کیسا ہی ہو۔ نیٹرم میور میں بھی بعض ایسی علامتیں ملتی ہیں۔ بال کھو کھلے اور بے جان ہوجاتے ہیں اور کناروں سے بھٹ جاتے بعض ایسی علامتیں میں جو تیں۔ بی مرحلہ کہی اور بے جان نہیں ہوتی۔

فاسفورس میں آئکھوں کے سامنے دھند کا سااحساس ہوتا ہے۔ موم بتی کی لو کے گرد سنز ہالہ فاسفورس کے علاوہ او پیم میں بھی پایا جاتا ہے۔ او پیم کا بھی او پٹک نرو (Optic Nerve) سنز ہالہ فاسفورس کے علاوہ او پیم میں بھی پایا جاتا ہے۔ فاسفورس بہت سے امراض چیتم میں کام آتی ہے۔ آئکھ کے پیچھے جو پردہ ہے اور جسے ریٹینا (Retina) کہتے ہیں، اس میں راڈز اور کونز ہے۔ آئکھ کے پیچھے جو پردہ ہوتے ہیں۔ کونز (Cones) جو مثلث شکل رکھتی ہیں رنگوں کو پھاڑنے کا کام دیتی ہیں اور مختلف رنگ دیکھنے کا شعورا نہی سے پیدا ہوتا ہے اور راڈز (Rods) کا لے اور سفید رنگ میں تمیز کرتے ہیں۔ اگر ریٹینا خراب ہوجائے یا ان اعصاب میں، جو پیغام لے کر جاتے ہیں، کمزوری پیدا ہوجائے تو وہ ہر رنگ کوریکارڈنہیں کرتے اور رنگوں میں فرق نہیں کر سکتے۔ آ ہستہ آ ہستہ ہوٹے والا اندھا بین جو بعد میں پورے اندھے بین میں تبدیل ہوجاتا

ہے فاسفورس کی علامت ہے جو کاسٹیکم میں بھی پائی جاتی ہے۔ کاسٹیکم اور فاسفورس کی اور بھی بہت سی علامتیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔

فاسفورس میں بیاس بہت محسوس ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے آ رام ملتا ہے لیکن پانی معدہ میں گرم ہونے پر قے ہوجاتی ہے۔ ایریشن کے بعد شدید متلی ہوجو قابونہ آئے تو اس میں بھی فاسفورس کار آ مد ہے۔ Ingmentation کی خرابی کی وجہ سے پیٹ، چھاتی اور گردن کے حصول پر زردرنگ کے نشان بن جاتے ہیں۔ بیدراصل کلاہ گردہ کی کمزوری ہوتی ہے اور گردوں پراس دوا کا غیر معمولی اثر ہوتا ہے۔

منہ کی اندرونی تکلیفوں میں بھی فاسفورس وسیع الاثر ہے۔ مسوڑ ھے جواب دے جائیں اوران سے ملکے رنگ کا بد بودارخون بہنے گئے تو فاسفورس کام کرتی ہے۔ بیخون رو کنے کی اولین دوا ہے۔اسی طرح اگر نفاس کا سرخ خون بھی ملکا ملکا دیر تک جاری رہے اور بد بونمایاں ہوتو فاسفورس اکثر کام کرتی ہے۔رحم میں افلیکشن اور رسولیاں ہوں تو اس سے بھی خون جاری ہوجا تا ہے کیک بعض دفعہ اس خون میں بدبونہیں ہوتی کم از کم آغاز میں بیخون بغیر بدبو کے ہوتا ہے۔اس میں بھی فاسفورس مفید ہے۔ گلا بیٹھنا بھی فاسفورس کی نشانی ہے۔ فاسفورس کےعلاوہ کاربووجی، کاسٹیکم، بوریکس اورکوکا بھی گلا بیٹھنے کے علاج میں بہت شہرت رکھتے ہیں۔کاربووج کے مریض کا گلاشام کوبیٹھتا ہے اور صبح کے وقت زیادہ خراب نہیں ہوتا۔ فاسفورس میں بھی یہی علامت یائی جاتی ہے۔ کاسٹیکم میں صبح کے وقت گلاخراب ہوتا ہے اور شام کوٹھیک ہوجا تا ہے۔ فاسفورس میں گلے کی زودحسی کی وجہ سے کھانسی اٹھتی ہے۔ بننے یازور سے بات کرنے سے کھانسی شروع ہوجاتی ہے اور گلے میں سوزش بھی ہوجاتی ہے۔ بعض دفعہ گلے میں خارش ہونے کی وجہ سے کھانسی اٹھتی ہے کیونکہ بلغم خشک ہوکر چیک جاتا ہےاور بے چینی اور تھلی پیدا کرتا ہے۔اس تکلیف میں رسٹا کس اور ہمیر سلف حسب علامات مفید ثابت ہوسکتی ہیں۔فاسفورس کی بے چینی محض اعصابی زود حسی سے علق ر کھتی ہے۔ جوتقریباً اس کی ہر بیاری میں یائی جاتی ہے۔ غیروں کی موجودگی میں تکلیف بڑھتی ہے۔ اعصاب سکون چاہتے ہیں اور بوجھ ہر داشت نہیں کرتے۔ سخت زود حس ہوجاتے ہیں۔ کمزوری فاسفورس کی ایک عام علامت ہے۔ دہریئ یہ بیاریوں میں بیآ ہستہ آ ہستہ اثر دکھانے والی دواہے لیکن حاد بیاریوں میں بیسر لیے الاثر ہے۔ اگر ہاتھوں ، کلائی ، کہنیوں یا پاؤں کے جوڑ اچا نک جواب دے جا کمیں تو فاسفورس دوا ہو سکتی ہے۔ جواب دے جا کمیں تو فاسفورس دوا ہو سکتی ہے۔

بعض دفعہ مریض کی نیند ہے چین ہوتی ہے، کہی گہری نیند نہیں آتی اور بلاوجہ آئے کھاتی رہتی ہے۔ یہا عصابی تناوکی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں فاسفورس بہت جلد فائدہ دیتی ہے۔ بادلوں کی گھن گرج سے تکلیفیس بڑھ جائیں تو اس کا بھی فاسفورس سے تعلق ہے۔ بعض دفعہ موسم تبدیل ہونے سے پہلے ہی بیاری کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ انتہائی حساس سائنسی آلے بھی موسم کے جس تغیر و تبدل کو محسوس نہیں کر سکتے ، فاسفورس کے مریض محسوس کر لیتے ہیں۔ ان کا مرض موسم تبدیل ہونے سے پہلے ہی شروع ہوجا تا ہے۔

فاسفورس کی ایک علامت یہ ہے کہ سیر ھیاں چڑھنے سے تکلیف بڑھتی ہے۔ گویہ علامت اپنی ذات میں کوئی الیمی چیز نہیں جو کسی خاص دوا کی نشاند ہی کرے۔ تاہم فاسفورس کی بھی بیعلامت ہے کہ سیر ھیاں چڑھنے میں اس کے مریض کو دفت پیش آتی ہے۔

نیٹرم میور اور نکس وامیکا کے علاوہ پٹیشیم پرمینگینیٹ بھی فاسفورس کا تریاق ہے پٹیشیم پرمینگینیٹ بھی فاسفورس کا تریاق ہے پٹیشیم پرمینگینیٹ <u>زود حسی</u> کاعلاج ہے اور اسے عموماً اعضاء کے سن ہوجانے کے رجحان کو دور کرنے کے لئے استعال کیاجا تا ہے۔

سخت نزلیہ جسے فاسفورس کی ضرورت ہو، بروقت علاج نہ ہونے پردائمی ہوجاتا ہے۔
اندرونی جھلیاں جواب دے جاتی ہیں۔اس وقت بھی اس کا علاج فاسفورس ہی ہے۔ گلے اور
میوکس ممبرین (Mucous Membrane) یعنی اندرونی جھلیول میں ہر جگہ
پوٹیشیم پرمینگیدیٹ اور فاسفورس کے بدائر ات مشترک ہیں کیکن اعصا بی علامتوں میں مشترک نہیں
اس لئے اسے ہرجگہ فاسفورس کے تریاق کے طور پراستعال نہیں کر سکتے۔

فاسفورس Fatty Degeneration یعنی جگراور دوسری جگہوں پر چر بی کے جالے بن جانے کا عمدہ علاج ہے۔ گردوں اور جگر کا جواب دے جانا اور دل پر چر بی کا انجماد فاسفورس کی خاص علامتیں ہیں۔شراب نوشی کے بدا ثرات کو بھی دور کرتا ہے۔ فاسفورس اعصا بی لحاظ سے بہت حساس دواہے۔جگر کیمیاوی مادے یعنی کیمیکلز بنانے کی دنیا کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ کیمیکلز بنانے والی خاموش فیکٹری ہے۔ یانچ ہزار کیمیکلز میں سے بہت سی تو جگر براہ راست بنا تا ہے اور کچھ دوسرے غدودوں کو پیغام رساں خلیوں کی معرفت کیمیاوی احکامات جاری کرکے بنوا تا ہے۔ کولیسٹرول (Cholesterol) بھی جگر ہی میں بنتا ہے۔جگر عام چر بی کو کولیسٹرول میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جن لوگوں میں پیرخاندانی بیاری ہو کہان کا جگر کولیسٹرول کی ایک قتم LDL یعنی Low Density Lipped زیادہ بنائے ان کےخوراک یر کنٹرول کرنے کے باوجودجسم میں اس کولیسٹرول کی زیادتی جاری رہے گی ۔ یا درکھنا چاہئے کہ کولیسٹرول کی بیشم یعنی LDL ہی خون کی نالیاں تنگ کر کے دل میں خون کی فرا ہمی میں مخل ہو جاتی ہےاوردل کا دورہ پڑنے کی وجہ بنتی ہے۔ فاسفورس جگر کےاس حصہ پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے جہاں پنقص واقع ہو۔جگر کے عل کو درست کرتا ہے اور وہ کولیسٹرول کم بنانے لگتا ہے۔ ناک کے اندر جو یانی کی تھیلیاں بن کرسانس میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں ان کو گلانے میں فاسفورس احیما کر دارا دا کرتا ہے۔ان تھیلیوں کی وجہ سے سونے میں بہت نکلیف ہوتی ہے۔ بیچے منہ کھول کر سانس لیتے ہیں۔ توت شامہ متاثر ہوتی ہے۔ جریان خون بھی ہونے لگتا ہے۔ بیر جحانات ہوں تو عورتوں کے رحم کی چھولی ہوئی غدودوں کو درست کرنے میں بھی فاسفورس انچھی دواہے۔

فاسفورس میں معدے اور سرکی تکلیفوں میں سردی سے افاقہ محسوس ہوتا ہے۔ شریا نوں میں خون کا دباؤ زیادہ ہونے کی وجہ سےخون بہنا شروع ہو جائے تو فاسفورس خون کے بہاؤ کورو کئے میں ممد ٹابت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک دوست کی نکسیر بے تعاشا پھوٹے کے باعث طبیعت بے حد خراب تھی۔ جھے آدھی رات کو بلایا گیا۔ میں وہاں گیا تو دیکھا کہ فرش خون سے بھرا ہوا ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہاں بکرا ذرح کر دیا گیا ہو۔ ان کے منہ سے بھی خون جاری تھا۔ میں نے خون والے منہ میں ہی فاسفورس اور ملی فولیم ملا کر ڈال دی۔ 15 منٹ کے اندرا ندرخون آنا بند ہو گیا اور وہ آرام سے سوگئے اور خدا کے فضل سے انہیں مکمل صحت ہو گئی۔ اگر زخموں سے معمول سے زیادہ سرخ رنگ کا خون جاری ہو جائے تو فاسفورس سے بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈک سے آرام آتا ہے اور ٹھنڈے یانی کی گورسے خون بند ہوجاتا ہے۔ سر میں دورانِ خون بڑھنے کہ شریا نیں کی جو جائیں گی۔ ایسی حالت میں سرکو ٹھنڈ اکر نے سے فائدہ ہوگا لیکن فاسفورس سے اس رجان کا مشتقل علاج ضروری ہے۔

مثانے اور غدہ قدامیہ (پراسٹیٹ) کے کینسر میں فاسفور س غیرمعمولی اہمیت کی دوا ہے۔ ہٹر یوں کے کینسر میں بھی فاسفور س بار ہاشا فی خابت ہوئی ہے۔ ایک مریض کوجس کا ہوتسم کاریڈی ایشن (Radiation) کا علاج ہو چکا تھا، جب اسے فاسفور س 30 دی گئی اور ہدایت کی گئی کہ ایک ماہ کے بعد اپنی کیفیت سے آگاہ کر بوایک ماہ کے بعد اس نے بتایا کہ اس کا وزن گرنا بند ہوگیا ہے اور بھوک پیاس محسوس ہونے گئی ہے۔ اس مریض کی ہڈیاں اتنی کمزورہوگئی محسیس کہ چل نہیں سکتا تھا اور دبا وَبالکل برداشت نہیں کرسکتا تھا۔ بیسا کھیاں استعمال کرتا تھا۔ تین ماہ کے اندراندر بیسا کھیاں چھوٹ گئیں اور کمزوری جاتی رہی۔ آٹھ دس سال بالکل ٹھیک رہا۔ اس سے بھی خدا کے فضل سے صحت یاب ہوگیا اور مزید پندرہ اس کے بعد دماغ کا کینمر ہوگیا۔ اس سے بھی خدا کے فضل سے صحت یاب ہوگیا اور مزید پندرہ رہنا چاہئے۔ فاسفورس کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا چاہئے کیونکہ یہ بہت گہرا اثر کرنے والی دوا ہے۔ زیادہ او نجی طافت میں استعمال سے گریز کرنا چاہئے۔ یہ چگر، ہڈیوں ، ہڈیوں کو وے گئی مرہ کی طافت میں استعمال سے گریز کرنا چاہئے۔ یہ چگر، ہڈیوں ، ہڈیوں کو کو کے گئیمر میں استعمال سے گریز کرنا چاہئے۔ یہ چگر، ہڈیوں ، ہڈیوں کو کے وینمرہ کے کینمر میں استعمال سے گریز کرنا چاہئے۔ یہ چگر، ہڈیوں ، ہڈیوں کو کو کے گئیمر میں اسے ہمیشہ یا در کھنا چاہئے۔

فاسفورس کی ایک علامت یہ ہے کہ گلے میں السر کی وجہ سے آواز بیٹھے جاتی ہے جو کینسر کی بھی علامت ہے۔ اس لئے اگر کسی کی آواز بیٹھ رہی ہواور گلے میں السر ہو جائے تو پوری احتیاط سے جائز ہ لے کر فوراً اس کا علاج شروع کر دینا چاہئے ور ندا گر دیر ہو جائے تو گلے کا کینسر خطرنا کے صورت اختیار کر لیتا ہے اور پھر قابو میں نہیں آتا۔

بعض دفعہ عضلات ڈھیلے ہو کر لٹک جاتے ہیں، حفاظتی جھلیاں کمزور ہو جاتی ہیں مثلاً بچوں کی پیدائش کے بعد رحم ڈھیلا ہو کر لٹکنے گتا ہے۔اس طرح ہر نیا وغیرہ کی تکلیفیں لاحق ہوتی ہیں۔ فاسفورس اعضاء کو واپس اپنی جگہ لے جانے اور عضلات کو مضبوط کرنے میں اہم کردارادا کرتا ہے۔

فاسفورس میں ایک علامت رسٹاکس اور برائیونیا سے مشابہ ہے۔ ابتدائی حرکت تکلیف دیتی ہے اور پھر آ رام محسوس ہوتا ہے۔ رسٹاکس میں لیٹنے سے تکلیف برطقی ہے لیکن حرکت کی ابتدا میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ کروٹ بدلتے ہوئے بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے پھر ذراساسکون ملتا ہے پھر تکلیف بڑھ جاتی ہے اور مریض بے چین دکھائی دیتا ہے۔ برائیونیا میں حرکت سے تکلیف کا بڑھنا بہت نمایاں ہے اسی لئے ہومیو پیتھی میں اگر برائیونیا 1200 رنیکا حرکت سے تکلیف کا بڑھنا بہت نمایاں ہے اسی لئے ہومیو پیتھی میں اگر برائیونیا 1200 رنیکا علاج ثابت ہوتی ہے۔ فاسفورس میں خصوصاً مبح کے وقت مریض جب اٹھ کر چاتا ہے تو اعضاء علاج ثابت ہوتی ہوتے ہیں۔

جوڑوں میں عمومی اکڑاؤ کے لئے بھی فاسفورس اچھی دوا ہے۔ میں نے اس تکلیف کے لئے دو نسخے بنائے ہیں۔ اگر بائیں طرف تکلیف ہوتو آر نیکا + لیکیسس + لیڈیم 200 طاقت میں بہت مؤثر ہے۔ یہ لمبے، گہرے وقع المفاصل کے مزمن مریض کو بار باردی جاسکتی ہے یعنی 200 طاقت میں ہونے کے باوجود پہلے ہفتے دن میں تین دفعہ، دوسرے ہفتے دن میں ایک دفعہ، چوشے ہفتے تک دفعہ، دوسرے ہفتے دن میں ایک دفعہ، چوشے ہفتے تک جب اجتماعی اثر ظاہر ہوجا تا ہے تو مریض محسوس کرتا ہے کہ گویا کیدم فائدہ ہوا ہے اور اس عارضہ سے پوری طرح نجات مل جاتی ہے۔ دوسرانسخہ اس وقت کام آتا ہے جب

دردوں کا زور دائیں طرف ہواور چوٹوں کا بھی اثر ہواور حرکت اور مالش سے تکلیف بڑھتی ہو۔ ایسی صورت میں آرنیکا، برائیونیا اور کاسٹیکم 200 طافت میں بہت اچھا اثر دکھاتی ہیں۔ گھٹنے کے درد اور کھلاڑیوں کی پرانی چوٹوں کے جاگ اٹھنے کے نتیجہ میں تکلیف بڑھے تو یہ نسخہ بہت کارگر ثابت ہوتا ہے۔

چہرہ کے اعصابی دردوں میں فاسفورس بہترین دوا ہے۔علاوہ ازیں حسب ذیل دوا ئیں مختلف اجتماعی نسخوں کی شکل میں اچھا کام کرتی ہیں۔ سپائی جیلیا، سلیشیا، فاسفورس اور میگ فاس فاسفورس کو سپائی جیلیا کے ساتھ ملا کر دیا جائے تو یہ چہرے کے بائیں طرف کے نور کیجیا (Neuralgia) کا اچھا نسخہ ثابت ہوتا ہے۔ اگر نور پلجیا دائیں طرف ہوتو اس میں سلیشیا،میگ فاس کے ساتھ ملا کر دینا بہت مفید ثابت ہوتا ہے اور فاسفورس کو اس نسخہ میں بھی ملایا جاسکتا ہے۔

عورتیں یا مرد اعصاب کی زود حسی کی وجہ سے اولا دسے محروم ہوں تو کالی فاس اور فاسفورس مفید ثابت ہوتی ہیں۔اعصاب کی زود حسی براہ راست بانجھ نہیں بناتی لیکن خلیوں میں بننے والے جرثو موں کی تکمیل نہیں ہویاتی اوران میں جان نہیں پڑتی۔

فاسفورس میں خالی پیٹ تکلیفیں بڑھتی ہیں۔اس کے مسول میں خون بہنے کا رجمان ہوتا ہے۔ان میں سے پچھ تو کئی پھٹی خوفناک شکل اختیار کر لیتے ہیں جونا کیٹرک ایسڈ کی بھی نشاندہی کرتے ہیں۔مگران مسول سے سرخ خون بہتویدا کثر فاسفورس کی علامت ہوتی ہے۔ سب زخموں سے بہت خون بہتا ہے۔ زخم خشک ہوکر پھر ہرے ہوجاتے ہیں۔جلد پر نیلگوں کا لیے داغ پڑ جاتے ہیں۔ برقان بھی ہوجاتا ہے۔شام کو سردی محسوس ہونے گئی ہیں۔ باکیس طرف کیٹنے سے دل کی دھڑکن بھی بہت زیادہ ہوجاتی ہے۔نبض تیز اور چھوٹی ہوجاتی ہے۔ ول میں گرمی محسوس ہوتی ہے۔

کھانے کے فوراً بعددوبارہ بھوک محسوس ہوتی ہے۔کھانے کے بعد منہ کا مزہ کھٹا ہوجا تا ہے۔ نے کا رجحان ہوتا ہے۔ بیٹ میں درد جسے شنڈی چیزوں کے استعمال سے آرام آتا ہے۔ معدہ میں سوزش ، چلنے اور پیٹ پر ہاتھ لگانے سے بڑھ جاتی ہے۔

فاسفورس

دائیں طرف لیٹنے سے آ رام آتا ہے۔ کمر میں درداور جلن نیز دونوں کندھوں کے درمیانی حصہ میں گرمی کا احساس، ہاتھوں اورانگلیوں میں فالجی کیفیت اور چیونٹیاں رینگنے کا احساس، کہنیوں اور کندھوں کے جوڑوں میں جلن اور درد۔

فاسفورس میں قوت سامعہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ آوازوں کی بازگشت سائی دیتی ہے۔ چہرہ زرد، آنکھوں کے گردنیلگوں حلقے، جبڑے کی ہڈی میں درداورسوزش اور منہ میں زخم جن میں خون بہنے کار جحان ہو۔ عورتوں کو کپڑے دھونے کے بعد اعصا بی درد شروع ہوجاتے ہیں۔ دانتوں میں بھی درد ہوتا ہے۔

مددگاردوائیں: آرسنک۔ایلیم سیپا۔لائیکو پوڈیم۔سلیشیا۔سپائی جیلیا۔ میگ فاس۔ دافع اثر دوائیں: کافیا بیکس وامیکا طاقت: کافیا کیس کے اور شاذ کے طور برایک لاکھ

152 **فا**ئٹولا**کا**

PHYTOLACCA

(Poke Root)

فائٹولاکا ایک پودے کی جڑسے تیار کی جانے والی دواہے جس کے پھل کوزیادہ مقدار میں کھالیا جائے تو زہر یلے اثرات پیدا ہوتے ہیں اوراس کی ابتدائی علامتیں قے ، دست اور سردرد کے طور پر ظاہر ہوتی ہیں۔

فائٹولاکا بہت اہم دوا ہے۔ یہ اپنی بہت سی علامات کے لحاظ سے مرکری سے ملتی ہے اس وجہ سے اسے ''نبا تاتی مرکری'' یعنی پارہ کہا جا تا ہے۔ مرکری کی تکلیفیں سردی اور نمی سے بڑھتی ہیں۔ رات کو تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ فائٹولاکا میں بھی کمر درد سردی اور نمی سے بڑھتا ہے اور جب مریض رات کو بستر میں گرم ہوتو درد میں اور بھی اضافہ ہوجا تا ہے۔ رات اس کے ہرمرض میں اضافہ کردیتی ہے۔ مرکری اور فائٹولاکا دونوں کا غدودوں کی بیاریوں سے گہرا تعلق ہے۔ فائٹولاکا مرکری کے زہر یلے اثر ات کودورکرتا ہے۔

انسانی جسم میں وہ حساس جگہیں جہاں ہڈی کے ساتھ جلد ملی ہوئی ہوتی ہےاور درمیان میں گوشت یا چربی کی موٹی تہنیں ہوتی وہاں چھلنے اور دکھن کا احساس فائٹو لا کا اور مرکری دونوں میں پایا جاتا ہے۔

مٹریوں کے دردوں میں بھی دونوں کا دائرہ اثر وسیع ہے۔ یوپی ٹوریم (Eupatorium) بھی انفلوئز اور مٹریوں میں شدید درد کے ساتھ چڑھنے والے بخاروں میں مفید ہے۔لیکن مٹریوں کی تکلیفوں میں مرکزی سب سے زیادہ نمایاں ہے۔وہ بیاریاں جن میں مٹریال گلنے لگیس اور ناسور بن جائیں ان میں مرکزی سے بہت فائدہ

ہوتا ہے۔

فائٹولاکا اندرونی جھلیوں ، جلداور گلے کے زخموں میں اور غدودوں میں جوسخت ہو جائیں اور پیپ بننے کا رجحان ہو، اچھا اثر دکھاتی ہے۔ بعض دفعہ فائٹولاکا کی مددگار کے طور پر ہمیں سلف یاسلیشیا بھی دین پڑتی ہیں۔ اس میں ہمیں سلف کی طرح گاڑھی جمٹنے والی بلغم بنتی ہے۔ فائٹولاکا آتک (Syphlis) کی اولین دواہے۔ آتشک کے پرانے زخموں اور خناق (Diphtheria) میں بھی مفید ہے۔ گنٹھیا اور بائی کے درد جو لمبے عرصہ سے موجود ہوں ، دائیں کند ھے اور بازومیں اپنٹھن ، بلی کے کوندوں کی طرح لیکنے والا درد جوا کی مقام سے دوسرے مقام کی طرف حرکت کرے اور ٹخنوں اور پاؤل کے پنجوں میں درد ہوتو یہ فائٹولاکا کی علامت ہے۔

یہ ناک کے کینسر میں بھی مفید ہے۔ نزلداور کھانسی کے ساتھ آنکھوں میں سرخی اورگرم پانی بہے۔ روشنی سے زود حسی، آنکھوں میں ریت کی موجودگی کا احساس اور جلن، پوٹوں کے کنار بے گرم، زبان چھلی ہوئی اور گلے میں گرم گولے کے بھنسے ہونے کا احساس اس کی علامات ہیں۔ فائٹولا کا کے مریض کو چکر بھی بہت آتے ہیں۔ بستر سے اٹھتے ہوئے کمزوری محسوں ہوتی ہے۔ سر در دیپیثانی سے بیچھے کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ آنکھوں اور کنپٹیوں پر بوجھ محسوں ہوتا ہے۔ بارش کے ساتھ سر در دمیں اضافہ ہوجا تا ہے۔ اگر سر پر خارش ہوجس کے ساتھ

دودھ پلانے والی عورتوں کے لئے فائٹولا کا غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ سینے کے غدود بہت سخت اور زود حس ہوجائیں اور کینسر کا احمال ہوتو فائٹولا کا دینے میں تاخیر نہ کریں۔ فائٹولا کا کے علاوہ برائیونیا، بیلا ڈونا اور کونیم بھی مفید ثابت ہوسکتی ہیں۔ بیلا ڈونا میں شختی کے ساتھ سرخی بھی ہوتی ہے اور برائیونیا میں بغیر سرخی کے غدود سخت ہوجاتے ہیں۔ میں شختی کے ساتھ سرخی بھی نا قابلِ برداشت ہوتی ہے۔ برائیونیا اور فائٹولا کا میں بچرکی طرح دراسی حرکت بھی نا قابلِ برداشت ہوتی ہے۔ برائیونیا اور فائٹولا کا میں بچرکی طرح

ابھاراور کھرنڈ بن جائیں تو فائٹو لا کا بھی اس کی ایک دوا ہوسکتی ہے۔

سخت گلٹیاں بن جاتی ہیں۔ فائٹولاکا کی مریضہ کا دودھ کھٹا، زہریلا اور پھٹا ہوا ہوتا ہے۔اسے دودھ پلاتے ہوئے سخت تکلیف ہوتی ہے اور دردسارے جسم میں پھیاتا ہے۔ (کونیم کا تفصیلی ذکرکونیم کے باب میں دیکھیں۔) جن عور توں میں دودھ کی کمی ہویا دودھ بالکل ختم ہوجائے ان کے لئے بھی فائٹولاکا مفید ہے۔ چیض سے پہلے اور چیض کے دوران سینہ میں سوزش اوراکڑا و ہوتا ہے۔ سردی لگنے سے سینہ میں دردہوتا ہے۔ الی عور توں کا نزلہ سینہ کے فدودوں پر گرتا ہے اور وہاں شخی پیدا ہوکر سخت تکلیف ہوتی ہے۔ دودھ کمڑی کے جالے کی طرح دھا گے دار ہوتا ہے۔ اگر بچے کو دودھ پلاتے ہوئے مال کوشنج ہوجائے اور دردجسم کے تمام اعضاء میں پھیل جائے تو فائٹولاکا ہی دوا ہے۔ حیض جلد جلد ہوا ورخون زیادہ آئے تو یہ بھی فائٹولاکا کی علامت ہے۔ عموماً ایسی عورتوں کے دائیں طرف بیضہ دانی میں دردہوتا ہے۔ فائٹولاکا کے مریض کے معدہ میں چوٹ لگنے کا سا احساس ہوتا ہے۔ لیس دار رطوبت کی قے ہوتی ہے۔ متلی کے معدہ میں چوٹ لگنے کا سا احساس ہوتا ہے۔ لیس دار رطوبت کی قے ہوتی ہے۔ متلی کے ساتھ درداور معدہ میں گرمی اور خوتی ہواسیر میں بھی یہ مفید ہے۔

فائٹولاکا بچوں کے دانت نکا گئے تکے زمانے کی تکلیفوں میں بڑی کارآ مد ہے۔
دانت بہت زور سے بھینچ جاتے ہیں۔ زبان پر دانتوں کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ فائٹولاکا کی
تکلیفیں مرطوب اور سردموسم میں، رات کے وقت اور حرکت کرنے سے بڑھ جاتی ہیں۔ خشک
اورگرم موسم میں نیز آ رام کرنے سے ان میں کی ہوجاتی ہے۔

فائٹولاکا کی ایک قسم جو موٹا ہے کے علاج میں بہت شہرت رکھتی ہے وہ فائٹولاکا بیری (Phytolacca berry) ہے۔ میں نے کئی مریضوں کو بیاستعال کروائی ہے اوراس کے اچھے نتائج ظاہر ہوئے ہیں۔ اگر چہ یہ فیوکس (Fucus) کی طرح دل کے لئے زیادہ خطرناک تو نہیں ہے لیکن بعض مریض جن کے دل کمز ور ہوں اس دوا کے اثر سے دل کی کمز ور محسوس کرتے ہیں، ان کوفوری طور پر یہ بند کروا دینی چاہئے۔ نیز جن مریضوں کا وزن کم کرنا مقصود ہوانہیں دستور کے طور پر کریٹیگس مدرئنگیر (Crataegus) مریضوں کا وزن کم کرنا مقصود ہوانہیں دستور کے طور پر کریٹیگس مدرئنگیر کے خلاف

زیادہ مؤثر ہے مگراس میں بھی شخت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل میں کمزوری کا احساس ہوتو اس کا استعال فوراً روک دینا جا ہے ۔ ورنہ خطرہ ہوتا ہے کہ کسی وقت دل کا حملہ ہو جائے جو جان لیوا بھی ثابت ہوسکتا ہے۔

> دافع انژ دوائیں: بیلاڈ ونا۔میز ریم طاقت: عموماً 30سے 1000 تک حسب ضرورت ایک لا کھ طاقت بھی استعال کی جاسکتی ہے۔

153 پکرک ایسٹر

PICRICUM ACIDUM

(Trinitrophenol)

تیز انی علامات رکھنے والے مریضوں کوعمو ماً سر دی زیا دہ محسوس ہوتی ہے اور گرمی سے سکون ماتا ہے۔ بعض مریضوں کواشٹنائی طور برگرمی زیادہ گئی ہےاوران کی بیاریوں میں اضافیہ ہوتا ہے۔انہیں ٹھنڈی سر دہوا کا جھونکا بھلامحسوس ہوتا ہے۔پکرک ایسڈ مؤخر الذکر مریضوں کی دوا ہے۔ ذہنی تھاکاوٹ اور کمزوری دور کرنے کے لئے اسے نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ ذہنی تھاوٹ کے آثار بڑی عمر میں زیادہ تر اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب آرٹیر پوسکلر وسس (Arteriosclerosis) کااثر شروع ہولینی مریض کی خون کی رگوں کے خول سخت ہوجا کیں، کیک باقی نہرہے اورخون کی شریا نیں تنگ ہونے لگیں جس کی وجہ سے د ماغ کومناسب مقدار میں خون فراہم نہ ہو۔ اس کے برعکس عارضی طور پر ایسی ہی علامتیں برین فیگ (Brain Fag) میں بھی ملتی ہیں ۔ ہرین فیگ اس وقت ہوتا ہے جب رگوں میں تشنج کی وجہ سے خون کا دوران کم ہو جائے۔ برین فیگ کا تعلق عمو ماً معدہ کی خرابی سے ہوتا ہے۔ آ رٹیر پوسکلروسس کے مریض کا معدہ خراب ہو جائے تو ہرین فیگ اور بھی زیادہ ہونے لگتا ہے۔ برین فیگ یا د داشت کی ایسی وقتی کمزوری کو کہتے ہیں جس میں مریض کی فوری یا دداشت اجا تک جواب دے جاتی ہے حتیٰ کہ چند منٹ پہلے یانی پیا ہو یا کھانا کھایا ہوتو بھول جاتا ہے اور اپنے عزیز وں برناراض ہوتا ہے کہ یانی یا کھانا کیوں نہیں دیتے۔کوئی کام کیے گا جوکربھی دیں توبار باریا د دہانی کرائے گا کہ میراوہ فلاں کام کردو کسی کا چیرہ دیکھے کر بھول جائے گا۔ تازہ یا دواشت کا خراب ہوجانا اور بہت دور ماضی کی یا دواشت کا زندہ رہنا

برین فیگ کی خاص علامت ہے۔ بکرک ایسڈ میں برین فیگ کی علامت نمایاں ہوتی ہے۔
آرٹیر یوسکار وسس کے نتیجہ میں ذہنی کمزوری مزمن ہوجائے تواس کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن
دوروں کی شدت میں کمی یا زیادتی ہوتی رہتی ہے۔اگر برین فیگ کا تعلق آرٹیر یوسکار وسس ک
یماری سے نہ ہو بلکہ دوسری عارضی وجوہات مثلاً کسی زہر کے خون میں سرایت کرجانے کی وجہ
سے ہوتو صحیح دواسے اس کا فوری علاج ہوسکتا ہے۔

پکرک ایسڈ کابرین فیگ آرٹیر یوسکاروس سے بہت ماتا ہے۔قریبی یا دواشت مٹ جانے کے دورے باربار ہوں تویہ دوابہت اچھی ہے۔ سر درد میں پکرک ایسڈ اس وقت کام آتا ہے جب لیغم وفکر اور زیادہ کام کے نتیجہ میں ذہن پر بہت دبا و ہو جو لمباعرصہ چلے اور پھر سر در د کادورہ ہو۔ بعض بہت مختی اور امتحان سے خوفز دہ رہنے والے طلباء کو مستقل سر درد کی شکایت ہوجاتی ہے۔ ایسے درد میں پکرک ایسٹر کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ وہ سر در دجو لمبی مخت اور د ماغ سوزی کے نتیجہ میں رفتہ رفتہ آ کر گھر جائیں خواہ وہ شدید ہوں یا نہ ہوں ،ان میں پکرک ایسٹر اچھا کام کرتی ہے۔ پکرک ایسٹر کے مریض کو نیند سے آرام آتا ہے۔

پکرک ایسٹر میں آئکھوں کے عضلات میں کمزوری واقع ہوتی ہے اور بو جھ محسوں ہوتا ہے۔ آئھوں میں ریت اور خشکی کا احساس اور بھاری بن نمایاں ہوتے ہیں۔ پکرک ایسٹر میں روٹا کی طرح باریک کام کرنے سے آئھوں میں تکلیف ہوجاتی ہے۔ باریک تحریر پڑھنے اور زورلگانے سے آئھوں میں در دہوتا ہے۔ آئکھوں کے اردگر دیے عضلات میں کمزوری پیدا ہوجائے توروز مرہ کے کام کاج میں رکاوٹ ہونے گئی ہے۔ پکرک ایسٹر اس کمزوری کو دورکر نے میں اچھی دوا ہے اور اس کوروٹا کے ہم پلے قرار دیا جاتا ہے۔ اونوسموڈ یم (Onosmodium) میں بھی باریک تحریر پڑھنے سے سر در دیم ہوجاتا ہے کیاں اس میں بھاری کی وجہ پچھاور ہوتی ہے میں بھی باریک کی وجہ پچھاور ہوتی ہے۔ البتہ نتیجہ کے لحاظ سے دونوں دوائیں ملتی ہیں۔

اونو سموڈ یم مردوں اور عورتوں کی جنسی کمزور بو<u>ل میں اچھی بیان کی جاتی ہے۔</u>

خصوصاً نو جوانوں کی بعض کمزور یوں کودور کرنے میں اسے مؤثر بیان کیا جاتا ہے۔

پکرک ایسڈ کے مریضوں میں پورک ایسڈ اور فاسفیٹ کی زیادتی اورسلفیٹ کی کمی ہوتی ہے۔ بہت ہی الیبی دوائیں ہیں ہوتی ہے۔ بہت ہی الیبی دوائیں ہیں۔ جن میں نچلے دھڑ کی بیار یوں کا ذکر ملتا ہے اور بعض اوپر کے دھڑ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہومیو پیتھک پکرک ایسڈ نچلے دھڑ کے بوجھل بن کو دورکرتی ہے۔ ریڑھ کی مڈکی اورٹانگوں میں جو کمزوری محسوس ہوتی ہے اس کے لئے کوئیم اور فاسفورس بھی مفید ہیں۔

غم کے بداثرات اور جذبات کے پیجان کے نتیجہ میں سر درد کے علاوہ جو علامات بھی پیدا ہوتی ہیں ان میں پکرک ایسٹر بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ ایمبراگر بیا، اگنشیا، نیٹر م میور، ایسٹر فاس اور سلیشیا بھی غم کے بداثرات کو دور کرنے میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ ان کی پکرک ایسٹر سے پیچان مشکل نہیں ہے۔

پرک ایسٹر کیل مہاسول کے لئے بھی مفید ہے۔ جولوگ خون کی کمی کا شکار ہوں اور جسمانی اور ذہنی محنت سے تھک چکے ہوں ان کے لئے بھی بہت مفید ہے۔ پکرک ایسٹر میں سر درد کو لیٹنے اور سرکوکس کر باند ھنے سے آرام آتا ہے لیکن حرکت سے، جھکنے سے اور دماغی محنت سے درد میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ کھلی اور ٹھنڈی ہوا میں آرام محسوس ہوتا ہے لیکن مرطوب موسم میں درد بڑھ جاتا ہے۔

طاقت: 30سے 200 تک

154

يائيپر نائيگر

PIPER NIGRUM

(Black Pepper) (ساهمرچ)

یہ کالی مرچ سے تیار کردہ دوا ہے۔ چھینکوں کی بیاری میں جہاں دیگر معروف دوائیں کا منہیں کرتیں میں نے اسے مفید پایا ہے۔ یہ خصوصاً ان لوگوں کو بہت فائدہ دیتی ہیں جو کالی مرچ سے زود حس ہوتے ہیں۔ انہیں کسی چیز پر کالی مرچ چھڑ کئے سے ہی چھینکوں کا دورہ شروع ہوجا تا ہے۔ اس کے علاوہ جولوگ کالی مرچ سے خاص طور پر زود حس نہ ہوں ان کے لئے بھی مختلف وجو ہات پر چھینکوں کے آنے کار ججان روکنے میں یہ مفید ہے۔

پائیپر نائیگر کامریض مزاجی لحاظ سے اداس او عمکین رہتا ہے۔ کسی کام پر پوری توجہ نہیں دے سکتا۔ اس کے خیالات میں کیسوئی نہیں رہتی۔ ذراسی آ واز پر چونک اٹھتا ہے۔ آ نکھ کے ڈیلوں میں جلن اور شدید درد جیسے بھٹ جا ئیں گے، اس کے ساتھ ناک میں خارش اور چینکیں بھی آ ئیں تو پائیپر نائیگر استعال کرنی چاہئے۔ اس کے مریض میں نکسیر بھوٹے کا رجحان بھی ہوتا ہے۔ ہونے خشک رہتے ہیں۔ سر بوجھل اور کنیٹیوں پر دباؤ پڑتا ہے۔ گلے اور ٹانسلز بھی ہوتا ہے۔ ہونے خشک رہتے ہیں۔ سر بوجھل اور کنیٹیوں پر دباؤ پڑتا ہے۔ گلے اور ٹانسلز بھی ہوتا ہے۔ بیاس گئی ہے۔ پیٹ ہوا سے بھرا رہتا ہے۔ قرار ہتا ہے۔ قراح باتھ کا دورہ بھی پڑجا تا ہے۔

مثانے اور بیشاب کی نالی میں جلس ہوتی ہے۔ مثانہ پھولا ہوااور بھرا ہوامحسوں ہوتا ہے۔ بیشاب مشکل سے خارج ہوتا ہے۔ باربار حاجت محسوں ہوتی ہے لیکن بیشا بہیں آتا۔ پائیپر نائیگر اس میں بہت مفید ہے۔ اس کی ہر تکلیف میں جلن اور دباؤ کا عمومی

احساس رہتاہے۔

پائیپر نائیگر میں دل کی علامات بھی پائی جاتی ہیں۔ سینے میں در داور در دسے کھانسی اٹھتی ہے۔ دل تیز دھڑ کتا ہے۔ سانس لینے میں دفت ہوتی ہے۔ دل کے مقام پر در د کا احساس ہوتا ہے۔ بعض دفعہ دورہ پلانے والی ماؤں میں ہوتا ہے۔ بعض دفعہ دورہ پلانے والی ماؤں میں بہتی کی ضرورت سے بہت زیادہ دورہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ ان کے لئے یہ بہت مفید دوا ہے۔ اس کا استعمال دورہ کو کم کردے گا۔

طاقت: 30 تک

155

بلاثينم

PLATNUM

(Platina)

بلاٹینم مغرور عورتوں کی بیاریوں میں بہت شہرت رکھتی ہے لیکن اس کا استعال نسبتاً کم ہوتا ہے کیونکہ اس مزاج کی عورتیں پرانے زمانے میں شاید زیادہ ہوتی تھیں۔ابز مانہ بدل گیا ہوتا ہے کیونکہ اس مزاج کی عورتیں پرانے زمانے میں شاید زیادہ ہوتی تھیں۔ابز مانہ بدل گیا ہے اس لئے اس سے کی متکبر،سرچڑھی عورتیں جو بچپن سے ہی منہ میں سونے کا چمچے لے کر پیدا ہوئی ہوں،خود دیتی ہی ۔امیر خاندان کی عورتیں جو بچپن سے ہی منہ میں سونے کا چمچے لے کر پیدا ہوئی ہوں،خود کو ہرشے سے برتر جمجھتی ہوں۔الیی عورتیں پلاٹینم کی مزاجی تصویر ہوتی ہیں۔ پلاٹینم سونے سے بھی بہت زیادہ قیمتی دھات ہے۔ بجیب بات ہے کہ پلاٹینم کا زہرامارت کا فرضی نشہ چڑھا کر بھی بہت زیادہ قیمتی دھات ہے۔ بیا بیکر بنادیتا ہے۔

بلاٹینم کا مریض خود کو بہت اعلی وار فع سمجھتا ہے۔ چھوٹی سی بات سے بہت چڑجا تا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اپنی بہت اہمیت کی وجہ سے ہروفت سمجھتا ہے کہ اس کی جان اور بدن کو خطرہ ہے۔ یہ زبنی کیفیت جسمانی حالت میں بدل جاتی ہے۔ اسے ہروفت بید دھڑکا لگار ہتا ہے کہ اسے بجھ ہوجائے گا۔

بلاٹینم میں دل کی دھڑکن تیز ہوجاتی ہے،اعضاء کا پنے گئتے ہیں،موت کا خوف بہت جلد گھیر لیتا ہے، مذہبی جنون بھی پایا جاتا ہے اور مریضہ بھے گئی ہے کہ وہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔
یہ باتیں پاگل بن کی علامت ہیں اور مزید پاگل بن کی طرف لے جاتی ہیں۔
یہا ٹیس پاگل بن کی علامت ہیں اور مزید پاگل بن کی طرف لے جاتی ہیں۔
یہا ٹینم میں جنسی رجحانات ہائیوس سے ملتے ہیں۔ تشنج بھی پایا جاتا ہے اور یہ سننجی کیفیت رفتہ رفتہ بڑھتی جاتی ہے اور عضلات کو متاثر کرتی ہے۔ جلد سن ہو جاتی ہے۔

خون کا سیلان سیاہی مائل ہوتا ہے۔ ناک سے سیاہ خون لوتھڑوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ ناک کی جڑ میں بھی نشنج ہوتا ہے جو بہت نکلیف دہ ہوتا ہے۔ ماؤف جگہ شکنجہ میں جکڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ چہرے پراعصا بی در دہوتا ہے اور مڈیوں میں بے حسی کا احساس ہوتا ہے۔

اگر بیضة الرحم میں سوزش ہواور لمباعرصہ چلنے والا بانجھ بن بھی پایا جاتا ہو، جنسی تحریک بہت جلد ہوتی ہواور بظاہراس کی کوئی وجہ معلوم نہ ہو سکے تو صرف اس علامت کے ساتھ بیدا ہونے والے بانجھ بن میں پلاٹینم کویا در کھنا جائے۔

اگر بانجھ بن کاتعلق بہت زیادہ بہنے والے کیکوریا سے ہوتو پھر پورکیس دواہے۔ پلاٹینم میں رحم کی دیگر خرابیوں کی علامتیں بھی ملتی ہیں۔ رحم کی تختی، گاٹھیں بننے کار جحان، رحم کا نیچ کی طرف لٹک جانا اور رحم سے بے تحاشا خون بہنا بھی پلاٹینم کی علامات ہیں۔خون کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے اور لوتھڑ ہے بھی بنتے ہیں۔ چیض کا خون بہت جلد شروع ہو جاتا ہے۔ بیعلامت تو بہت عام ہے کیکن پلاٹینم کی مزاجی علامات ساتھ موجود ہوں تو یہ بہت جلد کام کرے گی۔

یلاٹینم میں معدے کی بیاریاں بھی ملتی ہیں۔ ہوا بکٹر ت بنتی ہے۔ متلی بھی ہوتی ہے۔ مریض بے قراری اور بے پینی محسوس کرتا ہے۔ اجابت رک کراور کم آتی ہے اور بہت تھاوٹ محسوس ہوتی ہے۔

بلاٹینم میں شام کے وقت اور بیٹھنے سے یا کھڑے ہونے سے تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ حرکت کرنے اور چلنے پڑھنے سے کمی محسوس ہوتی ہے۔

> دافع اثر دوائیں: پلسٹیلا طاقت: 30 یا مزاجی اصلاح کے لئے اونچی طاقتیں۔

ريم م م

156 پلمبرمیٹیلیکر

PLUMBUM METALLICUM

سکہ یا سیسہ (Lead) کو لا طینی زبان میں پلیم کہا جاتا ہے۔گھروں کی آرائش کے لئے استعال ہونے والے رنگ وروغن (Paint) میں سکہ کا عضر بھی شامل ہوتا ہے اور اگر روغن خشک بھی ہوگیا ہوتو فضا میں سکہ کے ذرات معلق رہتے ہیں۔ جن لوگوں کو سکہ سے الرجی ہوتی ہے اگروہ ایسے کمرے میں داخل ہوں تو ان پر فور ً االرجی کا اثر ظاہر ہوگا اور پیپٹ میں شدید درو کا دورہ پڑے گا جیسے پیٹ کو سی نے شکنجہ میں جکڑ دیا ہویا مٹھی میں مروڑ دیا ہو۔ اگر پیٹ سے الرجی ذورہ پڑے گا جیسے ہیں شدید پیٹ درد میں بہی علامت پائی جائے تو پلیم مفید ثابت ہوتی ہے۔ خبھی ہواور ویسے ہی شدید پیٹ درد میں بہی علامت پائی جائے تو پلیم مفید ثابت ہوتی ہے۔ النوں کے نیچے مسوڑ ھوں پر ایک نیلی سی لکیر آ جاتی ہے جووقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوجاتی ہے۔

بہم اعصاب کے عارضی تشنج کی بہترین دواہے۔اس کے علاوہ اگر ہاتھ پر فالج کااثر ظاہر ہو، کلائی سکڑ کرلٹک جائے یا بہت زیادہ لکھنے کی وجہ سے کلائی بے کار ہوجائے، اگرایسے مریض میں پلمم کی بنیادی علامتیں موجود ہوں تو پلمم حیرت انگیز سرعت سے اثر دکھا تا ہے۔

پلمیم کے مریض کی زندگی اکثر ست رفتار ہوتی ہے۔ فرنهن اور اعصاب پر ہلکا سافالجی اثر دکھائی دیتا ہے۔ مریض سے کچھ پوچھا جائے تو وہ کچھ دیر کے بعد جواب دے گایا بات کو دہرائے گا۔ اگر مریض بعد از وقت رقمل دکھائے تو وہاں پلمیم خصوصی دوا ہے۔ لیکن میفرق مدِنظر رکھنا چاہئے کہ بعض اوقات کوئی شخص خیالات میں کھویا ہوا ہوتا ہے اور ہلکی سی آ واز سن کراس کا جواب نہیں دیتا، بعد میں ذہن میں نقش ہونے والا وہ پیغام

اسے جگاتا ہے تو پھروہ بو چھتا ہے کہ کیابات تھی؟ یہ بالکل الگ بات ہے۔ پلمیم کامریض ہمیشہ ہر چیز میں یہی رونل دکھاتا ہے حتیٰ کہ اسے در دکا احساس بھی پچھ دیر کے بعد ہوتا ہے۔ اس لئے ایسے مریض کے لئے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کوخی نہ کرلے یونکہ چھنے یا کاٹے والی چیز اپنا کام کر جائے تو اسے ذرا دیر بعد ہی پھھ چلے گا کہ کیا حادثہ گزرا ہے۔ یہ پلمیم کے ہر مریض میں نہیں ہوتا، صرف ان میں ہوتا ہے جومزا جا سرتا پا پلیم کے مریض ہوں۔ پلیم کامریض بات ہجھتا تو ہے لیکن ذہمن پراس کا نقش جمانے میں اسے پچھ وقت لگتا ہے۔ جلد کے در دمحسوں کرنے والے اعصاب دیر میں پیغام پہنچاتے ہیں۔ بعض اوقات احساس کا آہتہ آہتہ مہم ہونا اعصاب کے مستقل سن ہونے میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ جلد ہے حس ہوجاتی ہے، پاؤں اور دیگر اعضاء وغیرہ میں آہتہ آہتہ جان اور احساس کی طاقت مٹی چلی جاتی ہے۔ جب بیاری بہت بڑھ جائے تو مریض جسمانی طور پر کمز در ہوتے ہوتے آخر ہڈیوں کے گر دلیٹا ہوا جلد کا ایک تھیلا سابن جاتا ہے۔

پلمیم کی خاص علامت ہے ہے کہ جس عضو میں در دہووہ سو کھ جائے گا۔ بیعلامت بعض دوسرے فالجوں میں بھی ملتی ہے۔ فالجی بخار مثلاً ٹائیفائیڈ وغیرہ میں اگر سی خاص عضو پر جملہ ہوا ہوتو وہ حصہ کمزور ہو جاتا ہے لیکن در دکی وجہ سے نہیں۔ ٹائیفائیڈ بعض دفعہ ٹائلوں یا بازوؤں کو مفلوج کر دیتا ہے لیکن ساتھ در ذنہیں ہوتا جبکہ پلمیم کا فالج جس عضو میں ہواس عضو میں در دبھی مفلوج کر دیتا ہے۔ لیکن ساتھ در ذنہیں ہوتا جبکہ پلمیم کا فالج جس عضو میں ہواس عضو میں در دبھی ہوتا ہے۔ جسم کے جس عضو میں بھی فالجی اثر شروع ہووہ در دبھی ضرور کرتا ہے۔ ایسی صورت میں پلمیم کو فوراً استعمال کرنا چاہئے۔ عرق النساء میں بھی بیہ مفید ہے۔ اگر پلمیم کی دیگر علامات بھی پائی جائیں تو سب سے پہلے یہی دوا استعمال کروانی چاہئے۔ جہاں بھی فالج کے اثر کے تحت یائی جائیں ، در دسے بھر جائیں اوران میں کمزوری واقع ہوجائے تو پلمیم مؤثر ہوگا۔

پیانو بجانے والوں کوا کثر انگلیوں کے جوڑوں کا فالجے ہوجاتا ہے اور انگلیاں بے کار ہو کر لٹک جاتی ہیں، ان کے لئے دو دوائیں بہت مشہور ہیں ایک پلمیم اور دوسری کیورارے(Curare)۔مؤخر الذکر ایک خطرناک زہر ہے جس کا فالجے سے خاص طور پر

تعلق ہے۔رسٹائس بھی فالج کے بسرعت ظاہر ہونے والےاثرات میں بہت اچھی دوا ہے۔ اگر جلداستعال کی جائے تو فوری فائدہ دیتی ہے۔لیکن اگر دیر ہوجائے تو سلفر کے بغیر پورا فائدہ نہیں دیتی کیونکہ رسٹائس نسبتاً کم گہری اور مزمن دواہے۔ ہاں سلفر کے ساتھ ادلنے بدلنے پراس کی طافت بڑھ جاتی ہے۔ پلیم اس کے مقابلہ برزیا دہ گہری اور مزمن ہے۔ میں رسٹاکس کوسلفر کے ساتھ ادل بدل کر دیتا ہوں کیونکہ سلفر دفاعی رڈمل کو جگا دیتی ہے اور رسٹا کس فالجی اثر ات کو دور کرتی ہے۔اس نسخہ سے بولیو کے بہت پرانے مریضوں کوبھی اللہ کے فضل سے بہت نمایاں فائدہ ہوا۔رسٹائس کا فالج سے بہت گہراتعلق ہے۔ ہومیوڈ اکٹرعمو ماً پرانے فالجوں میں رسٹائس کواستعال نہیں کرتے حالا نکہ بیر بہت کارآ مددواہے۔شرط بیہے کے سلفرسے ادل بدل کر دیں۔ پلمم کے مریض کی قبض بہت سخت ہوتی ہے۔اجابت گول شکل میں ہوتی ہےجس کا اخراج بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ کئی دفعہ زخم بن جاتے ہیں اور فضلہ نکالنے کے لئے آلات استعال کرنے پڑتے ہیں۔اس کی اصل وجہ پیہے کہ انتڑیوں کے گردباریک عضلات کی جھلی ماؤف ہو جاتی ہے اور انتر یوں میں فضلہ کو آ گے دھکینے کی طاقت نہیں رہتی۔ یہ فالجی کیفیت آ ہستہ آ ہستہ بڑھتی ہےاورقبض گہری اور پرانی ہوتی جاتی ہے۔الیی قبض میں صبر کے ساتھ کچھ عرصة تك پلمهم دينة ربنا جايئے ـ دس پندره دن كےاندر يورااثر ظاہر ہوگا كيونكه ايسي بيارياں جوآ ہستہ آہستہ آتی ہیں ان کا علاج بھی نسبتاً آہسگی سے ہوتا ہے۔لیکن بعض اثرات فوری بھی ہوتے ہیں مثلاً پبیٹ میں مروڑ اور شنج ہوتو فوری اثر دکھائے گی۔زہر کے وہ اثرات جوفوراً پیدا ہوں ہومیو پیتھک طریق پراسی زہر کی ہومیوطافت سے فوری طور پر دور ہو سکتے ہیں۔ پلمبم کے مریض کے مثانے میں بھی فالجی اثر کے تحت پیشاب دھکلنے کی قوت کم ہو جاتی ہے اور بیشا برک جاتا ہے اور مثانہ میں ہی اکٹھا ہوتا رہتا ہے پھر قطرہ بہنے لگتا ہے۔اس بیاری کا تعلق پراسٹیٹ سے نہیں بلکہ مثانے کے فالج سے ہے۔اس کی علامتیں مختلف ہیں۔ضروری نہیں کہ ایک ہی وجہ سے پیٹاب بند ہو۔ بیچ کی پیدائش کے بعد پیٹاب رکے تو

کاسٹیکم (Causticum) اول دوا ہے۔ اپریشن کے بعد یہ کیفیت ہوتو سٹروشیم کارب (Strontium Carb) دوا ہوگی۔ پلمیم بھی مفید ہوسکتی ہے۔ اگر اچا نک صدمہ پہنچنے سے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہوتو پلمیم ان میں دوبارہ حرکت پیدا کردیتی ہے۔

پلمیم کی ایک علامت ہے کہ جو چیز کھائی جائے وہ معدہ میں جا کر کھٹاس میں تبدیل ہوجاتی ہے اور شدیدالٹیاں آتی ہیں۔ معدہ میں موجود لعابوں اور رطوبتوں کے اثر سے کھانا عموماً تین گھٹے کے اندر اندر ہضم ہو کر انتڑیوں میں منتقل ہوجانا چاہئے۔ اگر معدہ اس عرصہ میں خوراک کو باہر نہ نکالے تو خوراک معدہ میں ہی گلنے سرٹ نے لگتی ہے۔ اس سے تیز ابیت پیدا ہوتی ہے اور گندے بد بودار ڈکار آنے گئے ہیں۔ انتڑیوں کی حرکت کا نظام ست پڑجائے تو معدہ میں کھٹاس بیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ ستی فالجی اثر ات کی وجہ سے ہوتو پلمیم بہترین دوا ہے۔ معدہ میں سیاہی مائل الٹیاں آتی ہیں یا سبز رنگ کا مواد نکلتا ہے جس میں بوجھاور خون کی آمیزش بھی ہوتی ہے۔ جگراور معدے کا نظام در ہم برہم ہوجا تا ہے۔ معدہ میں بوجھاور گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ ناف اندر کمر کی طرف تھنچتی ہے۔

المحتلاقی کمزوری اور آ ہستہ آ ہستہ بڑھنے والے فالج میں پلیمیم کواچھی شہرت ہے۔ دو تین شم کو انہا کی کمزوری اور آ ہستہ آ ہستہ بڑھنے والے فالج میں پلیمیم کواچھی شہرت ہے۔ دو تین شم کی دوائیں ایسی بیاریوں میں کام آ سکتی ہیں۔ اوپیم اور کالی فاس بھی مفید ہیں۔ کالی فاس کو آ ہستہ آ ہستہ اونچی طاقت میں بڑھا کر دینا چاہئے۔ Progressive Muscular میں دوائی کے مرکزی حصہ میں وہ خلیے مرنے لگتے ہیں جوعضلات اوران کی حرکت کی صلاحیت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس بیاری کا کوئی شافی علاج نہیں ہے۔ ایسے مریض آ ہستہ آ ہستہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں اورا کثر جوانی کی عمرتک پہنچنے سے پہلے ہی وفات با جاتے ہیں۔ اگر وہ زندہ بھی رہیں تو سخت کرب ناک زندگی گزارتے ہیں۔ چونکہ یہ بیاری موروثی طور پرخون میں شامل ہوتی ہے رہیں تو سخت کرب ناک زندگی گزارتے ہیں۔ چونکہ یہ بیاری موروثی طور پرخون میں شامل ہوتی ہے اس کے علاج میں قطعی کامیا ہی بھی

پلېم م

سننے میں نہیں آئی مگرایسے مریضوں کوئسی حد تک نسبتی فائدہ ضرور پہنچاہے۔

اگر دل کی دھڑکن بھی بھی اچا نک تیز ہوجائے اور شنجی کیفیت بھی ہوتو اس کے لئے پلمبم اچھی دواہے۔اگر دل اچا نک مٹھی میں بند ہونے کا احساس ہوتو کیکٹس گرینڈی فلورا بہترین دواہے۔

پلمیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دھو کہ دہی اور بے ایمانی کرنے والو<u>ں</u> کے لئے شفا کا اثر رکھتی ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو یہ ساری دنیا میں کثرت سے استعال ہونی جائے۔

گردوں کی لمباعرصہ چلنے والی بیاریوں میں پلیم فائدہ مند ہے اورا گر پیشاب میں البیومن اورشوگر آرہی ہوتو اس کا بھی اچھا علاج ہے۔گردوں کی اندرونی جھلیوں پر بھی اس دوائی کا اثر ہوتا ہے۔ یہ دونوں اثرات اگر چہالگ الگ وجوہات سے تعلق رکھتے ہیں لیکن پیشاب میں انکھے ملتے ہیں۔

پہم کی علامتیں اوپیم سے بھی ملتی ہیں۔ ایوپلیکسی (Apoplexy) میں اچا نک خون کار جمان سر کی طرف ہو کررگ بھٹ جائے، چہرہ سرخ ہواور آئھ کی بتلیاں بھیل جائیں تو اکثر سے علامات موت پر منتج ہوتی ہیں۔ اگر شروع میں ہی اونچی طاقت میں آرنیکا اور اوپیم دے دی جائیں تو بہت مفید ثابت ہوتی ہیں۔ پلمیم کے مزاجی مریضوں میں اسے بھی اونچی طاقت میں دیا ضروری ہوتا ہے۔ دونوں کا اثر ایک ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کینٹ کا کہنا ہے کہ اوپیم سے علاج شروع کرنا چاہئے، پلمیم بعد میں دینی چاہئے۔ یہی بات درست ہے۔ اس بیاری کی اول مشابہت اوپیم سے ہی ہے۔

دواور دوا کیں بھی اپولیکسی میں بہت مفید بھی جاتی ہیں۔ اگر جگہ جے سرخ خون کا جریان ہوتو فاسفورس کام آئے گی۔ ایلیو مینا بھی اس بیاری کے علاج میں اچھی شہرت رکھتی ہے۔ شام کے وقت یا رات کو ٹانگول میں دورول کی شکل میں درد اٹھے جسے حرکت سے یا دبانے سے آرام آئے تو پہم ایک امکانی دوا ہے۔ بجلی کے کوندول کی طرح درد کی

لہریں اٹھیں تو یہ بھی پلمیم کی ایک علامت ہے جو کاسٹیکم اور کولو فائیلم میں بھی یائی جاتی ہے۔ سردی گرمی کے لحاظ سے پلمبم کاعمومی مزاج سورائینم سے ملتا ہے یعنی بہت ٹھنڈا۔ مریض گرمیوں میں بھی اینے آپ کو لپیٹ کر رکھتا ہے۔ آرنیکا کی طرح سرگرم رہتا ہے اورخون حمنے کار جحان ہوتا ہے۔

پاؤں کی انگلیوں کے درمیان اکثر حچھالے بن جاتے ہیں،ایسے چھالوں کے لئے پلمبم کے علاوہ سلفر بہت مفید ہے۔اگر ماتھوں یا یاؤں کی انگلیوں میں گینگرین ہواوریا وُں پر گٹے پڑھا ئیں توان میں بھی پلمبم اگر مزاجی ہوتوا چھا کام دکھائے گی۔

زبان کے نیجے غدود کی سوزش میں بھی مفید ہے۔جسم کوشدید جھٹکے لگنے اور دندل پڑنے کار جحان ہو،نرخرےاورغذا کی نالی میں فالجی اثر ات نمایاں ہوں ، غلط نگلنے کار جحان ہو اور پانی یا خوراک سانس کی نالی میں یا اوپر ناک میں چلے جائیں تو بیعلامتیں اور فالجی اثر والی دواؤں کی طرح پلمیم میں بھی ملتی ہیں۔

پلم میں بھی بھی پیٹ کا شدید در د مذیان کنے کے رجحان میں تبدیل ہوجا تا ہے اور گلے سے درد کا گولہ د ماغ کی طرف جاتا ہوامحسوس ہوتا ہے۔ بال بالکل خشک ہوجاتے ہیں ، آ نکھ کی تیلی سکڑ جاتی ہے اور آ نکھیں زرد ہوجاتی ہیں۔بعض اوقات اچانک بے ہوشی طاری ہو جاتی ہےاورنظرختم ہوجاتی ہے۔ چہرے کا رنگ زرد، گال مرجھائے ہوئے اور جلد چکنی اور چیکیل سی ہو جاتی ہےاور گہرے بھورے داغ پڑ جاتے ہیں۔

پلمبم میں بیاریاں رات کواور حرکت کرنے سے بڑھ جاتی ہیں اور دیانے سے آ رام

آتا ہے۔ دافع اثر دوائیں: ایلیو مینا۔ پٹرولیم ۔ بلاٹینم (CM)-200_200_30

سورانينم 681

157 سورانگیم

PSORINUM

(Scabies Vesicle)

یرانے سورائسس (Psoriasis) کے نتیجہ میں جلد پرا بھرنے والے فاسد مادوں سے تیار کی جانے والی دوا کا نام سورائینم ہے۔سورائینم بہت گہرا اور وسیع اثر رکھنے والی دوا ہے۔ بیاریوں میں اسے سلفر سے مشابہ مگر گرمی سردی کے احساس میں بالکل الث قرار دے سکتے ہیں۔سلفر کا مزاج سخت گرم اور سورائینم کا مزاج سخت ٹھنڈا ہوتا ہے۔اگر کسی مریض کی تمام علامتیں سلفر کی ہوں کیکن مریض ٹھنڈا ہوتو سلفر کی بچائے سورائینم دوا ہو گی۔سلفراور سورائینم جلد اور غدودوں پر بہت گہرا اثر کرنے والی دوائیں ہیں۔ دونوں میں مریض کے اخراجات سخت متعفن ہوتے ہیں اورجسم گندہ اور میلا میلا سار ہتا ہے جیسے عرصہ سے غسل نہ کیا ہو۔انتہائی سگین نوعیت کی جلدی امراض جو پخت دواؤں کے استعمال سے دب کرانتر یوں اوراندرونی جھلیوں پراٹر انداز ہوں ان میں سلفراورسورائینم دونوں ہی اولین اہمیت کی حامل ہوتی ہیں ۔ان امراض کی علامتیں بہت حد تک مشترک ہیں ۔گرسر دی گرمی کا فرق بہت نمایاں ہے۔سورائینم سردی گرمی کی علامت سے بے نیاز بعض ایسی خطرناک بیاریوں میں بھی کام آتی ہے جن کاسلفر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا مثلاً جانوروں کے سینگوں کی جڑ میں کینسر ہوجو بہت خطرنا ک ہوتا ہے اوراس کے نتیجہ میں جانور چنددن میں دم توڑ دیتا ہے تو ایسے جانوروں کو بار ہا سورائینم 1000 کی ایک ہی خوراک اللہ تعالیٰ کے فضل سے فوری شفا عطا کرتی ہے۔ حالانکہاس بیاری کولا علاج بتایا جاتا ہے۔

سورائینم کا مریض سخت ٹھنڈا ہوتا ہے اور لحاف لینا جا ہتا ہے کین بستر میں ذرا گرم ہو

تو خارش شروع ہوجاتی ہے۔سلفر سے اس جزوی مشابہت کے باوجودان کے مزاح الگ الگ ہیں اور پہچان بہت نمایاں ہے۔

سورائینم کی ایک علامت ایسی ہے جو کسی اور دوا میں موجو ذبیس اور سلفر کا تواس سے دور کا بھی تعلق نہیں وہ یہ کہ بعض دفعہ نوجوان بچوں کے سرکے بال بکشر سے سفید ہونے لگتے ہیں اور متعدد لٹیں سفید ہوجاتی ہیں تواس میں سورائینم سے بہتر دوا میر علم میں نہیں ۔ سورائینم ایک بزار طاقت میں ہفتہ وار استعال کرنے سے پچھ صمہ کے بعد ہی جڑوں سے سیاہ بال نکلنے ہیں۔ بالوں کا اوپر کا حصہ جو سفید ہو چکا ہووہ تو کا لانہیں ہوتا لیکن نیچے سے اگنے والا بال کا لا ہوتا ہے۔ زندگی کے عام دستور کے مطابق بڑی عمر میں جو بال سفید ہوتے ہیں معلوم نہیں ان پر سورائینم اثر انداز ہوتی ہے یا نہیں۔ شاذ صورتوں میں دیکھا گیا ہے کہ بڑھا بے کی عمر کو پہنے کر ایک بار پھر کا لے بال اگنے ہیں۔ میں نے خودالی خوا تین دیکھی ہیں جن کے بال بڑی عمر میں بڑی کر دوبارہ کا لے ہو گئے ۔ خدا تعالیٰ ہی اس نظام کو بہتر طور پر جانتا ہے۔ لیکن اگر کوئی میں ہومیو پیچھالیں تیر بہدف دوا معلوم کر لے جو ہر بوڑ ھے کے سفید بالوں کو کالا کرد ہے تو وہ دنیا کا امیر ترین آ دمی بن سکتا ہے۔ آر نیکا اور سورائینم کو مختلف طاقتوں میں ملا کرد سے کا تجربہ کرنا ایک صلائے عام ہے۔ ہوسکتا ہے ٹھنڈے مزاج کے بوڑھوں میں پنے کا گربہ کرنا ایک صلائے عام ہے۔ ہوسکتا ہے ٹھنڈے مزاج کے بوڑھوں میں پنے کا گربہ کرنا ایک صلائے عام ہے۔ ہوسکتا ہے ٹھنڈ مزاج کے بوڑھوں میں پنے کا گربہ کرنا ایک صلائے عام ہے۔ ہوسکتا ہے ٹھنڈ مزاج کے بوڑھوں میں پنے کا گربہ کرنا ایک صلائے عام ہے۔ ہوسکتا ہے ٹھنڈ مزاج کے بوڑھوں میں پنے کا گربہ کرنا ایک صلائے عام ہے۔ ہوسکتا ہے ٹھنڈ مزاج کے بوڑھوں میں پنے کا گربہ کرنا ایک صلائے عام ہے۔ ہوسکتا ہے ٹھنڈ مزاج کے بوڑھوں میں پنے کھنے کا گربہ کرنا ایک میں معلوم کر سے کو بوڑھوں میں پر بین کا تو ہوں کو بین کے کو بوڑھوں میں پر بیاتا ہے۔ ہوسکتا ہے ٹو بیاتا ہے ٹو بیاتا ہوں کو بیاتا ہے کہ بورٹھوں میں پر بینے کو بیاتا ہوں کو بیاتا ہے کہ بیال ہور

سورائینم کی جلدی امراض گریفائٹس سے بھی مشابہ ہیں۔ دونوں کے ایگزیما میں رخموں پر کھر نڈ آ جاتے ہیں جن کی نجل تہوں سے بدبودار پیپ نکلتی ہے اور زخم از سرنو تازہ ہو جاتے ہیں۔سورائینم میں زخموں کی بدبو گریفائٹس اور دیگر دواؤں کے مقابل پر بہت نمایاں ہوتی ہے۔ یہ بوتی ہے، زخموں میں سخت خارش ہوتی ہے اور کھجلانے پر خون بہنے لگتا ہے۔جلد میلی میلی اور خشک ہی ہوتی ہے۔ تمام جسم پر کھر نڈ والے ابھار بن جاتے ہیں اور زخم جلد مندمل نہیں ہوتے۔

سورائینم میں آئکھول کے چھپر متورم اور چیکے ہوئے ہوتے ہیں۔ پوٹوں کے کنارے سرخ ہوکر سوج جاتے ہیں۔ پیوٹوں کے کنارے سرخ ہوکر سوج جاتے ہیں۔ پیملامت اور بھی بہت دواؤں میں پائی جاتی ہے۔

اگر بیاری بہت بڑھ جائے اور آنکھ کی شکل گڑنے گئے تو ایلیو مینا اور ایلیومن بالمثل دوائیں ثابت ہوسکتی ہیں۔خصوصاً ایلیو مینا بہت گہرااثر کرنے والی دواہے۔اگر آئکھول میں سوزش ہواور گومڑ سے بن جائیں تو ایلیومینا کی بجائے ایسکولس (Aesculus) بہتر ہے۔ آنکھول کی بیاریاں ان ملتی جلتی دواؤں کے استعال سے عموماً ٹھیک ہوجاتی ہیں۔بعض دفعہ چھیرموٹے ہوکر اور کی سرخی باہر نمایاں دکھائی دیے گئی ہے۔ آئکھیں بہت اور اندر کی سرخی باہر نمایاں دکھائی دیے گئی ہے۔ آئکھیں بہت بھیا نکشکل اختیار کرلیتی ہیں اور لیکلیں جھڑنے کئی ہیں۔ان میں بھی سورائینم ،ہیپر سلف اور ایلیومینا کو اونجامقام حاصل ہے۔

سورائینم میں ایباز کام جس میں ناک بندر ہتا ہے، بار بار ہوتا ہے۔ ناک میں بندش کے باوجود جلن کے ساتھ بنگی زردی مائل سبز رنگ کی رطوبت بہتی ہے جس سے جلن کوقد رے سکون ماتا ہے۔ انفلوئنزا کے وائرس شکلیں بدل بدل کر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی صورت میں سورائینم بھی کچھ عرصہ فائدہ پہنچا کراثر کرنا چھوڑ دیتی ہے کیونکہ بیاری کی علامتیں بدل جاتی میں۔ لہذا نزلاتی بیار یوں میں کسی ایک دوا پر انحصار ممکن نہیں۔ علامتیں بدلیں تو دوا بدلنی بھی ضروری ہوگی۔

سورائینم ٹھنڈے مزاج کے مریضوں کی دواہے۔ٹھنڈسے پیدا ہونے والی بیاریوں پر
اپنااثر بہت تیزی سے دکھاتی ہے۔ مزید برآ ں سورائینم دنی ہوئی امراض کو باہر نکالنے کی طاقت
بھی رکھتی ہے۔ پس جن مریضوں کوسورائینم خودٹھیک نہ کر سکے توان کی اصل علامتوں کو جو کسی اور
دواسے تعلق رکھتی ہوں، ابھار کر معالج کی مدد کرتی ہے۔ اگر سورائینم کچھ فائدہ دے کر رک
جائے تو گھبرانا نہیں چاہئے۔ اس سے بیمرا دنہیں کہ دواکی شخیص غلط ہے۔ سورائینم کی بی بیا کہ اس سے میمرا دنہیں کہ دواکی شخیص غلط ہے۔ سورائینم کی بی بیا کہ انتظار کرتی ہے۔ پھر کچھ وقفہ ڈال کر دوبارہ سورائینم دینے سے رکا ہوا
فائدہ جاری ہوجاتا ہے۔

سورائینم میں مریض ہروقت بھوکا رہتا ہے خصوصاً رات کو بہت بھوک گئتی ہے اور یہ عجیب علامت ہے کہ رات کے بچھلے پہرمخض بھوک سے آئکھ کھل جاتی ہے۔ کھانا کھانے سے مریض کی تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے۔ سلفر کے مریض کو رات کو اور صبح کو

بھوک محسوس نہیں ہوتی لیکن دن چڑھنے کے بعد گیارہ بجے کے قریب معدہ میں شدید کھر چن کے ساتھ بھوک کااحساس ہوتا ہے۔

سورائینم میں سردرد نزلہ سے ادلتا بدلتار ہتا ہے۔ اس کیفیت میں برائیونیا اور رسٹاکس بھی مفید ہیں۔ سورائینم میں کھانسی بالکل خشک ہوتی ہے اور بلخم نہیں بنتی عموماً ایسی کھانسی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ آغاز میں ایکونائٹ، بیلا ڈونا اور آرسنک مفید ثابت ہوتی ہیں لیکن یہ مستقل شفا نہیں دیتیں۔ بعد میں پیدا ہونے والی علامتوں کے لئے اور دوائیں تلاش کرنی چاہئیں۔ مریض کی عمومی گرانی کرنا اور وقاً فو قاً پیدا ہونے والی علامتوں کو پیشِ نظر رکھ کردوائیں برلنا ضروری ہے لیکن جو دوائیں مریض کے مزاج سے موافقت رکھتی ہیں وہ عموماً مستقل فائدہ بہنیا تی ہیں، ان میں تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑتی۔

سورائینم میں منہ کے کنارول پر زخم بن جاتے ہیں، زبان اور مسوڑ ھے زخمی

رہتے ہیں اور دانت ڈھیلے ہو کر ملنے لگتے ہیں۔ بسااوقات کسی گہرے انفیکشن کے نتیجہ میں مسوڑ ھے خراب ہو جانے کے باوجود درد،سوزش اور بخار کی علامتیں ظاہر نہیں ہوتیں۔ جراثیم اندر ہی اندر ان کو کھو کھلا کر دیتے ہیں۔ایک دواہ پٹیشیا (Baptisia) میں بھی یہی علامت پائی جاتی ہے کہ گلاشدید خراب ہوتا ہے تی کہ غدود گلنے سڑنے لگتے ہیں کیکن دردنہیں ہوتا۔

۔ سورائینم کے مریض کوبغض دفعہ اچا تک اجابت کی حاجت محسوس ہوتی ہے اور ذراسی تا خیر سے کیڑے گندے ہوجاتے ہیں۔

سورائینم میں قبض برائیونیا اور گریفائٹس سے ملتی ہے۔ بعض دفعہ زم اجابت ہونے کے باوجود اخراج میں دفت پیش آتی ہے کیونکہ انتر یوں میں فضلہ کوآ گے دھکیلنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اجابت کے اخراج میں دفت کی علامت ایلیومینا، چائنا اور نکس موسکیطا جاتی ہے۔ اجابت کے اخراج میں دفت کی علامت ایلیومینا، چائنا اور نکس موسکیطا (Nux Moschata) میں بھی پائی جاتی ہے۔ سورائینم کے اسہال میں غیر بہضم شدہ غذاکے ثابت ٹکڑ ہے تھی خارج ہوتے ہیں۔ پیشاب بھی باربار آتا ہے جو ذیا بیطس کی نہیں بلکہ کمزوری کی علامتیں ہے۔

راسٹیٹ کی بعض تکلیفوں میں بھی سورائینم مؤثر ہے۔ کینسر میں بھی مفید ہے لیکن پر اسٹیٹ کے کینسر میں سب سے مؤثر دواسلیٹیا CM ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں کئ مریضوں پراس کا تجربہ کیا گیا ہے جو بے حد کامیاب ثابت ہوا ہے۔ اگر سلیٹیا CM کی ایک خوراک سے کچھ فائدہ ہوکررک جائے تو وقفہ کے بعد دوبارہ دی جاستی ہے لیکن بلاوجہ دہرانی نہیں چاہئے۔ کینسر میں خواہ وہ کسی جگہ کا ہو بہت اونچی طاقت حسب ضرورت جلد بھی دہرائی جا سکتی ہے لیکن اگر پہلی خوراک کا فائدہ جاری ہوتو ہے وجہ جلد نہیں دہرانی چاہئے۔ عموماً دل کے سکتی ہے لیکن اگر پہلی خوراک کا فائدہ جاری ہوتو ہے وجہ جلد نہیں دہرانی چاہئے۔ عموماً دل کے اعصاب کی کمزوری، شدید درد جسے لیٹنے سے آ رام آئے اور دل کے اردگرد کی جھلی میں سوزش کے لئے مفید ہے۔ سورائینم کی ایک علامت یہ ہے کہ نبض کمزور ہوتی ہے اور باسانی محسور نہیں کی حاسمتی۔

سورائینم عورتوں کی نکلیفوں میں تہھی بہت مفید ہو گی جب ان میں سر دی اوراخراجات کی بدیو کی علامتیں نمایاں طوریریا ئی جائیں۔

سورائینم میں انسان کی جنسی خواہشات میں کمی واقع ہوجاتی ہے اور کوئی احساس باقی نہیں رہتا۔ گریفائٹس میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے۔ سورائینم بظاہر خشک اور سرد دوا ہے لیکن اس کے بخار میں جسم خوب تیتا ہے اور گرم پسیند آتا ہے۔ بھاپسی نکلتی ہے لیکن پسیند آنے سے بخار کم نہیں ہوتا۔ ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ شدید پیاس گئی ہے۔ نا قابل برداشت خارش کی وجہ سے نینز نہیں آتی۔

سورائینم کی تکلیفیں سردی اور موسم کی تبدیلی سے بڑھتی ہیں۔ سرد ہوا کا جھو نکا نا قابل برداشت ہوتا ہے۔ کھانے سے تکلیف کم ہوتی ہے لیکن وقتی طور پر ۔ کھلی ہوا میں کھانسی اور خارش کی تکلیف کوآرام آتا ہے۔

مددگاردوائیں: سلفر۔ایلیومینا طافت: 200یا اونچی طاقتیں۔بعض دفعہاس کی پہلی خوراک اثر ظاہر کرنے میں نودس دن لیتی ہے۔اس لئے اس کا اثر دیکھنے کے لئے اتناا تظار ضرور کرنا جا ہئے۔ پولیس 687

158

پیویکس اری ٹینس

PULEX IRRITANS

پیولیکس اری ٹینس لینی پہو بیشاب کی علامتوں اورعورتوں کی رحمی خرابی میں ایک اہم دوا ہے۔ مزاج جلد برہم ہونے والا اور چڑجانے والا۔ سر در دعموماً سامنے کے حصہ میں اس احساس کے ساتھ کہ آئکھیں بڑی بڑی ہیں۔ چہرہ جھری داراور وقت سے پہلے بوڑھا لگنے والا۔ منہ کا مزادھات کا سا، گلے میں بال پھنسا ہونے کا احساس، پیاس عموماً زیادہ خصوصاً مردرد کے دوران، نیز سانس میں بہت بد بوہوتی ہے۔

معدہ کی خرابی کے ساتھ شدید تلی کا دورہ ،الٹیاں اوراسہال جوسخت بد بودار ہوتے ہیں ، یبٹ ہواؤں سے کیھولا ہوا۔

بیشاب کی علامتیں بہت اہم ہیں۔ پیشاب کی حاجت بار بارمحسوں ہوتی ہے لیکن جب آتا ہے تو تھوڑ اتھوڑ آتا ہے۔ پیشاب کی حاجت اتن تیز ہوجاتی ہے کہ اسے رو کناسخت مشکل ہوجاتا ہے۔ فوری حاجت روائی نہ ہوتو کیڑوں میں نکل جاتا ہے۔ مثانے پر دباؤاور پیشاب کی نالی میں جلن، بعض دفعہ پیشاب ایک دم بند بھی ہوجاتا ہے جس کے بعد سخت در دہوتا ہے۔ پیشاب کی نالی میں جلن، بعض دفعہ پیشاب ایک دم بند بھی ہوجاتا ہے جس کے بعد سخت در دہوتا ہے۔ پیشاب انہائی متعفن ہوتا ہے۔ اگر عور توں کو ماہواری سے پہلے مثانہ میں بے چینی اور زود حسی پیدا ہوجائے اور حیض تا خبر سے آئیں، منہ میں پانی بہت آئے اور اندام نہائی میں سخت جلن محسوس ہوتو ایسی عورت اس دواکی مثالی تصویر بن جاتی ہے۔

لیکوریا زیادہ اور سخت بد بودار جو کپڑوں کوزر دی مائل سبر داغ لگانے والا ہو، ان داغوں کو اچھی طرح دھوکر دور کرنا بھی مشکل ہوتا ہے ۔ کمر میں اگزیلک ایسٹر (Oxalic Acid) سے مثابہ در دہوتا ہے۔ جلد سے بدبوآتی ہے، بیٹھنے اور لیٹنے سے آرام، علنے پھرنے سے تکلیف میں اضافہ اور بائیں طرف تکلیف زیادہ۔

اس دوا میں ایک خوبی بہت نمایاں ہے کہ دوسری کوئی علامتیں موجود ہوں یا نہ ہوں تو بھی پیشاب کی اچا نگ سخت حاجت کونرم کرنے میں غیر معمولی اثر رکھتی ہے۔ جن مریضوں کو بیشاب کی حاجت کی وجہ سے بار باراٹھنا پڑتا ہے ان کے نیند کے وقفوں کو بہت بڑھا دیتی ہے اور بیشاب کی بد بوکو کم کرتی اور رنگت کوصاف کرتی ہے۔

عورتوں کے رحم اور جگر کے کینسر میں بھی بہت مفید ہے۔ رحم کی اندرونی جھلیوں کی اس حد تک اصلاح کردیتی ہے کہ اگران کی مستقل سوزش اور بیضہ دانی کی خرابیوں کی وجہ سے حمل نہ تھہرتا ہوتو اس دوا کے چند مہینے استعمال سے جو مناسب وقفوں کے ساتھ ہونا چاہئے حمل تھہرنے کا امکان روشن ہوجاتا ہے۔

طافت: 200یااونجی طافت میں اچھا کام کرتی ہے۔

بلسثيلا

159 پلسٹرا

PULSATILLA

(Wind Flower)

پلسٹیلا ایک بودے کے سفوف سے تیار کی جانے والی دوا ہے۔ ایلو پیتھک طریق استعمال میں اس سفوف کو صرف آئھ کی نکلیفوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ہومیو پیتھک طریقۂ علاج میں بیبکٹر ت استعمال ہونے والی دواؤں میں شامل ہے۔

اس دوامیں ذبخی اور جسمانی علامات اولتی برای ہیں۔ پلسٹیلا کا مریض زم مزاج، رونے کی طرف مائل اور بردل ہوتا ہے۔ یہ مزاج عورتوں میں زیادہ ملتا ہے اس لئے یہ عورتوں کی دواکے طور پرمشہور ہے۔ پلسٹیلا کا مریض سب کے لئے دل میں زمی رکھتا ہے۔ بات برروپڑے گایا چھوئی موئی کی طرح گمسم ہوجائے گا۔ چھوٹی چھوٹی بھوٹی بات کو بہت شدت سے محسوس کرتا ہے۔ جب یہ دیکھے کہ اس کی انا کو کچلا گیا ہے تو بہت بعزتی محسوس کرتا ہے اور چڑ جاتا ہے۔ بہت وہمی ہوتا ہے۔ عزت نفس کے معاملہ میں ضرورت سے زیادہ حساس ہوجا تا ہے۔ معمولی بات سے بھی اس کے جذبات کوٹیس پہنچتی ہے اور اسے ہروقت یہ وہم رہتا ہے کہ کوئی معمولی بات سے بھی اس کے جذبات کوٹیس پہنچتی ہے اور اسے ہروقت یہ وہم رہتا ہے کہ کوئی میری بعزتی کر رہا ہے لیکن وہ تشدد پیند نہیں ہوتا اور مار دھاڑ پر نہیں اتر آتا بلکہ بہت مملین ، میری بعض اور ہے۔ بہت روتا ہے۔ تو ہمات میں جلد مبتلا ہوجاتا ہے۔ ایسے مریضوں میں مذہبی جنون کی شایا ہوجاتا ہے۔ ایسے مریضوں عنورتیں اس جنون کا شکار ہوتی ہیں۔ چونکہ وہ اپنے عصہ کے جذبات کو دباتی رہتی ہیں اس لئے بالآخران کے یہ جذبات مذہبی پاگل پن میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پاگل پن کا اظہاران کی باتوں اور خیالات سے ہوتا ہے۔ مثلاً ان کے دماغ میں یہ خیال میٹھ جائے گا کہ فلاں خوراک بنی نوع انسان کی ہلاکت کا موجب ہے اس وجہ خیال میٹھ جائے گا کہ فلاں خوراک بنی نوع انسان کی ہلاکت کا موجب ہے اس وجہ خیال میٹھ جائے گا کہ فلاں خوراک بنی نوع انسان کی ہلاکت کا موجب ہے اس وجہ خیال میٹھ جائے گا کہ فلاں خوراک بنی نوع انسان کی ہلاکت کا موجب ہے اس وجہ

سے وہ تنزل پذیر ہیں۔اییاوہم پلسٹیلا کا خاصہ ہے۔ لائیکو پوڈیم کے بدائرات جن کی وجہ سے
انسان بے حد شرمیلا ہوجائے حتی کہ اپنے سائے سے بھی ڈریو پلسٹیلا ان کا تریاق ہے۔
بسااوقات پلسٹیلا کی مریض عورتوں کو شادی سے نفرت ہوجاتی ہے۔اگر شادی سے
نفرت نمایاں طور پر پائی جائے اور کوئی دوسری نفسیاتی وجہ معلوم نہ ہوتو پلسٹیلا دینی چاہئے۔
پلسٹیلا کا معدے کی تکلیفوں سے بھی تعلق ہے۔ تیل، گھی اور چربی والی مرغن غذا
ہضم نہیں ہوتی۔ ذراسی ملائی یا گھی کھانے سے معدہ جواب دے جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے
مریض چکنائی سے نفرت کرنے لگتے ہیں لیکن اگر نفرت نہ بھی ہوتو چکنائی والی غذا انہیں ہضم نہیں
ہوتی۔کار بووت جا وربعض اور دواؤں میں بھی یے علامت ملتی ہے۔

پلسٹیلا میں پیاس نہیں ہوتی لیکن ٹھٹڈا پانی پینے سے سکون ماتا ہے۔ ٹھٹڈا کھانا کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ معدے کی تکیفیں شبح کے وقت زیادہ ہوجاتی ہیں اور وہنی تکیفیں شام کو ہن ہیں۔ عموماً ڈیپریشن اور اداسی کے دور ہے بھی شام کو ہی پڑتے ہیں۔ ایسے مریضوں کے لئے یہ وقت بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ٹھٹڈی ہوا میں اور ہلکی حرکت کرنے سے مریض کو آرام ماتا ہے اور گرم کمرے میں جانے سے تکلیف ہڑھ جاتی ہے۔ مریض کی اندرونی مردی کی کیفیت گرم کمرے میں جا کر اور بھی شدت اختیار کرلے گی۔ پلسٹیلا میں یہ عجیب تضاد میں جا تا ہے کہ بظاہر جسم گرم ہوتا ہے لیکن مریض اندرونی طور پر سردی محسوس کرتا ہے اور گرم کمرے میں جانے میں ہوتا بالکہ زیادہ ہوجا تا ہے۔ کہ باوجود سردی کا احساس کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوجا تا ہے۔

پلسٹیلا کااٹر سلفر سے زائل ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کی جلن کے سواپلسٹیلا کی دوسری علامتیں سلفر سے نہیں ملتیں۔اگر سلفر زیادہ مقدار میں استعال کی گئی ہوتو پلسٹیلا دیں اور پلسٹیلا زیادہ دی ہوتو سلفردینے سے اس کااٹر زائل ہوجائے گا۔

اگر <u>سورائسس</u> (چنبل) جھوٹے جھوٹے دائر وں کی شکل میں ظاہر ہو اور دانے دبے ہوئے بھورے رنگ کے ہوں توالیم سورائسس میں پلسٹیلا اچھااثر رکھتی ہے۔ پلسٹیلا میں جسم کے کسی ایک حصہ میں رگیں پھول جاتی ہیں اوران میں خون جم جاتا ہے۔ رگوں کا جالا بن جاتا ہے اور سوزش بھی نمایاں ہوتی ہے۔ عموماً حمل کے دوران پیڈلیوں اور ٹانگوں پریہ تکلیف جملہ کرتی ہے۔ راس کی تفصیلی بحث ایسکولس وغیرہ میں کی جا چکی ہے۔ یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔) اس کے ساتھ السر اور زخم بننے کا رجحان بھی ہوتو پلسٹیلا بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔

پلسٹیلا نزلاتی بیمار بول میں بھی مفید ہے۔ بیدائی نزلہ یا اندرونی جھلیوں کی بیار یوں کوٹھیک کرتی ہے۔ ایسانزلہ جھاتی میں اتر تا ہے تو گاڑھی بلغم نکلتی ہے۔ صبح دوا کھانے سے اللہ کے فضل سے جلد آرام آ جا تا ہے۔ نزلاتی تکلیفیں چونکہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اس لئے ان میں فرق کرنا بہت مشکل ہے۔ ناک بند ہو تو اکثر پلسٹیلا ذہن میں آتی ہے۔ تا ہم اور بھی بہت ہی دواؤں میں بیعلامت یائی جاتی ہے جس کی تفصیل مختلف ابواب میں مذکور ہے۔ ناک بند بھی ہوتا ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کھوزلہ جاری رہتا ہے۔ نئس وامیکا اور کوئس (Coccus) بھی اس میں مفید ہیں۔ مریض کے مزاج کو پیش نظر رکھ کر دوا تلاش کرنی جائے۔

جوبچیاں جوانی کی عمر کوئی جوں ان کے لئے کلکیر یافاس کی طرح پلسٹیلا بھی بہت اہم دوا ہے۔ پاؤں بھی کر شفٹہ لگنے سے اگر حیض بند ہو جائیں یا بہت دیر میں آئیں تو پلسٹیلا اچھا اثر رکھتی ہے۔ پلسٹیلا کی مریض عور توں کو سارا مہینہ بیا حساس رہتا ہے کہ حیض آنے والے ہیں لیکن آتے ہیں۔ عور توں کے حیض ختم ہونے کے زمانے میں پیدا ہونے والی تکلیفوں میں بھی پلسٹیلا بہترین دوابیان کی جاتی ہے۔ اسے لیکیسس یا بیلا ڈونا سے ملا کر دینے سے کافی مفید نتائج نکلتے ہیں۔ عموماً چہرے پر گرم ہوا کے جھونکے محسوس ہوتے ہیں اور چہرہ سرخ ہوجا تا ہے۔ خون کی کمی کی شکار عور توں میں حیض کا وقت لمبا ہوجائے تو خون بیلا ہوجاتا ہے۔ چونکہ پلسٹیلا خون کی کمی کی جھی بہترین دوا ہے۔ اس لئے ایسی عور توں کو پلسٹیلا دی جائے تو حیض بالکل رک جا تا ہے لیکن چند ہینوں میں خون کی کمی پوری ہونے کے بعد پھر خود بخو دمعتدل طریق پر جاری ہوجا تا ہے۔ پلسٹیلا خون کی کمی دور کی کمی پوری ہونے کے بعد پھرخود بخو دمعتدل طریق پر جاری ہوجا تا ہے۔ پلسٹیلا خون کی کمی دور

کئے بغیر حیض جاری نہیں کرے گی۔اگر خون کی کمی نہ بھی ہواور سیابی مائل اور تھوڑا تھوڑا خون آئے تواس کا فوری تدارک پلسٹیلا سے کیا جاتا ہے۔

پلسٹیلا میں کمراور کندھوں میں درد ہوتا ہے۔ سخت چیز سے دبانے سے درد کی شدت میں کی آتی ہے۔ اسی طرح سخت چیز پر سونے سے بھی آرام ملتا ہے۔

پلسٹیلا کاسردرد در دِشقیقہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ عموماً ایک طرف ہوتا ہے۔ کنپٹیوں میں اندر کی طرف جاتا ہے اور چہرہ کی ایک ہی طرف محسوس ہوتا ہے۔ اس دواکی ایک خاص علامت ہے ہے کہ جسم کی ایک طرف گرم اور ایک طرف سے شندی ہوتی ہے۔ یہ گرمی سردی کا فرق ہاتھ لگانے سے بھی محسوس ہوتا ہے۔ چہرہ ایک طرف سے شندا اور دوسری طرف سے شندا اور زرد گویا خون نہیں رہا۔ یہ ایک الی نمایاں علامت ہے جس کے نتیجہ میں پلسٹیلا کی پہچان مشکل نہیں رہتی ۔ اس لئے سردرد کی دوسری علامتوں کے علاوہ یہ علامت بھی رہنما ہوسکتی ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہر درد میں یہ علامت موجود ہو۔ اگر یہ علامت نہ بھی ہو پھر بھی دیگر بالمثل علامتیں ملئے سے پلسٹیلا کام آسکتی ہے۔

پلسٹیلا میں آئھوں کی علامتیں بہت نمایاں ہیں۔ گوہانحبنیاں بہت نکلتی ہیں۔پلسٹیلا ان کا اچھاعلاج ہے۔ آئھوں سے گاڑھاموادنکلتا ہے، پلیس متورم اور چیکی ہوئی، چھوٹے بچوں میں آشوبِ چیثم ، آئھوں کے پردے کی سوزش اور ناک اور گلے کی علامتیں نیٹرم میور سے ملتی میں آشوبِ چیثم ، آئھوں کے پردے کی سوزش اور ناک اور گلے کی علامتیں نیٹرم میور سے ملتی ہیں۔نیٹرم میور پلسٹیلا کی مزمن دوا ہے یعنی اگر مستقل طور پر پلسٹیلا کی علامتیں موجود ہوں کیکن اس دواسے فائدہ نہ ہوتو نیٹرم میورد بنی جا ہئے۔

پلسٹیلا کانول کی بھی بہترین دواہے۔کانوں کی افکیشن ہویا کانوں سے بدبودار گاڑھا مواد نکلے اور اونچا سنائی دیو یہ مفید ہے۔ نزلاتی اثرات کان میں منتقل ہوں تو پلسٹیلا کے مریض کی طبیعت میں نرمی اور در دکے ساتھ رونے کا رجحان غالب ہوتا ہے جس میں عجب بے چارگی اور بے بسی کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن اگر کان کے درد کے ساتھ غصہ پایا جائے تو پلسٹیلا کی بجائے کیمومیلا دینی چاہئے۔

پرانے نزلہ کے ساتھ ناک کی اندرونی نالی میں خشکی کا احساس ہوتا ہے۔موادجم کر

سخت ہوجا تا ہے جس کی وجہ سے ہاکا ہاکا در دبھی رہتا ہے۔ الیم تکلیف میں پلسٹیلا سے فائدہ ہوگا۔

اس میں نزلاتی اخراجات ابتدا میں سفید ہوتے ہیں کیکن جلد ہی زردی مائل اور بد بودار

بھی ہوجاتے ہیں۔ قوت شامہ کم ہوجاتی ہے یا بالکل ختم ہوجاتی ہے۔ ضبح کے وقت بلغی
کھانسی ہوتی ہے جوشام تک بالکل خشک کھانسی میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ نزلے کا پرانا رجحان
ہوتو تکسیر بھی پھوٹی ہے۔

نگسیر کاحیض سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ اگر حیض رک جائے اور نگسیر آئے تو پلسٹیلا کی بجائے برائیونیا دوا ہوگی ۔ اگر حیض جاری رہتے ہوئے نگسیر آئے تو پلسٹیلا دوا ہے۔

پلسٹیلا میں شام کو الرجی کی شدت میں اضافہ ہوجا تا ہے لیکن نیڑم میور میں اس سے بالکل برعکس ضبح کے وفت خصوصاً نو بجے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اگر سردی سے گرم کمرے میں آئے سے چھینکیں آئیں تو اس کی دوا پلسٹیلا ہے۔ اگر گرمی سے سردی میں جانے سے چھینکیں آئیں تو ساڈیلا ،سلیشیایا نیٹرم میوراستعال کرنی چاہئیں۔

پلسٹیلا کے مریض کی نینداڑ جاتی ہے اور وہ سونے میں دفت محسوں کرتا ہے۔اسے سانس کی تنگی اور گھٹن کا احساس رہتا ہے۔اگر صحیح علاج نہ ہوتو دمہ ہوجاتا ہے۔اگر الرجی دمہ میں تبدیل ہو جائے تو پلسٹیلا بھی اسے ٹھیک کرنے میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔سلیشیا پلسٹیلا کی مزمن دوا ہے۔اگر پلسٹیلا سے بخار نہ ٹوٹ رہا ہوا ور طبیعت میں گرمی کا احساس ہو،اسی طرح انفیکشن کی تکلیفیں پلسٹیلا سے قابونہ آئیں حالا نکہ علامتیں پلسٹیلا سے ملتی ہوں تو سلیشیا دیں۔ یہ اکثر کام کرتی ہے۔ یہلے میں سلیشیا نہیں ویتا تھا لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ مزمن ہونے کا یہ جی تعلق ہوسکتا ہے کہ پلسٹیلا اپنی علامتوں کے باوجود کام نہ کرتی ہوا ور ناکام ہوجائے وہاں سلیشیا کام شروع کردے۔واقعتاً ہے ہات درست ثابت ہوئی۔

پلسٹیلا کن پیڑوں (Mumps) کی بھی بہترین دواہے اور یہ بیاری کو دوسری جگہ نتقل نہیں ہونے دیتی صحیح علاج نہ کیا جائے تو بیاری منتقل ہوکر آلاتِ تناسل پراثر انداز

ہوجاتی ہے اورایسے مریض ساری عمر کے لئے اولا دسے محروم ہوجاتے ہیں۔الی صورت میں سب سے پہلے ابراٹینم دینی چاہئے۔اس سے ٹھیک نہ ہوتو پھر پلسٹیلا دیں۔ان دونوں دواؤں میں ایک مشابہت یہ ہے کہ ان کے جسم کے در دادھرادھر گھومتے ہیں۔ابراٹینم (Abrotanum) کے در داریک خاص سمت یعنی دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں حرکت کرتے ہیں۔ پلسٹیلا کے در دایک خاص سمت یعنی دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں حرکت کرتے ہیں۔ابراٹینم میں بسااوقات مرض کی نوعیت کسی اس کے در دبھی بہت تیزی سے حرکت کرتے ہیں۔ابراٹینم میں بسااوقات مرض کی نوعیت کسی دوسری مرض میں بدل جاتی ہے۔اگر پھیپھڑوں کا کینسر ہٹریوں میں چلا جائے تو الی صورت میں انتقال مرض کی دواؤں کو بیش نظر رکھنا چاہئے اور ابراٹینم بھی استعال کی جاسکتی ہے کین سب سے مؤثر دوا فاسفورس (Phosporus) ہے اور کینسر ہٹریوں ہی سے شروع ہوا ہو یا ہٹریوں میں نتقل ہوا ہو، دونوں صورتوں میں فاسفورس بہترین دوا ثابت ہوگی۔

پلسٹیلا میں کھانا کھانے کے چند گھنٹے بعد معدے کی تکلیفیں شروع ہوتی ہیں۔ بے چینی، کھٹے ڈکار، ہواسے پیٹ کا بھر جانا وغیرہ وغیرہ نئس وامیکا میں بھوک کی حالت میں تکلیفیں بڑھتی ہیں اور کھانا کھانے کے بعد بچھ عرصہ تو آ رام رہتا ہے مگر تقریباً ایک گھنٹہ کے اندر اندر تکلیف واپس آ جاتی ہے۔

پلسٹیلا کے مریض کا منہ خشک رہتا ہے لیکن اسے پیاس نہیں لگتی۔ صفراوی مادہ بہت کثرت سے بنتا ہے اور ابکائی کے ساتھ منہ میں آ جاتا ہے۔ چکنائی کھانے سے پیٹ میں تناؤ پیدا ہوجاتا ہے۔ سبزی مائل پانی کی طرح بہت پتلے اسہال آتے ہیں اور رات کے وقت زیادہ آتے ہیں۔ قبض کے باوجود فرا جابت پلسٹیلا کا خاصا ہے لیکن کھل کر نہیں ہوتی۔ بار بار جاجت ہونے کے باوجود فرا غت کا احساس نہیں ہوتا۔ نکس وامیکا میں بھی یہی علامت ہے لیکن اس میں اجابت نرم ہونے کی بجائے سخت گھلیوں کی صورت میں ہوتی ہے۔ اس صورت میں ہوتی ہے۔ اس صورت میں اجابت نرم نہیں ہوگی بلکہ سخت اور بڑے جے ہوئے فضلے کی صورت میں۔ پلسٹیلا کی میں اجابت نرم نہیں ہوگی بلکہ سخت اور بڑے جے ہوئے فضلے کی صورت میں۔ پلسٹیلا کی

طرح گریفائٹس بھی چین کے خون کی کمی دور کرنے میں شہرت رکھتی ہے گرگریفائٹس ٹھنڈ سے مزاج کی دوا ہے جبکہ پلسٹیلا گرم مزاج کی قبض جب آخری حد تک بہنے جائے اور پلسٹیلا سے فائدہ نہ ہوتوسلیشیا سے بسااوقات فائدہ ہوجا تا ہے جس کی ناکامی کی صورت میں وریٹرم البم مفید ہوسکتی ہے قبض کے مریض بواسیر کی اشکار بھی ہوجاتے ہیں۔ مسے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ کین اگر سخت چیز پر سیدھا لیٹنے سے بواسیر کی تکلیف کو آرام آئے تو یہ اموینیم کارب کی ہیں۔ لیکن اگر سخت چیز پر سیدھا لیٹنے سے بواسیر کی تکلیف کو آرام آئے تو یہ اموینیم کارب کی خاص علامت ہے۔ اسے پلسٹیلا کی علامت نہیں سمجھنا چاہئے۔ اگر مسول میں بہت زیادہ جان ہو تو پلسٹیلا کی نسبت آرسنگ اور کالی کارب زیادہ مفید ہیں۔ بواسیر کے مسلسل جاری رہنے والے درد میں بیونیا (Paeonia) کو بہت شہرت حاصل ہے لیکن جب مزاجی علامتیں پلسٹیلا کی ملیں تو پلسٹیلا ہی کام کرے گی۔

اگر پیشاب کی حاجت محسوس ہواور مقدار میں تھوڑا آئے۔ معمولی جلن ہواور بے چینی کا حساس نمایاں ہوتو پلسٹیلا مفید ہوسکتی ہے۔ پلسٹیلا میں بعض دفعہ پیشاب کے ساتھ خون بھی آتا ہے۔ اس کی ایک علامت بیہ کہ کروٹ کے بل لیٹنے سے رات بھر پیشاب کی حاجت نہیں ہوتی۔ مریض کمر کے بل لیٹے تو بار بار اٹھنا پڑتا ہے۔ اگر بچوں کو سوتے میں پیشاب کی بیاری ہوتوان کے ازار بند میں کمر کے پیچھے گانٹھ دینے سے ان کا کمر کے بل لیٹنا چونکہ مشکل ہو جاتا ہے اس لئے بعض دفعہ ایس تر کیب سے ان کا بستر بھگونا بند ہوجا تا ہے۔ مگر بیتر کیب زیادہ تر پلسٹیلا کے مریضوں میں کام آتی ہے۔ نیز نیٹر م میوراور کالی فاس 6x میں ملاکر دینا بھی بچوں کی اس بہت مفید ہے۔

اگر کھانسے، چھنکنے اور النسی کے ساتھ پیشاب خطا ہو جائے تو پلسٹیلا اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ بستر میں پیشاب کرنے والوں کا اگر سونے کے جلد بعد پیشا ب خطا ہوتا ہوتو کاسٹیکم 200 یا سپیا 2000 کواولیت دینی چاہئے۔ اگر لمباعرصہ تک بیٹھا رہنے سے پیشاب کی حاجت محسوس نہ ہولیکن کھڑے ہوتے ہی دباؤ رہنے سے بیشا ب خطا ہو جائے تو یہ برائیونیا کی خاص علامت ہے جو کاسٹیکم میں بڑے اور چلنے سے بیشا ب خطا ہو جائے تو یہ برائیونیا کی خاص علامت ہے جو کاسٹیکم میں بھی ملتی ہے۔ اگر بیٹھے بیٹھے حاجت محسوس ہولیکن چلنے سے آرام آ جائے تو یہ رسٹاکس کی

علامت ہے۔ بیسب دوائیں اپنے اپنے دائرہ کارمیں علامتوں کے مطابق کام کرتی ہیں۔

پلسٹیلا کے مریض کو حرکت سے آرام آتا ہے۔ اس لحاظ سے بیرسٹاکس سے جزوی
طور پرمشابہ ہے۔ نمی کے لحاظ سے بھی ان دونوں میں مشابہت ہے۔ نم موسم میں بداختیاطی کی
وجہ سے پیدا ہونے والی نزلاتی تکلیفوں میں پلسٹیلا اور رسٹاکس دونوں کام آتی ہیں۔ بدلتے
ہوئے موسم میں کام آنے والی اور دواؤں کے علاوہ ڈلکا مارا کو بھی شہرت حاصل ہے مگر بیتب
علامتی دوا ہوگی اگر بدلتا ہوا موسم نم بھی ہو۔

پلسٹیلا حمل گرنے کے رجان کوروکنے کے لئے بھی مفید دوا ہے۔ بسااوقات رخم میں جنین کی بجائے کوئی لوھڑ اسابن جاتا ہے جو بے جان ہوتا ہے۔ پلسٹیلا اس لوھڑ ہے کو پکھلا دیت ہے۔ اس میں حیض کے دوران شدید شخی در دہوتا ہے۔ بھی بھی ایسے در دکے دور ہے بڑی تو پلسٹیلا مفید ہے لیکن اگر بیر بھان زیادہ ہوتو نیٹر م میور کواولیت دیں جو پلسٹیلا کی مزمن ہے۔ اگر نو جوان بچوں کو بلوغت کے آغاز میں ہی بیت نکلیف ہوتو کلکیریا فاس بھی بہت کار آمد ہے۔ رخم کے گرنے کے رجحان میں بھی پلسٹیلا مفید ہے۔ اس میں اور بھی بہت سی دوائیں کام آتی ہیں جن میں علامتوں کے لئاظ سے فرق کرنا جائے۔

بعض عورتوں کی چھا تیوں میں حمل اور بچے کی پیدائش کے بغیر بھی دودھ اتر آتا ہے۔ پلسٹیلا اس کیفیت میں بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ مرکیورس اور سائیکٹیمن بھی مفید ہیں۔ ایسی مائیں جن کو دودھ کم آتا ہوان کوعمو ما پلسٹیلا فائدہ دیتی ہے۔ اگر پیدائش کے بعد گندگی وغیرہ پوری طرح خارج نہ ہوتو پلسٹیلا اس کی صفائی میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ رحم کی عام صفائی میں پلسٹیلا بہت مفید ہے کیکن اس کا استعمال پرسوتی بخار سے پہلے پہلے ہوتو کام آتی ہے۔ بخار ہوجائے توسلیشیا یا سلفراوریا ئیروجینم کام دیں گی۔

اگررحم میں بچے کی پوزیش الٹی ہوتو پوزیش درست کرنے میں پلسٹیلا 200 کو بہت شہرت حاصل ہے۔ پیدائش کے وقت اگر در دیں کمزور ہوں تو ان کوطافت دینے کے لئے بھی پلسٹیلا مفید ہے۔ بعض ڈاکٹر روٹین میں نواں مہینہ شروع ہوتے ہی پلسٹیلا شروع کروا دیتے ہیں۔ اس کے اچھے اثرات دیکھے گئے ہیں لیکن در دیں شروع ہونے کروا دیتے ہیں۔ اس کے اچھے اثرات دیکھے گئے ہیں لیکن در دیں شروع ہونے

کے بعد وضع حمل میں سہولت پیدا کرنے کے لئے اس سے بہتر دوامیگنیشیا فاس اور کالی فاس کا مرکب (Combination) ہے۔ دونوں کی کچھٹکیاں پانی میں گھول کر گھونٹ گھونٹ پلائیں تو وضع حمل میں بہت سہولت ہوتی ہے۔

پلسٹیلا ریڑھ کی ہڈی نے مہروں کے ٹیڑھے بن میں ایک بہت کام آنے والی دوا
ہے۔ پدریڑھ کی ہڈی کے عضلات کوطافت دے کرانہیں سیدھا کردیتی ہے اور دونوں طرف سے
تناو کو برابر کردیتی ہے۔ اگر بچوں کی ریڑھ کی ہڈی میں خم پڑ جائے تو قد نہیں بڑھتا اور وہ او نچا
ہونے کی بجائے کبڑے ہونے لگتے ہیں۔ پلسٹیلا ایسے کبڑوں کے لئے مفید ہے۔ پلسٹیلا کے
مریض کے سی عضومیں در دہوتو وہ عضو سکڑنے لگتا ہے اور کمز ور ہوجاتا ہے۔ مثلاً ٹانگ میں دیرتک
دردر ہے تو ٹانگ چھوٹی ہوجاتی ہے۔ در دسے ماؤن ٹانگیں ہوں یاباز و، دونوں سو کھنے لگتے ہیں۔
اگر معدہ کی علامتیں پلسٹیلا کی ہوں اور ملیریا بھی حملے کر دے تو پلسٹیلا مفید
ہے۔ پلسٹیلا کے مریض کو اکثر پیاس نہیں لگتی لیکن ملیریا میں سردی لگنے سے پہلے غیر معمولی طور پر
شخت پیاس لگتی ہے اور بخار چڑھنے کے بعد پیاس ختم ہوجاتی ہے۔ اگر یہ علامت نمایاں ہوتو
پلسٹیلا ضرور دیں۔

پلسٹیلا میں چہرے کے دائیں طرف اعصابی در دہوتا ہے۔ ینچے کا ہونٹ سوج کرموٹا ہوجاتا ہے۔ یہ تکلیف عموماً شام کو بڑھتی ہے۔ شام کواور رات کے وقت خشک کھانسی بھی ہوتو پلسٹیلا ضرور دیں۔

پُلسٹیلا کی تکلیفیں گرمی ہے، چکنائی سے اور کھانا کھانے سے بڑھ جاتی ہیں۔کھلی ہوا میں حرکت کرنے سے اور ٹھنڈی خوراک سے کم ہوتی ہیں۔ ہاتھ جلتے ہوں اور پاؤں ٹھنڈے ہوں پایاؤں جلتے ہوں اور ہاتھ ٹھنڈے ہوں تو پلسٹیلا دوا ہو سکتی ہے۔

> مددگار دوائیں: کالی میور لے لائیکو بوڈیم سلفیورک ایسٹر دافع اثر دوائیں: کافیا کیمومیلائیس وامیکا طافت: 30سے 1000 تک یابعض صورتوں میں CM بھی دی جاسکتی ہے۔

160

پائیروجینم

PYROGENIUM

(سرطے ہوئے گوشت سے تیار کردہ دوا)

جیسا کہ عنوان میں ذکر ہے بیدوا گوشت کی عفونت سے تیار کی جاتی ہے جو انتہائی زہریلا مادہ ہے۔اس کو کھانے والے یا تو تیز بخار کے بعد نیم پاگل سے ہوکر مرجاتے ہیں یا دریہ تک اس کے بداثر ات سے تکلیف اٹھاتے رہتے ہیں۔

اس کا ذکر پہلے اس کٹرت سے مختلف ابواب میں آچکا ہے کھمکن ہے قاری میہ سمجھے کہ بیہ دوا پہلے گزر چکی ہے لیکن بحثیت دوااس کا ایک الگ باب کے تابع پہلے تفصیلی تذکرہ نہیں ہوا۔اس لئے قدرے اختصار سے اس باب کے نیچاب اس کی ضروری علامتیں بیان کی جارہی ہیں۔

اس کے تمام اخراجات میں شدید بد بو پائی جاتی ہے جن کے مہلک اثر سے اکثر تیز بخار چرٹ سے مہلک اثر سے اکثر تیز بخار چرٹ سے معار بچرکی بخار چرٹ سے معار بچرکی ہے۔ یہ بخار بچرکی بیدائش کے بعدرتم میں گندے مادےرہ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسے اگر سلفر کے ساتھ ملا کردیا جائے تو اور بھی بہتر کام کرتی ہے۔ میں نے دونوں کو 200 طاقت میں ملا کردینا بہت مؤثر یا بہت مؤثر یا بہت م

اگر انفلوئنز اکے دوران بے حد کمزوری محسوس ہوا ورمریض بہت بے چین ہوتو آ رسنک کے علاوہ پائیر وہینم بھی مفید ہے۔آ رسنک کو پائیر وہینم سے ملا کر دیا جائے تو اس کمزوری کو دورکر نے میں اور بھی بہتر نتائج دکھاتی ہے۔ یہی نسخہ بد بودار اسہال اور پیمین میں بھی کام آتا ہے۔ نزلاتی بخاروں میں مریض کو بہت سردی گے اور تعفن بھی پایا جائے، بے چینی بھی ہو تو پائیر وہینم کو بیسیلینم اور نیٹرم میور کے ساتھ ملا کر دیئے پایا جائے، بے چینی بھی ہو تو پائیر وہینم کو بیسیلینم اور نیٹرم میور کے ساتھ ملا کر دیئے

سے فائدہ ہوتا ہے۔ پائیروجینم میں فاسفورس کی طرح ٹھنڈاپانی پینے کی شدید نواہش ہوتی ہے لیکن معدہ میں پانی گرم ہوکر نے آ جاتی ہے۔ اگر چہ پائیروجینم کا مریض بہت سخت ٹھنڈا ہوتا ہے اور سردی کا احساس اس کی ہڈیوں تک سرایت کر جاتا ہے لیکن اسے شدید ٹھنڈا پانی پینے کی پیاس لگی رہتی ہے۔ ایسی صورت میں پائیروجینم کوفاسفورس کے ساتھ ملا کر دیا جاسکتا ہے۔ اگر منہ سے بہت سخت بدیو آئے تو پائیروجینم بھی مفید دوا ہو سکتی ہے۔ ایسے مریض اگر بہت سردی محسوس کریں تو پائیروجینم کو ملا کر دینا اکیلا اکیلا دینے سے بہتر ہے۔ ایسے مریض میں ملا کر دینا اکیلا اکیلا دینے سے بہتر ہے۔ میں نو ٹائیفائیڈ کے ہوتتم کے مریضوں کو پائیروجینم اور ٹائیفائیڈ مین میشہ اسے استعال کرتے تھے میں ملا کر دینا ہے حدمفید پایا جاتا ہے۔ میرے والدٹائیفائیڈ میں ہمیشہ اسے استعال کرتے تھے اور غالباً وہی اس مرکب کے موجد ہیں۔ اس کے ساتھ کالی فاس اور فیرم فاس x6 میں ملا کر دن بیٹویشیا 30 ماتھ کی اسی طرح محرار بہت مفید بیائی گئی ہے۔ رات میں سات آٹھ بار دینی چا ہے ۔ لیکن اگر ایسے مریض کو بد بودار اسہال بھی آتے ہوں تو بیٹیشیا 30 ماتھ کی اسی طرح محرار بہت مفید بیائی گئی ہے۔

پائیروجینم ایسے ملیریا میں بھی اثر دکھاتی ہے جوعام دواؤں سے قابونہیں آتا۔ مریض کو بہت سردی گئی ہے، آرسنگ کی طرح بے چینی ہوتی ہے اور اخراجات بہت بد بودار ہوتے ہیں۔
مویشیوں میں بھی اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد آنول رہ جائے اور پرسوتی بخار ہوتو پائیروجینم اورسلفر 200 کانسخانسانوں کی طرح مویشیوں پر بھی برابر اثر انداز ہوتا ہے۔
پائیروجینم مفید ہے۔ اگر مینام ہوجائے کہ سے گردوں کی سوزش (Nephritis) کے لئے بھی مفید ہے۔ اگر مینام ہوجائے کہ سی زمانے میں مریض کو تعفنی بخار ہوا تھا اور اس کے بعد گردے جواب دے گئے تو پائیروجینم بہت مفید ہے۔

پائیروجینم کی ایک علامت ہے کہ تیز بخار میں دل کی دھڑ کن نسبتاً آ ہتہ ہوجاتی ہے۔ اگر <u>دل کی دھڑ کن</u> کا توازن بگڑ جائے تو یہ پائیروجینم کی خاص علامت ہوتی ہے۔ اگر پائیرولینم کی مذکورہ بالا مزاجی علامتیں موجود ہوں تو یہ ہرشم کی جلدی امراض میں کھی کام آسکتی ہیں۔ چونکہ اس کا تعلق زیادہ تر وریدوں کے خون سے ہے اس لئے اس کے مزاج میں سخت قسم کی متعفن بواسیر بھی پائی جاتی ہے۔ یہ ایسی ضدی قے میں بھی مفید ہے جس میں بدبو بہت زیادہ ہو۔ مزاجی علامتیں ہوں تو یہ پھیچر وں کی ہر قسم کی تکلیفوں مثلاً جس میں بدبو بہت زیادہ ہو۔ مزاجی علامتیں ہوں تو یہ پھیچر وں کی ہر قسم کی تکلیفوں مثلاً مفید ہے۔

مددگاردوائیں: برائیونیا،سلفر،آرسنک اورٹائیفائیڈینم وغیرہ جن کاذکر اس باب میں گزر چکا ہے۔ طاقت: CM تا 30

161

ریڈیم برومائیڈ

RADIUM BROMIDE

جن کلینکس (Clinics) میں برقی شعاعوں کے ذریعہ علاج کیا جاتا ہے وہاں اٹھارہ لاکھریڈیائی طاقت کاریڈیم برومائیڈ استعال کر کے اس کمرے کی فضا کے اثر کومحلول میں شامل کرکے یہ ہومیو پیتھک دوا بنائی گئی ہے۔ اگر چہ بظاہریہ نا قابل یقین بات گئی ہے کین میددوا حقیقتاً کام کرتی ہے کیونکہ ہومیو پیتھی کی لطافتیں حدتصور سے بہت آ گے ہیں اور حقیقت میں میہ مادے سے تعلق رکھنے والا ایک غیر مادی طریقہ علاج ہے۔

ریڈیم برومائیڈ کوعام طور پر چہرے کے کیل مہاسے اور پھنسیوں کے لئے استعال کیا جاتا ہے۔اگر رحم میں زندہ جنین کی بجائے ایک بے جان سالوکھڑا بننا شروع ہوجائے تو بعض اطباءاس کو نکا لئے کے لئے بھی اسے مفید بیان کرتے ہیں۔ کینسر کی روک تھام اور علاج میں بھی بید مفید ہے۔وہ پھوڑ ہے پھنسیال جو لمبے موصد تک چلیں اور مزمن شکل اختیار کرجا ئیں ان کے علاج کے دوران ریڈیم برومائیڈ (ریڈیو برومیٹم) کونہ بھولیں۔

ایٹمی تابکاری کے اثر ات سے محفوظ رکھنے کے لئے بھی بیدوا بہت کارگر ثابت ہوئی ہے۔ تابکاری کے اثر سے بچانے کے لئے اسے CM پٹینسی میں کارسینوسین CM کے ساتھ اول بدل کرمندرجہ ذیل طریق میں استعال کیا جانا جا ہئے۔

ایک ہفتہ ریڈیم برو مائیڈ اور دوسر ہے ہفتہ کا رسینوسین CM دیں اور چند ماہ تک جاری رکھیں کیونکہ تابکاری کے اثر ات آ ہستہ آ

کھلی ہوا، مسلسل حرکت، گرم پانی سے نہانے اور لیٹنے سے بیاریوں کی شدت میں کمی آتی ہے۔ دافع اثر دوائیں: ریڈیم برومائیڈ اور کارسینوسین ایک دوسرے کے دافع اثر

کے طور پر بھی استعال کی جاسکتی ہیں۔لیکن ان کے
مہلک اثر ات سے مریض کے اندر جو جوعلامتیں ظاہر
ہوں دراصل ان کا علاج ہونا چاہئے۔سی ایک دافع
اثر دواپر انحصار نہیں کرنا چاہئے۔
طافت: 30سے لے کر CM تک

162 געלוגרו RHUS GLABRA

رس گلابراایک پودے کے پتوں اور تنے کے عرق سے تیار کردہ دوا ہے۔ اس کی سب میں میایاں علامت ہیہے کہ یہ جسم سے خارج ہونے والی ہرقتم کی بد بوکوختم کردیتی ہے حتی کہ اجابت میں پائی جانے والی عام بوبھی اس کے استعال سے مٹ جاتی ہے۔ میں نے کئی لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ بعض نو جوان جوا پنے جسم سے آنے والی بد بوسے خود بھی سخت بیزار سے انہیں رس گلابرا سے نمایاں فائدہ ہوا اور بعض تو مکمل طور پر شفا پاگئے۔ یہ دوا آئتوں کے فعل کی اصلاح کرتی ہے۔ آئتوں میں بیدا ہونے والی سوزش اور زخموں کوختم کرتی ہے۔ آئتوں کی صفائی ہوجاتی ہے اور بد بودار ہوا کا اخراج رک جاتا ہے۔

رس گلابرا کی ایک علامت ناک سے خون کا اخراج ہے۔ کثرت سے پسینہ آتا ہے جس سے بد بو آتی ہے اور کمزوری ہوجاتی ہے۔ مریض خواب میں اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھتا ہے۔ رس گلابرا کومرکری کا اثر زائل کرنے والی دواسمجھا جاتا ہے۔ عموماً اسے مدر تنگیر میں استعال کیا جاتا ہے۔ کموماً سے مائیک میں بہت مفید پایا ہے۔

رساکس 707

707 رس ٹاکسی کوڈینڈ ران (رسٹاکس)

RHUS TOXICODENDRON

(Poison-ivy)

ید دوارسٹاکس کے مختر نام سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ پچھو بوٹی نام کے ایک جنگلی بود کے پتوں سے تیار کی جاتی ہے۔ جس کے زہر سے نہایت خطرناک فتم کی خارش شروع ہوجاتی ہے۔ شدید بخار ہوتا ہے، بھوک ختم ہوجاتی ہے، متلی اور سخت سر درد، غدود رسوج جاتے ہیں اور منہ اور زبان پر زخم بن جاتے ہیں۔ 1798ء میں ایک فرانسیسی ڈاکٹر نے مشاہدہ کیا کہ ایک مریض کی شدید جلدی تکلیف اس زہر کے اثر سے دور ہوگئی۔ اس کے بعداس ڈاکٹر نے اس بوٹی کو بہت سی اور جلدی امراض، فالج اور جوڑوں کے در دمیں استعمال کیا اور اسے بہت مفید پایا۔ ہومیو پیتھی طریقہ علاج میں مرطوب موسم میں اس بوٹی کے تازہ پتوں کو پیش کردوا تیار کی جاتی ہے۔ رسٹاکس ایک ایسی دوا ہے جس کے بغیر ہومیو پیتھک ڈاکٹر وں کا گز ارامشکل ہے۔ یہ رسٹاکس ایک ایسی دوا ہے جس کے بغیر ہومیو پیتھک ڈاکٹر وں کا گز ارامشکل ہے۔ یہ بکثر ت بیار یوں میں استعمال ہوتی ہے۔

رسٹاکس کی سب سے اہم علامت جلن اور سوزش ہے جس کے نتیجہ میں ہڑے

ہڑے چھالے بنتے ہیں ۔جلدی بیاریوں میں سب سے بڑا چھالا رسٹاکس میں پایاجا تا ہے۔
اینا کارڈیم (Anacardium) اور کینتھر س (Cantharis) میں بھی چھالے ہوتے ہیں
لیکن نسبتاً کم ۔ رسٹاکس جل جانے والے مریضوں کو غیر معمولی فائدہ پہنچاتی ہے۔ انہیں
اونچی طاقت میں فوراً رسٹاکس دینا بہت مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رسٹاکس ہرقتم کے

رساکس 708

فالجی انرات میں اعلیٰ در ہے کی دوا ہے۔ جو فالج زیادہ تر دائیں طرف کے اعضاء پرحملہ آور موں انداز اور سلفر باری باری دینے سے بالکل ٹھیک ہوجاتے ہیں۔ اگر زیادہ علامتیں نہ بھی ملتی ہوں پھر بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچادیتی ہیں۔

اگر سخت تھاوٹ یا مسلسل بڑھتے ہوئے اعصابی دباؤکی وجہ سے ایک آئکھ کی نظر احلے نکھ کی نظر احلے نکھ کی نظر احلے نکھ کی نظر احلے نکھ کی نظر اور کی ہواور دل پر بھی کمزوری کا اثر ہوتو رسٹائس کی ایک دوخوراکیس فوراً فائدہ پہنچاتی ہیں۔ ایسی صورت میں عموماً دائیں آئکھ کے سامنے سائے سے تھرکتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں یا دائیں طرف کی آ دھی نظر ختم ہوجاتی ہے۔

اعصابی دردول میں جن میں آرام کرنے سے تکایف بڑھے اور حرکت سے آرام آئے، یہ بہت مفید ہے۔ چونکہ جلن کا احساس بہت ہوتا ہے اس لئے آرام نہیں کیا جاتا اور اضطرابی کیفیت طاری رہتی ہے اور کسی کروٹ بھی چین نہیں آتا۔ حرکت سے شروع میں تکلیف اضطرابی کیفیت طاری رہتی ہے اور کسی کروٹ بھی چین نہیں آتا۔ حرکت سے شروع میں تکلیف بڑھتی ہے لیکن رفتہ رفتہ آرام آنا شروع ہوجاتا ہے مگر پچھ عرصہ بعد دردیں واپس آجاتی ہیں۔ نرم حرکت جو آہتہ آہتہ کی جائے ،جسم کی دردوں میں کمی کا موجب بنتی ہے۔ سخت ورزش اس کا علاج نہیں بلکہ خطرناک ہے۔ ہلکی ورزش اور ہلکی حرکت مفید ہے۔

اگر علامتیں ملتی ہوں تورسٹاکس سر در داور دوسری جسمانی در دول کے لئے بھی بہت اچھی دوا ہے۔ رسٹاکس جب بھی بالمثل دوا ہوگی اس کے کھاتے ہی ضرور گہری نیند آجائے گی اور گھبرا ہٹ اور بے چینی کانام ونشان باقی نہیں رہے گا۔ میرے تجربہ میں بار ہااس کا بیاثر دیکھنے میں آیا ہے۔ بعض مریضوں نے توشکایت کی کہرات کا پیتے ہی نہیں چلا اور سورج چڑھنے کے بعد آئکھ کھی حالا نکہ قبل ازیں ان کی رات کروٹیں بدلتے گزرا کرتی تھی۔

رسٹاکس میں ایک اور علامت یہ بھی ہے کہ مثانے یا گردے میں ہلکی سوزش مزمن صورت اختیار کرلے تو مریض رات کو بار بار بیشاب کے لئے اٹھتا ہے۔اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے اور وہ بے چین رہتا ہے، ضروری نہیں کہ ایسے مریض کو ذیا بیطس ہو۔ فاسفورس میں بھی بیمامت ملتی ہے۔ بے وجہ آ نکھ کلتی ہے۔ بظاہر اچھا بھلا ہونے کے باوجود نیند کا احساس مٹ جاتا ہے۔ بیشاب کی کثرت کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ بعض دفعہ سوتے میں بھی بیشاب نکل جاتا ہے۔ بغیر ذیا بیطس کے رات کو آرام کے وقت بیشاب کی حاجت بہت زیادہ ہواور کوئی دوسری معین وجہ معلوم نہ ہوتو جسمانی بے چینی کی صورت میں غالبًا رسٹاکس مؤثر ثابت ہوگی۔

اگر جلدی بیاریاں تیز دواؤں سے دبا دی جائیں تو بالعموم جھلیوں پر انتڑیوں پر یا غدودوں برحمله آور ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ نہایت سنگین صورت اختیار کر لیتی ہیں۔اگر لبلبہ (Pancreas) یران کاحملہ ہوتوا یسے مریض کو سخت قسم کی ذیا بیطس ہوجاتی ہے۔اونچی طاقت میں رساکس کی ایک ہی خوراک اندرونی تکلیفوں کوفوراً رفع کرتی ہے مگراس صورت میں برانے ایکزیما کوجلد برضروراحیال دیتی ہے۔ میں نے ذیا بیطس کے ایک مریض کو بعض علامات کی مشابہت کی وجه سے اونچی طاقت میں رسٹاکس دی۔اجا نک اس کا ساراجسم ایگزیما سے بھر گیالیکن ذیا بیطس ہے کمل شفا ہوگئی تحقیق سے پتہ چلا کہ سی زمانہ میں اسے سخت ایگزیما ہواتھا جسے مختلف دواؤں سے دبا دیا گیا تھا۔اس کے بعد ذیا بیطس ہوگئی۔ پس رسٹاکس دینے سے ذیا بیطس تو ٹھیک ہوگئ مگر ا یکزیمالوٹ آیا۔بعض مریض ذیا بیطس ٹھیک ہونے سے اتنامطمئن نہیں ہوتے جتناا یکزیماد مکھ کر گھبرا جاتے ہیں۔حالانکہا گروہ صبر سے کام لیں توبسااوقات رسٹاکس ہی سے اس جلدی بیاری کاعلاج بھی ہوجا تا ہے جوخوداس نے باہر نکال دی ہواور وہی اس کامکمل صفایا بھی کر دیتی ہے۔ گرشروع میں ایگزیماایک دفعہ ضرور بھڑ کتا ہے اور پھر آ ہستہ آ ہستہ کم ہونے لگتا ہے۔ رسٹاکس کے ایکزیما میں یانی بہت بہتا ہے۔ اسے رونے والا (Weeping) ا گنزیما کہتے ہیں۔میرے پاس ایک دفعہ ایک بہت غریب مریضہ آئی جس کے ہاتھوں پر بہنے والاسخت تکلیف دہ ایگزیما تھا۔وہ روزمرہ کا کھانا یکانے سے بھی معذورتھی۔خاونداور بیجے بھی اس وجہ سے سخت تکلیف میں مبتلا تھا۔ میں نے اسے ایک ہزار میں رسٹاکس دی تو حالت مزید بگڑ گئی لیکن چند دنوں میں یانی خشک ہونے لگا۔ اگلے ہفتہ دوبارہ رسٹانس دینے

رساکس 710

سے روعمل ہوالیکن پہلے سے کم، تین چار ہفتوں میں اس کے ہاتھ بالکل صاف ہو گئے اور ایگزیما کا نام ونشان بھی باقی نہر ہا۔ پس جب بیدوا کام کرتی ہے تو جیرت انگیز اثر دکھاتی ہے۔ میرے علم کے مطابق اس کا کوئی اور متباول نہیں ہے۔ جہاں رسٹائس کی خاص علامتیں نمایاں ہوں وہاں رسٹائس ہی دینی پڑے گی۔ رسٹائس کا مرطوب موسم سے گہراتعلق ہے۔ برسات میں جبکہ گرمی بھی ہواس کی تکالیف بہت بڑھ جاتی ہیں۔

ملیریا بخارے لئے بھی رسٹائس بہت اچھی دواہے۔اگر علامتوں کے آغاز میں اسے برائیونیا کے ساتھ ادل بدل کر دیا جائے تو بہت مفید نسخہ بن جاتا ہے۔لیکن اگر پہلے آرنیکا اونچی طاقت میں حفظ ما تقدم کے طور پر دے دی جائے تو ملیریا کے خلاف جسم میں دفاع پیدا ہوجائے گا۔اس سلسلہ میں آرنیکا، آرسنک اور نیٹرم میور کا بھی مطالعہ کریں۔

رسٹائس ملیریا کے علاوہ بعض دوسر سے بخاروں میں بھی مفید ہے بینی وہ بخار جو بھی کم اور بھی نہیں اور بھی کم اور بھی نہا کے علاوہ بعض جاری رہتے ہیں، ان میں بھی اچھااثر دکھاتی ہے۔ ایسا بخار مریض کو نڈھال کر دیتا ہے۔ بے چینی، کیکیا ہٹ اور زبان پرخشکی رہتی ہے اور مریض سردی محسوس کرتا ہے گریہ مرکزی علامت ضرور موجود ہوگی کہ اسے کسی کروٹ چین نہیں آتا اور اس کا ساراجسم دکھتا ہے۔

رسٹاکس خلیوں کی سوزش (Cellulitis) میں بہت مفید ہے۔ بیسوزش غدودوں اور جلد کی بیرونی سطح اور اندرونی جھلیوں سے تعلق رکھتی ہے۔ در داور اینٹھن اس کی علامت ہیں۔ رحم کی اندرونی جھلیوں کی سوزش (Endometritis) میں بھی رسٹاکس دینی چھلیوں کی سوزش (Endometritis) میں بھی رسٹاکس دینی چھلیوں جائے ہیں مگن ہے کہ بیاری کوٹھیک کرے اور جلد پر نکال دے۔ سلفراور پائیروجینم ملاکر 200 طاقت میں دیں تو یہ بیاری کافی حد تک قابو میں آجائے گی۔ اگر ان دواؤں کو رسٹاکس کے ساتھ ادل بدل کر دیں تو خدا کے فضل سے بعض مریضوں کو مکمل شفا ہو جاتی ہے۔ وہ تمام جلدی امراض جن میں جلد پر پانی کے چھالوں کے علاوہ خون یا پیپ کے بڑے بڑے دیا جھالے ہوں ان میں بھی رسٹاکس مفید ہے بشرطیکہ جلن بہت نمایاں ہو۔

بچوں کے فائح (Infantile Paralysis) میں رسٹاکس بہت اچھا اثر دکھاتی ہے۔ بیچے کو بخار ہوتا ہے اوراس کے بعد آ ہستہ آ ہستہ فالجی اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔اگر کسی کو بہت بچین میں فالح ہو چکا ہویا ٹائگ کا کوئی حصہ کمزور ہونے گئے تو فوری طور بررسٹاکس شروع کروانی چاہئے ۔اسے سلفر سے ادل بدل کر دیں تو بہتراثر ہوتا ہے۔سلفراز خود بھی فالجی امراض میں بہت مفید ہے اس لئے دونوں مل کر بہت مفید ثابت ہوتی ہیں۔ پولیو کے بعض بہت یرانے مریض اس نسخہ سے خدا کے فضل سے بالکل شفایا ب ہو گئے ۔ وقتی طور پرجسم کا کوئی حصہ سو جائے تو وہ اور بات ہے، کچھ عرصہ کے بعد بیہ کیفیت خود ہی جاتی رہتی ہے۔ لیکن اگر فالجی کمزوری محسوس ہوتو پھررسٹاکس فوراً دینی جاہئے جواکثر کام کرتی ہے۔ رفتہ رفتہ بڑھنے والے فالج جو زیادہ لمباعرصہ تک رہنے والے اور گہرے ہوتے ہیں ان میں کاسٹیکم بھی ایک اہم دواہے۔ كاسٹيكم كوصرف فورى طورير ظاہر ہونے والے فالج كى دوانہيں سمجھنا جاہئے۔ كاسٹيكم كا فالج کچھدن پہلے سردی لگنے کے نتیجہ میں اندر ہی اندر شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن جب ظاہر ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے اچانک ہوا ہے۔ جزوی فالج میں جس کا تعلق محض چند عضلات سے ہو کاسٹیکم لا جواب دواہے،خصوصاً چہرے کے دائیں طرف کے فالج میں تواس کا کوئی بدل نہیں۔ سالہاسال کے بعد بھی اگر شروع کروائی جائے تو چند مہینے کے استعال کے بعدا گروہ پرانا فالج مکمل طوریر دورنہ بھی ہوتو اس میں بہت حد تک نرمی پیدا ہوجاتی ہے۔اسے عرف عام میں لقوہ کہا حاتا ہےاور کاسٹیکم کوزیا دہ تر لقوہ ہی کی دواسمجھا جاتا ہے۔

رسٹائس کا فالج عموماً دائیں طرف ہوتا ہے لیکن یہ محض دائیں طرف کی تکلیفوں کی دوا نہیں طرف کی تکلیفوں کی دوا نہیں ہے۔ بائیں طرف بھی کام آتی ہے مگر بائیں طرف کی اس سے زیادہ مؤثر دوائیں لیکیسس اور لیڈم ہیں جو آرنیکا کے ساتھ مل کرخوب کام دکھاتی ہیں۔ اگر ان کے ساتھ کیڈمیم سلف (Cadmium Sulph) میں روزانہ تین باردی جائے تو اور بھی مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ اگراس نسخہ سے کوئی فائدہ نہ ہوتو اسے جھوڑ کرسلفرا وررسٹائس ادل بدل کردے کردیکھیں۔

رسٹائس کے سردرد کی کئی علامات بخار میں ہونے والے سردرد سے مشابہ ہوتی ہیں۔ اگر کسی دورد سے مشابہ ہوتی ہیں۔ اگر کسی دورا کی علامتیں واضح ہوں تو وہی دوا دینی چاہئے۔ اگر کسی دوا کی علامتیں واضح نہ ہوں تو بسااوقات رسٹائس مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ عموماً علامات میں سر بوجھل ہوتا ہے اور در پیشانی سے شروع ہوکر سر کے بچھلی جانب گدی میں جاتا ہے۔

رسٹاکس میں چہرے اور سرکی طرف خون کا دوران ہوتا ہے۔ جلدد گھتی ہے اور سرخ اور متورم ہوجاتی ہے۔ شدید کھجلی ہوتی ہے۔ ایکزیما کے چھالوں پر کھرنڈ بن جاتے ہیں۔
بچوں کے ایکزیما میں خصوصاً سرکا ایکزیمارسٹاکس کے زیراثر آتا ہے لیکن بعض اوقات اس کار دِمل بہت شخت ہوتا ہے۔ اگر وہ چنددن کے اندراندرٹھیک ہوجائے تو پھر دوبارہ رسٹاکس دی جاتی ہہت مشکل ہے۔ جلد کی رسٹاکس دی جاتی ہے۔ اگر ایکزیماٹھیک نہ ہوتو پھر دوسری دواڈھونڈ نی بہت مشکل ہے۔ جلد کی الیمی امراض میں جب بیصورت پیدا ہو وہاں یا در کھنا چاہئے کہ وہ جلد کا کینسر بھی ہوسکتا ہے اور اس صورت میں کارسینوسن (Carsinocin) اور ریڈیم ہر ومینے تک دے کر دیکھنا چاہئے۔ اسی طرح کو ہزار طاقت میں ہفتہ ہفتہ کے وقفہ سے ایک دو مہینے تک دے کر دیکھنا چاہئے۔ اسی طرح گریفائٹس اور سورائینم کو بھی اول بدل کر دیا جائے تو بعض شخت ضدی ایکزیموں میں بھی بیمفید گابت ہوا ہے۔

رسٹاکس آنکھوں کی افکیشن میں بھی بہت مفید ہے جبکہ آنکھیں سرخ ہوجا ئیں اور پیپ پڑجائے۔خاص طور پراگر مرطوب موسم میں آنکھوں کی تکلیفیں زیادہ ہوں تو یہ بہت کارآ مد ہے۔ آنکھ کی حرکت یا آنکھ پر دباؤ پڑنے سے تکلیف بڑھتی ہے اور بہت گرم پانی نکلتا ہے۔
منہ میں زخم اور چھالے بن جائیں اور سرخ رنگ کی کچی کچی سطح نظر آئے اور رسٹاکس بالمثل دوا ہوتو اس میں بھی اچھا کام کرے گی۔منہ کی تکلیفوں میں اس کی خاص بہتان یہ ہے کہ منہ میں دھات کا سامزہ آئے گتا ہے جیسے بیٹری کے سیل کو زبان لگائی جائے تو عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ زبان سرخ اور زخمی سی ہو جاتی ہے۔ منہ اور جائے تو عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ زبان سرخ اور زخمی سی ہو جاتی ہے۔ منہ اور

رساکس 713

تھوڑی کے اردگرد آبلے بن جاتے ہیں۔ حلق کے غدود سوج جاتے ہیں اور گلے میں سوزش ہوتی ہے۔ چھالے پڑ جاتے ہیں۔ خوراک نگنی بہت مشکل ہوتی ہے۔ رسٹانس خوراک کی نالی کی اس قتم کی افکیشن (Oesphagus) میں بہت مفید ہے۔

ٹائیفائیڈ میں بھی رسٹائس کارآ مدہے۔اس میں بخارسرکو چڑھتا ہے، ہواسے پیٹ میں گڑ گڑ اہٹ پیدا ہوتی ہے اور بہت تناؤ ہوجاتا ہے۔ ڈ کار نہ باہر آتا ہے۔ ہوا کے اخراج کے دونوں راستے تنگ ہوکرسکڑ جاتے ہیں۔ یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے۔رسٹائس اس کے لئے اچھی دواہے۔اس کے علاوہ کولچیکم بھی مفید ہے۔

اگر ضرورت سے زیادہ بوجھا تھانے کی وجہ سے رحم میں نیچے گرنے کا رجحان

پیدا ہوتو رسٹا کس بہترین دوا ہے۔لیکن اس کااثر صرف رخم تک محدو ذہیں، ہرعضلہ جسے زیادہ بوجھ اٹھانے سے نقصان پہنچا ہواس میں رسٹا کس اور ملی فولیم کوفر اموش نہیں کرنا چاہئے۔

رسٹائس کی ایک اور علامت یہ ہے کہ مریض کے گلے کی خرابی کی وجہ ہے آواز بیٹھی ہوئی گئی ہے۔ جب وہ بولنا شروع کرے تو ٹھیک ہوجاتی ہے اور جتنا بولے آواز صاف ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگرایسے مریض کئی گئی گھنٹے بھی لگا تاریکچردیں تو آوازٹھیک رہے گی لیکن بعد میں اس کار دِمِمْ فاہر ہوگا۔

رسٹائس کی کھانسی بہت نکایف دہ ہوتی ہے۔ <u>نرخرے میں ہمہوفت خارش ہوتی</u> رہتی ہے۔رسٹائس سے جلد فرق پڑتا ہے۔

دل کے عضلات ڈھیلے پڑجائیں، دل پھیل کر بڑا ہوجائے اوراپنے فعل میں کمزور ہونے گئے تو رسٹاکس اس تکلیف میں بہت مؤثر ہے۔ اگر کھلاڑیوں کا ول پھیل جائے تو ان کے لئے رسٹاکس ہی بہترین دواہے۔ دل کی کمزوری یا بیاری کی وجہ سے بائیں بازومیں سن ہونے کا احساس اور بڑھتی ہوئی فالجی کیفیت پیدا ہوتو اس میں بھی رسٹاکس چوٹی کی دوا ہے۔ کچھ دن لیکیسس اور آرنیکا فروع کردیں۔ دوبارہ کیکیسس اور آرنیکا شروع کردیں۔

رساکس 714

کمرکی تکلیفوں کے لئے رسٹائس بہت مفید ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے اردگرد کے عضلات میں اکثر خرابیاں پیدا ہوجاتی ہیں، ان میں رسٹائس اچھا کام کرتی ہے۔ اگر ٹخنول میں موج آ جائے اور اس مرض کی دیگر متعلق دوائیں پورا کام نہ کریں تو رسٹائس شفا کے عمل کو مکمل کرسکتی ہے۔

عورتوں کی ٹانگوں کی بے چینی خصوصاً سوتے میں ٹانگوں کو ہلاتے رہنا بعض دفعہ دب ہوئے ایگزیما یا خارش کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔اگر ایسا ہوتو رسٹاکس دینے کی صورت میں ٹانگوں کوآرام آئے گاتو جلد پر مرض ظاہر ہوجائے گا۔

چھیا کی (Urticaria) مختلف بخاروں سے تعلق رکھتی ہے۔ ملیریا میں رسٹاکس کے مریضوں میں اکثر چھیا کی نکلنے کار جحان ہوتا ہے۔

شنگل یعنی ہر پیز (Herpes) میں بھی رسٹائس اچھی دواہے۔ایک ہر پیز تو جنسی بے راہروی کا نتیجہ ہوتی ہے، دوسری قسم وہ ہے جس میں اعصاب متاثر ہوتے ہیں۔اس قسم کی ہر پیز میں رسٹائس بھی دوا ہوسکتی ہے بشرطیکہ ماؤف جگہ سے بہت گرم یانی بہہر ہاہو۔

مددگاردوائیں: برائیونیا کلکیر یا فلور فائٹولاکا دافع انر دوائیں: اینا کارڈیم کروٹن گراونڈیلیا میزبریم گریفائٹس طاقت: 30سے 200اور بہت اونچی طاقت

164 ر يومس كرسپيس

RUMEX CRISPUS

(Yellow Dock)

ریوکس کرسیس کھانسی کے لئے بہت اچھی دوا ہے خصوصاً وہ کھانسی جو گلے میں خارش اور سرسراہٹ کی وجہ سے بیدا ہوتی ہے۔ ناک، گلا، سانس کی نالی اور چھاتی بلغمی مواد سے بھر جاتی ہے۔ یہ پنی یا گاڑھی دونوں صورتوں میں خارج ہوتی ہے۔ ریوکس کے بارے میں عموماً بیتا تر ہے کہ اس میں ہمیشہ بلغمی کھانسی ہوتی ہے جس کے مزمن ہوجانے کا امکان ہوتا ہے لیکن اس کے بالکل برعکس ریوکس میں خشک کھانسی بھی پائی جاتی ہے۔ اس لئے صرف بلغمی علامتوں پر ہی نظر نہیں رکھنی چا ہئے بلکہ خشک، تنگ کرنے والی کھانسی جو مستقل شکل اختیار کرلے وہ بھی ریوکس میں تخت قسم کی خطامتوں پر ہی نظر نہیں رکھنی چا ہے۔ بلکہ خشک، تنگ کرنے والی کھانسی جو مستقل شکل اختیار کرلے دیکس میں تخت قسم کی خطامتوں پائی جاتی ہے۔ یہ کھانسی کے دائر ہکان میں بھی آتی ہے۔ سانس کی نالی اور حلق میں سرسراہ ہے ہوتی ہے جو کھانسی پیدا کرتی ہے۔ ریوکس کی کھانسی کے ساتھ سینے کی درمیانی ہڈی میں درد ہوتا ہے۔ لیٹنے کے چند منٹ بعد شدید کھانسی کا دورہ اٹھتا ہے۔ بعض دفعہ آواز بالکل بند میں درد ہوتا ہے۔ لیٹنے کے چند منٹ بعد شدید کھانسی کا دورہ اٹھتا ہے۔ بعض دفعہ آواز بالکل بند

بعض اوقات سوزش یا انفیکشن بڑھ کر بلغم پیدا کرنے کا موجب بن جاتی ہے۔ ایسا مریض بلغمی مزاج کہلا تا ہے لیکن بعض لوگوں کے جسم بلغم پیدا کرنے کے خلاف ردعمل دکھاتے ہیں۔ دکھاتے ہیں۔ یونانی طب میں مریضوں کی پہچان کے لئے مختلف مزاج بیان کئے گئے ہیں۔ مثلاً صفراوی مزاج ، بلغمی مزاج ، دموی مزاج اور سوداوی مزاج۔ ریومکس اگر بلغمی مزاج والے مریض کی دوا ہوتو بہت زیادہ بلغم سبنے گی لیکن اگر مریض کا کوئی اور مزاج ہواور

اس میں ریوکس کی علامتیں پائی جائیں تو وہاں بیعلامت ظاہر نہیں ہوگی۔اس طریق پر دواؤں کی نشان وہی ہوسکتی ہے۔ انہیں کلاسیکل طب کے حوالے سے سمجھنا چاہئے ورنہ بعض تضادات دکھائی دیں گے۔

ریوکس معدہ کی تکلیفول میں بھی مفید ہے۔ معدہ میں بہت ہوا بنتی ہے اور گڑ گڑ اہٹ کی آ واز آتی ہے۔ عموماً نزلے کے بعد شدید دست شروع ہوجاتے ہیں ریوکس میں دست بغیر درد کے اور مقدار میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جو پانی کی طرح پتلے اور سیا ہی مائل ہوتے ہیں جو مریض کوضی صبح بستر سے اچا تک اٹھنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کھانے کے بعد معدے میں بوجھ محسوس ہوتا ہے جو حلق تک جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد چھاتی کے بائیں طرف در دہوتا ہے ، مریض گوشت نہیں کھا سکتا۔ پیٹ میں در دہوتا ہے جو حرکت سے یا بولنے سے بڑھ جاتا ہے۔ ریوکس کی ایک علامت یہ ہے کہ مریض کی زبان کناروں سے چھالی جاتی ہے اور زبان ریوکس کی ایک علامت یہ ہے کہ مریض کی زبان کناروں سے چھالی جاتی ہے اور زبان برزر درنگ کی تہہ جم جاتی ہے۔

جسم کے مختلف حصوں میں خارش بھی ہوتی ہے خصوصاً ٹانگوں میں چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا لگنے سے اور کپڑے بدلتے ہوئے خارش بڑھ جاتی ہے۔
در یوکس کا مریض بے حدست ہوتا ہے اور بہت کمزوری محسوس کرتا ہے۔ مزاج میں عمومی کمزوری کے ساتھ پڑ چڑا بن پیدا ہوجا تا ہے۔ سوچنے سجھنے کی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے۔ سرمیں لمکا لمکا در در ہتا ہے۔ در دبیثانی اور سرکی دائیں جانب ہوتا ہے۔ چھینکیں آنے سے در دمیں اضافہ رہتا ہے۔ نیزاس کا مریض ٹھنڈی ہواسے تخت زود حس ہوتا ہے۔ جوائے جھونکے سے کھانسی کا دورہ شروع ہوجا تا ہے۔ وہ عموماً اپنا سرمنہ ڈھانپ کر سوتا ہے۔ مریض کو بہت چھینکیں آتی ہیں جن کے ساتھ ناک بہتا ہے۔ شام کو اور رات کو تکلیف میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ دریوکس میں کھانسی عموماً گیارہ بج شروع ہوجاتی ہے خواہ مریض جاگ رہا ہویا سویا ہوا ہو۔ دریوکس کی ایک علامت سے بھی گیارہ بج شروع ہوجاتی ہے۔ گلے میں سخت بلغم کے جم جانے کی وجہ سے بولنا مشکل ہوجا تا ہے۔ کہ آواز بیٹھ جاتی ہے۔ گلے میں سخت بلغم کے جم جانے کی وجہ سے بولنا مشکل ہوجا تا ہے۔

ریوکس میں گلے میں کوئی گولہ سا پھنسا ہونے کا احساس ہوتا ہے جو نگلنے سے یا کھنکارنے سے کم نہیں ہوتا۔

ریوکس میں وجع المفاصل کی علامت بھی پائی جاتی ہے۔اس کی امتیازی علامت یہ ہے کہ جوڑوں کی تکلیف سردی سے بڑھ جاتی ہے۔ ہرفتم کی سردی جوڑوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پر کلکیریا فاس کی بھی خاص علامت ہے۔

ر یوکس کی تکلیفیں حرکت سے بڑھ جاتی ہیں۔ یہ علامت برائیونیا سے ملتی ہے لیکن برائیونیا میں مریض سرد ہواسے ایباز ودحس نہیں ہوتا جیساریوکس سے ہوتا ہے۔

طاقت: 30

رونا 719

165

روٹا گرویلنس

RUTA GRAVEOLENS

(Rue-Bitterwort)

روٹا ایک ایسی بوٹی سے تیار کی جانے والی دوا ہے جس کا انگریزی نام

Rue-Bitterwort ہے۔ یہ بوٹی بہت ہی روایتی دواؤں میں استعال ہوتی رہی ہے۔اس

یروٹی کو بھی مختلف قتم کے زہروں کا اثر زائل کرنے کے لئے استعال کیا جاتا رہا ہے۔اس

بوٹی کو جڑوں سمیت پیس کرعرق نکالا جاتا ہے اور اس سے ہومیو پیتھی دوا بنائی جاتی ہے جوروٹا

کے نام سے مشہور ہے۔

روٹا کا شاران دواؤں میں ہوتا ہے جوآ رنیکا کی طرح چوٹوں میں استعال ہوتی ہیں۔

روٹا خاص طور پر ہٹری کی چوٹ میں مفید ہے۔ اگر کسی عضو پر ضرورت سے زائد ہو جھ پڑے اور

وزنی چیز کواٹھانے یا تھینچنے کے بدا ٹرات باتی رہ جائیں اور کھیاؤ پیدا ہوتو رسٹا کس اور ملی فولیم

مرح روٹا بھی مفید ہے۔ اس لحاظ سے روٹا کی رسٹا کس سے بہت مشابہت ہے۔ سردی اور نمی کی طرح روٹا بھی مفید ہے۔ اس لحاظ سے روٹا کی رسٹا کس سے بہت مشابہت ہے۔ سردی اور نمی کی طرح روٹا بھی مفید ہے۔ اس لحاظ ت سے بڑھ کر ہو جھاٹھانے کی وجہ سے دل کی تکلیف ہوجائے تو شروع ہی میں روٹا کوا کیونا کئے کے ساتھ ملا کردیئے سے بیغیر معمولی اثر دکھاتی ہے۔

ہوجائے تو شروع ہی میں روٹا کوا کیونا کئے کے ساتھ ملا کردیئے سے بیغیر معمولی اثر دکھاتی ہے۔

بساوقات آ کھ کا باریک کام کرنے والوں کی بصارت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ نظر دھندلا جاتی بساوقات آ کھوں میں تھاوٹ کا حساس ہوتا ہے خصوصاً بائیں آ نکھ میں کمزوری اور دباؤ کے علاوہ درد بھی ہوتا ہے۔ نظر تھر تھرانے گئی ہے۔ اس تکلیف کے از الے میں روٹا بہت فائدہ مند ثابت ہوسکتی ہے۔

بسااوقات شدیدمخت اور ورزش کے نتیجہ میں کھلاڑیوں کے دل پھیل جاتے ہیں۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ <mark>دل بھیلنے</mark> کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن ہومیو پیتھی ادویہ سے دل کے پھیلاؤ کو کنٹرول کیا جاسکتا ہےان کے استعال سے آ ہستہ آ ہستہ اعصاب میں جان پڑ کر کچک پیدا ہو جاتی ہے اور وہ خود بخو داپنی اصل حالت کی طرف واپس لوٹنے لگتے ہیں۔اس پہلو سے روٹا بھی رسٹاکس کی ہم پلہ دواہے۔

اعصابی ریشے زخمی ہوجا ئیں تو عام اعصابی طاقت کی دوائیں کامنہیں کرتیں۔ آر زیکا بھی اثر نہیں کرتی لیکن روٹا اور رسٹا کس جیرت انگیز اثر دکھاتی ہیں۔اگر اپریشن کے دوران سرجن کی بداحتیاطی سے جاقو ہڈی کی سطح کو زخمی کر دے تو روٹا اس زخم کو تیزی سے مندل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔نشر کے لگائے ہوئے زخموں میں جہاں اعصابی ریشے زخمی ہو جائیں ہائی پیر کیم (Hypericum) بھی بہت مفید ہے۔ کسی مڈی پر ضرب آ جائے یا فریلچر ہو جائے تو روٹا دینے سے شفا کی رفتار بہت تیز ہوجاتی ہے۔روٹا مڈی اوراس کے اردگر د کے اعصاب کوتقویت دیتی ہے۔روٹا کے ساتھ کلکیریا فاس اور سمفائیٹم (Symphytum) کوملالیا جائے تو بہت مفیدنسخہ بنتا ہے۔کلکیریا فاس ہڈی کے اندرونی مادے کے لئے اور سمفائیٹم اور روٹا اعصابی رگ دریشہ کوطافت دینے کے لئے مفید ہیں۔اگر چوٹ تازہ ہوتو آرنیکا 30 بھی ملالینی جا ہئے۔ روٹاعموماً پرخون مریضوں کی دواہے۔اس میں خون بہنے کار جحان پایا جاتا ہے۔ مختلف بخارول، اعصابی در دوں اور معدے کی کمزوری میں مفید ہے۔ روٹا کا مریض بہت حساس ہوتا ہے۔جلد غصہ میں آ جاتا ہے۔ چلنے سے کمزوری محسوس کرتا ہے۔ ٹانگیں بوجھ برداشت نہیں کر . سکتیں۔اعضاء میں تھکن اور در دخصوصاً کمراور پیٹیر میں در دروٹا کی نمایاں علامات ہیں۔ جیت لیٹنے سے درد کی شدت میں کمی آتی ہے۔ آرام سے عموماً تکلیف بڑھتی ہے اور حرکت سے کم ہو جاتی ہے۔روٹا میں کا نوں کی بچھلی ہڈی میں درد کا احساس اور کا نول میں بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ چبرے کی ہڈی میں درد،مسوڑ ھے بھی دکھتے ہیں اور آسانی سے خون نکل آتا ہے۔ آ دھی رات کو کھانسی اٹھتی ہے۔ سینے میں تنگی اور بوجھ کا احساس ہوتا ہے اور حنجر ہے میں در دہوتا ہے

<u> ٹخنول کی موچ کے علاج میں روٹا کا ذکر دوسرے ابواب میں بھی گزر چکا ہے۔اس</u>

روڻا 721

تکلیف کے ازالے میں اسے بہت شہرت حاصل ہے۔ پاؤں کی ہڈیوں میں درد جس کی وجہ سے قدم زمین پررکھنا دشوار ہواور یوں محسوں ہوجیسے زخم بن گئے ہوں۔ نیز کلائی میں موج آنے اور انگلیوں کے تھجاؤ کو دورکرنے کے لئے بھی روٹا مفید ہے۔

> مددگاردوا: کلکیریاکارب دافع اثر دوا: کیمفر طافت: 30سے 200 تک

166

سباو بلا

SABADILLA

(Cevadilla Seed)

سباڈ یلا مسلسل چھینکول کےعلاج میں بہت مشہور ہے۔اس میں نزلہ نہ بھی ہو پھر بھی بکثر ہے چینکیں آتی ہیں۔بعض مریضوں کو گھاس سے الرجی ہوتی ہے اور چینکوں کے سخت دورے شروع ہوجاتے ہیں۔ جب دورہ ختم ہو جائے تو عموماً ناک سے یانی نہیں بہتا۔ گویا یہ چینکیں نزلہ کی وجہ سے نہیں بلکہ نتھنوں کے اندرسرسراہٹ کی وجہ سے آتی ہیں۔بعض ڈاکٹر ساڈ یلا کو بہت چھوٹی طاقت میں تجویز کرتے ہیں لیکن میں نے اسے 30 طاقت میں زیادہ مفید پایا ہے۔ سباڈ یلا کا مریض بہت سردی محسوس کرتا ہے۔معمولی سی سردی میں بھی کانینے لگتا ہے اور ہر مُصندی چیز سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ سباڈیلا میں بہت ہی علامتیں کیکیے سس سے ملتی ہیں۔ تکلیف کی ہائیں سے دائیں طرف حرکت اور مریض کا بہت تھنڈا ہونا ان دونوں کی مشتر کہ علامتیں ہیں لیکیسس خود بھی چھینکوں کی الرجی میں جسے Hay Fever کہتے ہیں، چوٹی کی دواہے۔اگر بدالرجی موسم بہار میں ہوتو کیکیسس کواولین حیثیت دینی چاہئے۔سباڈیلا بھی دراصل موسم بہارہی کی دواہے جب پھول کھل رہے ہوں۔ پھولوں کی خوشبو سے بعض لوگوں کو بہت حجینکیں آتی ہیں۔ایسی فوری نکلیفوں میں سباڈیلا احیما کام کرتی ہے کین اگرخزاں کے موسم میں الرجی ہواور بہت چھینکیں آئیں تو ایکیم سییا (Allium Cepa) بہتر ہے۔سباڈیلا کی مزمن دوالیکیسس ہےاورایلیم سیبا کی مزمن دوا ایلیو مینا ہے۔ یہ ہات یا در کھیں کہ جب بیاری کا فوری حملہ ہوتو عموماً اس دوا سے علاج کیا جاتا ہے جوفوری اثر والی دوا ہو۔ جب بیاری میں افاقہ ہو جائے تو پھرمستقل اثر والا دیریا علاج ہونا جا ہے۔

جب سباؤیلا کی علامتیں ہوں تو سباؤیلا ہی دیں۔ جب مریض ٹھیک ہو جائے تو اس بات کا انتظار نہ کریں کہ بیاری مریض پر دوبارہ جملہ آ ورہو۔ بیاری کے مستقل علاج کے لئے 1000 طاقت میں پندرہ دن کے وقفہ سے کیسسس دیں تو مکمل شفا ہوسکتی ہے۔ لیکن اگر سباؤیلا اور دیگر وقتی دوائیں فائدہ نہ دیں تو پھر بھی فوری ضرورت کے لئے کیسسس استعال کی جاسکتی ہے۔ بعض مریضوں میں بیفوری اثر بھی دکھاتی ہے۔ اس لئے اسے مزمن دوا کے طور پر بی نہیں ،حاد دوا کے طور پر بھی استعال کروایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایک خوراک دینے سے ہی چھینکیں بند ہو جاتی ہیں۔ چھینکوں کی بیاریاں مختلف شکلوں میں ڈھلتی رہتی ہیں۔ اس لئے ان کا علاج بہت توجہ جاتی ہونا چا ہے۔ نہ کورہ بالاسب دوائیں عموماً مفید ثابت ہوتی ہیں اور ما یوس نہیں کرتیں۔ خود سباؤیلا میں بھی بعض مزمن بیاریوں کو دور کرنے کی صلاحیت ملتی ہے۔ اگر نزلہ پرانا ہوجائے اور ناک کی نالیوں میں بیٹھ رہتو ایسے نزلہ کے علاج کے لئے بعض دفعہ سباؤیلا دینی پڑے آ

سباڈیلاکی ایک عجیب علامت ہے ہے کہ اس کے بعض مریضوں کو ہے وہم ہونے لگتا ہے کہ ان کا کوئی عضو دوسرے اعضاء سے بڑا ہوگیا ہے۔ کئی دفعہ میرے پاس ایسے مریض آئے بیں جو کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ ایک طرف سے سوج کر بڑا ہوگیا ہے لین دیکھنے میں ایسانہیں لگتا۔ ہیسباڈیلا کی خاص علامت ہے۔ اس علامت کی وجہ سے سباڈیلا دیں تو دوسری تکلیفیں بھی ساتھ ہی دور ہوجاتی ہیں۔ ایک عورت کا کیس مجھے یا دہے جسے ہپتال والوں نے لاعلاج قرار دے دیا تھا اور اس کی بیعلامت سب سے نمایاں تھی کہ وہ ہتی تھی کہ میری ایک گال سوجی ہوئی ہے۔ اس کو سباڈیلا دی گئی تو اللہ کے فضل سے سب علامتیں ٹھیک ہوگئیں۔ اگر دماغ میں کوئی غیر معمولی خیال بیٹھ جائے تو اس سے دوا تلاش کرنے میں بہت مددماتی ہے۔ سباڈیلا کا مریض اس وہم میں وریہ میں میں بہت مددماتی ہے۔ سباڈیلا کا مریض اس وہم میں اور بہ میں ماتا بختہ ہوجا تا ہے کہ اس کی پسلیاں یا ٹائیس ٹیڑھی ہوگئی ہیں یا بعض اعضاء سو کھ رہے ہیں اور بہ وہم اتنا بختہ ہوجا تا ہے کہ اس کی دماغ سے دکھا ہی نہیں۔

توہمات کی مدد سے دواؤں کی پہچان آسان ہوجاتی ہے اور بعض پیچیدہ بیاریوں کی شاخت میں مدد ملتی ہے۔ بعض مریضوں کو بیب وہم ہوتے ہیں۔ مثلاً تھوجا کے مریض کو بیہ وہم ہوتا ہے کہ میں شیشے کا بنا ہوا ہوں اور جھنجھنا کرٹوٹ جاؤں گا۔ ایک مریض بہت مختاط ہوکر چلتا تھا کہ کہیں ٹھوکر خدلگ جائے اور ٹوٹ نہ جاؤں۔ اسے ایک ماہر نفسیات کے پاس کے جایا گیا۔ اس نے سوچا کہ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ میں اسے زور سے تھیٹر ماروں ، جب ٹوٹے گا نہیں تو خود بخو د ٹھیک ہوجائے گا۔ اس نے اچا تک زور سے تھیٹر مارا تو وہ مریض چھن کروہیں گرکر مرگیا۔ بظاہر تو بیہ قصہ لگتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ بیج کہ نہیں مگر بعض معتبر لوگوں نے بیان کیا ہے۔ اگر بیج ہے تو یہ تھوجا کا مثالی مریض ہے۔

ہوسکتی ہے۔اگر پیٹے میں کیڑے ہوں تو ناک کے اندر تھجای ہوتی ہے جو پیٹے کے کیڑوں کی وجہ سے بھی ہوسکتی ہے۔اگر پیٹے میں کیڑے ہوں تو ناک کے اوپر یا اندر تھجای ہونا ایک طبعی امر ہے جس کی وجہ سے چھینکوں کا عارضہ لگ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سباڈ یلا پیٹ کے کیڑوں کا بھی بہت اچھا علاج ہے۔اگر چہ بورک (Dr. Boericke) نے سباڈ یلا باب میں تو اس کا ذکر نہیں کیا گرر پپرٹری میں سباڈ یلا کو کیڑوں کی اہم دوا ظاہر کیا ہے۔سباڈ یلا کی تھجلی عموماً تالو میں ہوتی ہے۔ایک اور دوا By کو کیڑوں کی اجم دوا ظاہر کیا ہے۔سباڈ یلا کی تھجلی عموماً تالو میں ہوتی ہدلے لیکن تالو پر بظاہر ٹھیک ہوجائے لیکن گلے کے پچھلے حصہ پر شدید تملہ کر سے اور اس کی وجہ بدلے نے تالو پر بظاہر ٹھیک ہوجائے لیکن گلے کے پچھلے حصہ پر شدید تملہ کر سے اور اس کی وجہ سے درد کے علاوہ بار بار کھانس اٹھے اور بے چینی ہوتو تکس وامیکا مفید ہے۔سباڈ یلا نزلاتی کیفیت میں آرسنگ سے مشابہ ہے لیکن آرسنگ میں جلن زیادہ ہوتی ہے۔

بعض ایسی دوائیں ہیں جن میں بیاری کے دوران بہت بھوک گئی ہے۔سباڈیلا میں بھی چھینکوں کے حملے کے دوران بھوک بہت بڑھ جاتی ہے۔

یہ دوا پبیٹ کے کیڑوں کی رشمن ہے۔اگر ناک کے باہر یا ہونٹوں کےاردگر داور تالومیں مستقل تھجلی کی علامتیں یائی جائیں توایسے مریض کے پیٹ میں عموماً کیڑے ہوتے ہیں۔ انترا یوں کے عوارض کا جسم کے بیرونی حصوں کی طرف منتقل ہونا ایک طبعی امر ہے۔
معدے کی سوزش ہوتو منہ میں بھی سوزش ہوتی ہے اور بعض دفعہ چھالے سے بن جاتے ہیں۔
اگر پیٹ میں کیڑے ہوں اور ساتھ ہی دوسری نزلاتی علامتیں بھی ہوں تو یہ ایک ہی دوا دونوں کو
تھیک کرسکتی ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کے لئے ایک دوا ٹینم بھی ہے۔ اس کے اثر سے یوں لگتا ہے
جیسے کیڑے بیصل گئے ہوں۔

سباڈیلا میں خشک کھانسی کے ساتھ بیٹ میں درد بھی ہوتا ہے اور سانس لینے میں دفت محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت بیاس بالکل نہیں ہوتی اور بیٹ میں خالی بن کا احساس ہوتا ہے۔ میٹھی چیزیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ مریض گرم چیز کھانے سے بہتر محسوس کرتا ہے۔ ٹھنڈ اور شھی چیزیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ مریض گرم چیز کھانے سے بہتر محسوس کرتا ہے۔ ٹھنڈ سے مشروبات سے تکلیف میں اضا فد ہوجا تا ہے۔ سردی سے ہاتھ پاؤں ٹھنڈ سے ہوجاتے ہیں جبکہ ہراور چہرہ گرم رہتے ہیں۔ گرمی، جلن اور جسم میں بچھر ینگنے کا احساس پایا جاتا ہے۔ جلد ہیں دراڑیں پڑنے کا احساس پایا جاتا ہے۔ جلد بالکل خشک ہوجاتی ہے اور خشکی کی وجہ سے جلد میں دراڑیں پڑنے لگتی ہیں۔ خصوصاً پاؤں کی انگیوں کے نیچ جلد بھٹے کا رجمان ملتا ہے۔ پاؤں کے ناخنوں میں مزمن سوزش بھی سباڈیلا کی ایک علامت ہے۔

گلے میں کچھ چیننے کا حساس ہوتا ہے جس کی وجہ سے مریض ہروفت نگلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ گلے کی بیۃ نکلیف مزمن ہو جاتی ہے جوسر دہوا سے بڑھ جاتی ہے۔ زبان پرجلن کا احساس ہوتا ہے۔

بچوں میں اسہال کا رجمان بھی ماتا ہے۔ بیٹ میں کاٹنے والے درد محسوس ہوتے ہیں جیسے کوئی چھری سے کاٹ رہا ہو۔ عورتوں کو چین کا خون دیر سے جاری ہوتا ہے اور بیضة الرحم (Ovary) میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے چاقو چل رہے ہوں۔ اعضاء کے نیچ گرنے کا حساس دوسری اور بہت ہی دواؤں کی طرح سباڈ یلا میں بھی پایا جاتا ہے۔

سيبا	مددگاردوا: دافع اثر دوائیں: طافت:
ىلىشتىلا -لائكوپودىم-كونىم كىلىپىس	دافع انژ دوا نین:
30	طاقت:

سبائنا 727

167

سباتنا

SABINA

(Savine)

سبا نناعورتوں کی بیار یوں میں بکثرت استعال ہونے والی دوا ہے اور حیض کے سوااس کی تضویر عموماً پلسٹیلا سے ملتی ہے۔ گرمی سے اس کی تکلیفیں بڑھتی ہیں۔ پلسٹیلا میں حیض کا خون بہت کم اور رک رک کر آتا ہے جبکہ سبا ننا میں اس کے برعکس بہت زیادہ خون بہتا ہے۔ خون بہنے کار جحان صرف رحم تک ہی محدو زہیں رہتا بلکہ دوسر مقامات مثلاً ناک یا گردوں سے بھی خون بہنے گا ہے۔ اگر حیض کا خون بہت زیادہ ہواور عمومی رنگ میں بھی خون بہنے کا رجحان ہوتو سبا ننا بہت مؤثر ثابت ہوگی۔ سبا ننا میں عموماً تیسر سے ماہ میں حمل ضائع ہونے کا بہت احتمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات عورتوں کے بیضتہ الرحم میں جھوٹی جھوٹی گی تھیں سی بن جاتی ہوں کی خاص علامت ہے۔ اس صورت میں اللہ جاتی ہیں بن کے ضل سے سبا ننا ہے ممل شفا ہو جاتی ہے اور حمل بھی گھر ہو جاتا ہے۔

بواسیر کے وہ مسے جن سے بہت زیادہ خون بہتا ہو، ان میں بھی مفید ہے۔ اگر گردول میں سوزش کی وجہ سے بہت درداور بے چینی ہواور پیشاب میں خون آئے تو سبا ننا اچھی دوا ہے۔ اس لحاظ سے یہ پریرا بریوا (Pareira Brava) سے مشابہت رکھتی ہے۔ سبا ننا میں گردوں کے چاروں طرف گھہری ہوئی سوزش ہی رہتی ہے۔ دردیں لہردار نہیں ہوتیں۔ پریرا میں دردیں نیچے کی طرف اترتی ہیں اور پھریاں بھی پائی جاتی ہیں جومثانے میں پھنس جاتی ہیں۔ سبا ننا میں مریض ہروقت پیشاب کی حاجت محسوس کرتا ہے۔ فارغ ہوتے ہی دوبارہ حاجت محسوس ہوتی ہے حالانکہ پیشاب مقدار میں زیادہ

نہیں ہوتا۔صرف بے چینی ہوتی ہے۔ یہ علامت کینتھرس میں بھی پائی جاتی ہے۔

مردوں اورعورتوں دونوں کے اخراجات <u>سوزا کی بیماریوں</u> (Gonorrhoeal) کی طرز کے ہوں تو سبائنا کی ضرورت محسوں ہوگی۔سوزاک کی با قاعدہ تکلیف نہ بھی ہواور مریض بظاہر بالکل ٹھیک ٹھاک ہولیکن اگر اخراجات سوزاک کی علامات رکھتے ہوں تو ان میں سبائنا بہت مؤثر دواہے۔

سبائنا کی ایک علامت یہ ہے کہ مل نہ بھی ہوتو رحم میں در دِزہ کی طرح دردا ٹھتے ہیں جو بچے کی بیدائش کے وقت سے تعلق رکھتے ہیں۔ رحم میں حرکت اور نیچے کی طرف دباؤ ہوتا ہے۔ اگر واقعی حمل ہوتو بھرایسے در دِحمل ضائع ہونے کا موجب بن جاتے ہیں۔ سبائنا کی ایک خاص علامت حیض کے ایام کا لمباہونا اور بہت زیادہ خون بہنا ہے۔ بعض دفعہ یہ دورا تنالمباہوجا تا ہے کہ ایک حیض دوسر سے حض لگتا ہے۔ درمیانی وقفہ بہت کم رہ جاتا ہے۔ سرخ جمکدار خون بہتا ہے جس کی وجہ سے مریض عوماً خون کی کی کا شکار ہوجاتی ہے اوراس کے خون کی رنگت بھی گلا بی ہوجاتی ہے۔ وراس کے خون کی رنگت بھی گلا بی ہوجاتی ہے۔

رحم میں شدید درد کی اہریں اٹھتی ہیں۔ان دردوں کا جنسی اعضاء کی خارش ہے بھی تعلق ہوتا ہے۔اگرجنسی اعضاء میں خارش ہواور دردرحم کی طرف منتقل ہوتو سبا بنااس کا علاج ہے۔ یہ دردایک مقام پڑہیں ٹھہرتے،ان کی حرکت نیچے یا اوپر کی طرف مسلسل جاری رہتی ہے۔ اکثر تجربہ کار ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ سبائنا استفاط کے رجحان کورو کئے کے لئے حفظ مانقدم کے طور پر بہت اہم کر دارا داکرتی ہے۔میرے نزدیک کولوفائیلم (Caulophyllum) بھی بہت مؤثر ہے۔(دیکھئے باب کولوفائیلم)

حیض کے طویل ایا م، رحم کی اندرونی تکالیف اور رسولیوں کے رجمان کوختم کرنے کے ساتھ کلکیر یا کارب اور میوریکس ملا کر دی جائیں تو یہ نسخ بھی بہت مؤثر ہے۔ یہ اسقاط کے رجمان کو بھی ختم کرتا ہے۔ اگر حمل کے دوران رحم کی بیرونی جھلی بھٹ جائے اور جنین کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتو بعض دفعہ فوری طور پر سبائنا دینے سے یہ خطرہ ٹل جاتا ہے۔

اگر حیض کے بعد لیکوریا بہت بڑھ جائے جو حصینے والا اور سخت بد بودار ہو نیز جنسی خواہشات بہت بڑھ جائے ہو حصینے والا اور سخت بد بودار ہو نیز جنسی خواہشات بہت بڑھ جائیں تو سبائنا سنعال کرنی چاہئے۔ سبائنا میں مسول کی علامت بھی پائی جاتی ہے جن میں خون بہنے کار جحان ہوتا ہے۔ یہ مسے کافی خطرنا ک بھی ہو سکتے ہیں اور ان کازیادہ تعلق رانوں اور پیڑے کے درمیان والے حصہ سے ہوتا ہے۔

سبائنا میں خون بہنے کا رجحان تو بہت ہے مگر ایک دم بہت شدت اور جوش سے نہیں ابلتا ۔ ملی فولیم میں جہاں خون بہے،اچا تک بہت زور سے نکلنے لگتا ہے جیسے مشک کا منہ کھول دیا گیا ہو۔ بیخاص فرق یا در کھنا چاہئے۔

سبائنا گنتھیا میں بھی مفید دوا ہے اور اس میں ایک دلچیپ بات یہ ہے کہ سبائنا کے خون بہنے کار جمان صرف گنتھیا کی موجود گی میں رک جاتا ہے۔ اگر گنتھیا ٹھیک ہوجائے توخون بہنے گلے گا اور اگرخون بہنار کے تو گنتھیا کی تکلیف ہوجائے گی۔ گاؤٹ لیعنی گنتھیا کی تکلیف گرم کمرے میں زیادہ ہوجاتی ہے۔ جوڑ سوزش سے سرخ اور چمکدار ہوجاتے ہیں۔ سینے میں جلن ہوتی ہے اور منہ کا مزہ کڑوا ہوجاتا ہے۔ پیٹ میں در دہوتا ہے۔ سرمیں اچا نک در دشروع ہوجاتا ہے۔ چرہ اور سر پرخون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ چباتے ہوئے دانتوں میں در دہوتا ہے۔ ہر وقت پیٹ جرے ہونے کا احساس رہتا ہے۔ سبائنا میں صرف قبض بھی یائی جاتی ہے۔

تھوجا پلسٹيل	مددگاردوا: دافع اثر دوا:
30	طاقت:

168 سينگونيريا

SANGUINARIA

(Blood Root)

سینگونیریا (Sanguinaria) انگریزی لفظ Sanguine سے ماخوذ ہے جس کے معنی''خون کے رنگ کا''اور''خون آشام'' کے ہیں۔ بینام ہی اس دوا کے بھر پورمزاج کوظاہر کرتا ہے۔اس کے مریض کے منہ پرسرخی اور تمتماہ شیائی جاتی ہے۔جلن اور سرخی اس دوا کا خاصہ ہے۔

سردردگدی سے شروع ہوتا ہے اور عام طور پردائیں کنیٹی یادائیں آئھ میں آکر کھر جاتا ہے۔ اگر درد بائیں آئھ میں اپنا مقام بنالے تو وہ سپائی جیلیا (Spigelia) کی علامت ہے۔ سینگونیریا کی بیاری خون کی خرابیوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جبکہ سپائی جیلیا کی تکلیفیں اعصاب کی زود حسی کے نتیجہ میں بیدا ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے مزاح میں بھی فرق ہے۔ سینگونیریا میں درد کے ساتھ دھڑکن پائی جاتی ہے۔ جبکہ سپائی جیلیا میں بجلی کے کوندوں کی طرح لیکتے درد کی اہریں پائی جاتی ہیں۔ سینگونیریا میں نیند مرض کو بڑھا دیتی ہے۔ بیعلامت لکیسس سے مشابہ ہے۔

سینگونیر یا میں سردرد کے ساتھ شدید متلی بھی ہوتی ہے اور تکلیف میں بہت اضافہ ہو جا تا ہے۔ الٹیاں آنے کے بعد آرام آتا ہے۔ مریض کی ہھیایاں اور پاؤں جلتے ہیں اور وہ پاؤں بستر سے باہر رکھتا ہے۔ پلسٹیلا میں یہ علامتیں صرف عورتوں کے لئے مخصوص ہیں لیکن سینگونیر یا میں مردعورتیں سب برابر ہیں۔ یہ بہت لمجا اثر والی دوانہیں ہے صرف وقتی فائدہ پہنچاتی ہے اور مزمن بیاریوں میں کام نہیں آتی سوائے چھاتی کی مزمن بیاریوں کے جیسے شید وقی ۔ ان میں یہ گہرے دیریا اثر رکھنے والی دوا ثابت ہوتی ہے۔

سینگو نیریا میں سانس کی نالی اورنرخرے میں کھانسی کے ساتھ درد بہت نمایاں ہوتا ہے۔ بات کرتے ہی دردشروع ہوجاتا ہے۔کھانسی کے ساتھ ہوا کا گولا ساگلے میں پھنس جاتا ہے۔ اسے نکالنے سے پچھسکون ملتاہے۔

سینگونیریا تپ دق اور چھاتی کی بہت گہری بیاریوں میں کام آتی ہے مگر بیصرف مریض کو پرسکون کرتی ہے، ممل شفانہیں دیتی۔ تپ دق میں سلفر، سلیشیا اور گریفائٹس گومکمل شفا بخشنے کی صلاحت رکھتے ہیں مگرتپ دق کاعلاج عموماً نسبتاً نرم دواؤں سے کرنا چاہئے جن میں سینگونیریا بھی ہے۔ اکثر تمیں طاقت میں استعال ہوتی ہے اور زیادہ اونچی طاقت میں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔

اگریسی کو گلاب کے پھول کی خوشبو سے الرجی ہوتو سینگونیریا اس کا تریاق ثابت ہوتی ہے۔

سینگونیریامیں بعض دفعہ سات سات دن کے سر در د کا دورہ پڑتا ہے۔

اگرسینگونیریا میں دوسری علامتیں ملتی ہوں توبائیں طرف کے درد میں بھی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر کندھے کا جوڑ جم جائے اور گردن کا دایاں حصہ اور کمر کا پچھلا حصہ بھی متاثر ہواور سب عضلات اکڑ جائیں تو سینگونیریا بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ سینگونیریا بیرونی صدمہ کی وجہ سے پہنچنے والی چوٹ کے لئے مفیز نہیں بلکہ بیاندرونی تکلیفوں کی دواہے۔

سینگونیریا کے مریض کے چہرے پرمستقل سرخی آ جاتی ہے۔ کھانے پینے میں بداختیاطی اور مرغن غذاؤں سے سردرد ہونے لگتا ہے۔ معدے میں جلن ہوتی ہے۔ سب اخراجات میں تیزابیت یائی جاتی ہے۔ ابکا ئیاں بھی آتی ہیں۔ قے میں اتن تیزابیت ہوتی ہے کہ گلا چھل جاتا ہے۔ اگر معدے میں حدسے بڑھے ہوئے تیزانی مادے موجود ہوں تو سینگونیریا بھی، بشرطیکہ دیگر علامتیں پائی جائیں بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ مرض بڑھنے کے ساتھ بھوک بھی بڑھتی ہے مگر کھی انے کودل بالکل نہیں جا ہتا۔

معدے میں تیز ابیت زیادہ ہونے کی وجہ سے دمہ ہوجائے تو کس وامیکا کے علاوہ سینگو نیر یا بھی مفید دوا ہے۔معدے میں ہوا بہت بنتی ہے۔اسہال اچا نک شروع ہوجاتے ہیں جن میں بہت تیزی یائی جاتی ہے۔کروٹن، ایلو اور پوڈوفائیلم میں بھی بیعلامت ہے۔اگر بزلہ اچا نک ختم ہوجائے اور اسہال شروع ہوجا کیں توسینگو نیریا دوا ہوسکتی ہے۔

سینگونیریامیں حیض کاخون اور لیکوریا نہایت بدبودار ہوتے ہیں۔ حیض سے پہلے متلی اور پیٹ میں دردجو رانوں تک پھیلتا ہے۔ عورتوں کے سن پاس کی تکالیف میں سینگونیریا استعمال کی جاتی ہے۔

حلق میں سرسراہٹ کے ساتھ کھانسی اٹھتی ہے جو مریض کو نیند سے جگا دیتی ہے جسے اٹھ کر بیٹھنے سے آ رام آتا ہے۔اس کھانسی کا تعلق عموماً معدہ سے ہوتا ہے۔سونے، آ رام کرنے اور پھل کھانے سے تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔حرکت سے اور بستر میں اٹھ کر بیٹھنے سے تکلیفیں کم ہوجاتی ہیں۔

مددگاردوا: اینٹی مونیم ٹارٹ طاقت: 30 اوراس سے زیادہ استعال کی جاسکتی ہے۔ سليل 735

169

سيكيل كورنيثم

SECALE CORNUTUM

(ارگٹ)

سیکیل یعنی ارگٹ ایک ایساز ہرہے جسے زمانہ قدیم سے ہی وضع حمل میں سہولت پیدا کرنے والا خیال کیا جاتا ہے حالا نکہ اس کا ذرا بھی زیادہ استعال سخت خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے عورتوں کی عمومی صحت کو بہت نقصان پہنچتا ہے اور وہ ساری عمر کے لئے ایسی اندرونی پہاریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں جن کا کوئی معروف علاج نہیں۔

ہی آ رام آتا ہے۔ سیکیل کے مریض کو گرمی کی بجائے ٹھنڈ سے فائدہ پہنچتا ہے۔ موسم میں سخت ٹھنڈا بھی ہوتو گرمی محسوس کرتا ہے۔ آ رسنک سے سیکیل کا مقابلہ ہے اور بعض دفعہ ان دونوں میں امتیاز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آبس میں بعض مشابہتوں کی وجہ سے بیا یک دوسرے کے اثر کوزائل بھی کر دیتی ہیں۔ اگرایک دواکی علامتیں موجود ہوں لیکن فائدہ نہ ہوتو دوسری دینی جائے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بعد کام آتی ہیں۔

سیکیل کے زخموں میں ناسور بننے کا رجھان ہوتا ہے۔ زخم رفتہ رفتہ خراب ہو کر گئیگرین میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اگر انگلی کٹ جائے تو زخم ٹھیک ہونے کی بجائے آ ہستہ آ ہستہ اوپر کی طرف بڑھنے گتا ہے جس سے سخت بد بو آتی ہے اور جس عضو پر ہواس کے سارے بقیہ جھے کو گلا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے جوڑ سے کا ٹنا پڑتا ہے ور نہ بیاری جوڑ پار کر جاتی ہے اور بقیہ عضو بھی گینگرین کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہومیو بیتھی میں خدا کے فضل سے گینگرین کا علاج موجود ہے۔ بار ہا ایسے مریضوں کا میں نے خود کا میاب

سليل 737

علاج کیا ہے اور اللہ تعالی کے ضل سے کوئی عضو کاٹنا نہیں پڑا۔ جبکہ ڈاکٹروں نے قطعی طور پر اسے گینگرین قرار دے دیا تھا اور سرجری پر مصر تھے۔ جب ایسا مریض صحت یاب ہونے لگتا ہے تو سب سے پہلے زخم کی رنگت بدلتی ہے اور سیاہی کی بجائے اس پر سرخی آنے لگتی ہے۔ گینگرین میں سیکیل اور آرسنک دونوں بہت مفید دوائیں ہیں۔ اگر آرنیکا بھی ساتھ ملاکر دی جائے تواثر میں اضافہ ہوجا تا ہے۔

سیکیل میں ہرجگہ جلن کا احساس بہت نمایاں ہوتا ہے۔ نزلہ، گلے کی خرابی اور سانس کی تکلیف میں بھی جلن یائی جاتی ہے۔

سیکیل میں ہر سیلان خون میں خواہ وہ رخم سے جاری ہویا ناک سے یا کسی اور زخم سے ،سیاہی بہت نمایاں ہوتی ہے۔سیکیل کے دائر ہ میں آنے والی ہر بیاری کا دریدوں کے خون کے گندا ہونے سے تعلق ہے۔ایسے مریض جوموت کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہوں اگران کا سارانظام خون گندہ اور سیاہ ہوچکا ہوتو سیکیل کواس حوالے سے یا در کھنا چاہئے۔

سیکیل عورتوں کے اندرونی امراض میں بھی بہت مفید ہے۔ رحم میں زخم بن جاتے ہیں اور مسلسل خون جاری رہتا ہے جوسیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ مہینہ میں چنددن کے لئے خون رکے توسیاہی مائل گندے پانی کا اخراج ہوتا ہے جس میں نا قابل برداشت بوہوتی ہے۔ سیاہ بد بودار خون کے لوھڑ نے نکتے ہیں جن میں تعفن پایا جاتا ہے۔ سیکیل ان عوارض میں کام آنے والی ایک خون کے لوھڑ سے نکلتے ہیں جن میں گینگرین بنے کا خطرہ ہو۔ سیکیل کی علامتوں والی عورتوں میں بہت اہم دوا ہے خصوصاً اگر رحم میں گینگرین بنے کا خطرہ ہو۔ سیکیل کی علامتوں والی عورتوں میں اگر حمل ضائع ہونے کا بھی رجحان ہوتو سیکیل اس رجحان کا قلع قمع کرنے کے لئے کا فی ہے۔ اگر حمل ضائع ہونے کا بھی رجحان ہوتو سیکیل اس رجحان کا قلع قمع کرنے کے لئے کا فی ہے۔ ایک دوہ ماہ کے استعال سے رحم کی کا یا بیٹ جاتی ہے اور وہ مضبوط اور تو انا ہوکر بیچ کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل ہوجا تا ہے۔

اگروضع حمل کے وقت رخم بچے کو ہا ہر دھکیلنے کی کوشش کرے مگر فم رحم میں سخت این طفن کی وجہ سے بچہ بیدا نہ ہو سکے تو ایسی مریضہ کاسکیل سے فوری علاج کرنا انتہائی ضروری ہے ورندا گر سرجن مہیا ہوتو فوری اپریشن کرنا پڑے گایا پھروہ مریضہ مخت اذیت

سيليل 738

سے رڑپ رڑپ کر جان دے دے گی۔ وضع حمل کے بعد در داور تکایف جاری رہے، نفاس کے خون میں زیادتی کی وجہ سے رخم میں در دہواور خون سیابی مائل گندے رنگ کا ہوتو سیکیل باعث شفا بن جاتی ہے۔ حمل کے دوران چھا تیاں سکڑ جائیں اور دودھ نہ بنے اور ماں بچے کو دودھ نہ بنے سے افاقہ ہوتا ہے۔

سیکیل کی ایک علامت ہے ہے کہ اس کے پیشاب میں بھی سیاہ رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ یہ سیابی خاص طور پر پائی ہوتا ہے۔ یہ سیابی خاص طور پر پائی جاتی ہے۔ یہ سیابی خاص طور پر پائی جاتی ہے اور اس سیابی کی وجہ عموماً یہ ہوتی ہے کہ پیشاب میں پروٹین آنے گئی ہے۔ گردوں کی جھلیوں پر اثر ہوتا ہے۔ اس کے لئے Terebinthina بہت مؤثر دوا بھی جاتی ہے۔ سیکیل کے مریض میں پیشاب کا سیابی مائل ہونا البیومن کی وجہ سے نہیں بلکہ گندے خون کے ذرات شامل ہونے کے باعث ہوتا ہے۔

سیکیل کے مریض کے نمونیہ میں بھی چیپھڑوں میں گنگرین بننے کار جمان پیدا ہو
جاتا ہے۔اس لئے ایسے نمونیہ کا علاج سیکیل سے ہی ہونا چاہئے ۔سیکیل وقت پر دی جائے تو

بہت طاقتور دوا ثابت ہوتی ہے اور فوری اثر دکھاتی ہے۔ ہر جگہ جہاں زخموں میں سوزش ہو، گلنے
سرٹ نے اور گینگرین بننے کار جمان پایا جائے خواہ یہ علامتیں معدہ میں ظاہر ہوں یا پھیپھڑوں میں یا
پھراندرونی جھلیول میں سیکیل ان سب عوارض میں ایک لازمی دوا ثابت ہوتی ہے۔
سیکیل میں شنج اور اپنٹھن بھی یائے جاتے ہیں۔خصوصاً کسی ایک عضو میں مثلاً
تلووں، پنڈ ایوں یابازوؤں کے سی حصہ میں شنج شروع ہوجاتا ہے۔اگر سیکیل کی دوسری علامتیں
مجمی ملتی ہوں تو پھر یہ فوری فائدہ دیتی ہے۔اعصابی دردوں میں بھی بہت مفید دوا ہے۔ یہ درد
اعصاب کے ریشوں کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہیں جیسے بحلی کوندگئی ہواور بہت تکلیف دہ ہوتے
ہیں۔سیکیل کے اعصابی دردوں کو گیڑ ااوڑ ھنے سے آرام ملتا ہے۔
ہیں۔سیکیل میں یاگل بین کی علامت بھی ملتی ہے۔مریض بذیان بکتا ہے، مقتد دہوتا ہے۔

سليل 739

کمزوری کے باوجود پاگل بن کے جوش میں مارنے کے لئے دوڑتا ہے۔ ایسی حالت میں اسے سنجالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔

سیکیل میں اسہال سیاہی ماکل اور متعفن ہوتے ہیں۔ مریض کوا کثر پیۃ ہی نہیں چاتا اور بلاارادہ ہی اسہال جاری ہو جاتے ہیں۔ مریض کا جسم سخت ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور بے حد کمزوری محسوں ہوتی ہے مگر پھر بھی اسے گرمی گئی ہے اوروہ کپڑااوڑ ھنالپند نہیں کرتا۔

ایشیائی ہیضہ (Asiatic Cholera) میں بھی سیکیل مفید ہے۔اس میں کیمفر کی طرح جسم بالکل ٹھنڈ اہو جاتا ہے کیکن اندرونی طور پر مریض کوگرمی کا احساس نہیں ہوتا۔

سكيل ميں ٹانگوں اور بعض مقامی حصوں پاکسی ایک طرف کا فالج بھی پایا جاتا

ہے لیکن اس کی کوئی معین سمت نہیں ہے۔ دائیں طرف بھی ہوسکتا ہے اور بائیں طرف بھی۔ گر اس فالج کی تشخیص پر وفت ضائع کرنے کی بجائے سیکیل کی مزاجی علامات پر ہی انحصار کرنا چاہئے۔ سیکیل میں اس بات کوضر وریا در کھیں کہ جہاں بھی مرض نمودار ہوگا وہاں سن ہونے اور جلن کا احساس ضرور پایا جائے گا اور رات کے وفت تشنج اور اینٹھن میں ہمیشہ اضافہ ہوگا۔ اس کا مریض کھلی ہوا میں آ رام محسوس کرتا ہے، گرمی، ٹکور اور چیض کے ایام سے قبل تکلیفیس بڑھ جاتی میں بہت ہوگا۔ س

کیمفر اوراو پیم سے سکیل کااثر زائل ہوجا تا ہے یعنی پیدونوں دوائیں سکیل کا تریاق

ہیں۔ ہیں۔

مددگاردوائیں: چائنا، آرسنک، ایکونائٹ، بیلا ڈونا، پلسٹیلا دافع اثر دوائیں: کیمفر، اوپیم طاقت: 30 سىنىشو 741

170 سينيثواورس

SENECIO AUREUS

(Golden Ragwort)

سینی و عام طور پر نو جوان بچوں کی اندرونی تکلیفوں کے لئے مفید ہے۔ اگر بلوغت کے آغاز میں سردی لگ جانے کی وجہ سے حیض کے ایام میں بے قاعد گی ہوجائے تو جب تک صحیح دواسے علاج نہ کیا جائے ساری عمر بہ تکلیف رہتی ہے۔ اس تکلیف میں کلکیر یا فاس کے علاوہ سینیشو کو بھی شہرت حاصل ہے۔ عام طور پر بچیاں شرم کی وجہ سے اپنی تکلیفیں نہیں بتا تیں۔ با احتیاطی سے ان دنوں میں نہا لیا جائے ، پاؤں بھیگے رہیں ، نہا کر پوری احتیاط نہ کی جائے اور مرطوب موسم میں نگے پاؤں پھرنے کی عادت ہوتو حیض پر جتنے بدا تر پڑتے ہیں ان کا علاج سینیشو سے ممکن ہے۔

سیلان خون اس دواکی خاص علامت ہے۔ جگہ جگہ سے خون بہتا ہے۔ جہاں بھی اندرونی جھلی اور جلد آپس میں ملتی ہیں ان کے جوڑوں سے خون بہنا سینیشو کی بھی علامت ہے۔

الس کی پیشاب کی علامتیں بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اکثر مقدار میں کم اور تیز رنگ کا،

بعض دفعہ خون ملا پیشاب آتا ہے جس میں پیپ بھی شامل ہوتی ہے۔ ہروقت جلن اور پیشاب
کی مسلسل حاجت اس کا طبعی نتیجہ ہے۔ آرتھرائیٹس (Arthritis) کے علاج میں بھی اس کو شہرت حاصل ہے۔ اس کے گردے کے درد کے دورہ میں پریرا اور بربرس (Berberis)
مددگار ثابت ہوتی ہیں لیکن دیگر علامتیں موجود ہوں تو بیا کیلی ہی کافی ہے۔

مردرد میں تیزی نہیں یائی جاتی گر بدحواس ساکر دیتی ہے۔ بعض دفعہ بائیں آئکھ میں سردرد میں تیزی نہیں یائی جاتی گھر میں

تیز در داٹھتا ہے جو بائیں کنپٹی کی طرف بڑھتا ہے۔ چھینکیں آتی ہیں اور گلے میں جلن کا احساس ہوتا ہے۔ دانت بہت حساس ہوجاتے ہیں۔ چہرے کے بائیں طرف در دہوتا ہے۔ مند، تالواور گلاخشک ہوتے ہیں اور نگلنے میں دفت محسوس ہوتی ہے۔

پیٹے کے درد میں اجابت کے بعدافاقہ محسوس ہوتا ہے۔ پانی کی طرح پتلے اسہال آتے ہیں جن میں سخت کلڑ ہے بھی ملے ہوتے ہیں۔ پیشاب بہت کم مقدار میں آتا ہے۔ اس کارنگ گہرا ہوتا ہے اور بعض اوقات اس میں خون کی آمیزش بھی ہوتی ہے اور پیپ بھی آتی ہے۔ جلن کا احساس اور بار بار حاجت محسوس ہوتی ہے۔ بچوں میں بھی مثانے کی بے چینی کی یہ علامت یائی جاتی ہے جس کے ساتھ سراور پیٹ میں در د ہوتا ہے۔

نوجوان بچوں میں بعض دفعہ حیض کا خون جاری ہونے سے پہلے گلے، سینے اور مثانے میں سوزش محسوس ہوتی ہے۔ حیض کے ایام ختم ہونے کے بعد یہ تکلیفیں خود بخو د دور ہو جاتی ہیں۔ اگر عور توں میں کسی وجہ سے حیض رک جائے اور اس کی بجائے ناک سے خون جاری ہوجائے تو اس میں بھی سینیشو مفید ہوسکتی ہے۔

اگر رحم اپنی جگہ سے ٹل جائے، پیثاب درد کے ساتھ آئے یا بالکل بند ہوجائے، گردول میں شدید سوزش ہواور سردی لگ کر بخار چڑھے تو یہ ساری علامتیں سینیشو کا تقاضا کرتی ہیں۔

سینیثو میں تکلیفیں دو پہر اور رات کو بڑھ جاتی ہیں۔کھلی ہوا میں نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔عور توں کی تکلیفیں حیض جاری ہوجانے سے کم ہوجاتی ہیں۔مریض کی توجہ کسی اور طرف پھیردی جائے تو تکلیف کا احساس کم ہوجاتا ہے۔

طاقت: 30سے 200 تک

سييگا 743

171

سينيگا

SENEGA

(Snake Wort)

سیدیگا ایک ایسی ایلو پیتھک دوا ہے جو گزشتہ سوسال سے بھی زائد عرصہ سے روایتی طب میں سینہ کی بیاریوں کے علاج میں استعال ہوتی رہی ہے اور بیاس نسخہ کا مستقل جزو بنی رہی ہے جو کھانسی، تپ دق اور چھاتی کی دوسری بیاریوں میں استعال ہوتا تھا۔ اگر چہ بیہ درست ہے کہاس سے ابتدامیں فائدہ پہنچتا ہے لیکن اس کے لمجاستعال سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ درست ہے کہاں جن کی بیآ غاز میں اصلاح کرتی ہے بعد میں انہی کو بڑھانے کا موجب بنتی ہے۔ اور وہی بیاریاں جن کی بیآ غاز میں اصلاح کرتی ہے بعد میں انہی کو بڑھانے کا موجب بنتی ہے۔ ایسی سیاریوں میں اس کا ہومیو پیتھک استعال بغیر کسی نقصان کے شافی ثابت ہوتا ہے۔ دل سے تعلق رکھنے والے دمہ (Cardiac Asthama) میں بھی سینی گا کومفید بتایا حات ہے۔

اس کا بلورل (Pleural) نمونیہ سے بڑا گہراتعلق ہے اور اس مرض کے ازالہ میں یہ بہت کا میا بی سے استعال کی گئی ہے۔ پھیچرٹ سے کے اردگرد کی جھلی کو Pleural کہا جاتا ہے۔
اس کی سوزش کے ساتھ جونمونیہ ہواسے بلورل (Pleural) نمونیہ کہتے ہیں۔ اس بیاری کے ازالے میں اس کا اتنا گہراتعلق ہے کہانسانوں میں اگر چہاس کا یہ استعال خطا بھی جاتا ہے اور تشخیص غلط بھی ہوسکتی ہے کیان جانوروں کے بلورل نمونیہ میں یہ ہمیشہ تیر بہدف ثابت ہوتی تشخیص غلط بھی ہوسکتی ہے کہان وروں کے بلورل نمونیہ میں یہ ہمیشہ تیر بہدف ثابت ہوتی ہے۔ جانوروں میں بیاری کی علامتیں صاف اور غیر مبدل ہوا کرتی ہیں۔ اس لئے جہاں ایک جہاں ایک جانور کی تکلیف میں کوئی دوا کام کرے گی دوسرے جانور کی اسی تکلیف میں بھی ضرور کارگر ہوگی۔

پھیپھڑوں کی بیار بوں میں بہت گاڑھا چیٹنے والا بلغم بہت کثرت سے بیدا ہوتا ہے۔ تپ دق بگڑ جائے تو بیعلامت اور بھی نمایاں ہوجاتی ہے۔ سینیگا سے اس بلغی تکلیف کا ایک حد تک از الد ہوجاتا ہے لیکن میکمل شفانہیں دے سی

سینیگا کے چھاتی کے درد، آرام کے دوران بڑھ جاتے ہیں مگر کھانسی حرکت سے بڑھتی ہے۔خصوصاً دمہ کی تکلیف معمولی حرکت سے بھی بہت بڑھ جاتی ہے۔ مریض دمہ کے دوران اعضاء کو حرکت دینا بھی پیند نہیں کرتا۔ لیئر گر (Layrings) کے تپ دق میں بھی اسے شہرت حاصل ہے۔ چپنے والا بلغم بار بار کھانسے سے بہت مشکل سے خارج ہوتا ہے۔ تپ دق کے آخری مراحل میں بھی اس کی تکلیف کم کرنے میں اسے کا میا بی سے استعال کیا گیا ہے۔ بعض ہومیو پیھس کے نزدیک مزاجی علامتیں موجود ہوں تو بائیں چہرے کے فالج کے لئے بھی بیدوا اچھی ثابت ہوگی۔

سینیگا کامزاجی مریض جھگڑالوہوتاہے۔

طاقت: 30سے 200 تک

سِپيا 745

172

سيبيا

SEPIA

(Inky Juice of Cuttle Fish)

سیبیاعمو ماً ایسی خواتین کی دوانتمجھی جاتی ہے جود بلی تیلی ہوں اوران کے کو لیج ننگ اور جسم کی ساخت میں قدر سے تنی یائی جاتی ہولیکن بیلازم نہیں ہے کہ عورت کی یہی جسمانی تصویر ہوتو وہ سیبیا کی مریضہ ہوگی۔سیبیا بنیا دی طوریر جگر اور رحم کی خرابیوں سے تعلق رکھنے والی دوا ہے۔ جب ان بیاریوں کی علامات ظاہر ہونے لگیں تو خواہ مریضہ کے جسم کی ساخت مذکورہ بالا نہ بھی ہو،اسے پھر بھی سیمیا دی جاسکتی ہے۔ دواتجویز کرتے ہوئے جسمانی علامات پرزور دینے کی بجائے گہری اندرونی مزاجی علامتوں کو پیش نظرر کھنا جاہئے۔ سیبیا دراصل اپنے خاص مزاج سے پیچانی جاتی ہے جس میں یہ بات شامل ہے کہ عورتوں میں طبعی جنسی رجحان مٹ جاتا ہے اور پیار اور محبت کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک پیار کرنے والی ماں احیانک مامتا کے جذبات سے عاری دکھائی دیتی ہے۔اینے خاوند سے قطعاً بے نیاز اور بے تعلق ہوجاتی ہے۔ رفتہ رفتہ اس کے تعلقات کے دائر مے محدود ہونے لگتے ہیں اور اس میں خورکشی کا ر جحان بھی پیدا ہوجا تا ہے اور عورت نیم یا گل سی ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیات دراصل کمبے عرصہ تک اندر ہی اندر تکلیفیں بر داشت کرتے رہنے سے پیدا ہوتی ہیں۔اس عرصہ میں دیکھنے والوں کو کچھ معلوم نہیں ہوتالیکن بید مباؤ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اچانک لاوے کی طرح پھوٹتا ہے اور وہ سییا کی مریضہ بن جاتی ہے۔خاونداور بچوں کی طرف توجہ نہ کرنا اس بڑھتے ہوئے دباؤ کاطبعی نتیجہ ہے۔ گویا مریضہ اندر سے ٹوٹ بھوٹ چکی ہے یہاں تک کہ ہر چیز سے بیزار ہوجاتی ہے۔ سیبیا کے مریض کا جگر سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ رحم میں کوئی نقص پیدا ہو

جائے تو دوران حمل اور وضع حمل کے بعد کئی تئم کی بیاریاں ظاہر ہوتی ہیں جن کے ساتھ جگر کی خرابی بھی ضرور پائی جاتی ہے۔ ایسی عورت پاگل بھی ہوجاتی ہے اور ہراس چیز سے جواجھی گئی جا میٹے نفرت کرنے لگتی ہے۔ اس نفرت اور بے تعلقی کی وجہ سے وہ خوفز دہ بھی ہوتی ہے اور اس خوف کے نتیجہ میں بیاری مزید براھتی جاتی ہے۔

سپیا کی ایک اور بہت نمایاں علامت یہ بتائی جاتی ہے کہ مریضہ کے ناک پر کالے رنگ کی کاٹھی ہی بن جاتی ہے جیسے پر ندے کے دو پر ہوں۔ میں نے بھی دوسر ہے ہومیو پیتھک ڈاکٹر وں کی طرح صرف اسی علامت کو مدنظر رکھ کر بہت سے مریضوں کوسپیا دی لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ یہ نشان اکثر جگر کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر سپیا کا مزاج ہوا ورجگر خراب ہوتو پھر سپیا فائدہ دے گی ورنہ جگر کی کوئی دوسری دوا ڈھونڈ نی پڑے گی۔ ایسی حساس عورت جس کے جذبات منجمد ہوگئے ہوں اور اس کے چہرے اور ناک پر داغ ہوں تو اس کے علاج میں سپیا فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔

جگری خرابی بڑھتے بڑھتے ہوتی ہے۔ بعض عورتوں کے چہرہ پرحمل کے دوران چھائیاں پڑجاتی ہیں اور چہرہ برونق نظر آتا ہے۔ سپیا میں بغیرحمل کے بھی یہ علامتیں ظاہر ہموتی ہیں۔ بھورے رنگ کے مسے بھی نگلتے ہیں اوران میں کالے کالے دھبے علامتیں ظاہر ہموتی ہیں۔ بیعلامت خاص طور پرسپیا سے تعلق رکھتی ہے۔ جسم پر سفیدیا ملکے بھورے رنگ کے گول گول دھبے پڑ جاتے ہیں جن کا جگری خرابی سے تعلق ہے۔ ہومیو پیتھی اصطلاح میں انہیں Liver Spots کہا جاتا ہے۔ اگر یہ بھورے یا پیلے رنگ کے ہوں تو فاسفورس اور سپیا مفید ہیں اور سفیدی مائل ہوں تو مرکسال یا کلکیر یا وغیرہ مفید ہوں گی۔

سیپیامیں قبض کا بھی رجحان ہے جو حمل کے دوران بڑھ جاتا ہے۔فضلہ خارج کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ایسی عورت وضع حمل کے وقت بھی دفت محسوس کرتی ہے کیونکہ عضلات کی بالا را دہ حرکت میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور پوری طاقت کے ساتھ بچہ کو باہر دھکیلنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔سیپیا کی علامتیں ہوں تو اس کے دیئے

سے بچہ کی پیدائش سہولت سے ہو جاتی ہے۔اگر بید مدد نہ کرے تو کولو فائیلم میانسیمیم بھی کا م ہ سکتی ہیں۔

سپیامیں پیٹ خالی ہونے کا احساس رہتا ہے اور بہت بھوک محسوس ہوتی ہے۔ سپیامیں بھوک اور کمزوری کھانے کے بعد بھی اسی طرح محسوس ہوتے رہتے ہیں۔ کھانے کے باوجود آرام نہیں ملتا۔ اگرائیں عورت کا رحم نیچے گرجائے یاریڑھ کی ہڈی کے عضلات ڈھیلے ہوجا کیں تو سپیا فوراً اثر دکھاتی ہے۔ یہ حمل کی قعے میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ مزاجی علامتیں ملتی ہوں تو اس کا امتیازی نشان ہے ہے کہ کھانا کھانے کے بعد قع میں سفید دودھیا مادہ خارج ہوتا ہے۔ اس کی بھاریوں میں منہ کا مزہ اور قوت شامہ متاثر ہوتے ہیں۔ لیکیوریا میں بھی سفید مادہ نکلتا ہے۔ اس کی بھاریوں میں منہ کا مزہ اور قوت شامہ متاثر ہوتے ہیں۔ اگر مریض میں سپیا کی دوسری علامتیں بھی موجود ہوں تو سپیا ہر پیز (Herpes) میں بھی مفید ہوسکتی ہے۔

سیپیا کے مزاجی مریض کواس سردرد میں سیپیا فوری فائدہ پہنچا تا ہے جس کے ساتھ کڑوی قے بھی آئے۔

مزاجی مما ثلت ہوتو آئکھ کی ہرشم کی تکلیفوں میں سیبیا مفید ہے۔ مزاج سیبیا کا ہوتو بہت سی جلدی امراض کا علاج بھی سیبیا سے ہوسکتا ہے۔ جلدی علامات بہت سی دواؤں میں مشترک ہوتی ہیں۔ اگر مزاج ، ماحول اور پس منظر سیبیا سے مشابہ ہوتو جلدی امراض میں فائدہ دے گی ورنہیں۔

سلفر کی طرح سیبیا میں پیپ اور بد بودار مادہ خارج ہوتا ہے۔ ناک سے سبز رنگ کا مواد نکلتا ہے۔اگر جلد اور اندرونی جھلیوں میں انحطاط ہوتو مذکورہ علامتوں کے ہوتے ہوئے مفید ثابت ہوگی۔

سپیامیں عموماً قبض ہوتی ہے۔اگر اسہال شروع ہوجائیں تواس کے ساتھ سفید چیکنے والا مادہ بھی نکلتا ہے۔ سخت فضلہ اور بیجیش میں بھی بیسفید مادہ ہوتا ہے اور اس میں سخت بد بوہوتی ہے۔ بواسیر کے مسے بھی بہت نکلیف دہ ہوتے ہیں۔ بیشاب میں خون سپيا 748

بھی آتا ہے۔ بیچے کی پیدائش کے بعد اگر پلیسنطا (Placenta) یعنی بچہ دانی کی جھی اندرہی رہ جائے تو بہت گہری تکیفیں پیدا ہوجاتی ہیں۔ اگر اس میں پلسٹیلا کام نہ کر بے توسیپیا دوا ہوسکتی ہے لیکن پلسٹیلا اور سیپیا اس وقت تک مفید ہیں جب تک نظام خون کے اندرز ہر داخل نہ ہو گیا ہو۔ جب خون میں زہر داخل ہوجائے تو سلفراور پائر وجینم کا آزمودہ نسخہ بہترین ثابت ہوتا ہے۔ یہ دونوں 200 کی طاقت میں ملا کرفوراً دینی چا ہمیں۔

دودھ پلانے کے زمانے میں سیپیا کا مزاج کر کھنے والی عورت کا حیض عموماً بند ہوجا تا ہے لیکن کلکیر یا کارب کے مریض میں حیض کا خون کی جاری ہوجا تا ہے۔ سیپیا کے مریض کے خون میں تیزائی مادے یائے جاتے ہیں جن سے اعصا بی در دہوتے ہیں۔

اگر درمیانے درجہ کی ورزش کی جائے تو سیبیا کی تکلفیں بڑھ جاتی ہیں کین بہت زیادہ ورزش کرنے سے آرام محسوس ہوتا ہے۔

سیبیا میں ہاتھ یا وک سونے کی علامت بھی ملتی ہے۔ ملیریا بخار جس میں وقت کا تعین نہ ہو،اس میں سیبیا ایک ترتیب بیدا کر دیتی ہے جس سے اصل دواکی پہچان ممکن ہو جاتی ہے۔اگر سیبیا کامریض ہوتو سیبیا خود ہی شفا کا موجب بن جاتی ہے۔

عضلاتی کمزوری کی وجہ سے نظر کمزور ہوجاتی ہے۔ آنکھوں کے سامنے سیاہ دھبے تقریح ہیں۔ کمزوری اور رحم کی خرابیوں کے نتیجہ میں آنکھوں میں سوزش ہوجاتی ہے۔ بپوٹے بوجھل ہوکر نیچولٹک جاتے ہیں۔ کانوں کے بیچھچا ورگردن کے قریب ابھار بن جاتے ہیں۔ بعض مریضوں میں چہرے پر زرد داغ پڑجاتے ہیں۔ زبان سفیداور منہ کا ذاکقہ بہت نمکین ہوتا ہے۔ مانے کی ہوتی ہے۔ مریض ترش چیزیں پیند کرتا ہے۔ نقاہت اور کمزوری کا احساس بہت ہوتا ہے۔ کھانے کی بوسے مملکی ہوتی ہے جو کروٹ کے بل لیٹنے سے زیادہ ہوجاتی ہے۔

مددگاردوا: نیٹرم میور نیس وامیکا ۔ فاسفورس طاقت: 30اوراونچی طاقتیں اور سیپیا کی ذہنی مریضاؤں کے لئے ان کا مزاج درست کرنے کیلئے ایک لا کھ طاقت میں دینی چاہئے۔ سليشيا 749

173 سليشيا

SILICEA

(Silica - Pure Flint)

سلیشیا یا سلیکا (Silica) زمین کی سطح پر پایا جانے والا ایک ایساعضر ہے جوریت اور کئی قشم کے پتھروں میں پایا جاتا ہےاورتمام روئے زمین پر پھیلا بڑا ہے۔اس عضر نے زندگی کے آغاز ہی میں عام مٹی کے ساتھ مل کرزندگی کی تغمیر میں حصہ لیا۔اس لئے بیتمام زندہ اقسام کے خلیوں کی عضری ترکیب میں داخل ہے۔ بعض مشہور ہومیو پیتھک اطباء کے تجربات سے سلیشیا کی بہت سی خصوصیات معلوم ہوئی ہیں۔ ہومیو پیتھی کےسوااسے بطور دواکسی اورطریقتهٔ علاج میں استعال نہیں کیا گیا۔ ایک طویل عرصہ کی محنت اور ہومیو پیتھک پروونگ (Proving) کے بعداس کی علامات منظر عام پر آئی ہیں۔سلیشیا ان دواؤں میں سے ہے جس کی بیروونگ بہت آ ہتہ ہوتی ہے۔ یہ گہرے اثرات کی حامل ہے اور ایسی اندرونی تبریلیاں پیدا کرتی ہے جوآ ہستہ آ ہستہ وقوع پذیر ہوتی ہیں۔سلیٹیا کی پروونگ سے اس بات کاعلم ہوا کہ یہ بہت گہرااورلمبااثر کرنے والی دواہے۔ جسم کے اندر کوئی بھی بیرونی مادہ داخل ہوجائے توسلیٹیا اسے برداشت نہیں کرسکتی اوراسے فوراً ہاہر نکال پھینکنے کے لئے جسم کو ر دعمل دکھانے پر تیار کرتی ہے۔اگر بیرونی مادہ بے جان ہوتواس کےار دگر دپیپ بنا کراسے باہر کی طرف دھکیلتی ہے۔ یہ پیپ موہل آئل کی طرح اس بیرونی چیز کے گر دلیٹ کراس کی حرکت کوآ سان کرتی ہے اوراس کو نکا لنے کا جورستہ بناتی ہے اس سے گوشت پوست اور جھلیول وغیرہ کوزخی نہیں ہونے دیتی۔اگر ہیرونی مادہ جراثیم یا وائرس یا پیٹ کے کیڑے وغیرہ ہوں توان کے خلاف ہرمناسب رقمل کے لئے جسم کومستعد کرتی ہے اور بید فاعی کارروائی تمام اینٹی بائیوٹک

(Anti-Biotic) دواؤں سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ سلیشیا جراثیم اور کیڑوں کے خلاف ردعمل دکھا کران کوجسم کے اندرہی مارکران کی پیپ بنادیتی ہے یا انہیں بغیر پیپ بنائے مختلف مخارج سے باہر نکال پھینکتی ہے۔

بعض بیاریوں میں جراثیم کےخلاف سلیشیا کارڈمل کافی نہیں ہوتایا الکل ہی نہیں ہوتا مثلًا ٹائیفائیڈ کے مریض پرسلیشیارتی برابر بھی اثر نہیں کرتی ۔اسی طرح فسادخون کی بعض قسموں میں سلفراور یا ئیروجینم سلیشیا کی نسبت زیادہ مؤثر ہیں۔ ہمیں لمبے تجربہ سے معلوم ہو چکا ہے کہ کن بیار یوں میں سلیشیا کام آسکتی ہے اور کن بیار یوں میں کسی اور دوا کی ضرورت ہے۔ایسی گہری بیاریاں جن میں جسم کے پیچیدہ نظام کے مخصوص رقمل کی ضرورت ہے ان کے لئے کمبی محنت،غور وفکر اور ہر مرض اور مریض کی نوعیت کوسمجھ کر دوا کی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نےجسم میں ایک ایسانظام جاری کیا ہوا ہے جو لاکھوں بیار یوں کےخلاف الگ الگ دفاعی کارروائی کے لئے ترکیب اور ترتیب دیا گیا ہے۔ بیایک ایس عظیم فیکٹری ہے جس کی گهرائی، وسعت اور ہمہ گیر تخلیقی طاقتوں کا تصور بھی عام انسان تو کیا ماہر سائنسدان بھی بوری طرح نہیں کر سکتے ۔ پس سلیشیا گو بہت ہمہ گیر ہے مگراس وسیع وعریض نظام پر ہرگز حاوی نہیں۔ سلیشیا عموماً متعدی بیار یوں، پھوڑ ہے پھنسیوں میں بہترین کام کرتی ہے۔ اسی طرح بے جان چیزوں کے خلاف حیرت انگیز بلکہ نا قابل فہم ردعمل دکھاتی ہے مثلاً اگر جسم میں لوہے کا کیل داخل ہو جائے ، کوئی اور چیز غلطی سے نگل لی جائے ، گلے میں مجھلی کا کا نٹا بھنس جائے یا بندوق کے چھر ہےجسم کے اندررہ جائیں توسلیشیا اس قتم کی چیزوں کوجسم سے باہر نکا لنے میں عجیب کام دکھاتی ہے۔اس کے دوطرح کے اثر ات ظاہر ہوتے ہیں۔اگر چھوٹی طاقت میں دی جائے تو ماؤف جگہ پر آ ہستہ آ ہستہ خون کی فراہمی تیز کر کے تیزی سے جراثیم کو مارکر پیپ بنائے گی اوران پھوڑ ہے پھنسیوں کو جو عام طور پر ہفتہ دس دن میں یک کر سے شخے کے لئے تیار ہوتے ہیں دوتین دنوں میں ہی یکا کر سے شخے کے لئے تیار کر دے گی۔اس سے تکلیف بھی نسبتاً کم ہوتی ہے اور پیپ بھی بہت زیادہ نہیں بنتی۔

زخم کا سوراخ بھی معمولی سا ہوتا ہے جود کیھنے میں بدنما معلوم نہیں ہوتا۔اسی طرح اگر سوئی جسم میں داخل ہوجائے پاکسی دھات یا کنگر کاٹکڑا جسم کے اندر کہیں پھنسا ہوتو سلیشیا اسے باہر دھکیل دیتی ہے اورایسے پراسرار طریق پر باہر نکال دیتی ہے کہ پیطریق ابھی تک انسانی سمجھ سے بالا ہے مگر مشاہدات قطعی ہیں۔ایک دفعہ ایک قابل سرجن نے مجھے بتایا کہ سی مریض کی انترایوں میں سوئی پھنسی ہوئی تھی اور ایریشن خطرنا ک تھا۔اسے انہوں نے سلیشیا کی شہرت سن کر سلیشیا دی۔ کچھ عرصہ کے بعداندرونی اعضاء کوزخی کئے بغیروہ سوئی خود ہی جسم سے باہرنکل گئی اور سوئی کے جسم سے باہر نکلنے کارستہ سیدھا جلد کے قریب ترین تھا۔ مختلف جھلیاں اور چر بی کی تہیں وغیرہ بالکل حائل نہیں ہوئیں اور نہ ہی زخمی ہوئیں۔ پیطریق جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔انسانی فکراور تصور کے احاطہ میں نہیں آ سکتا مگر مشاہدہ اتناقطعی اور بار بار ہونے والا ہے کہ کوئی معقول انسان اس کاا نکارنہیں کرسکتا۔ایک دفعہ ربوہ میں ایک بیجے کے یاؤں میں شخصے کا ایک بڑا سااورٹیڑھا تکڑا یاؤں کی ہڈی تک پہنچ کروہیں چینس گیا۔ یاؤں اتنا سوج گیا تھا کہ ڈاکٹروں نے ایریشن کرنے سے انکارکر دیا۔اسے سلسل ایک مہینہ تک 6x میں سلیشیا کھلائی گئی۔سلیشیا کے اثر سے سوجن رفع ہو گئی اور شیشے کا وہ ٹکڑا ہڑے آرام سے باہر نکلنے لگا یہاں تک کہاس کا ایک کنارہ جلد سے اور نکل آیا۔ تب اسے موجنے سے کھینچا گیا تو بغیر تکلیف کے باہر آ گیا۔

افریقہ کے بعض ممالک اور پاکستان میں سندھ کے علاقہ میں گندے پانی کی وجہ سے ایک کیڑ اجسم میں داخل ہوجا تا ہے جو بہت خطرناک ہوتا ہے اور اندر ہی اندر فیتے کی طرح لمبا ہوتا چلا جاتا ہے اور ایک سوت کی طرح جسم میں ابھار بنا دیتا ہے جو بڑھتے بڑھتے ایک فٹ بال کے برابر بھی ہوسکتا ہے۔اسے فیل پایعنی ہاتھی کا پاؤں جیسی بیاری کہا جاتا ہے۔ وقف جدید کا ایک معلم ہومیو ڈاکٹر نثار مورانی جو ہندوؤں سے مسلمانوں ہوا تھا، فیل پاکے علاج کے لئے سلیٹیا کو کا میا بی سے استعال کرتا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق سلیٹیا کو کا میا بی سے استعال کرتا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق سلیٹیا کو کا میا بی اندر بھولا دیتی تھی۔ اسے چیرا وغیرہ دے کر باہر نکا لئے سلیٹیا کو کا ندر ہی اندر بھولا دیتی تھی۔ اسے چیرا وغیرہ دے کر باہر نکا لئے

کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کیونکہ ایسے کیڑے کو سرجری کے ذریعہ باہر نکالنے کی کوشش کرنا انتہائی خطرناک ثابت ہوسکتا ہے۔اگریہ پورا نکلنے کی بجائے کہیں سے ٹوٹ جائے جس کاغالب احتمال ہوتا ہے یا غلط چاقو لگنے سے ٹکڑے ٹکڑے ہوجائے تو خون کے ذریعہ جہاں جہاں یہ گڑے کھیلیں گے اس کا ہر ٹکڑ ابہت تیزی سے بڑھنے لگتا ہے اور انتہائی مہلک ثابت ہوتا ہے۔ افریقہ میں اس کیڑے کے بعض ماہر معالجین اسے کانٹے پر لیٹتے ہیں۔ یہ سندھ ہویا افریقہ ہوتا ہے۔اگر درمیان میں ٹوٹ جائے تو ساری محت اکارت جاتی ہے۔سندھ ہویا افریقہ سلیشیا ہر جگہ کیساں کارروائی کرتی ہے اور اس کیڑے کو بگھلا کر خم کا چھوٹا ساسوراخ بنا کر اس کا مواد باہر نکال دیتی ہے۔

بعض اوقات مجھلی کا ٹیڑھا کا نٹا گلے میں پینس جاتا ہے جو نکلتا ہی نہیں۔ایک دفعہ بھے بھی ایسی صورت حال کا سامنا کرنا پڑا۔ جب باوجود کوشش کے کا نٹا نہ نکل سکا تو میں نے سلیشیا x6 کھا لی۔ چند گھنٹوں کے بعد ہلکی سی کھانسی کے ساتھ کا نٹا خود بخود باہر آ گیا۔ بعض بچوں پر بھی یہ تجربہ کرکے دیکھا ہے۔الا ماشاءاللہ،سلیشیا ہمیشہ کار آمد ثابت ہوتی ہے۔

اونچی طاقت میں سلیٹیا دینے سے بڑے بڑے پھوڑوں کا مواد خود بخو دخشک ہونے لگتا ہے اور وہ اندر ہی اندر سکڑ کرختم ہوجاتے ہیں۔ پیپ بن کر بہتی نہیں ہے لیکن اس کے برعس بعض صور توں میں پیپ بھی بنتی ہے۔ سلیٹیا کے اس دہر سے اثر کو مجھنا چاہئے ۔ عمو ما جسما نی نظام دفاع یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ حسب موقع کیا رؤمل دکھائے۔ سلیٹیا عمو ما اونچی طاقت میں سل کے مادوں کو بہر نظافت میں سل کے مادوں کو بیر کردیتی ہوں اور ان مادوں کے گرد پیپ بنانے کے مل کو تیز کردیتی ہوئی کو تیز کردیتی خون کی کسی شریان کے بالکل ساتھ ہوں توسلیٹیا کے پیپ بنانے کے ممل کے ساتھ وہ ثریان بھی خون کی کسی شریان کے بالکل ساتھ ہوں توسلیٹیا کے پیپ بنانے کے ممل کے ساتھ وہ ثریان بھی میں میں کے مادوں کے گا کہ اس مریض کی زندگی کو بھی بہالے جائے گا۔ میں میٹن گیاں مریض کی زندگی کو بھی بہالے جائے گا۔ میں میٹن گیاں مریض کی زندگی کو بھی بہالے جائے گا۔ میں میٹن گیاں مریض کی زندگی کو بھی بہالے جائے گا۔ میں میٹن گیاں مریض کی زندگی کو بھی بہالے جائے گا۔ میں میٹن گیاں مریض کے دؤمل کے میٹر یا نیں بھٹے گیاں مریض کے دؤمل

سے ڈاکٹر کو ہروقت خطرہ بھانپ لینا چاہئے۔ چھوٹی طاقت نسبتاً نرمی اور آ ہستگی سے کام کرتی ہے۔ اس لئے عموماً کسی شدیدردعمل کا خطرہ بیدا ہی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کینٹ کا کہنا ہے کہ سلیشیا تپ دق کے مریضوں کے لئے بہت اونچی یا بہت چھوٹی طاقت میں یکساں خطرناک ہے اس لئے حتی المقدور دوسری مددگار دواؤں سے کام لینا چاہئے۔ اگر مجبوری ہوتو 30 طاقت میں دے کردیکھا جائے بینہ بہت اونچی طاقت ہے۔ بہت نیچی۔

سلیثیا کا بعض دواؤں سے تضاد ہےاس لئے اسے ان کے ساتھ ملا نانہیں جا ہے ۔ مثلاً یارہ لعنی مرکری کی ہرشکل سلیشیا سے متصادم ہے۔ان دونوں کوایک ساتھ استعمال نہیں کرنا جا ہے بلکہ ان دونوں کے درمیان ہیر سلف دینی ضروری ہوتی ہے کیونکہ اس کی بہت سی علامتیں سلیشیا سے ملتی ہیں اور بیرمر کسال سے بھی موافقت رکھتی ہے۔اس لئے ہیپر سلف ان دونوں دواؤں کے درمیان ایک مل سابنادیتی ہے۔ بعض دفعہ سلیشیا کاغیر متوقع اثر ظاہر ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کے دانت کی جڑوں میں نفیکشن موجود ہوجس کا اسے علم نہ ہواور ایبا مریض کسی اور بیاری کے لئے سلیشیا استعال کر بے تواجا نک خراب دانت کے گرد جبڑ بے سوج جا کیں گے اور دانت ملنے لگے گا۔ایسی صورت میں اگر وہ سلیشیا کے تریاق کے طور پر ہیپر سلف کھالے تو در دکو فوراً آ رام آ جائے گا اور اسے بیلم بھی ہو چکا ہوگا کہ فلاں جگہ انفیکشن موجود ہے۔ پھر حسب ضرورت کوئی اور بالمثل دوادی جاسکتی ہے جو تکلیف دہ ردمل کے بغیر دانت کوٹھیک کر دے۔ سلیشیا کی ایک عمومی علامت میہ ہے کہ مریض کو بہت سردی لگتی ہے اور اس کے ہاتھ یا وُل شنڈے ہوتے ہیں۔ یہالیی علامت ہے کہ جوبعض او قات سیجے دوا تک پہنچنے کی راہ میں بھی حائل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ مریض جنہیں تعفنی بخار ہوں ان کے ہاتھ یا وُں بعض دفعہ بہت گرم ہوتے ہیں اور کئی ڈاکٹراس علامت کے بیش نظر انہیں سلیشیا کی بجائے پلسٹیلا دیتے ر ہتے ہیں جو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاتی ۔سلیثیا کی پہچان یہ ہے کہ بخار چڑھنے سے پہلے سردی کی وجہ سے ہاتھ یاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں لیکن بخار چڑھنے کے بعد پلسٹیلا کی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ سلیشیا پلسٹیلا کی مزمن (Chronic) دوا ہے۔

سليشيا 754

کئی دفعہ مریض بخار میں جل رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی گرم ہوتے ہیں لیکن انہیں پلسٹیلا کی بجائے سلیشیا کی ضرورت ہے اور سلیشیا ہی فائدہ دیتی ہے۔ عموماً فانسلز کی انفیکشن میں ایسا ہوتا ہے اور بعض بچا یسے ڈاکٹروں کے ہاتھوں چنددن کے اندر مر جاتے ہیں کیونکہ دراصل وہ سلیشیا کا تفاضا کررہے ہوتے ہیں اور انہیں مسلسل پلسٹیلا ہی دی جاتی ہے یہاں تک کہ بیاری قابو سے نکل جاتی ہے۔

سلیثیا کے مریض کو یہ خوف رہتا ہے کہ میں جوکام کروں گایا جوامتحان بھی دوں گااس
میں ناکام ہوجاؤں گا۔خصوصاً سکول کے بچے اس ناکامی کے احساس میں مبتلار ہتے ہیں۔ مثلاً
بعض لوگ دل میں بیٹھے ہوئے خوف کی وجہ سے ڈرائیونگ کے امتحان میں باربارناکام ہوتے
ہیں حالانکہ انہیں اچھی بھلی ڈرائیونگ آتی ہے۔ ایسا خوف چونکہ بعض دوسری دواؤں میں بہت
نمایاں طور پر بیان ہوا ہے اس لئے سلیشیا کا خیال ہی نہیں آتا۔ ایسے مریضوں کواگر سلیشیا کا
کے ساتھ کالی فاس ملاکر دی جائے تو بعض دفعہ تعجب انگیز فائدہ پہنچتا ہے۔

مختلف قتم کے زخم اورالسر مندمل نہ ہوں تومستقل ناسور بن جاتے ہیں۔اگرسلیشیا کی علامتیں ملتی ہوں تو مستقل کا سور بن جاتے ہیں۔اگرسلیشیا کی علامتیں ملتی ہوں تو بیانی ہوار کو نیم خوابیدہ حالت سے نکال کرمستعد کر دیتی ہے اور انہیں ابھار کر پیپ بناتی ہے۔ جب وہ بہہ جائے تو زخم بالکل خشک ہوکر معمولی سانشان باقی رہ جاتا ہے۔

اگر عورتوں کے جسم میں غدود برٹھ جا کیں تو ان کے خلاف بھی سلیشیا بہت مفید دوا ہے۔ جلد پر ظاہر ہونے والی عمومی تکلیفیں مثلاً زہر بلے دانوں، چھالوں اور پھوڑوں وغیرہ میں سلیشیا کا بہت اچھااثر ہے۔ جن لڑکیوں اورلڑکوں کے چہرے پر آغاز جوانی میں کیل نکل آتے ہیں اور بہت بدنما دکھائی دیتے ہیں، انہیں 30 طاقت میں کالی برومیٹم کے ساتھ سلیشیا ملاکردیئے سے بسااوقات نمایاں فائدہ ہوتا ہے اور بہت ضدی شم کے کیل بھی ہیچھا چھوڑ جاتے میں ۔ لیکن ان دونوں کو کم از کم ایک ماہ تک استعال کرنا چاہئے۔ بعدازاں بھی وقفے وقفے کے ساتھ حسب ضرورت دہرانا چاہئے۔

سليشيا 755

جسم کے جس حصہ سے بھی پیپ والے ریشہ دار مواد خارج ہوں سلیشیا کوفراموش نہیں کرنا چاہئے۔سلیشیا میں بیاؤں کرنا چاہئے۔سلیشیا میں بیاؤں کرنا چاہئے۔سلیشیا میں سردی کے احساس کے باوجود گرم رہتے ہیں اور پسینہ آتا ہے اور جلن بھی ہوتی ہے۔سلیشیا میں سردی کے احساس کے باوجود یاؤں میں پسینہ آتا ہے۔

سلیشیا میں سردرد گدی سے شروع ہوتا ہے۔ عموماً صبح کے وقت درد کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے جلسیمیم سے اسے ممتاز کرنا مشکل ہوتا ہے۔ دونوں ٹھنڈے مزاج کی دوائیں ہیں۔سلیشیا میں دردگدی سے آگے کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ ما تتھاور آئکھوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔اگر یہ علامت واضح ہوتو سلیشیا سے علاج شروع کرنا چاہئے۔اس کا سردرد صبح شروع ہوکررات تک جاری رہتا ہے۔

مجھی سلیشیا کے مریض کا نجلا دھڑ خشک ہوتا ہے اور اوپر کے دھڑ پر ٹھنڈ اپسینہ آتا ہے۔
کلکیر یا کارب سے فرق رہے کہ کلکیر یا کارب میں اوپر کے سارے بدن پر نہیں بلکہ صرف سر پر
بہت زیادہ پسینہ آتا ہے۔ رسٹاکس میں اوپر کے بدن پر پسینہ آتا ہے لیکن سر پر بالکل نہیں آتا۔
سلیشیا میں خاص وقت پر مرض شروع ہوتا ہے اور خاص وقت پر ہی ختم ہوتا ہے اور وقفہ وقفہ سے
مرض عود کر آتا ہے۔ اس کا تعلق شروع چاند سے بھی ہے۔ چاند نکلتے ہی سلیشیا کی بیاریاں
زور پکڑ لیتی ہیں۔

بعض بچوں کا دمہ بھی شروع جاند میں شدت اختیار کرلیتا ہے اور بیسلیشیا کی خاص علامت ہے۔ مختلف قسم کے بخاروں ،حیض کے ایام کی تکلیفوں اور مرگی کے دوروں کا بھی جاند کی تاریخوں سے تعلق ہوتا ہے۔ بیاری کے سات دن کا دور بھی سلیشیا میں ماتا ہے۔

گدی والے درد کے علاوہ سلیٹیا کا سر در دزیا دہ تر دائیں طرف حملہ آور ہوتا ہے۔ اس پہلو سے اس کی میگنیٹیا فاس سے مشابہت ہے۔ اس کا تفصیلی ذکر میگنیٹیا فاس میں گزر چکا ہے۔ سرکے تکلیف وہ ایکزیما میں بھی سلیٹیا بہت کار آمد ہے۔ اس کے میا تھے سورائیم اور گریفائیٹس بھی مددگار کے طور پر دینی پڑتی ہیں جس سے تکلیف وہ

مزمن ایگزیموں میں بہت نمایاں فرق پڑتا ہے۔ یہ دوائیں ایک ہزار طاقت میں باری باری درمن ایگزیموں میں بہت نمایاں فرق پڑتا ہے۔ یہ دوائیں ایک ہزار طاقت میں باری باری درمزن سلیشیا اور گریفائیٹس باری باری دینے پڑتے ہیں کیونکہ یہ مرض بہت گہرا ہے اور صرف ایک دودواؤں کے قابو میں نہیں آتا۔

بعض دفعہ بچوں کے چہرے پرخون کی غدود ہیں ابھر آتی ہیں، کی کی جلداورخون کے چھالے سے بن جاتے ہیں۔ اگر وہ ٹھنڈے مریض ہوں تو اللہ کے فضل سے سلیشیا سے بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ ورنہ فیرم مٹیکیکم (Ferrum Metallicum) اس مرض کی اولین دوا ہے اور تجربہ بتا تا ہے کہ یہ بعض پیدائش خون کے ابھاروں میں بھی مفید ثابت ہوئی ہے۔

سلیشیا گلینڈز کی زیادہ خطرنا ک اور گہری بیماریوں میں کام آتی ہے۔ سخت غدودوں کو چھوٹا اور نرم کرنے میں سلیشیا ایک اہم دوا ہے۔ کلکیر یا فلور، برائیٹا کارب، فائیٹو لاکا اور کا سلیکیم بھی مفید ہیں۔ لیکن اگر جبڑوں، گردن اور بغلوں کے غدود تیزی سے سخت اور بہت بڑے ہونے شروع ہوجا ئیں اور مریض ٹھنڈا ہوتو سلیشیا استعال کرنی چا ہے لیکن اگر اس کے باوجودا فاقد نہ ہوتو احتمال ہے کہوہ کینسر ہو۔ اس صورت میں اکیلی سلیشیا فائدہ نہیں دے گی بلکہ سلفر CM و بنی چا ہے ۔ جب اس کے استعال سے مریض ٹھنڈ محسوس کرنے گے تو پھر سلیشیا سلفر CM کی خوراک دینی پڑے گی۔ جب تک سردی گرمی کی علامتیں تبدیل نہ ہوں اس وقت تک ان کوادل بدل کردینا مناسب نہیں۔

سلیثیا آئکھوں کی بیاریوں میں بھی مفید ہے۔ کورنیا کے السر میں بھی جوعلاج کے لحاظ سے ایک مشکل مرض ہے سلیثیا بالمثل ہوتو غیر معمولی فائدہ دیتی ہے۔ (دیگر مشابہ دواؤں سے موازنہ کے لئے دیکھئے کلکیریا فلور)

نزلاتی مادہ کی وجہ سے اگر کان میں شور ہوتو یہ علامت بہت ہی دواؤں میں مشترک ہے۔سلیشیا اسی وفت کام آئے گی جب میراجی دوا ہو۔ اگر <u>دانتوں کے کنارے</u>

سليشيا 757

تجرنے لگیں تو کلکیر یا فلور کی طرح سلیشیا بھی دوا ہو سکتی ہے۔

اکثر ہومیو پیتھک کتابوں میں گلے کی اچا نک خرابی کے علاج کے سلسلہ میں سلیشیا کا ذکر نہیں ماتا بلکہ یہ گلے کی مستقل اور مزمن بیماریوں میں مفید بتلائی جاتی ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ گلے کے غدود میں تعفن کی وجہ سے بخار ہوتو صرف سلیشیا دینے سے ہی فوری آرام آسکتا ہے۔ اس کے ساتھ کالی میور، فیرم فاس اور کلکیریا فلور ×6 دیں تو بخار اللہ کے ضل سے بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض ایسے مریضوں کا اس علاج سے اگر پہلے دن ہی بخار نہ ٹوٹ تو دو تین دن کے اندر رفتہ رفتہ ختم ہوجاتا ہے۔

سلیشیا کے مریض کوسر دی لگنے کے باوجود تخت ٹھنڈ نے پانی کی بیاس محسوں ہوتی ہے اوروہ برف کھانا چا ہتا ہے یا مشروبات میں برف ڈال کر پیتا ہے۔سلیشیا کے بارے میں ایک علامت اکثر کتب میں کھی ہوئی ہے کہ اس کے مریض کو گوشت سے نفرت ہو جاتی ہے۔اگر مریض پیند بھی کرے تو صرف ٹھنڈا گوشت پیند کرتا ہے۔میراوسیج تجربہ اس کے خلاف گواہی دیتا ہے۔ بکثر ت سلیشیا سے فائدہ اٹھانے والے مریضوں میں گوشت سے نفرت کی عادت موجوز نہیں ہوتی۔

مزمن اسہال کی بیاری میں بھی سلیٹیا بہت مفید ہے۔ تپ دق کے اثرات کی وجہ سے بھی اسہال مزمن صورت اختیار کر لیتے ہیں یا پھرا گرخوراک گندی اور مضرصحت ہوجسیا کہ مہاجر کیمپوں وغیرہ میں ہوجاتی ہے تو اسہال کی بیاری مستقل ہوجاتی ہے یا پیچیش مزمن شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ایسی بیاریوں میں سلفراور کروٹن کے علاوہ سلیٹیا بھی دوا ہو مکتی ہے بشر طیکہ مریض کا جسم ٹھنڈار ہتا ہو۔ ایک عالمی جنگ میں اسہال کی بیاری بہت پھیلی تھی۔ ایک ہومیو بیتھک ڈاکٹر سلیٹیا کا استعال شروع کیا تو ہر جگہ اس سے فائدہ ہوالیکن ایک اور موقع پر سلیٹیا سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ بیتھی کہ خاص موسم اور خاص وبا وغیرہ میں علامتیں بدل جاتی ہیں اور دوسری دواؤں کی ضرورت برقی ہے۔

سلیشیا کی بعض علامتیں کالی کارب سے ملتی ہیں۔ دونوں ٹھنڈے مزاج کی دوائیں

ہیں۔جنسی امراض میں بھی سلیشیا کی کالی کارب سے بہت گہری مشابہت ہے۔اگر سردی کی وجہ سے رات کو بستر میں پیشاب نکل جائے تو بھی سلیشیا مفید ہے۔ بعض عدرت خصصاً بحد میں سے حیض اوران کی جو ان کا میا تعدید ہے۔

بعض عورتوں خصوصاً بچیوں کے حیض اجا نک رک جائیں تو سلیشیا بشرطیکہ دیگر علامتیں موجود ہوں بہت مؤثر ٹابت ہوگی حلیٰ کہاس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی مرگی کا بھی مؤثر علاج ہے۔

دمہ کے لئے بھی سلیٹیا بہت مفید ہے۔ دمہ کے دوران بخار ہوجائے توسلیٹیا سے بہتر کوئی دوانہیں۔ دمہ کے ایک حملہ کے بعد سلیٹیا دیں تو بیزیا دہ گہرااور لمبااثر دکھاتی ہے اور دمہ کے متقبل حملہ کے رجحان کوختم کردیتی ہے۔

مرگی میں اگر سلیشیا دوا ہوتو مریض کے ٹھنڈے ہونے کے علاوہ اس کا اورا (Aura) بھی اس کی نشا ند ہی کرتا ہے جو پیٹ کے اندر درمیان سے شروع ہوتا ہے اوراس کا غبار د ماغ کی طرف اٹھتا ہے۔ شروع چاند میں ہونے والے مرگی کے دورہ میں بھی سلیشیا کونظر انداز نہ کریں۔

سلیشیا میں زبان پر گنٹھیا کی قتم کا درداورسوجن ہوتی ہے یعنی زبان کا کوئی نہ کوئی حصہ دکھنے لگتا ہے۔مسوڑھوں پر چھالے بن جاتے ہیں۔ معدہ میں خرابی کی وجہ سے پیچکی شروع ہوجائے توسلیشیا سے آرام آتا ہے۔نکس وامیکا اور اگنیشیا بھی پیچکی کے لئے بہت مفید دوائیں ہیں۔

سلیشیا میں متلی اور قے کا رجحان بھی ملتا ہے۔اگر سلیشیا کی دیگر علامتیں پائی جائیں تو اس سے جگر کی خرابی کا بھی علاج ممکن ہے۔ایسے مریض کوگرم کھانا پسندنہیں ہوتا بلکہ مختلہ اکھانا مرغوب ہوتا ہے۔

بعض دفعہ بچوں کوشدید قبض ہو جاتی ہے اور اجابت کے وقت بچہ بہت زور لگا تا ہے۔ ایسے بچوں کے لئے سلیٹیا اور وریٹرم البم بہت مفید دوائیں ہیں۔ (تفصیل کے لئے د کیھئے وریٹرم البم۔)

بیشاب کی بہت سی تکلیفول میں بھی سلیٹیا مفید ہے۔اگر پیپاورخون آنے لگے،

نزلاتی حملے ہوں لیعنی بار بار بیشاب آئے ،مختلف مادے ببیثاب کے ذریعے خارج ہوں اور برتن کی تہ میں بیڑھ جائیں توسلیشیا دینے سے فائدہ ہوگا۔

گردہ میں بننے والے کنگر خصوصاً آگریلیٹس (Oxalates) جو کسی اور دواسے ٹھیک نہیں ہوتے بسااوقات کچھ عرصہ سلیٹیا کھ کھلانے سے چھوٹے چھوٹے ریت کے ذریح بن کرنکل جاتے ہیں۔ ایسی پھریاں ایکسرے میں بھی نظر نہیں آئیں اس لئے صرف گردے کی درد کے شدید دورے ان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پھر یلے علاقوں میں جہاں پھروں کے سگریزے خوراک میں شامل ہوتے ہوں وہاں اس قتم کی آگریلیٹس کی پھریاں بھروں کے سگرین مہاجرین کے کیمپول میں آگریلیٹس کی پھریوں کے مریضوں پینے میرے ہومیو پیھک کے شاگر دڈ اکٹروں نے وابعی پیانے پراسے کا میابی سے استعمال کیا ہے۔ میرے ہومیو پیھک کے شاگر دڈ اکٹروں نے وسیع پیانے پراسے کا میابی سے استعمال کیا ہے۔ بعض عور توں کے رقم میں یانی کے تھیلے سے بن جاتے ہیں جور سے رہتے ہیں یا پھٹ جاتے ہیں اوران سے لیس دار مواد بہنے لگتا ہے۔ یہائی تکلیف دہ اور بے چین کرنے والی بیاری ہے۔ بیمائی تکلیف دہ اور جوٹی گھٹیاں بیاری ہے۔ بیمائی ہیں۔ ان سب تکلیفوں کے از الد کے لئے اگر سلیشیا مزاجی دوا ہوتو بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔

پاؤں میں گٹے پڑ جانا، اندر کی طرف اگنے والے ناخن (In Growing Toe Nail)
کی وجہ سے سوزش اور درد، رگڑ لگنے سے تکلیف بڑھ جائے، تنگ جوتا پہننے سے گٹے پڑ
جائیں تو حسب علامات سلیٹیا یا سلفر مفید ثابت ہوسکتی ہیں مگر بعض ہومیو پیٹھس نے دعویٰ کیا
ہے کہ انگو تھے کے ناخنوں کی یہ بیماری سب سے زیادہ آسٹریلین نارتھ پول کے میگنٹ سے تیار
کی ہوئی ہومیو پیٹھک دوا کے دائر ہ کارمیں آتی ہے۔

مردگاردوائیں: تھوجا۔پلسٹیلا۔فلورکایسٹر طاقت: تھوجا۔پلسٹیلا۔فلورکایسٹر طاقت: اونچی پوٹینسیاں

174 سپائیجیلیا SPIGELIA

(Pink Root)

سیائی جیلیا ایک بودے سے تیار کی جاتی ہے جسے Pink Root یعنی گلائی جڑ کہا جاتا ہے۔ یہ بائیں طرف کے اعصابی دردوں کے علاج میں بہت شہرت رکھتی ہے لیکن وجع المفاصل کے علاج میں بھی اسے اونجامقام حاصل ہے۔ ایسے مریض جو جوڑول کے درد میں مبتلا ہوں ان کے اعصاب بھی اس بہاری سے متاثر ہو کر بہت زودحس ہو جاتے ہیں۔ وہ اعصابی دردجن کی جڑ وجع المفاصل میں ہولیکن بظاہراعصابی تکلیف معلوم ہوتی ہوان میں سائی جیلیا بہت مفید دوا ہے۔ دل کی بہاریوں سے بھی اس کا تعلق ہے۔ دل کے بردول کی سوزش اور دل کی تیز دھڑکن میں بہت کام آتی ہے۔ چبرے کے بائیں طرف کے اعصابی در دوں میں بہت مؤثر ہے۔اس کے بارے میں اکثر قابل ہومیو پیتھک معالجین کا کہنا ہے کہ گردن سے لے کرچپرے تک کے کوئی اعصابی در دسیائی جیلیا کے دائر ہ کار سے باہر نہیں لیعض دفعہ گردن اور کندھے کے جوڑوں میں درد مستقل صورت میں تھہر جاتا ہے۔ گرم ٹکور کرنے سے آ رام آتا ہے۔ سیائی جیلیا کی تکلیفیں سردی سے بڑھتی ہیں کیکن درد میں جلن یائی جاتی ہے جیسے آ گسی لگی ہواور درد کے کوندے شعلوں کی طرح لیکتے ہیں یا ایسے لگتا ہے کہ گرم تاروں سے ماؤف جگہ کوجکڑ دیا گیا ہے اوراعصاب کے کناروں پربھی گرمی کا شدیدا حساس ہوتا ہے۔ایسی کیفیت میں سیائی جیلیا کوہیں بھولنا جاہئے ۔حتی المقدور ایلوپیتھکٹیکوں سے احتر از کرنا جاہے جوان دردوں کے دبانے میں مفیدتو ثابت ہوتے ہیں کیکن اگر ٹیکہ غلط لگ جائے تو دائمی نقصان کا موجب بن سکتا ہے۔ سیائی جیلیا کام کرے تو کسی ٹیکے کی ضرورت نہیں بڑتی اور اگر

سپائی جیلیا کام نہ کرے تو دوسری بالمثل ہومیود واؤں کی تلاش کرنی حیاہئے۔

آ تکھوں کا درد جواعصاب سے تعلق رکھتا ہواور سردی لگنے سے شروع ہواس میں درد کی لہریں آئکھ کے اعصاب میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔سپائی جیلیا کے در دسارے جسم میں دوڑتے پھرتے ہیں۔

سپائی جیلیا قرل کی بعض بیماریوں میں بھی بہت مفید ہے۔ پیری کارڈائیٹس (Pericarditis) دونوں میں سپائی جیلیا کام آتی (Pericarditis) دونوں میں سپائی جیلیا کام آتی ہے۔ ان کی تفصیل ہے ہے کہ پیری کارڈائیٹس دل کے اردگر دکی جھلیوں میں سوزش کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے بخار اور سینے میں در دہوتا ہے اور اینڈ وکارڈائیٹس دل کی جھلی اور والوکی سوزش کو کہتے ہیں جوعموماً بیکٹیریا کے افکیشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سانس لینے میں دفت ہوتی ہے۔ بخار ہوجا تا ہے اور دل کافعل درست نہیں رہتا۔

سپائی جیلیا کی دماغی علامات میں کمزور یا دداشت، ہر چیز سے بے رغبتی، بے چینی اور پریشانی نمایاں ہوتے ہیں۔ اچپانک اٹھ کر کھڑا ہونے پر چکر آتے ہیں غالبًا بلڈ پریشر کم یا زیادہ ہوجا تا ہے یا بعض دفعہ کان کے مائع کا توازن برقر ارنہیں رہتا۔ کان کی انفیکشن سے بھی ایسا ہوسکتا ہے۔ سخت درد کے باوجود غنودگی ہی رہتی ہے۔ سراونچا کرکے لیٹنے سے آرام محسوس ہوتا ہے۔ اگر مریض سامنے کی طرف جھکے تو تکلیف بڑھتی ہے۔

سپائی جیلیا میں درد دائیں اور بائیں دونوں طرف ہوتے ہیں لیکن عام طور پر سپائی جیلیا بائیں طرف کی دوا ہے اور سینگو نیریا دائیں طرف کی ۔ سپائی جیلیا سے اثر پذیر ہونے والا جو درد گدی سے شروع ہوتا ہے وہ بھی دائیں طرف اپنا مقام بنا تا ہے اور بھی بائیں طرف اوراس میں دھڑکن ہوتی ہے اور درد کی لہریں دوڑتی پھرتی ہیں۔ بیدر دما تھے پر آ کر بھی دائیں اور بھی بائیں آئی میں گھہر جاتا ہے۔ درد کے ساتھ بیا حساس ہوتا ہے کہ سر پرکس کر کیڑ ابندھا ہوا ہے۔ بعض دفعہ درد کی شدت سے مریض ٹھنڈ ا ہوجاتا ہے، پسنے چھوٹ جاتے ہیں اور الٹیاں آنے گئی ہیں۔ ایسے مریض کو فوراً گرم لحاف اوڑھا کر قہوہ وغیرہ پلانا چاہئے اور بلاتا خیر سپائی جیلیا شروع کرا دینی چاہئے۔

درد کی غیر معمولی زود حسی ان سب دواؤں میں پائی جاتی ہے۔ پلسٹیلا، ہیپر سلف، کیمومیلا، آگزیلک ایسٹر،ان کااینے ابواب میں مطالعہ کریں۔

سپائی جیلیا میں اعصاب کے اندر تکلیف محسوں ہوتی ہے جس کی وجہ سوزش اور چوٹ وغیرہ نہیں ہوتی ۔ یہ دردا تناشدید ہوتا ہے کہ درد کی کئیریں بیرونی جلد پر سرخی کی صورت میں دکھائی ویئے گئی ہیں۔ غالبًا خون کا دوران زیادہ ہوجا تا ہے۔ یہ سپائی جیلیا کی خاص علامت ہے۔ سرخی کی کئیریں صرف ماؤف جگہ پر ہی ابھرتی ہیں۔ چھنے والے دردوں میں کمس نا قابل برداشت ہوتا ہے۔

سپائی جیلیا میں آئکھیں بہت بڑی محسوس ہوتی ہیں،نظر ایک جگہ نہیں ٹھہرتی اور بعض دفعہ ایک چیز اپنی اصل جگہ سے ہٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آئکھول میں درد کے ساتھ سخت دباؤمحسوس ہوتا ہے۔ آئکھ کا ڈیلا ہلائیں تو درد بڑھ جاتا ہے۔ اس میں سرخی نہیں ہوتی۔ صاف ستھری آئکھ میں درد ہوتو اکثر اعصاب کا قصور ہوتا ہے۔ آئکھ ہلانے سے بھی سر چکرانے لگتا

آ نکھیں روشنی سے زور حس ہوتی ہیں۔ آنکھوں سے پانی بہتا ہے۔ چہرے کا اعصابی دردر خساروں کی ہڈیوں، آنکھوں، آنتوں اور کنیٹیوں تک پھیل جاتا ہے۔ جھکنے سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔

سپائی جلیا انتر یوں کے کیڑوں کے لئے بھی مفیدہے۔

دافع اثر دوائیں: پلسٹیلا طاقت: 30اوراونچی پڑینسی دی جاسکتی ہے۔

175

سيبونجيا لوسطا

SPONGIA TOSTA

(Roasted Sponge)

ا منیخ سمندر میں پائی جانے والی زندگی کی ایک ایک ایک این قتم ہے جسے آئی جانوروں میں شار
کیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ چٹانوں اور پھروں سے چپکے رہتے ہیں اور حرکت نہیں کرتے۔ اگر
ان کا کوئی حصہ ٹوٹ جائے یا کٹ کرالگ ہوجائے تو وہ کسی پھر یلی سطح پر چہٹ کر بہت تیزی
سے بڑھنے لگتا ہے اور ایک نیا آفنج وجود میں آجا تا ہے۔ مرنے کے بعدان کے جسم سطح سمندر پر
تیرنے لگتے ہیں۔ پھولوگ انہیں اکھا کر کے فروخت کرتے ہیں اور یہی ان کا ذریعہ معاش
ہے۔ آفنج میں یہ خوبی ہے کہ اس کو دبایا جائے تو اس میں موجود سب پانی نکل جاتا ہے اور پھر یہ
خود بخو دا پنے اصل جم پر واپس آجا تا ہے۔ اس کی بیخاصیت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ سوسال بھی
پڑار ہے تو اسی طرح رہے گا۔ اسے بہت ہی گھریلوضروریات میں استعال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے جلا کرکئی دواؤں میں بھی شامل کیا جاتا رہا ہے۔

ہومیو پیتھی طریق علاج میں اسے بھون کر جو دوا تیار کی جاتی ہے وہ بہت سی یاریوں میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کا زیادہ تعلق دموی کھانسیوں اور دل کی تکالیف سے ہے۔ دل کمزور اور پھلپھلا سا ہو جائے ، اس میں پوری جان نہ رہے اور اعصاب ڈھیلے پڑ جائیں تو اس کے نتیجہ میں کھانسی اٹھتی ہے اور دمہ بھی ہوجا تا ہے۔ اسے اعصاب ڈھیلے پڑ جائیں تو اس کے نتیجہ میں کھانسی اٹھتی ہے اور دمہ بھی ہوجا تا ہے۔ اس میں اعصاب ڈھیلے پڑ جائیں تو اس کی کمزوری سے تعلق رکھنے والی کھانسی کہتے ہیں۔ اس میں سپونجیا چوٹی کی دوا ہے۔ اس کھانسی کی ایک خاص پہچان یہ ہے کہ کھس کھس کی آ وازیں آ تی ہیں جیسے آ را چل رہا ہو۔ اگر یہ پہچان نہ بھی ہوتو دل کی کمزوری سے جو کھانسی پیدا

ہواس میں سپونجیا ضروراچھااثر دکھاتی ہے۔الیی کھانسی میں جوسپونجیا کی محتاج ہو،اس میں دوسری دوائیں کا منہیں کریں گیاس میں سپونجیا ہی دینی پڑے گی۔

دل کی کمزوری سے تعلق رکھنے والے دمہ میں خوف بھی پایا جائے، سانس اکھڑے اکھڑے اور دمہ کی دوسری دوائیں کام نہ کر اکھڑے ہوں، دل کے مقام پر کچاپن محسوس ہواور دمہ کی دوسری دوائیں کام نہ کر رہی ہوں تو سپونجیا کو پیش نظر رکھنا چا ہے ایسے مشکل وقتوں میں یہ بڑی کار آمد ثابت ہوتی ہے۔

سپونجیا کو ایکونائٹ سے بھی مشابہت ہے۔ ایکونائٹ میں بہت خوف ہوتا ہے۔

سپونجیا میں بھی بہت خوف ماتا ہے۔ دل کے دموی مریض کا خوف بسااوقات سپونجیا کی شاند ہی کرتا ہے۔

رات کوآئکھ کھے تو سپونجیا کے مریض کو پیٹنیں چاتا کہ وہ خود کہاں ہے۔ دروازہ اور کھڑی کہاں ہے۔ یہ کیفیت روزمرہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے جومرض کی نشاندہی کرتی ہے اور یہ دماغی انتشار سپونجیا میں نمایاں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اور دواؤں میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے۔ جہاں تک گھبراہٹ اور جھٹکے ہے آئکھ کھلنے کا تعلق دواؤں میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے۔ جہاں تک گھبراہٹ اور جھٹکے ہے آئکھ کھلنے کا تعلق ہو وہ گرائینڈ ملیا اور آرسنک میں بھی بہت نمایاں ہے لیکن یہ احساس کہ نہ معلوم میں کہاں ہوں، سپونجیا کے علاوہ فاسفورس، لیسس ، کار بووج کہ گلونائن، لائیکو پوڈیم اور ایسکولس میں بھی پایا جاتا ہے۔ سپونجیا کا مریض رات کے کسی حصہ میں جب بھی اٹھے گا ذہنی انتشار کا شکار ہوگا۔

اگر دل آ ہستہ آ ہستہ کا مریض رات کے کسی حصہ میں جب بھی اٹھے گا ذہنی انتشار کا شکار ہوگا۔

جاتا ہے۔ سپونجیا اس میں بھی مفید ہے۔ دل پھیل جائے تو عام طور پر اپنی اصل سائز سے بڑا ہو جائے تو سپونجیا اس میں بھی مفید ثابت ہوتی ہیں ان میں سپونجیا بھی شامل ہے۔ اس بارہ میں رسٹاکس کا خصوصیت سے مطالعہ کریں۔ سپونجیا کے ساتھ دل کی عموی طاقت کے لئے کریٹیگس ور (Crataegus, Q.) بھی استعال کرنی چاہئے۔

سپونجیا گرم مزاج دواہے۔مریض کوگرمی زیادہ گئی ہے۔ کھلی ہوا کو پہند کرتا ہے۔ گرم کمرے میں تکلیف بڑھتی ہے۔ چھونے اور دبانے سے علامات بڑھ جاتی ہیں۔ حرکت کرنے، چلنے اور جھکنے سے بھی تکلیفوں میں اضافہ ہوتا ہے۔سردی کے موسم میں تکلیفوں میں کمی ہوتی ہے لیکن ٹھنڈی ہواسے کھانسی میں اضافہ ہوجاتا ہے۔

سپونجیا گلہڑ لینی تھائی رائیڈ گلینڈ کے بڑھنے میں مفید دوا ہے۔اس کی گلٹیاں پھر کی طرح سخت نہیں ہوتیں بلکہ اسفنج کی طرح نرم نرم اور انگلی کے دباؤ سے دبنے والی ہوتی ہیں۔ سپونجیا میں رحم کے غدود بھی بڑھ جاتے ہیں۔وہ بھی اشفنج کی طرح بھلبھلے ہوتے ہیں۔

جن بچوں کے غدود پھیل جا کیں اور جسم لٹکا ہوا ڈھیلا ڈھالا ہوان کے لئے بھی سپونجیا مفید ثابت ہوسکتی ہے۔ بعض لوگوں کی ٹھوڑی دہری ہوجاتی ہے اور نرم نرم گوشت لٹکنے لگتا ہے۔ سپونجیا کے بارے میں کہاجا تاہے کہ بیاس کے لئے مفید ہے۔

سپونجیا کی ایک دلچیپ علامت یہ ہے کہ میٹھا کھانے سے گلاخراب ہوجاتا ہے۔

30 کی طاقت میں سپونجیا فاکدہ دیتی ہے۔اس دوران میٹھی چیزوں سے پر ہیز کریں۔ چند دنوں کے بعد میٹھا کھا کر دیکھنا چاہئے کہ فرق پڑا ہے یا نہیں۔اگر فرق نہ پڑے تو پھر 200 طاقت استعال کرنی چاہئے۔سپونجیا میں مریض رات کو بہت بے چین رہتا ہے، پرسکون نیند نہیں آتی، سوتے ہوئے جھٹکے لگتے ہیں، نیند میں تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں اور دن کو بھی پرسکون نیند نہیں آتی۔ سپونجیا دل کی جھلیوں کی سوزش اور دل میں افعیکشن کے لئے بہت مفید ہے۔
سپونجیا کا مریض معمولی ہی جسمانی محنت سے تھک جاتا ہے۔سرکی طرف دوران خون ہوتا ہے اور سرور دشد بید ہوتا ہے اور آئکھوں سے لیس دار رطوبت نگلتی ہے۔خشک نزلہ جس میں بوتا ہے اور سرور دشد بید ہوتا ہے اور آئکھوں سے لیس دار رطوبت نگلتی ہے۔خشک نزلہ جس میں ناک بندر ہتا ہے، منہ میں آبلے بنتے ہیں، حلق میں چھن اور خشکی ، دکھن اور در دکا احساس ہوتا ہے اور گلے میں سرسرا ہے کے ساتھ کھانی اٹھتی ہے۔

سپونجیا میں شدید بھوک اور پیاس کی علامت یائی جاتی ہے۔ منہ کا ذا کقہ کڑوا رہتا

ہے۔ عورتوں میں حیض کے خون کی مقدار کم ہوتی ہے اور حیض سے قبل کمر میں درد، شدید بھوک اور دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے۔ دوران حیض مریضہ رات کودل کھٹنے کی وجہ سے اٹھ جاتی ہے۔ مسلسل کھانسی دمہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

سپونجیا کے مریض کی علامتیں سٹر ھیاں چڑھنے سے، کھلی ہوا میں اور آ دھی رات سے قبل بڑھ جاتی ہیں۔ سرنیجا کرکے لیٹنے سے نیز سٹر ھیاں اتر تے ہوئے کمی ہوجاتی ہے۔

طاقت: 30

769 August 769

176 سطينم

STANNUM METALLICUM

(Tin)

سٹینم ایک دھات ہے جسے برتنوں پر قلعی کرنے کے لئے استعال کیا جاتا ہے۔
ہومیو پیتھی میں اس کا استعال عموماً کم کیا جاتا ہے لیکن میں نے اسے بہت اہم اور مفید دوا پایا
ہے۔ پھیچھڑ ول کی تکلیفول کو کم کرنے کے لئے خواہ وہ سل کے آخری مقام تک پہنچ چکی
ہوں، عموماً مفید ہے۔ بلغمی مزاح کے لئے بہت اچھی دوا ہے۔ دن میں ہونے والے سر درد
میں جورات کو کم ہوجا ئیں مفید ثابت ہوتی ہے مگر اس کا سب سے اچھا استعال پھیچھڑ وں کی
علامات کو زم کرنے اور پیٹ کے کیڑوں کے لئے ہوتا ہے۔ شینم کے باب میں عموماً کیڑوں کا
ذکر نہیں ماتا ریبرٹریز (Repertories) اس کا ضرور ذکر کرتی ہیں۔ تجربہ بتاتا ہے کہ پیٹ
کے کیڑوں میں شینم کو لمباع صد دیا جائے تو کچھڑ صد کے بعدوہ بے جان ہو کریا پگھل کی گھل کر
نکل جاتے ہیں۔ اس کو کم از کم چند ماہ ضرور استعال کرنا چاہئے۔ شینم سکے کے الحدوم کے بعدوہ ہے۔ شینم سکے کے الحدوم کے بعدوہ کے مثین سکے کے الحدوم کے بعدوہ کے میں۔ اس کو کم از کم چند ماہ ضرور استعال کرنا چاہئے۔ شینم سکے کے Poisoning تریات کے طور پر بھی مفید ہے۔

سٹینم منہ کے چھالوں میں بھی کا م آتی ہیں۔

جن علاقوں میں قلعی شدہ برتن استعال ہوتے ہیں وہاں پائی جانے والی معدے اورا نتر یوں کی بیاری میں شینم کوفرا موش نہیں کرنا چاہئے ۔مغربی ممالک میں چونکہ قلعی کئے ہوئے برتنوں کا رواج نہیں ہے اس لئے وہاں شینم کی بھی اتنی ضرورت پیش نہیں آتی ۔ ہوئے برتنوں کا رواج نہیں ہے اس لئے وہاں شینم کی بھی اتنی ضرورت پیش نہیں آتی ۔ ہاں مغربی ملکوں میں کھانے اور مشروبات بکثرت لوہے کے ایسے ڈبوں میں سربمہر کئے جاتے ہیں جن کے اندر'' ٹن' یعنی شینم کی ایک تہ سے کھانوں اور مشروبات کو بیرونی ڈبے کے اثر سے محفوظ کیا جاتا ہے۔اس لئے جہاں بھی یہ بکثرت استعال کیا جائے وہاں وہاں

^{سی}نم 770

سٹینم کی علامتیں پائی جاسکتی ہیں۔

سٹینم جلد پکھل جانے والی دھات ہے اور اس سے بنی ہوئی دواسٹینم بلغم کو بھی جلد پکھلا
دیتی ہے۔ اگر پھیپھرٹے ہے بھاری ہوجا کیں اور سوزش کی وجہ سے تختی پیدا ہوجائے توسٹینم
بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس میں دردیں دن کو بڑھتی ہیں۔ سورج پڑھنے سے تکلیف کا آغاز
ہوتا ہے جو آ ہستہ آ ہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور دن ڈھلنے کے ساتھ ساتھ تکلیف میں کمی ہونے
لگتی ہے جوغروب آ فتاب کے وقت بالکل ختم ہوجاتی ہے۔

دھوپ سے سر درد میں اضافہ ہوتو نیٹر م میوراور سینگو نیریا وغیرہ مفید ہیں۔ شینم بھی ان میں شامل ہے۔

سٹینم میں ایک خاص بات ہیہ ہے کہ اگر سردی گلے تو اعصاب پرحملہ ہوجا تا ہے اور <u>منہ</u> پر اعصا <u>بی</u> دردیں شروع ہوجاتی ہیں۔

سٹینم میں ایک اور علامت یہ ہے کہ چھاتی میں کمزوری محسوں ہوتی ہے اور بولئے سے
یوں لگتا ہے جیسے اندر سے چھاتی جواب دے گئی ہے۔ سٹینم میں چھاتی کمزورہ وجاتی ہے اور یوں
معلوم ہوتا ہے جیسے پھیپھڑوں میں جان ہیں رہی۔ سینے کی کمزوری کی وجہ سے آ واز نہیں نکتی
اور بولنے کی طاقت میں کمی آ جاتی ہے۔ گئی ایسے مریض ہیں جن کو یہ تکلیف مستقل ہوجاتی ہے۔
ایسے لوگوں کو اونچی طاقت میں سٹینم دینی چاہئے۔ پندرہ بیس دن کے بعداونچی طاقت کی ایک
ایک خوراک چند ماہ تک استعمال کریں تو جیرت انگیز انقلا بی تبدیلیاں پیدا ہونے گئی ہیں۔
ایک خوراک چند ماہ تک استعمال کریں تو جیرت انگیز انقلا بی تبدیلیاں پیدا ہونے گئی ہیں۔
جہاں بھی سل کی علامت متلی بھی ہے۔ کھانا لیکانے کی بوسے بھی کا کچیکم
کی طرح متلی ہوتی ہے اور منہ کا مزہ کڑوا ہوجا تا ہے۔ معدہ خالی ہونے کا احساس
کی طرح متلی ہوتی ہوتی ہوتا ہے۔ کمزوری کا احساس غالب ہوتا ہے
خصوصاً سینے میں زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ بات کرنا بھی مشکل لگتا ہے۔ خشک کھانسی
خصوصاً سینے میں زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ بات کرنا بھی مشکل لگتا ہے۔ خشک کھانسی

771

رفتہ رفتہ بڑھتی ہوئی کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔موسم کی تبدیلی کو بہت شدت سے محسوں کرتا ہے۔دل میں شدید دھڑکن پائی جاتی ہے۔معمولی محنت سے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ دل میں شدید دھڑکن پائی جاتی ہے۔معمولی محسوس ہوتے ہیں۔شنج بھی ہو جاتا ہے اور اگو مٹھے ہتھیایوں کی طرف تھنچ جاتے ہیں جو پلمبم کی بھی نمایاں علامت ہے۔

سٹینم کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ سٹر ھیاں اترتے ہوئے بھی کمزوری کا احساس ہوتا ہے جب کہ اکثر عوارض میں مریض کے لئے صرف سٹر ھیاں چڑ ھناد شوار ہوتا ہے۔ کلائی اور ہاتھوں کے عضلات میں شنج اور لکھتے ہوئے یا ٹائپ کرتے ہوئے انگلیوں میں جھٹکے لگنا اس کی خاص علامات ہیں۔

عورتوں میں حیض بہت جلداور مقدار میں زیادہ آتے ہیں۔رحم میں شدید خارش اور پنچے گرنے کا احساس بھی ہوتا ہے۔زردی مائل یا سفید رطوبت نکلتی ہے جس کی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے۔

سٹینم میں بیاری کی علامات چھونے سے زیادہ ہوجاتی ہیں لیکن دبانے سے یا کسی سخت چیز پر سونے سے آ رام آتا ہے۔ درد آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں اوراسی رفتار سے کم ہوتے ہیں مگر سرکا درد آہستہ آہستہ ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک دم ختم ہوجاتا ہے۔

مددگاردوا: پلسٹیلا طاقت: 30سے 200 تک

177

سٹفی سیکریا

STAPHYSAGRIA

(Stavesacre)

سٹفی سیریا ایک بودے کے بیجوں سے تیار کی جانے والی دوا ہے۔ اس کا بودا انگور کی بیل کے مشابہ ہوتا ہے جس پر کاسنی اور نیلے رنگ کے بیمول کھلتے ہیں۔ قدیم سے ہی اس کے بیمل کوئی بیار یوں کے علاج کے لئے استعال کیا جاتا رہا ہے۔ معدہ کی صفائی کے لئے قے لانے کے علاوہ اسے بیرونی طور پر خارش اور جو کیس مارنے کے لئے اور مسوں کو دور کرنے کے لئے استعال کیا جاتا تھا۔ ہومیو بیتھی میں اس کے بیجوں سے جودوا تیار کی جاتی ہے سٹفی سیریا کہلاتی ہے۔

سٹیفی سیریا ایک بہت ہی اہم دواہے کیونکہ اس کا اعصاب سے بہت گہر اتعلق ہے۔اگر
اس کے مریض کی شناخت ہوجائے تو بہت سے ایسے مرض جوقا بو میں نہیں آتے ،وہ اس دواسے قابو
میں آسکتے ہیں۔ سٹیفی سیگریا ایسے مریض کی دواہے جو بہت حساس اور شائستہ مزاج ہو۔ بعض حساس
میں آسکتے ہیں۔ سٹیفی سیگریا ایسے مریض کی دواہے جو بہت حساس اور شائستہ مزاج ہو۔ بعض حساس
لوگ اپنے غصہ کا ایک دم اظہار کر دیتے ہیں اور مدمقابل پر برس پڑتے ہیں کیکن کچھ لوگ اسے برداشت
کر جاتے ہیں۔ بعض زود حس اور نازک مزاج عور تیں غصہ کی حالت میں گنگ ہی ہوجاتی ہیں، ایک
لفظ تک نہیں بولتیں اور اپنی شرافت کی وجہ سے غصہ کو دبا دیتی ہیں مگر بعد میں اس کا بدا ثر ظاہر ہوتا
ہے اور سر میں درد اور شدید بے چینی شروع ہوجاتی ہے۔ دو چاردن سخت افسر دہ رہتی ہیں۔ ایسے
مریضوں کی گھٹ گھٹ کر پیدا ہونے والی بعض جسمانی بیاریاں انہیں آگھر تی ہیں جو دراصل
یا پیٹ درد کے دورے بڑنے لگتے ہیں اور ان سے ملتی جلتی بیاریاں انہیں آگھر تی ہیں جو دراصل
ان کی اعصابی تکلیف کا ہی مظہر ہوتی ہیں۔ ہر وہ بیاری جو مسلسل غصہ، تکلیف اور شرمندگی

برداشت کرنے کے نتیجہ میں ہواس میں سٹیفی سیگریا کواول مرتبہ حاصل ہے۔ قریبی عزیزوں کی زیادتی کے خلاف غصہ دبانے کے نتیجہ میں عموماً سیپیا کی مریضہ بنتی ہے۔

سٹیمی سیگریا کے مریض کے چھوٹے اور معمولی زخم کوا گر چھوا جائے تو شدید شنجی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جواعصا بی زود حسی کا طبعی نتیجہ ہوتی ہے۔

بواسير كےمسول ميں بھي سخت تكليف محسوس ہوتى ہے اور مريضه چھوٹى جھوٹى جسمانى بیار یوں پرشدید تکلیف کا اظہار کرتی ہے۔اس کےاعصاب میں اتنا تناؤ ہوتا ہے کہوہ چھوٹی سی تکلیف کوبھی بہت شدت سے محسوں کرتی ہے۔ ملنے جلنے والے لوگ اس کے بارے میں کہنے لگتے ہیں کہ بہانہ کرتی ہے۔ یہ باتیں سن کراس کی تکلیف اور بھی بڑھ جاتی ہے اور بعض دفعہ اسے بے ہونثی کے دورے بڑنے لگتے ہیں۔ایسی مریضاؤں کوسٹفی سیکریا دینا ضروری ہے۔اس کے تعلق میں جو بیاریاں سامنے آتی ہیں وہ خاموشی کے دور ہے، بےخوا بی جسم میں تھ کا وٹ، زہنی کوفت، سوینے شبحصنے کی صلاحیت میں کمی ، بات بھول جانااور مثانے میں بے چینی کی وجہ سے کثرت پیشاب وغیرہ وغیرہ ہیں۔قوت سامعہاورقوت شامہمتاثر ہوتی ہیں اور انگلیوں کے پورے بھی زودس ہو جاتے ہیں۔معمولی می آ وازبھی برداشت نہیں ہوتی۔ جلد پر بھی بیاریاں ظاہر ہوتی ہیں۔سریر ایگزیما ہوجاتا ہے جس میں کوئی پھوڑا پھنسی وغیرہ ہیں ہوتے لیکن شدید در داور تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ جہاں بھی بیعلامات ہوں وہاں بیدوا کام آتی ہے۔ بعض دفعہ اعصاب پرابھاراور گومڑین جاتے ہیں جن میں شدید در دہوتا ہے۔ سٹفی سگریا میں اعصاب کے غدود جنہیں اصطلاحاً Ganglia (گینگلیا) کہتے ہیں زود حس ہوتے ہیں۔ذرابھی ہاتھ لگ جائے تواجا نک در دشروع ہوجائے گا۔ بغیر ہاتھ لگائے یا دباؤکے بغیران میں در ذہیں ہوتا محض اعصاب کے غیر معمولی حساس ہونے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ مردوں میں بیددوایراسٹیٹ کی تکلیفوں میں مفید ہے۔ پر اسٹیٹ گلینڈز بڑھ جا نیں

تو پیشاب کی تکلیف شروع ہوجاتی ہے۔ بہت سے مریض عمومی دواؤں سے ٹھیک ہوجاتے ہیں لیکن بعض ایسے مریض ہوتے ہیں جن میں عام دوائیں کام نہیں کرتیں اس لئے مختلف وجو ہات دھونڈ نا پڑتی ہیں۔ اگر کسی کا مزاج سٹیفی سگریا سے ماتا ہواور پراسٹیٹ کا مریض ہوتو بید دوا مفید ثابت ہوسکتی ہے۔ پراسٹیٹ کی تکلیف کا فوری علاج ضروری ہے ورنہ یہ تکلیف بڑھ کرمثانہ یا گردوں میں افلیشن بیدا کر دبتی ہے اور بھی کینسر بھی بن جاتا ہے۔ پراسٹیٹ کا کینسر بہت خطرناک ہوتا ہے اور اکثر مہلک ثابت ہوتا ہے۔ اس کینسر میں سلیشیا CM جیرت انگیز اثر دکھاتی ہوتا ہے۔ اس کینسر میں سلیشیا CM جیرت انگیز اثر دکھاتی ہے۔

سٹینی سیریا کودوسری دواؤں کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ استعال کرنا چاہئے یعنی
پہلے کاسٹیکم ، پھر کولوسنتھ اور پھرسٹینی سیریا۔ پیٹ اورانٹر یول کے تعلق میں بیددوا بہت کام کرتی
ہے اور بہت ہی تکلیفیں اور در دجو باریک اعصابی ریشوں سے تعلق رکھتے ہیں دور ہوجاتے ہیں۔
سٹینی سیریا کا سردر دعموماً پچھلے حصہ سے شروع ہوتا ہے اور سارے سرپر پھیل جاتا ہے۔
سرمیں مہاسے بھی ہوتے ہیں۔ اگر میہ بہت خشک اور حساس ہوں توسٹینی سیریا کی علامت ہے۔
سرمیں مہاسے بھی ہوتے ہیں۔ اگر میہ بہت خشک اور حساس ہوں توسٹینی سیریا کی علامت ہے۔
سٹینی سیریا میں مریض اندرونی طور پر کپلیا ہے محسوں کرتا ہے اور بیرونی جسم نہیں لرزتا

سٹیفی سگریا میں حیض کے ایام میں دانتوں میں درد ہوتا ہے۔ دانت سیاہ ہو کر کھر کھر کے ہونے ہوئے ہیں۔ سٹیفی سگریا عورتوں ادر مردوں کی جنسی بیار بول میں بھی بہت مفید ہے۔ بیٹر لیول اور کمر میں درد صبح بستر سے اٹھنے سے پہلے بڑھ جاتا ہے مگر عموماً رات کے وقت آ رام کرنے سے تکلیف میں کی آتی ہے۔

مددگاردوائیں: کاسٹیکم کولوسنتھ دافع اثر دوائیں: کیمفر طاقت: 30سے 200 تک

178

سٹروشیم کاربوئیکم

STRONTIUM CARBONICUM

سٹروشیم کارب ممل جراحی کے بعد پیدا ہونے والی علامات میں بہت مفید ہے۔
سرجن کو چاہئے کہ آپریشن کے دوران اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھے کیونکہ جولوگ آپریشن کے
صدمہ سے اچا نک مفلوج سے ہوجاتے ہیں اور موت کے قریب پہنچ جاتے ہیں ان کے لئے
سٹروشیم کارب بہت اچھی ثابت ہوتی ہے۔ حادثات میں شدید زخمی ہوجانے سے بھی اگر
جسم اچا تک جواب دے جائے تو یہی دواا کسیرثابت ہوتی ہے۔

چوٹیں گئے اور صدمہ پہنچے ہے آرنے اایک ہزار کی طاقت میں دستور کے طور پر دے دی جائے تو اچی چیز ہے لین اگر حادثات کے صدمہ سے مریض ایک دم بے جان سا ہو جائے تو ایسی صورت میں تو سٹر نشیم کارب کے علاوہ کار بووج فوری خطرہ سے نکالنے میں جادو اثر دوا ہے۔ سٹر نوشیم کارب اور کار بووج دونوں اس پہلو سے ایک دوسر کی رقیب دوائیں ہیں۔ بعض ڈاکٹر یہ فرق کرتے ہیں کہ اپریش کے بعد صدمہ پنچ تو سٹر نشیم کارب دیتے ہیں اور عام بھاریوں یا حادثات کے نتیجہ میں پنچ والے صدمہ میں کار بووج کے لیکن یہ کوئی فیصلہ شدہ امر نہیں ہے، ہاں روز مرہ کے دستور کے مطابق اپریشن کے بدا ثرات میں سٹر نوشیم کارب کو اہمیت دینی چاہئے ۔ عموماً اس سے بظاہر مرتے ہوئے جسم میں نئی جان پڑ جاتی ہے۔ جسم گرم ہو جاتا ہے اور مریض آرام سے سوجاتا ہے۔ اگر فائدہ نہ ہوتو کار بووج کار بووج کا جاور روٹیل باتی نہیں رہتا اور مریض موت کے کنار سے بنچ جاتا ہے، کار بووج کا تقاضا کرتی ہے جو مریض کو واپس زندگی کی مریض موت کے کنار سے بختی خاتا ہے، کار بووجاتا ہے اور روٹس کی دوائی کے خوالی کو تول کرنے مریض کو دوائی کار بوجاتا ہے اور روٹس کی دوائی کی کار بوجاتا ہے اور روٹس کی دوائی کی کی دوائی کرتی ہے۔ جسم کا دفاعی نظام بیدار ہوجاتا ہے اور دوسری دوائی کے اثر کو قبول کرنے کی دوائی کی دوائی کی دوائی کی دوائی کار ہوجاتا ہے اور دوسری دوائی کے اثر کو قبول کرنے کی دوائی کی دوائی کی دوائی کے کار بوجاتا ہے اور دوسری دوائی کے اثر کو قبول کرنے کی سے جسم کا دفاعی نظام بیدار ہوجاتا ہے اور دوسری دوائی کے اثر کو قبول کرنے

گتا ہے۔ ہاں صدمہ کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے مقامی عضلاتی فالح میں کاسٹیکم سب سے مؤثر دوا ہے۔ سرکی گدی پر چوٹ گئی ہویا ریڑھ کی بڈی کوصدمہ پہنچا ہوتو آرنیکا 1000 کے ساتھ نیٹر مسلف 1000 ملاکردینی جا ہے۔

ہرانسانی جسم میں بیاریوں کے خلاف دفاع کے سب سامان میسر ہیں۔ان کواستعمال میں کیسے لانا ہے، بیاصل چیلنے ہے جس کا ہومیو پیتھک طریق کے ذریعیہ مقابلہ ہوسکتا ہے۔

سٹر نشیم کارب آئکھوں کے لئے بھی اچھی دوا ہے۔اگر آئکھوں میں درداورسرخی پائی جائے اور پانی بہتا ہواور آئکھ کھو لنے اور پڑھنے سے تکلیف میں اضافہ ہوجائے اور جلن بھی ہوتو پھرسٹر نوشیم کارب بھی مفید دوا ثابت ہوسکتی ہے۔

سٹرنشیم کارب کی ایک اور واضح علامت سے ہے کہاس کے مریض کو <u>گوشت سے</u> نفرت ہوجاتی ہےاورروٹی کھانے کی اشتہاء *بڑھ* جاتی ہے۔

ﷺ فخنے میں موج آنے کے نتیجہ میں جو تکیفیں ہوتی ہیں ان کا تفصیلی ذکر آرنیکا، لیڈم،
ہیلس وغیرہ میں گزر چکا ہے۔ یہ تکیفیں مزمن ہوجا ئیں اور دیگر دواؤں سے قابو میں نہ آئیں تو
سٹر نوشیم کارب بھی دوا ہوسکتی ہے۔ سٹر نوشیم کارب گردن کے پیٹوں کے درد میں بھی مفید
ہے لیکن اس عارضہ کے لئے اسے عموماً 30 طاقت میں استعمال کرنا جا ہئے۔ یہ دوا دائیں
کندھے میں درد کے لئے بھی مفید بتائی گئی ہے۔ اگر وجع المفاصل کے ساتھ اسہال بھی
ہوں، پنڈلیوں اور یاؤں کے بلووں میں تشنج ہواور یاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہوں تو دیگر
کئی دواؤں کی طرح سٹر نوشیم کارب بھی دوا ہوسکتی ہے۔

سٹرنشیم کارب میں مریض کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، وہ گوشت سے عموماً نفرت کرتا ہے۔ وہ سے بھوماً نفرت کرتا ہے۔ ویسے بھی عام کھانے میں مزہ نہیں رہتا۔ رات کے وقت اسہال کی تکلیف بڑھ جاتی ہیں۔ سٹرنشیم کارب کی تکلیفیں موسم کی تبدیلی اور خاموش رہنے سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ مریض سردی بالکل برداشت نہیں کرسکتا۔

179 سلفر

SULPHUR

(Sublimated Sulphur)

سلفران دواؤں میں سے ہے جن کے بغیرایک ہومیو پیتھک معالی کا گزارانہیں چل سکتا۔ یہ غیرمعمولی طاقتور دوا ہے اورانسانی جسم پرجملہ آ ور جراثیم کے مقابلہ کی بنیادی صلاحیت رکھتی ہے اورسورِک (Psoric) دواؤں میں بہت اونچا مقام رکھتی ہے۔ (سوراکی تفصیلی بحث کے لئے سورائینم اور مرکری دیکھئے) سوراکی بیاریوں کوغدودوں سے باہر نکا لنے میں سورائینم اور مرکری کی طرح سلفر بھی سرفہرست ہے۔

بنیادی بات بہ ہے کہ انسانی جسم میں جو قدرتی نظام دفاع موجود ہے اس میں بہ صلاحیت ہے کہ وہ ہرتم کی بیاری کا قلع قمع کر سکے اس لئے اسے ہی قدرتی دفاع کے لئے اکسانا اور ابھارنا چاہئے۔ ہومیو پیتھی میں سلفراسی دفاعی نظام کو حرکت میں لاکر بہت طاقتو را ینٹی بائیوٹک کے طور پر کام کرتی ہے۔ تعفن والی پر انی بیار یوں میں اکثر سلفر کی ضرورت پڑتی ہے۔

سلفراورسلیشیا گرمی اور سردی کے احساس کے لحاظ سے مخالف مزاج رکھتی ہیں۔اس کے باوجودا گرکسی مریض کوسلیشیا دی جارہی ہواور بھی بھی سلفر دی جائے تو بیسلیشیا کے اثر کو تازہ کردیتی ہے اوراس سے متصادم نہیں ہوتی ۔نہ صرف سلیشیا بلکہ دوسری دواؤں سے بھی سلفر کا اکثریہی تعلق ہے۔

بعض اوقات انسانی جسم کچھ عادات کواپنالیتا ہے جورفتہ رفتہ اتنی پختہ ہوجاتی ہیں کہ انہیں چھوڑ نامشکل ہی نہیں ناممکن بن جاتا ہے۔سلفر میں یہ گہری خاصیت پائی جاتی ہے کہ مختلف قسم کی عادتوں اورنشوں کو توڑتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دواجسم پر اثر کرنا

چھوڑ دے تو تھوڑی دریے لئے وہ دوا بند کر کے سلفر استعمال کروا نیں تو پہلی دوا دوبارہ کام شروع کردے گی۔

سلفر کے مثالی مریض کا مزاج لا ابالی ہوتا ہے اور اس کی عادات میں ہے۔ افیمی کو جاتی ہے۔ وہ نہانے سے نفرت کرتا ہے۔ اس پہلو سے اس کا مزاج او پیم سے ماتا ہے۔ افیمی کو بھی نہانے سے نفرت ہوتی ہے۔ سلفر کا مثالی مریض سخت گندہ ہوتا ہے، جسم سے بد ہوآتی ہے اور بغلوں اور پاؤں میں بد بودار پسینہ آتا ہے۔ صفائی کو قطعاً کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی طبیعت میں ایک عجیب تضاد ہوتا ہے کہ با وجود اس کے کہ خود بد بودار ہوتا ہے، اس کی بغلیں، پاؤں اور سانس سب متعفن ہوتے ہیں کین وہ غیروں کی بواسے خود بری کر سکتا۔ اگروہ اپنی ہی بو میں بسار ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن دوسروں کی بواسے خوت بری لگتی ہے۔ دراصل بنیادی طور پر بیات حیوانوں کی فطرت میں ود بعت ہے۔ جانوروں کو بھی اپنی بو بری نہیں گئی۔ شیر کے بھٹ کے پاس سے گزریں تو خطرنا ک بوآتی ہے لین شیر کوا چھی گئی ہے۔ اسے آدمی سے بوآتی ہے۔ اس کی ظور پر سلفرکا ہوجاتی ہو ہوجاتی ہو ۔ اس کی ظور پر سلفرکا ہو سے بھی بیزار ہوجاتا ہے اور اسے قے شروع ہوجاتی ہے۔

سلفر کے مریض جب تک چلتے پھرتے رہیں ٹھیک رہتے ہیں لیکن جونہی بستر میں لیٹ کرگرم ہوں ان کی بہت ہی بیاریاں عود کرآتی ہیں۔ یہ بات سلفر کے علاوہ مرکری میں بھی پائی جاتی ہے اور ان دونوں کے بنیادی مزاج میں داخل ہے۔ گرمی اور سردی دونوں کے مضر ہونے کے لحاظ سے یہ دونوں دوائیں مشابہت رکھتی ہیں لیکن بعض ایسی علامات بھی ہیں جوان دونوں میں تمیز کر دیتی ہیں۔ مثلاً سلفر کے مریض کا منہ عموماً معتدل یا خشک ہوتا ہے لیکن مرکری کے مریض کا منہ عموماً معتدل یا خشک ہوتا ہے لیکن مرکری کے مریض کا منہ بواب سے بھرار ہتا ہے۔ سلفر کی بوانسان کے عام اخراجات کی بوجیسی ہوتی ہے خواہ کتنی سخت ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے اخراجات جلد کو چھیلتے ہیں۔ عورتوں کے لیکوریا میں بھی جو مرکری یاسلفر کی مریضا کیوں یہی علامت یائی جاتی ہے۔

سلفر میں تقریباً ہوتھ کی جلدی امراض ملق ہیں مثلاً چھا لے، خشک خارش ، تر خارش میں جلد پر خشکی سے ایسے جھلکے بن بن کر اتر نا جیسے مجھلی کی جلد پر ہوتے ہیں، خارش سے خون بہتے کا ربحان ، مختلف قسم کے پھوڑ ہے پھنسیاں غرضیکہ ہرقتم کی جلدی امراض جن میں جلن کی علامت نمایاں ہواور دوسری علامتیں بھی ملیں تو ان میں سلفر اکثر فائدہ دے گی۔جلدی امراض میں سلفر کی پوری علامتیں نہ بھی ہوں تو بھی بیماری کو نتھا رکراصل کو سامنے لے آتی ہے۔
میں سلفر کی پوری علامتیں نہ بھی ہوں تو بھی بیماری کو نتھا رکراصل کو سامنے لے آتی ہے۔
مرکی چوٹی ، آئکھوں ، چھاتی اور دونوں کندھوں کے درمیان جلن ہوتی ہے۔ بعض اوقات جسم سے آگ کے شعلے نکلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ بواسیر کے مسول ، چھالوں ، معدہ اور گلے میں بھی جلن میں کی جاری کا حساس ہوتا ہے۔ بیشا ہوگی جلن ہوا آتا ہے ، بعد میں دریتک جلن محسوس ہوتی ہیں اوروہ انہیں بستر سے باہر نکال جلن محسوس ہوتی رہتی ہے۔ مریض کے پاؤل رات کو جلتے ہیں اوروہ انہیں بستر سے باہر نکال کر شفنڈ اکرنا جا ہتا ہے۔ اس پہلو سے پہلسٹیلا کے مشابہ ہے۔

سلفر کے بعض مریض بہت بھوک محسوں ہونے کے باوجود تھوڑ اسا کھانے کے بعد ہی
کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ علامت سب سے زیادہ لائیکو پوڈیم میں پائی جاتی ہے۔سلفر کی
امتیازی علامت یہ ہے کہ مریض کی صبح کی بھوک بالکل غائب مگر گیارہ بجے معدہ میں سخت
کمزوری محسوں ہوتی ہے۔ کھر چن اور نیچ گرنے کا احساس ہوتا ہے۔ فوری کھانے کی طلب اتن
شدید ہوتی ہے کہ ذرا بھی انتظار دو بھر ہوتا ہے جی کہ بھوک سے غثی کا دورہ بھی پڑسکتا ہے کی صبح
اٹھنے کے بعد گیارہ بچے تک بھوک غائب رہتی ہے۔

سلفر کی علامات میں بیبھی داخل ہے کہ جلد بہت حساس ہوتی ہے اور ذراسی رگڑ لگنے سے بھی زخم بن جاتے یا گئے بڑ جاتے ہیں ۔سلفر چنبل کی بہترین دواؤں میں سے ہے۔ مگر محض اس پرانحصار نہیں کیا جاسکتا۔

سلفر کے مریضوں Veinous Systemb یعنی نیلے سیاہی مائل خون کی رگوں کا فظام عموماً خراب ہوتا ہے۔ بواسیر کا مرض اور تکلیف دہ مسول کا ہونا سلفر کی ایک عام علامت ہے۔ بواسیر کے ایسے مریضوں کی علامتیں سلفر دینے سے ابتدا میں بڑھ جاتی ہیں علامت

اور بہت خارش ہونے لگتی ہے جس کا علاج نکس وامیکا ہے۔

بعض اوقات ٹانگوں میں نیلی وریدیں پھول کر جالا سا بنا دیتی ہوں جنہیں

Varicose Veins

کہتے ہیں۔وریدوں میں خون گاڑھا ہوکر جمنے لگتا ہے۔ ہومیو پیتھی
میں بہت ہی الیبی دوائیں ہیں جن کے ذریعہ ان رگوں کی اصلاح ہوسکتی ہے۔ سلفرانہی دواؤں
میں سے ایک ہے۔

سلفر عورتوں کے سن یاس میں بھی کام آتی ہے یعنی اس عمر میں جس میں عورتوں کا حیض بند ہور ہاہو۔اس دور میں عورتوں کے چہرے اور سر پر گری کی لہریں محسوس ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ دل پر بھی خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے لئے پلسٹیلا بھی استعال کی جاتی ہے مگر مجھے اس میں اتنا فائدہ دکھائی نہیں دیا جتنی اس کی شہرت ہے۔ البتہ اکیلی پلسٹیلا کی بجائے بیلا ڈونا ساتھ ملاکردینازیا دہ مفید ہوتا ہے۔ مگر سلفر کی علامتیں واضح ہوں تو سلفراکیلی ہی کافی ہوتی ہے۔ لیکسٹیلا کر دینازیا دہ مفید ہوتا ہے۔ مگر سلفر کی علامتیں واضح ہوں تو سلفراکیلی ہی کافی ہوتی ہے۔ لیکسٹس کی طرح سلفر کی بیاریاں سونے کے بعد بڑھتی ہیں اور مریض گھبرا کراٹھ جاتا ہے۔ رات کے بچھلے پہرزیا دہ گھبرا ہوتی ہے۔ سونے کے بعد بڑھتی ہوتی گھبرا کراٹھتا جسمانی نہیں بلکہ ذہنی ہوتی ہے۔ بیاری کے اثر سے جواعصاب پر بڑتا ہے، مریض گھبرا کراٹھتا ہے اور سخت بے سکون ہوجا تا ہے۔ دن کو گیارہ بیج کے قریب یہ بے چینی معدہ میں ظاہر ہوتی ہے۔ رات کو تکلیف بڑھتی ہوتی ہے مراسر کی گری سے لیکیسس کی طرح محض سونے سے تکلیف نہیں بڑھتی ۔

بعض دفعہ بچے کی پیدائش کے بعداس کے گرد کیٹی ہوئی جھلی (Placenta) کا پچھ حصدرتم میں ہی رہ جاتا ہے اور پوری صفائی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے سخت تعفن والا بخار ہو جاتا ہے۔اس میں سلفراور پائیروجینیم (Pyrogenium) ملا کر دینے سے بہتر کوئی نسخہ نہیں۔ اسی طرح نزلہ زکام کے ساتھ ہونے والا بخار جو عام روز مرہ کی دواؤں سے ٹھیک نہ ہواس میں بھی سلفر 200اور یا ئیروجینیم 200 ملا کر دینے سے افاقہ ہوتا ہے۔

گاؤٹ لیعنی جوڑوں کی تکلیف میں بھی سلفر بہت مفید ہے۔ بعض دفعہ سلفر کھانے _____ سے گاؤٹ کی دنی ہوئی تکلیف جس کی موجود گی کا پہلے علم نہیں ہوتا ، ظاہر ہوجاتی ہے اور مریض خوفز دہ ہوکراس کا استعال جھوڑ دیتا ہے حالانکہ اگر سلفر سے گاؤٹ کی تکلیف ظاہر ہوتو وہی کچھ عرصہ تک دینے سے اس کا مؤثر علاج بھی ثابت ہوتی ہے۔ اگر سلفر بند کر دیں توبیہ بیاری دب جائے گی اور پھر دوسری اندرونی بیاریوں کا پیش خیمہ ہوگی جو بآسانی قابومیں نہیں آ سکتیں۔ ت دق اور پھیچر وں کی امراض میں سلفر میں سلیشیا کی طرح بہت محتاط ہوکر استعمال کرنی جا ہے کیونکہ یہ بھی چھیچے وں کو بہت طاقتورر ڈیمل کا حکم دیتی ہے اورا گرلمبی بہاری سے چھیچو ہے کمزور ہو چکے ہوں تو وہ سخت رغمل کے نتیجہ میں پھٹ بھی سکتے ہیں۔سلفرت دق کے ان مادوں کو جومختلف شکلوں میں خلیوں اور اندرونی پر دوں میں لیٹے پڑے ہوتے ہیں باہر نکالتی ہے کیونکہ سلیشیا کی طرح اس کوبھی اجنبی چیزوں کی موجودگی ناپسند ہے۔سل کے کیڑےاگر زیادہ مقدار میں ہوں تو ان کا اپنی کمین گا ہوں سے باہر نکلنا فائدہ کی بجائے مہلک ثابت ہوسکتا ہے کیونکہ سل کا مریض اپنی کمزوری کی وجہ سے ان کومغلوب کرنے کی بجائے ان سے مغلوب ہو جا تا ہے۔سلیشیا بھی ہراجنبی چیز کو چاہےوہ ریت کا ذرہ ہویا اندر چیپی ہوئی بندوق کی گولی ہویا شیشے کا ٹکڑا ہوضرورجسم سے باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ جراثیم جوزندگی کونقصان پہنچانے والے ہیں ان کےخلاف اتنا طاقتور رقمل پیدا کرتی ہے کہ سل کے بعض مریض اس رقمل کے نتیجہ میں مربھی جاتے ہیں۔ یہ ہومیو پیتھک معالج کا کام ہے کہ کمزور مریض کو اتنی زیادہ طاقت ور دوانہ دے کہ جسم اس سے نیٹ ہی نہ سکے۔مناسب یہی ہے کہ شروع میں دواح چوٹی طاقت میں دی جائے۔اگر فائدہ ہوتو رفتہ رفتہ طاقت بڑھا ئیں نیز مریض کو مدد گار دوائیں مثلاً سٹینم بھی دیں جوآ ہستہ آ ہستہ مریض کی دفاعی طاقت کو بڑھاتی ہے۔

یہ نہ بھولیں کہ مزاج کے لحاظ سے سلفرگرم ہے اور سلیثیا ٹھنڈی ۔ کلکیریا کا رب سل کے فاسد مادوں کو باہر نکالنے کی بجائے ان کے گردانڈوں کے جھپکے کی طرح کیلشیم

کے خول چڑھا دیتی ہے جن کے اندروہ قید ہوجاتے ہیں۔ یا در کھیں کہ کلکیر یا کارب دینے کے معاً بعد سلفرنہیں دینی جا ہے ورنہ کئ قسم کی خرابیاں پیدا ہوسکتی ہیں۔ اگر کلکیر یا کے بعد سلفر دینے سے پہلے ایک د فعد لائیکو بوڈیم دے دیں تواس کے بعد سلفر دی جاسکتی ہے۔

ہر پیز (Herpes) یا Shingals جواعصا بی ریشوں پر نکلنے والے چھالوں کی بیاری ہے،اس میں سلفر بھی اچھا کام کرتی ہے۔

معنبہ کیا ہے کہ سلفر سے منتج کے اسہال کار جمان پایا جائے تو اس میں بھی سلفر مفید ہے لیکن ڈاکٹر کینٹ نے متنبہ کیا ہے کہ سلفر سے منتج کے اسہال رو کئے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے۔ کیونکہ اگر اسہال رک گئے تو وہ چھپچرٹوں کی نکلیفوں کو بڑھا دیں گے جو خطرناک ثابت ہوسکتا ہے۔ اگرسل کے مریض کو اسہال لاحق ہوں تو پہلے نرم دواؤں سے آ ہستہ آ ہستہ اسہال کا علاج کرنا چاہئے اور پھر تی دق کے مرض کو جڑ سے اکھیڑنے کی طرف توجہ دینی چاہئے۔

خسرہ میں بھی سلفر بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اگر جلن اور بے چینی بہت بڑھ جائے لیکن دانے باہر نہ کلیں اور خدشہ ہو کہ بیاری اندرونی جھلیوں پر جملہ نہ کر دیتو سلفر کے علاوہ آرسنگ بھی بہت کارآ مد ہوتی ہے۔ سلفر میں آرسنگ جیسی بے چینی نہیں ہوتی۔ ہاں جلن اور آگے کا احساس آرسنگ سے مشابہ ہوتا ہے۔

ٹیکوں کے بدا ترات دور کرنے میں بھی سلفراچھی دوا ہے۔اس کے علاوہ چنداور دوائیں بھی مفید ہیں۔

سلفر کے مریض کوفلسفی بننے کا بہت شوق ہوتا ہے اور پھھ مزاجاً فلسفی ہوتے بھی ہیں۔اگر یہ شوق جنون کی حد تک بڑھ جائے تو اونچی طافت میں سلفر کی ایک دوخورا کوں سے کافی فرق بڑجا تا ہے۔ان میں بعض اقتصادی فلسفی ہوتے ہیں جو ہر وقت سکیمیں بناتے رہتے ہیں لیکن عملی طور پر پھھیں تو اکثر اپناسارا سرمایہ ڈبو لیکن عملی طور پر پھھیں تو اکثر اپناسارا سرمایہ ڈبو بیٹھتے ہیں۔ بہت ست مزاج ہوتے ہیں۔کسی کام میں ان کا دل نہیں لگتا۔ اپنی سوچوں ہی میں مقیدر ہتے ہیں۔ان کا علاج بھی سلفر کی اونچی طافت ہے۔

سلفر کے مریض کو سردرد بہت ہوتا ہے جس کا دورہ ہفتہ میں ایک دفعہ تو ضرور پڑتا ہے۔ اسے گرمی پہنچانے سے آ رام آتا ہے حالانکہ سلفر کی عمومی تکلیفیں گرمی سے بڑھتی ہیں، خاص طور پر بستر میں گرم ہونے سے اور کمرے کی گرمی سے کیکن سردردکوگرم کمرے میں آ رام ماتا ہے۔ اسی طرح گرم گلورسے بھی فائدہ پہنچتا ہے۔

آ تکھول کے سامنے چنگاریاں اور شعلے ناچتے ہیں۔ بھی سر اوپر اٹھانے سے تارے نظر آنے لگتے ہیں۔ مختلف قتم کے رنگوں کے دھے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ عام طور پر سردرد شروع ہونے سے پہلے ایسا ہوتا ہے۔ اگر شروع میں سلفردے دی جائے تو سردرد ہوگاہی نہیں۔ ہرقتم کے ایگزیما اور خارش میں بھی سلفر مفید ہے۔ پرانے نزلہ، زکام میں اور ناک سے آنے والی بدیو میں بھی یہ فائدہ مند ہے۔ یہ ایسی بدیوہوتی ہے جسے مریض خود بھی محسوس کرتا ہے جبکہ اکثرا بنی بدیو کوخود محسوس نہیں کرتا ہے جبکہ اکثرا بنی بدیو کوخود محسوس نہیں کرتا ہے جبکہ اکثرا بنی بدیو کوخود محسوس نہیں کرتا۔

اگردائیں طرف شدید میں کا اعصابی درد ہوتو اس میں بھی سلفر کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔ اگر ہونٹ کٹے بچھٹے ہوں اور ان میں زخم بنتے ہوں تو سلفر بھی بالمثل دواؤں میں سے ایک ہے غدودوں میں سوزش پیدا ہو جومستقل ہو جائے اور گلے میں سلسلہ وار دائیں بائیں گلٹیاں بننے لگیں تو سلفر بھی دوا ہو سکتی ہے۔ بائیں گلٹیاں بننے لگیں تو سلفر بھی دوا ہو سکتی ہے۔

مسوڑ ھے خراب ہو جائیں اور دانت ڈھیلے ہو کر لٹکنے لگیں تو بھی اگر سلفر مزاجی دوا ہوتو اس کا از الہ کرسکتی ہے مگر صرف ایک دانت میں تکلیف ہوتو سلفر کی بجائے کوئی اور دوا تلاش کریں۔

پیٹ کی ہواؤں میں بہت ہی دوائیں اچھااڑ دکھاتی ہیں لیکن معین دوا کی تلاش بہت مشکل ہے۔اگرکوئی اور دوا کام نہ کر بے قو سلفر مفید ہو سکتی ہے خصوصاً بد بودار ہوا میں۔
سلفر ہیضہ کی ایک بہت اہم دوا ہے۔اگر ہیضہ کی وبا پھیلی ہوتو حفظ ما تقدم کے طور پر کثرت سے سلفر استعال کروانی جائے۔ چند روز 200 طاقت میں دن میں ایک دفعہ سلفر

دیے سے ہیضہ سے بچاؤ ہوجا تا ہے۔اگر اور دوائیں جوعمو ما ہیضہ میں کام آتی ہیں میسر نہ ہوں تو سلفر ہی ایک حد تک اکیلی کافی ہوسکتی ہے۔اس کا ہیضہ سے بہت گہراتعلق ہے۔

سلفر پر اسٹیٹ گلینڈز پر بھی گہرااثر رکھتی ہے اور اسے تھو جا کے ساتھ ملا کر دینا زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اگر مریض کے ہاتھ یا وں اور بغلوں میں بد بودار پسینہیں آتا اور اس کے ہاتھ یا وال اور بھا ہونے کے ہاتھ یا وال میں تو محض پیشاب کی علامتوں کے مشابہ ہونے کے باتھ سلفر کا منہیں کرےگی۔

سلفر **مردانہ وزنانہ کمزوریوں میں** مفید ہے۔عورتوں کے <mark>بانچھ بن میں بھی سلفر</mark>کو اہم مقام حاصل ہے۔

سلفر کے مریض کی ذہنی علامات بہت نمایاں ہوتی ہیں۔ بیا دداشت کمزور ہوتی ہے اور سوچ بچار میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ اور سوچ بچار میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ سر درد جس میں جھکنے سے اضافہ ہو جاتا ہے اور دائمی سر درد جو معین وقفول سے عود کر آتا ہے۔ خشکی سے بال بھی گرتے ہیں۔ یہ سب

علامتیں سلفر کی ما دولاتی ہیں۔

سلفر کے مریض کوسینہ پر دباؤ اور جلن کا احساس رہتا ہے۔ سانس رکتا ہے اور کھلی ہوا پیند کرتا ہے۔ آ دھی رات کودم گھٹتا ہے اور سینے پر ہو جھمحسوس ہوتا ہے۔ سلفر کے مریض کی تکلیفیں آ رام کرنے ، کھڑے ہونے ، بستر کی گرمی سے ، نہانے سے اور ضبح کے وقت بڑھ جاتی ہیں۔ گرم موسم میں دائیں کروٹ لیٹنے سے آ رام آتا ہے۔

وہ لوگ جوکو ئلے کی کا نوں میں کا م کرتے ہیں یا کسی اور رنگ میں کو ئلے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لئے بھی سلفر بہت ضروری دوا ہے کیونکہ یہ کو ئلے کی وجہ سے بیدا ہونے والی بہت سی بیار یوں میں مفید ہے۔

مددگاردوائيں: ايلوسورائينم ايكونائك آرنيكا شينم بائيرولينم تصوجاوغيره طاقت: 30 اوراونچي پوڻينسيال

180 سلفيوريكم ايسيرم

SULPHURICUM ACIDUM

(Sulphuric Acid)

سلفیورک ایسڈسلفرکا تیزاب اورانسانی زندگی پراس کا گہرااثر ہے۔عام برہضمی کے نتیجہ میں معدہ کے اندرسلفیورک ایسڈ پیدا ہوتا ہے اوراس کے اثر سے جو ہوا بنتی ہے اس کی بد بو ہائیڈروجن سلفائیڈ کی طرح ہوتی ہے۔ ہرتیزاب جوانسانی جسم میں موجود ہے بعض ایسی بنیادی خصوصیات کا حامل ہے جو مریضوں پراثر دکھاتی ہیں۔اگرجسم میں کسی بھی تیزاب کا عضر زیادہ ہو جائے تو اچا نک شدیدضعف کا حملہ ہوتا ہے اورجسم سے طاقت نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ سلفیورک ایسڈ معدہ کی ایسی تیزابیت کی بہترین دوا ہے۔اس دوا کے مطالعہ سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عناصر کا توازن بدلنے سے علامتیں کتنی بدل جاتی ہیں۔سلفرایک ایسی دوا ہے جوسر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جلن پیدا کرتی ہے۔لیکن اس کے ساتھ ہائیڈروجن کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جلن پیدا کرتی ہے۔لیکن اس کے ساتھ ہائیڈروجن کے ایٹم کا اضافہ کر دیں تو سلفیورک ایسڈ بن جائے گا جس کا مزاج سلفر کے عمومی مزاج سے مختلف ہے۔اس کے مریض کوسر دی سے بھی تکلیف ہوتی ہے اورگری سے بھی۔

سلفیورک ایسڈ کی ایک علامت یہ ہے کہ مریض کے سار ہے جسم پر کیکی طاری ہوجاتی ہے لیکن اس کا سردی کے احساس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ اس کے بغیر ہی جسم میں تفر تقر اہٹ اورلرزہ طاری ہوجا تا ہے ۔ سلفیورک ایسڈ میں کا لے رنگ کا خون بہنے کا بھی رجحان ہوتا ہے ۔ ناخن کی پوروں اور جہاں جلدا ندرونی جھلیوں سے ملتی ہے ان جوڑوں سے کا لاخون بہنے لگتا ہے جیسے سانپ کا زہرجسم میں سرایت کرنے سے ہوتا ہے ۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جلد کے اندرخون کا اخراج ہوجانے کی وجہ سے اس خون

میں طبعًا باہر کی طرف نکلنے کار جحان ملتاہے۔

بعض دفعہ جلد پر بلاوجہ سرخ خون کے دھیے پڑ جاتے ہیں۔ یہ دھیے سیاہی مائل بھی ہوتے ہیں۔ یہ دھیے سیاہی مائل بھی ہوتے ہیں جو کیچے کیچے اور بہت بدزیب نظر آتے ہیں۔ چہرے پر بعض بہت سی ایسی بیاریاں ظاہر ہوتی ہیں جن کی تشخیص معالجین کے لئے بہت مشکل کام ہے۔ سلفیورک ایسڈ کے مزاج میں اس قتم کا اندرونی جریان خون داخل ہے لیکن اس کے علاوہ اور ادویہ میں بھی یہ رجحان ماتا ہے۔

سلفیورک ایسڈ بہت سی جلدی امراض میں مفید ہے۔ اگر عمومی دواؤں کا مزاج معلوم ہوتو ضرور فائدہ پہنچتا ہے۔سلفیورک ایسٹر کی بعض علامتیں سلفر سے بھی ملتی ہیں۔سلفر میں صبح کے وقت بعض تکلیفیں نمایاں ہوجاتی ہیں مثلاً اسہال۔

سلفیورک ایسڈ معدہ کی تیزابیت کے لئے ایک اچھی دوا ہے۔سلفیورک ایسڈ میں اور نیکا کی بعض علامتیں پائی جاتی ہیں۔آرنیکا کی طرح جسم میں چوٹوں کا احساس، درد، کمزوری اور نیکا کی بعض علامتیں پائی جاتی ہیں۔جلد پرخون دھبوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ ان دھبوں کا رنگ سیابی مائل پانیلا ہوتا ہے لیکن ایک علامت آرنیکا میں نہیں ہے جواس میں ہے کہ خون اندر سے اہل کر جلد کے نیچ ظیوں کو بھر دیتا ہے جس کی وجہ بچھ میں نہیں آتی ۔جلد پر بھی خون کے چھالے سے بن جاتے ہیں اور چھلنے لگتے ہیں جواندرونی بھاری کا مظہر ہیں۔اس مرض میں سلفیورک ایسڈ ایک بہت اہم دوا ہے۔اگر سلفیورک ایسڈ کی عمومی علامتیں موجود ہوں تو ایک دو خوراکوں سے ہی آرام آجاتا ہے۔سلفیورک ایسڈ کے مریض کے اعصاب جلد جواب دے جاتے ہیں اور خون کا نظام معمولی بے احتیاطی سے بھی بگڑ جاتا ہے۔اس میں خون کی گہری خرابیاں پائی جاتی ہیں۔جلد پر پھوڑ ہے بھی بننے لگتے ہیں۔ کمزوری محسوس ہوتی ہے۔رنگ خراب ہو جاتی ہیں۔جلد پر پھوڑ ہے بھی بننے لگتے ہیں۔ کمزوری محسوس ہوتی ہے۔رنگ خراب ہو جاتی ہیں۔جلد پر بھوڑ ہے ہیں۔ایسڈ سلف کی زیادتی سے جو بیاریاں خطرناک اور لمبا خراب ہو جاتی ہیں گئی جاتے ہیں۔ایسڈ سلف کی زیادتی سے جو بیاریاں خطرناک اور لمبا پر صفحتے ہیں لیکن اچا تک ختم ہو جاتے ہیں۔ایسڈ سلف کی زیادتی سے جو بیاریاں خطرناک اور لمبا پر صفحتے ہیں لیکن اچا تک ختم ہو جاتے ہیں۔ایسڈ سلف کی زیادتی سے جو بیاریاں خطرناک اور لمبا

چلنے والی دکھائی دیتی ہیں وہ بسااوقات عارضی اثر ات رکھتی ہیں اور دائمی بداثر ات چھوڑے بغیر ختم ہوجاتی ہیں۔

سلفیورک ایسٹر کے مریض کے اخراجات میں تیزابیت پائی جاتی ہے اور کاٹنے والے مادے نکلتے ہیں۔اگرجہم میں تیزاب زیادہ ہوجائے تو بعض دفعہ کھانا کھاتے ہوئے سخت کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور مریض پسینہ پسینہ ہوجاتا ہے۔ کھانے سے بھی تھکا وٹ محسوس ہوتی ہے۔جسم میں برقی کوندے ایک طرف سے دوسری طرف لیکتے ہیں۔ بعض مریض ان سے لطف محسوس کرتے ہیں۔ یہ سلفیورک ایسٹر کی خاص علامت ہے۔ اس میں سرورد اور دوسری در دیں آ ہستہ آ ہستہ ہوتی ہیں اور ایک دم ختم ہوجاتی ہیں۔ شنوائی آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ تہ مونیک ہونے گئی سے کین ایک دم واپس نہیں آتی۔شنوائی کے معاملہ میں سلفیورک ایسٹر کا مزاج اپنے عام مزاج سے مختلف ہے۔ درد، پیپ اور بد بووغیرہ کے تھیک ہونے کے بعد بہت آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ لیے عرصے میں شنوائی واپس آتی ہے۔

بعض اوقات ناک کی رطوبت کان کی طرف منتقل ہونے سے قوت شامہ میں کی واقع ہوجاتی ہے۔ اگر دیگر علامتیں ملتی ہوں تو یہ تکلیف بھی سلفیورک ایسٹر کے دائرہ کار میں ہے۔ اس میں دانتوں کا درد آ ہستہ آ ہستہ بڑھتا ہے اور بہت شدید ہوجاتا ہے لیکن ایک دم ختم بھی ہو جاتا ہے اور لمبا گہرا بدائر پیچے نہیں چھوڑتا۔ منہ اور گلے میں زخم بین جاتے ہیں۔ سلفیورک ایسٹر ایسے مریضوں کے لئے بہت مفید ہے اور ان بچوں کی بھی بہترین دوا ہے جومنہ کے زخموں کی وجہ سے معدہ جواب دے جاتا کے دخموں کی وجہ سے معدہ جواب دے جاتا ہے۔ سلفیورک ایسٹر کے مریض کا سانس بہت بد بودار ہوتا ہے اس میں کھٹاس نمایاں ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو تیز ابی چیزیں کھانے سے بھی ہوجاتی ہے لیکن سلفیورک ایسٹر کے مریض کو جے بعض ہوجاتی ہے لیکن سلفیورک ایسٹر کے مریض کو جے بیں۔ آ و یسٹر (Oyster) کھانے سے بھی جو ایک سمندری گھونگا ہے اور کچا اور کھٹا کھل کھانے سے بھی اسہال شروع ہوجاتے ہیں۔ ایسے مریض کے بیٹ درد کے دردوں میں بہی دوا مفید ثابت ہوتی ہے۔

اگر عورتوں کو حیض کے دوران ڈراؤنی خوابیں آنے لگیں تو اس مرض کی اور

دواؤں کے علاوہ سلفیورک ایسٹر بھی زیر نظر رؤنی جا ہئے۔ (تفصیلی بحث کے لئے دیکھیں آرنیکا اور آرسنک)

اگر حیض کی زیادتی کی وجہ سے کسی عورت کو حمل نہ طہر نے تو سلفیورک ایسڈ اس کی دوا ہو سکتی ہے بشر طیکہ عمومی مزاج ملتا ہو۔ دراصل بانجھ بن کی بے شار وجو ہات ہیں اور صحح دوا کے انتخاب کے لئے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ حسب ذیل چند دواؤں میں یہ مضمون نسبتاً تفصیل سے بیان ہوا ہے۔

پلسٹیلا ،کولوفائیلم ،سبائنا،کلکیریا کارب،اشوکااورگوئپیم (Gossypium)۔ سلفیورک ایسٹر میں کمر کی کمزوری کااحساس رہتا ہے اور مریض کا دل لیٹنے کو جاپہتا

ہے۔ کھڑا ہونا اور بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ ملکا چلنے سے آرام محسوس ہوتا ہے۔ صبح کے وقت پسینہ آتا ہے جوعموماً سلی مادہ کی موجود گی کی وجہ سے ہوتا ہے۔

سلفیورک ایسلٹر شراب کی پرانی عادت توڑنے کی بہترین دوا ہے اور پورپ میں ایسے بہت سے مریض ملتے ہیں جن کوشراب کا جنون ہوجا تا ہے اور بالآخریدان کی ہلاکت کا موجب بن جاتی ہے۔ ایسے مریضوں کا بہترین علاج سلفیورک ایسٹر ہے جوبعض دفعہ جادو کا سا اثر دکھا تا ہے۔ ایک بڑے گلاس پانی میں خالص سلفیورک ایسٹر کا ایک قطرہ ملا دینا چاہئے۔ اس پانی کودن بھرتین خوراکوں میں ختم کردینا چاہئے۔ بعض مریضوں پر جن کوتمام دوسرے معالجین پانی کودن بھرتین خوراکوں میں ختم کردینا چاہئے۔ بعض مریضوں پر جن کوتمام دوسرے معالجین نے قطعاً لاعلاج قرار دے دیا تھا۔ نیخ استعال کیا گیا توایک ہفتے کے اندراندران کی کایا پلٹ گئ اور شراب کو ہاتھ لگانے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ دنیائے طب میں غالبًا اس مرض کی اس سے بہتر کوئی دوانہیں۔

مددگاردوا: پلسٹیلا طاقت: مدر نگیجر(Q) کی صورت میں دی جاسکتی ہے۔

181 طيرينٹولا ہسيانيه

TARENTULA HISPANIA

(Spanish Spider)

ٹیرینٹولا سین میں پایا جانے والا ایک بے حدز ہریلا مکڑا ہے جس کے کائے سے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ اس مکڑے کے عرق سے بیدوا تیار کی جاتی ہے جو پیشا ب کی علامتوں میں کینتھرس (Cantharis) کی طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ کینتھرس بھی ایک مکھی کے زہرسے تیار کی جانے والی دوا ہے۔ بیز ہریپیثاب کی نالیوں میں شدید جلن پیدا کرتا ہے۔ گردوں کی جھلیاں سوج جاتی ہیں۔قطرہ قطرہ پیثاب باربار جل کرآتا ہے جیسے پھلا ہوا تا نباہو۔

ٹیرینٹولا میں سارے بدن میں اور خصوصیت سے نیلے اعضاء میں آگ گئے کا احساس پایا جاتا ہے۔اس کے ساتھ دل کی بے چینی اور کمزوری بھی لازم ہے۔ کینتھرس میں ضروری نہیں ہے کہ دل پر اثر ہو۔ اس کے علاوہ ٹیرینٹولا میں بعض رنگول سے نفرت اور کراہت پائی جاتی ہے۔کالا،سرخ اور سبزرنگ نا قابل برداشت ہوتا ہے۔اگر یہ کیفیت دائمی ہوجائے تو اونچی طاقت میں ٹیرینٹولا دینے سے ٹھیک ہوجاتی ہے۔وہ بیاری جوانسانی مزاج پر مشقلاً اثر انداز ہو چکی ہواس میں دوااونچی طاقت میں دینی چاہئے لیکن دوائیں عموماً 30 طاقت میں شروع کرانا محفوظ طریقہ علاج ہے۔

ٹیرینٹولا میں ایک علامت ہائیومس (Hyoscyamus) سے مشابہ ہے۔ ہائیومس میں بعض اوقات شرمیلی بچیاں بھی بے حیائی کی با تیں کرتی ہیں لیکن وہ بے ہوشی اور بے اختیاری کی حالت میں ایسا کرتی ہیں۔ان کے کسی گندے ذہنی رجحان سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ ٹیرینٹولا کے مریض میں ہوش کے دوران بھی بے حیائی کار جحان پایا جاتا ہے۔ اور وہ واقعتاً بے شرم اور بے حیا ہو جاتا ہے۔ وہ ہر جائز اور ناجائز ذرایعہ سے اپنی نفسانی خواہشات کو پوراکرنا چاہتا ہے۔ ایسے مریض کوٹیرینٹولا اونچی طاقت میں دینا ضروری ہے۔

ٹیرینٹولا میں مریض کا گوشت پوست سکڑنے لگتا ہے اور وہ آ ہستہ آ ہستہ ہڈیوں کا پنجر
بن جاتا ہے جیسے اسے گھن لگ گیا ہو۔ یہٹیرینٹولا کا مزاج ہے۔ اس علامت کا ہسپانوی مکڑے
کے زہر یلے اثر سے تعلق ہے۔ جب وہ کسی جانور کو کاٹنا ہے تو اس کے زہر کے اثر سے شکار کا
گوشت گھلنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ آسانی سے اسے چوس سکتا ہے۔ پس اس کے زہر میں
گوشت گھلانے کی طبعی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اس لئے اگر کسی مریض کا گوشت گھل رہا ہواور
کوئی اور علامت نہ بھی ہوتو اسے ٹیرینٹولا استعال کرانی جائے۔

ٹیرینٹولامیں سردی سےزود حسی پائی جاتی ہے۔ سونے سے پہلے ٹانگوں میں بے چینی نمایاں ہوتی ہے۔ بیعلامت ارجنٹم ، لائیکو پوڈیم اور آرسینک میں بھی برابرملتی ہے۔

ٹیرینٹولا کے امراض اور درد معین وقت پر ظاہر ہوتے ہیں مثلاً اگر پیرکو بیاری کا حملہ ہوا
ہےتوا گلے پیرہی کو پھر حملہ ہوگا۔ اس کی جو بیاری دوہفتوں کے بعد عود کر آتی ہے۔ وہ ایک دفعہ
پھر دو ہفتے ہی کے بعد دوبارہ ہوگی۔ وقت کی پابندی کرنے کا تعلق عموماً جانوروں کے زہروں
سے ہوتا ہے۔ مثلاً اکثر سانپوں کا زہر ہمیشہ موسم بہار ہی میں اثر دکھا تا ہے جس کی وجہ سے
سانپ کے بار بارکا ٹیے کی بہت می دیو مالائی کہانیاں بن گئیں ہیں۔ حالانکہ سانپ بار باراسی
موسم میں نہیں کا ٹا بلکہ اس کا ٹے کے پرانے زخم دوبارہ ہرے ہوجاتے ہیں۔ اگر موسم بہار میں
سانپ نے کا ٹا ہوتو ہر موسم بہار میں مریض کو یہی احساس ہوتا ہے کہ اسے دوبارہ سانپ کا ہے گیا
ہے۔ ایسے زخموں سے مستقل نجات کے لئے اور پرانے زخموں کے نشان دور کرنے کے لئے
لیکسس سے بہتر کوئی دوانہیں جواونچی طافت میں دینی چاہئے۔

ٹیرینٹولا میں عین وقت پر مرض کا دہرایا جانا سال یا مہینے سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ دنوں

اور ہفتوں سے علق رکھتا ہے۔

ملیریا میں بھی ، جبکہ دوسری دوائیں نا کام ہو پھی ہوں اور ملیریا ہفتہ یا پندرہ دن کے وقفوں کا یا ہند ہو،اللہ کے فضل سے ٹیرینٹولاشفا بخشنے کی طاقت رکھتا ہے۔

میرینٹولاکا مریض بالعموم تخت پیاسا، بدمزاج، عیاراور مکار ہوتا ہے۔خوفناک سکیمیں بناکر بہت عیاری کے ساتھ نقصان پہنچا تا ہے۔ ٹیرینٹولا کی مریضہ پر لے درج کی مکار ہوتی ہے اور اپنے مکرسے بہت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اکثر دھمکی آمیزالفاظ استعال کرتی ہے۔ اسے اجنبی چہرے دکھائی دیتے ہیں۔ جانور، جن، بھوت اورخوفناک شکلیں نظر آنے گئی ہیں۔ اجنبی چہرے دکھائی دیتے ہیں۔ جانور، جن، بھوت اورخوفناک شکلیں نظر آنے گئی ہیں۔ ٹیرینٹولا بے چینی اور جلن کے لحاظ سے آرسنگ سے مشابہ ہے اور ہاتھ پاؤں کے تلوے جاناخصوصیت سے سلفر کی یا دولا تا ہے۔ بعض رنگوں سے نفرت سین کے لڑنے والے بیاوں سے ملتی ہے جو سرخ رنگ سے خت نفرت کرتے ہیں اور سرخ چیز پر جملہ آور ہوتے ہیں۔ آرسنگ ٹیرینٹولا کے اثر ات کو زائل کر دیتا ہے۔ ٹیرینٹولا جب کسی بیاری میں ناکام ہو جائو آرسنگ ٹیرینٹولا کے اثر ات کو زائل کر دیتا ہے۔ ٹیرینٹولا جب کسی بیاری میں ناکام ہو جائو آرسنگ اس کی متبادل دوا کے طور برکام کرتا ہے۔

ٹیرینٹولا کی تکلیفوں میں سردی مضر ہے مگر اس کی بعض علامتیں سلفر سے ملتی ہیں۔ ہتھیلیوں اور تلووں میں جلن کے لئے نیز ایسی عورتوں کے رحم کی جلن دور کرنے کے لئے جو ہسٹریا کار جحان رکھتی ہوں،ٹیرینٹولاا چھی دوا ثابت ہوسکتی ہے۔

ٹیرینٹولا کا مریض عموماً یہ خیال کرتا ہے کہ اس کی جنگ کی جارہی ہے جس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر کھولتا رہتا ہے اور سیمیں بناتا ہے۔اگر کوئی لومڑ کی طرح جالاک ہوا ورساتھ کچھ باگل بھی ہوتو اسے ٹیرینٹولا اونچی طاقت میں دینا چاہئے۔ٹیرینٹولا کا مریض بیار نیش ہوتو ہر بیاری کا ڈرامہ رچاسکتا ہے۔اٹوائی کھٹوائی لے کر پڑر ہے گا اور بہانے بنا کر اپنی طرف توجہ کھنچتا رہے گا۔اس کی حقیقی بیاری یعنی اندرونی بے چینی آرسنک سے مختلف ہوتی ہے۔ ٹیرینٹولا کا مریض گھبرا ہے سے سرتکے پر رگڑتا ہے۔ سر پر وحشت سوار

ہوتی ہے، آنھیں نہیں گاتیں اور روشن سے زود سی کے ساتھ کنیٹیوں اور گدی میں بہت دردہوتا ہے۔

ٹیرینٹولا کی نیٹرم میور سے بیمشا بہت ہے کہ سر پر چھوٹے چھوٹے ہتھوڑ سے بیٹر نیٹر میں کا احساس ہوتا ہے۔ دائیں آنکھ میں کا احساس ہوتا ہے۔ دائیں آنکھ میں دھنداور نظر کی کمزوری کے علاوہ دائیں آئکھ سے مواد نگلتا ہے۔ دائیں کان میں شدید درد ہوتا ہے۔ ناک کے دائیں نتھنے میں ایک نزلاتی مرکز بن جاتا ہے جہاں سے نزلد کا آغاز ہوتا ہے۔ کلے میں بھی دائیں طرف تکلیف نمایاں ہوتی ہے۔ خوراک سے نفرت اور بے دلی، کھنڈ سے پانی کی پیاس اور متلی بھی خصوصیت سے ٹیرینٹولا کی علامتیں ہیں۔ گلے کی خرابی کی وجہ سے باہر بھی سوزش نمایاں ہوجاتی ہے۔

سے باہر بھی سوزش نمایاں ہوجاتی ہے۔ ٹیرینٹولا میں شدید اور مسلسل قبض رہتی ہے جس کی وجہ سے مریض سخت بے چینی محسوس کرتا ہے، کروٹیس بدلتا ہے اور تکبیہ کے ساتھ سررگڑتا ہے۔ بعض دفعہ انیا اور اسہال کی دواؤں سے بھی اسے افاقہ نہیں ہوتا۔

بسااوقات غم اورفکر سے ذیا بیطس ہوجاتی ہے۔الیی صورت میں اگر سارے جسم میں خصوصاً ٹانگوں اور بازوؤں میں دکھن کا احساس بھی ہوتو ٹیرینٹولا دوا مفید ثابت ہوسکتی ہے۔ وقتی فائدہ ہی نہیں دیتی بلکہ اللہ کے فضل سے کمل شفا بھی بخشی سکتی ہے۔

ٹیرینٹولا گردول کے شنج میں جو پھر یوں یا سوزش وغیرہ سے ہو، بہت مفید ہے۔اگر گردے کے اردگر دکو لہے کے اوپر کمر کے پاس در دنمایاں ہواور بیبیٹناب میں جلن ہولیکن مقدار میں زیادہ ہواورا جانک جکڑن کی علامت پائی جائے تو غالبًا ٹیرینٹولا ہی دوا ہوگی۔

اگر عورتوں میں جلن کے ساتھ شدید <u>خارش رحم کے اندر تک</u> جاتی ہوئی محسوں ہوتو اس تکلیف کوبھی ٹیرینٹولا سے آرام آسکتا ہے۔ رحم میں غدود کا بڑھ جانا، رحم کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا، ڈھیلا ہوکرلٹک جانا اور نیچ گرنے کا حساس اور رحم کا دباؤبر داشت نہ کرسکنا یہ تمام علامتیں ٹیرینٹولا میں یائی جاتی ہیں۔ ٹیرینٹولا کے تشخبات کا سانس کی نالی سے گہراتعلق ہے۔ آواز بیٹ<u>ے</u> جاتی ہے۔ گلے میں مسلسل چین کا احساس اور آواز کا بوجھل پن ٹیرینٹولا کا مزاج ہیں۔

ٹیرینٹولا ول کی تکلیفول اور دمہ میں اگر دیگر مزاجی علامتیں پائی جائیں تو بہت مفید ثابت ہوسکتا ہے۔

ٹیرینٹولا کے مریض کی پیٹھ پر اکثر پھوڑے نکلتے ہیں گردن کی پشت پر اور دائیں یا بائیں کندھے کے اوپر کاربنکل نکل آتا ہے۔ کاربنکل اکثر ذیا بیطس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ٹیرینٹولا کی دیگرعلامتیں پائی جائیں تو دونوں تکلیفوں کوشفاد سے سکتا ہے۔

ٹیرینٹولا میں اعضاء میں سن ہونے کا احساس، کمزوری اور جلن کا پایا جانا اس کے عمومی مزاج کا خاصہ ہے۔ ہروفت بے بینی رہتی ہے۔ اعضاء میں شدید در دہوتا ہے۔ ٹانگول کا درد خاص طور پر نمایاں ہوتا ہے۔ جلد میں دکھن کا احساس جو ملکے دباؤ کو بر داشت نہ کر سکے۔ بعض اوقات مریض کیڑے کا وزن بھی بر داشت نہیں کرسکتا۔

کولہوں میں خصوصاً رات کے وقت در دہوتا ہے۔ ٹیرینٹولا میں تکلیفیں عموماً رات کو بڑھ جاتی ہیں۔ تمام جسم میں خارش اور جلن ہوتی ہے۔ چلنے سے رانوں میں در دہوتا ہے اور بیا حساس کہان پرکس کر پٹی باندھی گئی ہو۔ ٹانگوں کا فالجے بھی نمایاں ہے۔ حرکت کے ساتھ بیٹھ پر در د اور بے چینی جبکہ سر در د کورکت سے آرام آتا ہے۔

ٹیرینٹولا میں تشنج بہت نمایاں ہوتے ہیں یہاں تک کہ اگر باقی علامتیں بھی پائی

جائیں توبیدوا <u>مرگی</u> میں بھی شفا بخشنے کی طاقت رکھتی ہے۔

دافع اثر دوائيں: ليكيت كينتھرس مددگاردوائيں: كيوپرم ميك فاس عموماً 30 طاقت ميں طاقت: 30 سے 200 تك

182 ٹیوبر کیوینم

TUBERCULIUNUM

(A Nosode from Tubercular abscess)

تپ دق کے مادے سے تیار کردہ اس دوا کا نام ٹیوبر کیولینم ہے۔ ڈا کٹر برنٹ نے اس دوا پرسب سے زیادہ کام کیا ہے اور ان کے تج بات کے حوالے سے دوسرے ہومیو پاتھک معالجین نے اس کے اثر ات سے استفادہ کیا ہے۔ ڈاکٹر کینٹ نے بھی اس دوا کو بہت اہم قرار دیا ہے۔اس کی بنیادی صفات کو یادر کھنا جا ہے کیونکہ اس سے تب دق سے براہ راست تعلق رکھنے والی بیاریوں ہی میں نہیں بلکہ دوسری بیاریوں میں بھی بہت مدد ملے گی۔ بدایک نوزوڈ (Nosode) ہے۔نوزوڈ کسی بیاری کے گندے اور متعفن مادے سے تیار کی جانے والی دواکو کتے ہیں۔اگراصل زہر کو بہت زیادہ لطیف کر دیا جائے تو تیار کردہ دوا میں اصل غلاظت اور گندگی کا کوئی نام ونشان تک باقی نہیں رہتا، ہاں اس زہر کی یا دا بک لطیف طاقت بن کرموجود رہتی ہے جس سے اس بیاری یا اس سے ملتی جلتی بیاری کے علاج میں مدد لی جاتی ہے۔ نوزوڈ عام طوریر 200 طاقت سے کم استعال نہیں کرنی جاہئے ۔زیادہ بہتر ہے کہ اسے اونچی طاقت میں استعال کیا جائے۔ایک ہزار طاقت میں استعال بہت احیا ہے۔ اس دوا کے بارے میں کینٹ کا دعویٰ ہے کہ اگر کسی شخص کو 200ء ایک ہزار، دس ہزار، پچاس ہزاراور آخر میں ایک لا کھ طافت کی 2 خورا کیں وقفوں سے دی جائیں تو ایسے شخص کو تمجھی سل نہیں ہوگی جا ہے وہ سل کے مریضوں کے درمیان اٹھے بیٹھے۔ وہ مریض جن میں سلی اثرات پائے جاتے ہوں خواہ مخفی ہوں۔ان میں ٹیوبر کیوینم پاکسی اور نوزوڑ کی ضرورت پڑ سکتی ہے جس کے اثر سے دیگر بالمثل دوائیں پوری طرح کام کرنے لگیں

گ۔ ٹیوبر کولینم جسم میں گہرا رڈمل پیدا کرتی ہے اور اس کے اثر سے دوسری دوائیں جو ٹیوبر کیولینم جسم میں گہرا رڈمل پیدا کرتی تھیں،کام کرنے گئی ہیں۔ٹیوبر کیولینم ٹیوبر کیولینم دینے سے پہلے سے تھی کے باوجود کام کرتی تھیں،کام کرنے گئی ہیں۔ٹیوبر کیولینم دینے کے بعد علاج شروع کیا جائے تو علاج زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔

ٹیوبر کیولینم کوا پنٹی سورک (Anti-Psoric) دوا کہا جاتا ہے۔جلدی امراض سورک امراض سورک امراض کہلاتی ہیں۔ملیریا اور وہ سب بخار جو بار بار بلیٹ آئیں جسم میں موجود رہتے ہیں اور وقتی طور پر دب جاتے ہیں کی دودن کے بعدیا اس سے بھی زائد وقفہ سے واپس آ جاتے ہیں۔ ایسے بخاروں میں ٹیوبر کیولینم بہت مفید ہے۔ کئی ڈاکٹر ملیریا بخار کے دوران بھی ٹیوبر کیولینم استعال کرتے ہیں اور اسے ملیریا توڑ کہتے ہیں۔

اس میں ایک علامت یہ ہے کہ مریض جہاں بھی ہو وہاں سے کہیں اور جانا جا ہتا ہے۔ آرنیکا اور تھو جامیں بھی یہ بات یائی جاتی ہے۔

ایک اور بات یا در گھنی چاہئے کہ سل اور آتک (Syphilis) دونوں کے مریض بیاری بڑھنے پر پاگل بھی ہوجاتے ہیں مگر دونوں کے پاگل بن میں فرق ہوتا ہے۔ سل کے مریض عموماً سر میں شدید درد کے دوروں اور سینے کے اندرونی زخموں کی تاب نہ لا کر پاگل ہو جاتے ہیں۔ سفلس کے مریض کا ساراجسم زخموں اور ناسوروں سے بھرجا تا ہے جو ہڈیاں بھی گلا دیتے ہیں۔ ناک کی ہڈی گل کر بالکل بیٹھ جاتی ہے۔ یہ مرض براہ راست دماغ پر بھی ہملہ آورہوتا ہے اور مریض کو کمل کر بالکل بیٹھ جاتی ہے۔ یہ مرض براہ راست دماغ پر بھی ہملہ آورہوتا ہے اور مریض کو کمل طور پر پاگل کر دیتا ہے۔ سل کے پاگل میں تشدد کا رجحان پایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ خاموش بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ خیف وز ارغورتیں جنہیں سل اندر ہی اندر کھو کھلا کر دیتی ہے پاگل ہوجا کیں تو ان کے جسم میں بہت زیادہ طاقت آ جاتی ہے۔ دماغ میں جوش پیدا ہوجا تا ہے اور وہ وہ تشدد پر اتر آتی ہیں حالا نکہ عام حالات میں بالکل خاموش طبع ہوتی ہیں۔ اگر ٹیو ہر کیولینم او نچی طاقت میں دی جائے تو یہ ایسے مریضوں کو پاگل بن سے بچاسکتی ہے۔ کالکیر یا سے ٹیو ہر کیولینم کا ایسا گہرا تعلق ہے کہ بعض ڈاکٹروں کے نزد کیک بیا کیک دوسرے کے ساتھ ادل بدل کر بھی دی جاسکتی ہیں۔

ٹیوبر کیولینم میں عضلاتی نظام اتنا کمزور پڑجاتا ہے کہ اعضاء لگئے ہوئے محسوں ہوتے ہیں۔اس کی یہ علامت بہت شدید ہوتی ہے۔اگر بچہ میں سل کا مادہ ہوتو اجابت کے ساتھ ان کی آنت بھی باہر نکل آتی ہے۔اس میں ٹیوبر کیولینم کونہیں بھولنا چاہئے۔مردانہ یا زنانہ اعضاء کے نیچ گرنے کے احساس کودور کرنے کے لئے بھی بیدوا بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔

حیض بہت جلد، بہت زیادہ اور بہت لمباعرصہ تھہرنے والے ہوتے ہیں۔ در دبھی بہت پائے جاتے ہیں۔ان علامات میں دوسری دواؤں کے ساتھ ساتھ ٹیوبر کیولینم بھی مفید ہے۔اسے نظرانداز نہیں کرنا جاہئے۔

خشک، سخت اور مزمن کھانسی جو عام نزلہ زکام وغیرہ کے نتیجہ میں نہ ہو بلکہ آ کر گھر ہی جائے، ٹیوبر کیولینم کے مریضوں میں ملتی ہے۔ پلسٹیلا بھی ایسی کھانسی کو زم کرنے میں کام آتی ہے۔ رنگ ورم (Ringworm) یعنی دوری یا دام میں چھوٹے دانوں کا ایک چکر سابن جاتا ہے جو اگر بالوں میں ہو جائے تو بالوں کو جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے۔ اس کو ایلو پیشیا میں جو بالوں کو چھوں کی شکل میں گول گول دائروں کی صورت میں تارتی رہتی ہے۔ اس بیاری میں ٹیوبر کیولینم یا بیسیلینم دونوں بہت مفید ہیں۔ ڈاکٹر برنٹ کا میں اتارتی رہتی ہے۔ اس بیاری میں ٹیوبر کیولینم یا بیسیلینم دونوں بہت مفید ہیں۔ ڈاکٹر برنٹ کا خیال ہے کہ اس کی بنیادی وجہ کی مادہ ہی ہے اور اگر کسی کو یہ بیاری ہوتو اس کو لازماً بیسیلینم یا ٹیوبر کیولینم دیوبر کیولینم دونوں بہت مفید ہیں۔ ڈاکٹر برنٹ کا شوبر کیولینم دیوبر کیولینم دیوبر کیولینم دیوبر کیولینم دیوبر کیولینم دین جا ہے۔ پکرک ایسٹر بھی ایلو پیشیا اور دادگی بہت توی دوا ہے۔

عضلات کوسوتے میں جھٹکے لگنا بھی ٹیوبر کیولینم کی ایک نمایاں علامت ہے لیکن اس بیاری میں اور بھی کئی دوائیں کا م آتی ہیں۔

ٹیوبر کیولینم میں طوفان سے قبل ہی مریض میں بیاری کی علامات ظاہر ہونے گئی ہیں۔ ٹیوبر کیولینم کو حاد بیاریوں سے زیادہ مزمن بیاریوں کے اثر کوتوڑنے کے لئے استعال کیا جاتا ہے ورنہ وہ مزمن بیاریاں نسلاً بعد نسلٍ منتقل ہوتی رہتی ہیں۔لیکن حاد بیاریوں میں بھی بیفوری اثر دکھانے والی دواہے۔ ایشیائی اورافریقن ممالک میں غربت کی وجہ سے ملیریاعام ہے۔ چہرے زرد، کھیکے اور بے رنگ پڑجاتے ہیں۔ پھیپھڑوں کی تکلیفیں، کھانسی، دمہ وغیرہ عام ہوتی ہیں۔ ٹیو ہر کیولینم سے دمہ کی بیخ کنی کامؤثر علاج کیا جاسکتا ہے کیونکہ کی امراض بھی دمہ میں تبدیل ہوجاتی ہوں۔

بعض ریتلے علاقے جہاں کثرت کے ساتھ نمونیہ ،سل اور ملیریا بخاریا کے جاتے ہیں وہاں رات کو اچا کے جاتے ہیں وہاں رات کو اچا تک میں مونیہ ہوجا تا ہے جو پھیپھڑوں کی مزوری کی وجہ سے سل ہونا کوئی عجو بنہیں۔ایسے ملیریائی علاقوں مثلاً سندھ میں ٹیوبر کیولینم مفید ہی نہیں بلکہ ضروری دوابن جاتی ہے۔

ملیریا بخار میں عموماً سردرد ہوتا ہے جس کے ساتھ متلی بھی ہوتی ہے۔ تپ دق کی علامتیں رکھنے والا مریض جس میں ملیریانے گہرے اثرات چھوڑے ہوں اس کے سردرد میں بھی بیدوا کام آتی ہے۔

جسم میں دکھن اور بخار کی کیفیت اور ہر چیز سے بیزاری بھی ٹیوبر کیولینم کی علامت ہے۔
بچوں کے بڑھتے چلے جانے والے سر کی بیماری میں جسے ہائیڈرو کیفیلس
بچوں کے بڑھتے ہیں جب بظاہر بالمثل دوائیں کام نہ کریں تو ٹیوبر کیولینم اونچی
طافت میں وہ رڈِمل پیدا کر دیتی ہے جوعام دواؤں کودکھانا چاہئے تھالیکن وہ نہیں دکھا تیں۔

ٹیوبر کیولینم میں پیٹ کی بہت ہی علامتیں سلفر کے مشابہ پائی جاتی ہیں۔ صبح کے
وقت دست کا زور، بھی پیچین، بھی اسہال اور بھی بہت قبض ۔ یہ سب انتر یوں کی تکلیفیں
ہیں۔اگر وقت پر ٹیوبر کیولینم سے ان کاعلاج نہ کیا جائے تو بعض دفعہ مریض علاج کے قابل ہی
نہیں رہتا اور انتر یوں کے ناسوروں سے مستقل خون رہنے لگتا ہے۔ اس بیاری کا علاج لیے

مددگاردوا ئیں: کلکیریا کارب۔ جائنا۔ برائیونیا۔ سلفر۔تھوجا۔ ٹیوبر کیولینم کے بعد شلیلینم بھی اچھا کام کرتی ہے۔ طاقت: روزمرہ 30سے 200 تک یاحسب ضرورت بہت اونچی طاقتیں

عرصة تك ٹيوبر كيولينم ديتے رہنے سے ممكن ہوسكتا ہے۔

183

VERATRUM ALBUM

(White Hellebore)

وریٹرم البم میں سرسے پاؤں تک سردی کا شدیدا حساس پایا جاتا ہے۔ یہ دواہیضے کی بہترین دواؤں میں شامل ہے۔ ڈاکٹر ہائیمن نے ہمیضہ کی وبا پھیلنے سے پہلے ہی بغیر کسی ہمیشہ کے مریض کودیکھے وریٹرم البم کو ہمیضہ کی دوا تجویز کیا تھا۔ یہ دوا ہمیضہ میں کیمفر اور کیو پرم کا مقابلہ کرتی ہے مگراس کے اخراجات مقدار میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جوزندگی کی تمام قوتوں کو بالکل نے وڑ کرر کھ دیتے ہیں۔

وریٹرم میں سردی کا احساس بہت نمایاں ہوتا ہے اور شنڈ سے نہیں اور مربینے آتے ہیں اور مربیض سرسے پاؤں تک شنڈ سے بسینوں میں شرابور ہوتا ہے۔ کیمفر میں بھی بالکل یہی علامات نمایاں ہیں کیکن فرق بیہ ہے کہ کیمفر میں اجابت تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے۔ وریٹرم میں بے حد پانی والے کھلے اسہال آتے ہیں جود کھتے ہی دیکھتے جسم کا پانی نچوڑ لیتے ہیں اور مریض جلد ہی موت کا شکار ہوجا تا ہے۔

وریٹرم البم ،کیمفر اور کیوپرم نتنوں میں تشنج کا ہونا لازمی ہے۔خصوصاً پنڈلیوں میں بہت تشنج ہونا ہے جو ہیضہ کی خصوصی علامت ہے۔

وریٹرم الیم کی ایک متضا دعلامت انتڑیوں کی خشکی بھی ہے۔ جس طرح یہ اسہال کی چوٹی کی دوا ہے۔ اگر قبض دائی ہو چکی ہواور کی چوٹی کی دوا ہے۔ اگر قبض دائی ہو چکی ہواور لیم عرصہ تک کمزوری کا رجحان ہوا ور ساتھ ٹھنڈا پسینہ بھی آئے تو وریٹرم الیم اچھا علاج ثابت ہوتی ہے۔ اگر یہ علامتیں نہ بھی ہوں مگر قبض غیر معمولی طور پر شدید ہوتو تب بھی بیدوا مفید ثابت ہوتی ہے۔ اگر یہ علامتیں نہ بھی ہوں مگر قبض غیر معمولی طور پر شدید ہوتو تب بھی بیدوا مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس صورت میں اسے 30 طاقت میں روز انہ دو تین دفعہ دیتے

ر ہنا چاہئے۔ یہ پیٹ کوآ ہستہ آ ہستہ زم کرے گی اور انتز یوں کی خشکی کو دور کر دے گی۔ تا ہم اس کے پوری طرح مؤثر ہونے سے پہلے قبض کے اس مریض کو یا تو انیا دینا پڑے گایا گلیسرین کی ٹیو برناستعال کرنی پڑیں گی کیونکہ فضلہ اتنا زیادہ تخت ہو چکا ہوتا ہے اور اتنی زیادہ مقدار میں اکٹھا ہو چکا ہوتا ہے کہ طبعی طریق پراس کا اخراج ناممکن ہوجا تا ہے۔

وریٹرم البم کا مریض مسلسل سردی محسوس کرنے کی وجہ سے سخت چڑ چڑا اور مائل بہ اشتعال ہوجا تا ہے۔اگرایسے مریض کو ہروقت گرم رکھا جائے تو اس کی طبیعت اعتدال پر آ جاتی ہے بعنی اشتعال اس کے مزاج کا کوئی مستقل حصہ نہیں ہوتا۔

وریٹرم البم کے بعض مریضوں میں مذہبی جنون بھی ملتا ہے۔ ایسے مریض تیز تیز اور جلد جلد با تیں کرتے ہیں۔ بھی با تونی ہونے کا دورہ پڑ جا تا ہے اور بھی خاموشی کا۔ خاموش کے دورے کے وقت مایوسی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ خودشی کار جمان پیدا ہوجا تا ہے مگر ذہنی مریضوں کی ایسی علامتوں کا اور بھی بہت سی دواؤں میں ذکر موجود ہے۔ یہاں اس ذکر کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب بھی ذہنی مریضوں کے علاج کا موقع آئے تو وریٹرم بھی ایک امکانی دوا ہوسکتی ہے کہ جب بھی ذہنی مریضوں کے علاج کا موقع آئے تو وریٹرم بھی ایک امکانی دوا ہوسکتی ہے لیکن شاذ کے طور پراستعال ہوتی ہے۔

بعض بچیاں ہر حیض سے پہلے بغیر کسی وجہ کے بے حد اداس اور مایوس سی ہوجاتی ہیں۔ مسکرانا بھول جاتی ہیں۔ ان کواگر وریٹرم البم فائدہ دے تومستقل شفا ہو جاتی ہے۔ ورنہ الیں بچیوں کے مستقل ذہنی مریضہ بن جانے کا احتمال نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ طبیب کوالیں بچیوں کے علاج میں یہ علامت یا در کھنی چاہئے کہ جن کو وریٹرم البم کی ضرورت ہوان کولازماً سردی محسوس ہوتی ہے۔

وریٹرم البم میں بعض تضادات بھی پائے جاتے ہیں۔ سرمیں سردی محسوں نہیں ہوتی جبکہ باقی جسم محسنڈا ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے سرمیں برف کوٹ کر بھر دی ہو۔ گدی اور سرکی چوٹی پریہ احساس بہت نمایاں ہوتا ہے جوسلفر

کے بالکل برعکس ہے۔سلفر میں سرکی چوٹی پرجلن کا احساس ہوتا ہے۔وریٹرم البم کا مریض شدید سردی محسوس کرنے کے باوجود سخت ٹھنڈا پانی پیتا ہے۔ پچلوں سے پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے۔ متلی اور قے کے باوجود معدہ میں شدید کھرچن اور بھوک محسوس ہوتی ہے۔

30 سے 200 تک



805

184

زنكم

ZINCUM METALLICUM

(Zinc)

زنک اعصاب کی بیماریوں میں کام آنے والی ایک بہت اہم دواہے۔ابیامریض جس کا اعصابی نظام کمبی بیماریوں کی وجہ سے جواب دے چکا ہواوراس کے اعصاب اتنے کمزور ہوجائیں کہ جسم میں موجود بیماریوں کو باہرا چھا لنے کی طاقت ندر کھتے ہوں توان کے اس عارضے کی اصلاح کے لئے بیدوا بہترین ثابت ہوتی ہے۔

اگرایسی وبائی امراض پھیلی ہوں جن کے مریضوں کی شناخت کے لئے ان کی علامتوں کا جلد پر ظاہر ہونا ضروری ہوتا ہے مثلاً خسر ہ اور چیک وغیرہ تو زنکم کے مریض میں علامتیں ظاہر خہونے کی وجہ سے اس کی تشخیص نہیں ہو سکے گی کیونکہ اس کے مریض میں بیاری کا حملہ اندر تو ہو جائے گا مگر اس کی علامتیں ظاہر نہیں ہوں گی۔ ہومیو پیتھک زنک دینے سے اس کی بیاری کی علامات باہر آ جائیں گی۔

وہ فالحی امراض جوآ کر گھر جائیں اور ٹھیک ہونے کا نام ہی نہ لیں ان میں اگر زنگ دی جائے تو اعصاب میں ایک اضطراب پیدا ہوجاتا ہے، ایک جدو جہد شروع ہو جاتی ہے اور صاف پتہ چلتا ہے کہ جسم نے بیاری کے خلاف ریم کمل دکھایا ہے۔ دبی ہوئی بیاریاں خواہ و بائی ہوں یا اعصابی ، ان کی دبی ہوئی علامتوں کو زنگ باہر نکال دیتا ہے۔ یہ ریم کمل زندگی کو بچانے کے لئے ضروری ہے لیکن تکلیف دہ بہت ہے اور بسااوقات بہت سخت ہوتا ہے۔ اگر اعصابی کمزوری کی وجہ سے دبے ہوئے فالج کے خلاف روم کمل پیدا کرنا ہوا و راس مریض کی دواز نک ہوتو اسے اس روم کل کے خلاف روم کے متنبہ کر دینا جائے۔ ڈاکٹر کینٹ نے تو یہ لطیفہ بنایا ہوا ہے کہ اگر زنگ کے مریض کو فالج ہو جائے جو ایک جو جائے کہ اگر زنگ کے مریض کو فالج ہو جائے

806

تواس کے علاج کے لئے تیز رفتار گھوڑ ہے پر جانا چاہئے اور دواد سے ہی گھوڑ ہے پر بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو جانا چاہئے کیونکہ ذنک کا اثر بہت جلد ظاہر ہوتا ہے اور اتنی خوفنا ک سرسرا ہے ہوتی ہے کہ عین ممکن ہے گھر والے ڈاکٹر کو مار نے کے لئے دوڑیں کہ مریض کو کیا زہر دے دیا ہے۔ اس سرسرا ہے کے بعد جب اعصاب میں جان پڑنے لگے گی اور فالج ٹھیک ہوگا تو پھر وہ شکر سے اداکر نے کے لئے اس ڈاکٹر کو ڈھونڈیں گے۔ میں نے بھی بار ہاا سے مریضوں کو زنک دی ہے دل کر نے نے بھی بار ہاا سے مریضوں کو زنک دی ہے جس کے نتیجہ میں سرسرا ہے پیدا ہوئی لیکن اتنی خوفنا کنہیں کہ تیز رفتار گھوڑ ہے کی ضرورت پڑی ہو۔ میں اپنے مریضوں کو پہلے ہی متنبہ کر دیتا ہوں کہ اس دوا کا شدید رؤمل شفا کی ابتدائی علامت ہوگی۔

زنک کی ایک خاص پہچان ہے ہے کہ اس کا مریض اپنے پاؤں کومسلسل حرکت دیتا رہتا ہے۔ عموماً عور تیں رات کے وقت اپنے پاؤں بستر سے باہر نکال کرآپیں میں رگڑتی رہتی ہیں یا بعض مریض اپنی ٹانگوں کو مسلسل ہلاتے رہتے ہیں۔ اگر کسی میں بیرعادت پائی جائے تو وہ جب بھی بیمار ہواسے زنک دے کر دیکھنا چاہئے۔ اگر زنک کے مزاجی مریض کی پہچان ہوجائے تو اس کی سب بیماریوں میں زنک مفید ثابت ہوگا۔

زنگ کے ساتھ نکس وامیکا بھی نہ دیں کیونکہ بید دونوں ایک دوسرے کی مخالف دوائیں ہیں۔ حالا نکہ اعصابی تناؤ میں بید دونوں قدرے مشابہ ہیں۔ جب دو دواؤں کے مزاج آپس میں ملتے ہوں تو وہ ایک دوسرے کے اثر کو زائل بھی کرسکتی ہیں اور بعض صور توں میں ایک دوسرے سے متصادم ہوکر سخت رؤمل بھی دکھا سکتی ہیں۔ اگر کسی مریض کو زنگ دینا ہولیکن اس سے پہلے اسے نکس وامیکا دی جا چکی ہوتو زنگ دینے سے پہلے کیمفر یا سلفردے کرنکس وامیکا کے موجو داثر کو زائل کرنا ضروری ہے۔

اگر جلدی بیماری دب جائے یا بہت ست رفتاری سے جلد پر ظاہر ہواور آ ہستہ آ ہستہ دانے نکلیں تو زنگ کی ایک دوخور اکیس ان کے ظاہر ہونے کی رفتار کو تیز کر دیتی ہیں۔ دانے نکلیں تو زنگ کی ایک دوخور اکیس ان کے ظاہر ہونے کی رفتار کو تیز کر دیتی ہیں۔ نوجوان بچیوں کے حیض کا زمانہ بہت دیر سے اور آ ہستہ آ ہستہ شروع ہو تو یہ علامت بھی زنک کی نشاند ہی کرتی ہے۔اگر زنک سے اس کا علاج نہ کیا جائے تو بعض دفعہ رخم اوراعصاب کی بہت ہی بیاریاں یا کمزوریاں زندگی بھر کے لئے لگ جاتی ہیں۔

زنگ کے زہر سے معدے کا نظام بہت ست پڑجاتا ہے۔ کھانا بہت آہتہ ہت ہت ہت ہوتا ہے۔ بھوک مٹ جاتی ہے، معدے میں تعفن پیدا ہوتا ہے، تیزابیت کی وجہ سے کھٹی قے شروع ہو جاتی ہے۔ قبض رہتی ہے۔ اس نظام کی ست روی مثانے میں فالجی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ پیشا ب اوراجابت دونوں میں اکھی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس مرکری میں تیزی اور شدت پائی جاتی ہے۔ پیشاب میں جلن ہوتی ہے جو بعد میں بھی جاری رہتی ہے۔ پیش میں بھی کہی ہوتا ہے کہ اجابت کے باوجود پیٹ میں بل پڑتے ہیں اور جلن رہتی ہے۔ زنگ کا مریض کھڑے ہوکر پیشاب آتا ہے۔ اس کے برعکس کا سائیکم کا مریض صرف کھڑے ہوکر پیشاب کرسکتا ہے، بیٹھنے پراس کا پیشاب بالکل بند ہوجا تا ہے یا رک رک کر آتا ہے اور بعض مریضوں کو پیشاب جاری کرنے کے لئے پیھیے کی طرف کھنچنا پڑتا ہے۔

زنگ کے ٹکسالی کے مریض کا چہرہ زردی مائل اور جھری دار ہوتا ہے۔ابیام ریض ہمیشہ گفتڈ ارہتا ہے۔ جب ذہن پر اثر ہونے گئے اور اس کی یا دداشت جواب دینے گئے تو پہلی علامت بین ظاہر ہوتی ہے کہ مریض سوال کو پہلے دہرا تا ہے پھر جواب دیتا ہے۔ ذراسے اچانک شور سے اس کا جسم لرز اٹھتا ہے۔ زنگ کا مریض اگر مفلوج ہوجائے تو اس کے چہرے پر جو بڑھا پے کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اگر چہ وہ اسے بھر پور بڑھا پے سے پہلے ہی بوڑھا دکھانے بگتے ہیں لیکن زنگ کے مریض میں جوانی کے عالم میں یہ علامتیں ظاہر نہیں ہوا کرتیں۔ یہ سار سپر یلا اور ایگیر کیس کا خاصا ہے کہ چھوٹی سی عمر میں ہی مریض بوڑھا دکھائی دے گا۔ سار سپر یلا میں تو بعض نے بھی بوڑھے لگتے ہیں۔

زنک کے بعض مریض ایمیں (Apis) کی طرح سوتے میں چینیں مارتے ہیں کیونکہ ان کے دماغی اعصاب میں زنک کا مخصوص ارتعاش پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایمیں کی علامتیں توہڑی آسانی سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر وہ علامتیں نہ ہوں تو بلاتر دد زنک شروع کرا دینا جاہئے۔ یہاں بھی مریض یا گھر والوں کو متنبہ کرنا ضروری ہے کہ ہوسکتا ہے کہ شروع میں چیخوں کار جحان بڑھ جائے جورفتہ رفتہ کلیتاختم ہوجائے گا۔

808

زنگ ریڑھ کی ہڑی اور حرام مغز کی سوزش (Spinal Meningits) میں بھی مفید دواہے۔اگر کچھ دوائیں مثلاً ہرائیونیا، بیلا ڈونا، سیمیم وغیرہ اس تکلیف میں فائدہ پہنچائیں اور کچھ دیر کے بعد ساتھ چھوڑ دیں تو ان کے بعد زنگ بہت اچھا اثر دکھاتی ہے۔ ٹیو ہر کولرمیننجائٹس (Tubercular Meningitis) کے علاج میں بھی زنگ مفید ثابت ہوا ہے۔ میننجائٹس کی وبا کے دنوں میں اگر ہفتے میں ایک دوبارزنگ 200 استعال کیا جائے تو غالبًا اس کی روک تھام کے لئے مفید ثابت ہوگا۔

آ تکھوں کی متعدد تکالیف میں بھی زنگ بہت کام آتا ہے۔اگر آنکھوں کے چھپر

يلم 809

آ ہستہ آ ہستہ پھول کر بڑے ہو جائیں اور آ نکھول میں رفتہ رفتہ سرخی بڑھنے گے اور مزمن ہو جائے ، اس کے ساتھ اندرونی علامتیں بھی ظاہر ہونے لگیں اور نظر دھندلا جائے اور بھری اعصاب متاثر ہوں تو ان تکالیف میں زنگ بہت کار آ مد ثابت ہوگا۔ زنم سلف سفید موتیا کی بہترین دواؤں میں سے ہے۔ میں نے ایک نوے سالہ بوڑھے مریض کو جس کی آ نکھوں میں سفید موتیا کی علامتیں ظاہر ہوکر کافی آ گے بڑھ چکی تھیں ، ایک لاکھ طاقت میں زنم سلف کی ایک خوراک دی۔ اس مریض کو ایک سرجن نے میرے پاس بھوایا تھا کہ اس عمر میں ہم اس کا اپریشن خوراک دی۔ اس مریض کو ایک ایک لاکھ طاقت کا بیرچرت انگیز اثر میں نے دیکھا کہ اس کی آئیس کر سکتے۔ زنکم سلف کی ایک لاکھ طاقت کا بیرچرت انگیز اثر میں نے دیکھا کہ اس کی آئیس کی وفات بین میں کر سکتے۔ زنکم سلف کی ایک لاکھ طاقت کا بیرچیرت انگیز اثر میں نے دیکھا کہ اس کی وفات بین میں سے بہترکیا ہے۔ نہوئی۔

آ نکھ میں پیدا ہونے والے وہ تمام مادے جونظر کو دھندلا دیتے ہیں یا جم کرموتیا کی طرح شکل اختیار کر لیتے ہیں،ان سب میں زنک اچھی دوا ہے۔لیکن اگر مرض نصف سے آگ بڑھ چکا ہوا ورسختی کی طرف مائل ہوتو اس وقت زنک دینے کی بجائے آپریشن کروالینا ہی بہتر ہے کیونکہ اگر موتیا میں شخق شروع ہو چکی ہوتو زنک دینے سے وہیں رک جائے گا اور مریض نہ اپریشن کے قابل ہو سکے گا نہ اس کی بینائی ٹھیک ہوگی ۔لہذا ایسے مریض کوموتیا پہنے ہی دینا چاہئے تا کہ جلد آپریشن کے ذریعہ اسے جائے سے نجات ملے۔

زنگ کے ساتھ کلکیریا فلور 6x میں کھلانا بہت مفیدرہتا ہے۔ اس طرح آنکھ میں ٹیکانے کے لئے Cineraria Maritima Sussex کا لوش بہت فائدہ مند ہے۔ دن میں تین باراس کا ایک ایک قطرہ ماؤف آئکھ میں ٹیکایا جائے توافاقے کی رفتار اور بھی تیز ہوجاتی میں تین باراس کا ایک ایک قطرہ ماؤف آئکھ میں ٹیکایا جائے توافاقے کی رفتار اور بھی تیز ہوجاتی ہے۔ روز مرہ کے طور پر زنکم سلف 200 ہفتہ میں ایک دو بار استعمال کروانا چاہئے۔ اگر CM طاقت میں دیا جائے تو مہینے سے پہلے اسے نہیں دہرانا چاہئے۔ اور اگر دہرانا بھی ہوتو ایک دفعہ دے کر بند کر دیں۔

اگر آئھ میں سفیدسی جھلی تھیلنے لگے تو زنک کی دوسوطاقت بہت فائدہ دیتی ہے۔

810

آئھوں کے چھپر میں اگرایسی بیاری ہوجائے کہ پلکوں کے بال مڑکر آئھ کے چھپر میں داخل ہونے شروع ہوجائیں تو وہ قدرتی طور پر بڑھتے ہوئے چھپر وں کے اندرہی گول چھلکوں کی شکل میں بڑے ہونے لگتے ہیں اور بہت تکلیف دیتے ہیں۔ عموماً اس کا علاج جراحی ہے لیکن ایک جراحی کے بعد پھرکوئی دوسرابال مڑکر اندر چلا جائے گا اور بیسلسلختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ اس کا مستقل علاج زنکم سلف ہے اور میں نے اسے اکثر 200 طاقت میں بہت مفید پایا ہے۔ آئھ میں ناخونا (Pterygium) کو بھی زنگ 200 مہت جلد ٹھیک کردیتا ہے اور کسی ایریشن کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایریشن کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایریشن کی ضرورت نہیں رہتی۔

سرکوجب چکرآئیں تو زنم کا مریض ہمیشہ یہی خیال کرتا ہے کہ وہ بائیں طرف گرے
گا۔دائیں بائیں سر ہلانا اور سرکو تکیے میں دھنسانے کی کوشش کرنا بیزنکم کی بھی ایک علامت ہے۔
سراور ہاتھ خود بخو دہلتے رہیں اور رعشہ سا ہوجائے تو اس میں بھی زنم اچھی دوا بتائی جاتی ہے۔
کالی بائیکروم کی طرح ناک کے اندراوپر کی طرف جڑھ میں دباؤاوردکھن کا احساس۔
دانت جلدی مسوڑھوں کو چھوڑ نے لگتے ہیں۔دانتوں کو بھینچنے سے مسوڑھوں کو پچھآ رام محسوس ہوتا
ہے۔ جن بچوں کے اعصاب کمزور ہوں ان کے لئے دانت نکالنا مشکل ہوجاتا ہے اور خاص
علامت یہ ہے کہ دونوں پاؤں بے چینی کی وجہ سے مہتے رہیں گے یا آپس میں رگڑتے رہیں
گے،اگلتے وقت گلے کے عضلات میں بچھ تھوڑی سی در دہوتی ہے اور معدے میں میٹھی چیزوں
سے جلن پیدا ہوجاتی ہے نیزمتلی ، پچکی اور قے کار ججان ہوجاتا ہے۔ زنم کے مریض بہت جلدی
جلدی کھاتے ہیں اور کھانا کھاتے وقت ان کی بے صبری نمایاں ہوتی ہے۔ پیٹ اکثر گیس سے خلدی کھاتے ہیں اور کھانا کھاتے وقت ان کی بے صبری نمایاں ہوتی ہے۔ پیٹ اکثر گیس سے خلای کا ہواہوتا ہے۔

کمر کے نچلے حصہ میں درد،جس میں دباؤ برداشت نہیں ہوتا۔مردوں اورعور توں کے جنسی اعضاء بھی متاثر ہوتے ہیں اور فوتوں (Testicles) میں اوپر کی طرف کھپاؤ ہوتا ہے۔عورتوں میں بیماری کے طور پرشہوانی جذبات تیز ہوجاتے ہیں اور پستان متورم يم 811

ہوجاتے ہیں۔رات کے وقت حیض کا خون زیادہ بہتا ہے اور حیض کے دوران سب نکلیفوں میں اضافہ ہوجاتا ہے۔

ٹانگوں میں ویریکوز وینز (Vericose Veins) اور پاؤں میں چل بلینز (Chilblains) یعنی انتہائی سردی کے نتیجہ میں پاؤں کے پنج کا سخت سرخ ہوکر متورم ہوجانا جس کے نتیجہ میں ایسا پنجہ جڑ بھی سکتا ہے۔ کوہ پیاؤں کو بعض دفعہ انتہائی سردموسم میں برف پر مسلسل چلنے سے یہ تکلیف ہوتی ہے۔

إنديس تشخيص امراض

REPERTORY

ر بیرٹری کے سلسلہ میں ایک ضروری نوٹ

اس ربیرٹری میں بعض دواؤں کا نمونے کے طور پر تفصیل سے ذکر ہے کہ ایک ہی مرض بہت ہی دواؤں میں مل سکتی ہے ما ایک ہی دوا بہت ہی بیار یوں میں کام آسکتی ہے مگر اس میں دواؤں میں مل سکتی ہے مگر اس میٹریا میڈیکا (Materia Medica) کی طرز الیسی ہے کہ صرف بڑی بڑی دواؤں یا امراض کے ابواب کی نشاندہ بی کی گئی ہے اورا گرکوئی ان میں سے ایک بھی غور سے پڑھ لے تو وہیں اس کی ضرورت پوری ہوجائے گی یا دوسری دواؤں کی طرف اسے وہاں سے رہنمائی مل جائے گی۔ اس ربیرٹری میں جو بین کی طرز اپنائی گئی ہے اس سے امید ہے کہ پڑھنے والوں کا بہت سا وقت بیچ گا اور کتاب کے مطالعہ سے جو تکرار کا ایک عمومی ساتا ٹر ابھرتا ہے اس کی سمجھ آجائے گی کہ کیوں بیت کرارضروری تھی۔

بسم الله الرحمن الرحيم

بعض بیاریوں کاخصوصی ذکرخواہ روز مرہ لاحق ہونے والی عارضی بیاریاں ہوں یا لمبی مزمن اور بہت گہری بیاریاں ہوں۔

- (۱) نزله، زکام، بخار
 - (۲) کھائسی۔
- (۳) ٹانسلز (Tonsils) یعنی گلے کے غدودوں کی ہرفتم کی خرابی
- (٣) حچموٹے بچوں کا علاج جوابنی بیاریاں خودنہ بیان کرسکیں۔
- - (۲) معدہ کے عوارض۔
 - (۷) آنگھوں کی تکالیف۔
 - (۸) سلی امراض اور پھیچھ وں کی تکلیفیں مثلاً دمہ، کینسروغیرہ۔
 - (۹) جلدي امراض ـ
 - (۱۰) ول کی بیاریاں۔
 - (۱۱) یے کی تکالیف جس کے ساتھ ذیا بیطس کی پیچید گی ہو۔
 - (۱۲) رحم کی روز مرہ خرابیاں، کینسراور جریان خون۔
- (۱۳) بانجھ بن اوراسقاط حمل حمل کے دوران عمومی عوارض اورتسہیل ولا دت کی دوائیں۔
 - (۱۴) شریانوںاوروریدوں کی خرابیاں۔
- (۱۵) اعصابی ریثول یعنی نروس سطم (Nervous System) کی تکالیف۔
- (۱۲) مختلف تو ہمات اور عوارض کی نشاندہی کرنے والی خوابیں۔ نیند کا فقدان یازیادہ نیند۔

1_نزله،زکام، بخار

روزمرہ کے تجربہ سے بیہ بات ثابت ہے کہ اگر نزلدز کام کا آغاز میں ہی مؤثر علاج کیا جائے تو خدا کے فضل سے نزلہ کے نتیجہ میں ہونے والی خطرناک پیچید گیوں سے بچاجا سکتا ہے۔ جو نہی ناک کے اندر سردی کا احساس ہو فوراً کیمفر (Camphor) بہت جھوٹی طاقت یا 30 طاقت میں دینی چاہئے یا پھرا یکونا ئٹ (Aconite) جس طاقت میں بھی میسر ہو، دے دیں۔ایک ہزار طاقت میں بھی خدا کے فضل سے بہت اچھا اثر دکھاتی ہے۔

اگر چېره تمتمایا ہوا ہواور دھڑکن والا سردرد ہوتو ایکونائٹ (Aconite) کے ساتھ بیلا ڈونا (Belladonna) اور آرنیکا (1000 (Arinca) بھی ملالیا جائے تو بینسخہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ نصف گھنٹے کے وقفہ سے دوخورا کیس دینا کافی ہوتا ہے لیکن اگر بیماری کچھ مفید ثابت ہوتا ہے۔ نصف گھنٹے کے وقفہ سے دوخورا کیس دینا کافی ہوتا ہے لیکن اگر بیماری کچھ آگے بڑھ چکی ہوتو بیسیلینم (Bacillinum) + ڈفتھیرینم (Oscillococcinum) وافعاؤئنیزینم (Oscillococcinum) اور اوسلوکو سینم (Oscillococcinum) کی بڑھ چکی ہوتو بین دن روزانہ ایک یا حسب ضرورت دوخورا کیس دی جائیں تو نزلہ بگڑتا جاروں ملا کر دیں۔ تین دن روزانہ ایک یا حسب ضرورت دوخورا کیس دی جائیں تو نزلہ بگڑتا باریک نظر سے مطالعہ کریں اور حسب موقع علاج کریں۔

اگر نزلہ کے ساتھ جھینکیں بہت ہوں تو مندرجہ بالانسخہ کے بعد نیٹرم میور (Natrum Mur) 200 دیں۔اگراس کے باوجود بخار ہوجائے تواسے حسب ذیل ادویہ سے قابومیں لانے کی کوشش کریں۔

کالی فاس (Kali Phos) + فیرم فاس (Kali Phos) کالی میور (Kali Phos) بالی میور بیرم فاس (Kali Phos) بالی میور (Kali Phos) بالیشیا (Kali Mur) بالیشیا (Kali Mur) بالیشیا (Sulphur) بالی نیروجینیم (Pyrogenium) بالی نیروجینی (Sulphur) بالی نیروزانه شیخ شام دین ورنه علامات کے مطابق حسب ذیل شخوں سے علاج کریں۔ زکام میں یانی سی تبلی رطوبت اور سردی کی علامت سیمیم (Gelsemium) ، سلیشیا

(Silicea)، نیٹرم میور (Natrum Mur)، سورائینم (Silicea) اور کالی کارب (Kali Carb) میں مشترک ہے۔کالی کارب میں کمر کی دکھن پچھلے پہرتین چار بجے بڑھ جاتی ہے جبکہ نیٹرم میور میں صبح سے شام تک دن بھر رہتی ہے۔

اگرگرمی سے نکلیف بڑھے توپلسٹیلا (Pulsatilla) اورائیس (Apis) دونوں کام آ سکتی ہیں۔ دونوں میں پیاس کم اور رطوبت عموماً گاڑھی، زرد رنگ کی ہوتی ہے لیکن پلسٹیلا کا مریض نرم مزاج ہوگا جبکہ ایپس کا مریض چڑچڑا ہوگا اور عضلات میں ڈیک لگنے کی طرح کے تیز لہر دار در دہوں گے اور پییٹا ب میں کمی اور گردوں میں سوزش ہوگی۔

کالی بائیکروم (Kali Bichrom) پرانے ضدی نزلہ میں مفید ہے۔ گاڑھی کیس دار زر در طوبت نکلتی ہے جس کے ساتھ پیچھے ناک کی جڑھ میں در دہوتا ہے۔ مادہ گاڑھا اور جڑا ہوا دھاگوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

موسم بہار میں Hay Fever اور الرجی کی وجہ سے چھینکوں کے دورے شروع ہوں تو سیاڈیلا (Sabadilla) ضروری ہے کیکن اگر الرجی خزاں کے موسم میں ہواور چھینکیں آئیں اور آئیکھوں سے سادہ پانی بہے جو خراش نہ پیدا کرے نیز نزلہ کا اثر کا نوں پر بھی ہوتو سباڈیلا کی بجائے اہلیم سییا (Allium Cepa) دوا ہوگی۔

اگر آنکھوں سے جلن پیدا کرنے والا پانی بہے جوسوتے میں گلے اور چھاتی پر گر کر خارش اور کھانسی کا موجب بنے تو یوفریزیا (Euphrasia) دوا ہوگی۔

موسم بہار کی الرجی کے مستقل علاج کے لئے کیکیسس (Lachesis) 1000 بہت اچھا کام کرتی ہے جسے سباڈیلا سے آ رام آنے کے بعد بیاری کی بیخ کنی کے لئے لمبے وقفوں کے ساتھ چند ماہ استعال کرنی چاہئے۔

جب بھی مرطوب موسم ہو یا جلد جلد موسمی تبدیلیاں واقع ہوں تو نزلاتی اور جلدی بیاریوں میں ڈ لکا مارا (Dulcamara) بہترین دوا ثابت ہوتی ہے۔اس کے زکام سے ناک بند ہوجا تا ہے،صرف ہلکا ہلکا یانی رستار ہتا ہے۔

اگر کمزوری، بے چینی اور جلن بہت ہولیکن گرمی سے آ رام آئے تو آ رسینک

(Arsenic) دوا ہوگی۔ اگر کھانے کی بوسے متلی ہوتو یہ کالچیکم (Colchicum) کی نمایاں علامت ہے۔

ذیا بیطس کے مریضوں کی نزلاتی تکالیف میں دوسری ضروری دواؤں کے علاوہ (Natrum Phos) اور نیٹر م فاس (Kali Sulph) نیٹر م سلف (Natrum Sulph) کالی سلف (Arnica) اور نیٹر م فاس (Arnica) ملاکر دن میں دو تین بارد بنی جا ہمیں اور اگر جسم اور بٹریوں میں درد بہت ہوتو آرنیکا (Eupatorium) ملاکر دینا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔

پرانا نزلہ جودھا گوں کی صورت میں نکلے اس میں کالی بائیکروم (Kali Bichrom) کے ساتھ ملاکر کے علاوہ کو کس کیکٹائی (Coccus Cacti) کو ہمیپر سلف (Hepar Sulph) کے ساتھ ملاکر دینا نزلہ کے برانے مریضوں کے حق میں بہترین ثابت ہوتا ہے۔

اگرنزلہ سے گلاخراب ہوجائے تواس کے لئے مندرجہ ذیل دواؤں کو یا در کھیں۔ ہرائیٹا کارب(Baryta Carb) + جلسیمیم (Gelsemium) (اگر پیاس نہ ہو،منہ میں خشکی ہواور سر بھاری ہو)

+ (Causticum ایکونائٹ (Aconite) کونائٹ (Arnica) کے آرنیکا (Arnica) کے ایکونائٹ (Aconite) ہیلاڈونا (Belladonna) (ہوشم کی گلے کی خرابی میں جس میں گلے کی طرف رجحان خون ہو، ہوزش اور در دہو) 30 طاقت سے لے کر 1000 طاقت تک بعض دفعہ 1000 طاقت میں نسخہ غیر معمولی سرعت سے کام کرتا ہے۔ آ دھے گھنٹہ کے وقفہ سے دوخورا کیس کا فی ہوتی ہیں۔

ﷺ برائیٹا کارب (Baryta Carb) + بیلاڈونا (Causticum) کاسٹیکم (کرناتی کیفیت اور گلے کی خرائی)

بعض دفعہ اس نسخہ میں کاسٹیکم (Castucum) کی بجائے کالی میور (Kali Mur) ملانا حسب علامات ضروری ہوتا ہے۔

اگر گلاشد یدخراب ہونے کے ساتھ منہ سے پانی بہے اور سخت بدبوآتی ہوتو مرکری

(Mercurius) کے مرکبات میں دوا تلاش کریں۔

ضروری نوٹ:۔ جن دواؤں کی بحث نزلہ، زکام اور بخار کے مذکورہ بالا باب کے تحت کی گئی ہے ان میں سے کسی دوا کا بھی تفصیلی ذکر پڑھ لیا جائے تو ان امراض کے سجھنے میں آسانی پیدا ہوجائے گی۔

آرم ٹرائی فلم Arum Triphyllum	ین Alumina	اليوب
ارومیم Bromium	Aurum Metallicum منتیکیم	آ رم
کار بونیم سلف Carboneum Sulph	ر یا کارب Calcarea Carbonica	كلكير
Coccus Lorentz	بووت Carbo Vegetabilis	كار
Capsicum کیپسیکم	Guaiacum	گائي
نیٹرم کاربNatrum Cabonicum	ورانینم Medorrhinum	میڑ
الكس واميكا Nux Vomica	السلا Nitruc Acid	نائطر
Mercurius مرکری	راسٹس Hydrastis	ہائیڈ
اسورانکینم Psorinum	Phosphorus ورس	فاسف
Silicea يشيا	ىٹس Cistus	
تھوجا Thuja	Pulsatilla U	بلسله
•	ابائنگروم Kali Bicrom	كالى

2_ کھائسی

کھانتی اگر اچا تک ہو جائے ، منہ اور گلا خشک ہواور مریض اس اچا تک حملہ سے خوفز دہ ہوتو ایکونائیٹ (Arsenic) + آرسینک (Aconite) اور خوفز دہ ہوتو ایکونائیٹ (1000 (Aconite) + آرسینک (جب بیلا ڈونا (Belladonna) 1000 (Belladonna) دھ گھنٹہ کے وقفہ سے دوبار پھر لمبے وقفہ سے (جب بھی ضرورت پڑے) اور اگر ہروفت بے چینی گلی رہے تو آرسینک کو آزمانا چاہئے۔ ایسا مریض جو آرسینک کو مریض کری سے مریض جو آرسینک کا نقاضا کرے لیکن خشک کھانسی اور چھینکیس گرمی سے

بڑھیں تو آ رسینک آ بوڈ ائیڈ (Arsenic Iodide) مفید ہوگی جو کی خون کے مریض کے لئے بھی مفید ہے۔

خشک کھانسی کے ساتھ اگر نچلے جڑے اور گلے کے غدود بڑھے ہوئے ہول، لیٹنے سے چکرآئیں تو برومیم (Bromium) دیں۔

جب سردیاں گرمیوں میں تبدیل ہورہی ہوں تو اکثر نزلاتی تکلیفوں میں برائیونیا (Bryonia) کام آتی ہے جو 200 طاقت میں اچھا کام کرتی ہے۔ اس موسم میں اگر کالی کھانسی اور دمہ ہوجائے تو ڈروسرا (Drosra)لازمی دوا ہوگی۔نمدارموسم میں بھی ڈروسرا کی تکلیفیں بڑھتی ہیں۔

اگر بیلا ڈونا(Belladonna) سے آرام نہ آئے تو کلکیریا کارب(Calcarea Carb) سے آرام نہ آئے تو کلکیریا کا ریض عموماً کم خون دیں اور یا در کھیں کہ بیلا ڈونا کا مریض پرخون ہوتا ہے اور کلکیریا کا مریض عموماً کم خون والا۔

گرم مزاج مریض کی خشک کھانسی جوبلغمی کھانسی بن جائے اور گلے میں پیپ پڑنے کا رجحان ہوتو کلکیر یاسلف(Calcarea Sulph) دواہوگی۔

روٹھنے کی عادی لڑکیوں اور ہسٹیر یائی مزاج عور توں کی کھانسی میں اگنیشیا (Ignatia) بہترین ہے۔

ر یومیس (Rumex) کی کھانسی ضدی اور خشک ہوتی ہے۔ گلے میں سخت کھجلی ہوتی ہے، کھانسی لیٹنے سے بڑھتی ہے۔ اسے چیلی ڈونیم (Chelidonium) کے ساتھ ملا کر دینا بہترین نسخہ ہے۔ اگر میکام نہ کرے تو سلفر (Sulphur) 200 اور رسٹاکس (Rhustox) بہترین نسخہ ہے۔ اگر میکام نہ کرے تو سلفر (Sulphur) 200 اور رسٹاکس (200 باری باری دیں۔

سپونجیا (Spongia) کی خشک کھانسی دل کے عارضہ سے تعلق رکھتی ہے۔ چھاتی سے آرا چلنے کی سی آ واز آتی ہے۔

وہ خشک کھانسی جو بیننے یا بولنے سے چھڑ جائے فاسفورس (Phosphorus) کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ سل اور چھیپھڑوں کے کینسر کی بھی بہترین دوا ہے۔شروع میں چند مہینے اسے 30 طاقت سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ نیز برائی او نیا (Bryonia) کے ساتھ ملا کریا باری باری دن میں تین چار باراستعمال کرائیں۔علاوہ ازیں روزانہ چائے کی چمچی کا چوتھا حصہ ہلدی، پانی یا دودھ کے ساتھ بلائیں، چھپھڑے کے کینسرکا بہترین علاج ہے۔

پرانی کھانسی میں کالی کارب نمایاں کام کرتی ہے۔ کالی کارب کے مریض کی آئکھوں کے پپوٹے عموماً متورم ہوتے ہیں اور اکثر کمر در دکی شکایت بھی ہوتی ہے جو سبح تین چار بج ضرور بڑھ جاتی ہے۔

گلے کی سوزش میں، جو کان کی طرف جائے نیز مریض کی ناف پردکھن کا احساس ہوتو پہلے میں، جو کان کی طرف جائے نیز مریض کی ناف پردکھن کا احساس ہوتو پہلے میں (Plumbum) میں کے دوجہ سے ہونے والی کان درد کا بھی فوری علاج ہے۔ یہ کام نہ کرے تو حسب علامات کیمومیلا (Pulsatilla) بہترین کام کرتی ہیں۔

ایسے بچوں کی خشک کھانسی میں، جن کو پیٹ کے کیٹر وں کی شکایت اور ناک کوانگلی سے کھجلانے کی عادت ہو، سائنا (Cina) دوا ہوگی۔اگراس کے ساتھ معدہ تیز ابی ہوتو نکس وامیکا (Nux Vomica) کارآ مدہے۔

جسمانی رطوبات ضائع ہونے سے یابار بارجریان خون سے کھو کھلے ہوجانے والوں کی چائنا(China) دواہے۔

کھانستے وقت متلی ہو مگر نے نہ ہو اور چھاتی میں بلغم کھڑ کھڑائے تو اپی کاک (Ipecac)مفیدہے۔

خشک کھانی میں جو حجرہ پر دباؤ ڈالے اور نیند کے دوران زیادہ ہوجائے، کیکیسس (Lachesis) بہت مؤثر ہے۔

خشک کھانسی جورات کوزیادہ ہواور بچے سخت غصیلے اور ضدی ہوں ان کے ہر مرض کا علاج کیمومیلا(Chamomilla)ہے۔

Argentum Metallicum ارجنومٹیلیکم Alumina

Carbo Vegetabilis کار بووت	ا ينٹي مونيم ٹارٹ Antimonium Tart			
Drosera נ'תפית ו	Causticum کاسٹیکم			
Hyoscyamus ہائیوسائیمس	Hepar Sulphuris ميپرسلف			
کالی بائنگروم Kali Bichromicum	اپی کاک			
كالى آئيوڈائيڈ Kali Iodide	Kali Carbonicum کالی کارب			
سینگونیریا Sanguinaria	سورائينم Psorinum			
Senega Li	Silicea Limin			
ٹیو بر کولینم Tuberculinum	Stannum مثينم			
Conium $\int_{-\infty}^{\infty} e^{ix} dx$	الكس واميكا Nux Vomica			
Capsicum کیسیکم	Baryta Carb برائيطا كارب			
ليكيـس Lachesis	يوفريزيا Euphrasia			
ا من المنسل Hydrastis	ا گنشیا Ignatia			
3۔ ٹانسلز (Tonsils) یعنی گلے کےغدودوں کی ہرفتم کی خرا بی				

2- با منز (Tonsits) من منظے کے علاودوں کی ہر من کرانی بیاری شروع ہوتے ہی ا یکونائٹ (Aconite) + بیلاڈونا (Belladonna) 1000 اور آرنيکا (Arnica) کی چندخوراکیس فوری اثر دکھاتی میں روز مرہ کی گلے کی خرابیوں میں سلیشیا (6x(Ferrum Phos) + فیرم فاس (6x(Ferrum Phos) + كلكيريا فلور (Kali Mur) + كالي ميور + 6x (Calcarea Fluor) ملاكر دیں۔ بخار کی صورت میں شروع میں نصف گفتیہ کے وقفہ سے ان کودہرا نابیٹر تا ہے۔

گلے کے غدودوں کا تفصیلی ذکر نزلہ، زکام، کھانسی اور نزلاتی بخاروں کی بحث کے دوران گزر چکا ہے،اسے ضرور پڑھ لیں نیز اگر بخار کے ساتھ سانس میں بد بوہو، گلاسو جا ہوا ہو اورنگلنامشکل ہوتو بیٹیشیا (Baptisia)ا کیلی دواہی کافی ہوگی۔ گلے میں پیپ پڑنے کا رجمان ہواور اندرکوا بھی سوجا ہوا ہوتو کالی بائی کروم (Kali Bichrom) ضروری ہے۔

غدودوں میں شدید سوجن کے ساتھ تختی پائی جائے اور جگہ جگہ پیپ کے دھبے نظر آئیں، نگلتے وقت درد کانوں تک چلا جائے ، حلق میں خشکی اور جلن بہت ہوتو فائیولاکا (Phytolacca)انتہائی ضروری ہے۔

گلے کی نئی اور پرانی تکلیفوں میں ہرایسے مریض کے لئے برائیٹا کارب(Bryta Carb) بہت مفید ہے جس کی غدودویں بیاری کے ہرحملہ کے بعد پہلے سے پچھاورموٹی اور سخت ہو جاتی ہیں اورا بنے پہلے جم کی طرف واپس نہیں لوٹیتں۔

گلے سے خوفناک بد ہوآئے تو مرکری (Mercurius) کے مرکبات کا مطالعہ کرکے دوا تلاش کریں۔

کلے کی خطرناک تکالیف میں ٹرینٹولا ہسپانیہ (Tarentula Hispania) کی جسمانی اور نفسیاتی علامات کا بغور مطالعہ ضروری ہے۔

شدید درد اور ایسے زخم جو کٹے بھٹے ہوں، منہ میں بے حد بد بودار لعاب ہوتو نائیٹرک ایسٹر (Nitric Acid) دواہوگی۔

نزلاقی بیار یوں میں برومیم (Bromium) کا ذکر گزر چکا ہے۔ٹانسکز (Tonsils) کے لئے اسے دوبارہ احتیاط سے پڑھ لیں۔

سخت سوزش، گلے میں پھانس اٹکنے کا احساس، بخار اورجسم سے سخت کھٹی ہو ہمیپر سلف (Hepar Sulph) کی علامات ہیں۔

سیفیلینم (Syphilinum) 200طافت میں گلے کی ہرخرابی کے آغاز میں استعمال کرنی مفید ہے۔ نیز مندرجہ ذیل نسخے کام آسکتے ہیں۔

(Kali بیٹیشیا (Baptisia) + بیٹیشیا (Phytolacca) کالی میور (Kali کالی میور (Silicea) + سلیشیا (Silicea) ملاکر 30 طاقت + Mur) + کلکیر یا فلور (Silicea) + سلیشیا (Silicea) کی بجائے ہیپر سلف میں روزانہ تین بار، اگر گلے میں درد زیادہ ہوتو سلیشیا (Silicea) کی بجائے ہیپر سلف

(Hepar Sulph)دیں۔

ہے۔ انٹولاکا (Phytolacca) + ہیپرسلف (Phytolacca) ہے۔ ہیپرسلف (Phytolacca) ہے۔ ہیپرسلف (Carboveg) ہے۔ اللہ طاقت میں روزانہ تین بار۔ الله علی اللہ جو ٹھیک ہونے میں نہ آئیں ان کو یہ نسخہ بھی دیں۔ انفلوئیزینم (Diphtherinum) + ٹوتھیرینم (Becillinum) + ٹوتھیرینم (Oscillo Coccinum) چاروں اکھی 200 طاقت میں ملاکر۔ تین دن اور اوسلوکوسینم (Oscillo Coccinum) چاروں اکھی 200 طاقت میں ملاکر۔ تین دن تکلیف کی شدت کے دوران دن میں ایک باریا زیادہ سے زیادہ حسب ضرورت دوبار استعال کروائیں۔ تین دن سے زیادہ دینے کی ضرورت نہیں۔

4_ جیموٹے بچوں کاعلاج جواپنی بیاریاں خود نہ بیان کرسکیں

بچوں کوعموماً نزلاتی بیماریاں، گلے کی خرابیاں اور کان کی تکلیفیں لاحق ہوتی ہیں اوران نزلاتی تکلیفوں کے نتیجہ میں روزانہ رات کو بخار کا حملہ ہوتا ہے جو یا تومسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے یا ایک دم دب جاتا ہے جس کے نتیجہ میں بیچ کی موت بھی واقع ہوسکتی ہے۔ ایسی تمام بیاریوں کا ٹکسالی کانسخہ میہ ہے۔

ا يكونائيك (Aconite) + آرنيكا (Arinica) ا رسينك (Arinica) ا يكونائيك (Aconite) ا بيلادُ ونا (Belladonna) (Belladonna) + بيلادُ ونا (Kali Mur) + كالى ميور (Silicea) ا سليشيا (Ferr Phos) كالى ميور (شاك) ا

کلکیر یا فلور (Calc. Flour) + کالی فاس (Kali Phos) + کالی و نعبہ کلکیر یا فلور (Calc. Flour) + کالی فاس (Kali Phos) + کالی و نعبہ درجائی ہوں تک نظر سے اس مناسب حال نسخہ تلاش کریں۔اسی طرح اگر وہائی بیماریاں پھیلی ہوں تو وہائی بیماریوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ بچہ تو بھی نہیں بتا سکتا مگر طبیب کے لئے ضروری ہے کہ گہری نظر سے اس کی علامتوں کا مطالعہ کرکے مناسب حال دواکی فوری تلاش کرے۔

Ipecac	ا پي کاک	Chamomilla	حجيموميلا
Nux Vomica	نكس واميكا	Natrum Muriaticum	نیٹرم میور ۱
Alumina	اليومينا	Calcarea Phos	كلكير يافاس
Allium Cepa	ايليم سيبيإ	Bryonia	برائيونيا
Veratrum Album	وريثرم البم	Podophilum	بوڈ وفائکم
		Colocynthis	كالوسنتھ

5_ اسہال، پیچش قبض اورانترا بوں کے عارضی

یا گہرے مزمن عوارض

انترایوں کی بیاریوں میں ہرفتم کی پیچیدہ گہری بیاریاں شامل ہیں۔ بڑی آنت میں گہرے ناسور جن کی وجہ سے جریان خون بکثرت ہو، ہرفتم کی قبض، ہرفتم کی پیچیش اور جگر اور انترایوں کا کینسر، ہرفتم کے عارضی یا مستقل اسہال۔ غرضیکہ شاید ہی کوئی بیاری الیمی ہوجوا نترایوں کے عوارض میں نہ ملے۔ اس لئے ان کا تفصیلی مزید ذکرر بپرٹری میں کیا جانا ممکن نہیں اور طبیب کے لئے ریپرٹری کے ذریعہ مرض کی شناخت کرنا بھی تقریباً ناممکن ہیں اور طبیب کے لئے ریپرٹری کے ذریعہ مرض کی شناخت کرنا بھی تقریباً ناممکن انترایوں وغیرہ کی بیاریوں پر گہری نظر ڈالیس تو طبیب کو محض چند دواؤں کے تفصیلی مطالعہ سے ان دوسرے ابواب کی نشاند ہی بھی ہو جائے گی جن میں انہی بیاریوں کا مزید ذکر

لازمی ہوگا۔اگران کو بار بار	لگا كر تفصيلى مطالعه	ئسب ذیل ابواب کا چند گھنٹے	موجود ہے۔ پس<
ملکہ حاصل ہوجائے گا۔) بسهولت تشخيص كا	ز برہوجا ئیں تو پھرمریضوں ک	پڑھاجائے اوروہ ا
Aethusa	ايتقوزا	Abrotanum	ابراثينم
Alumen	اليومن	Alumina	أبلو مينا
Apocynum	ايپوسائنم	Apis	اييس
Belladonna	بيلا ڈونا	Arnica	آرنيكا
Calc. Carb	كلكير يإ كارب	Bryonia	برائيونيا
Carbo Animalis	كار بواليتميلس	Calc Fluor	كككير يا فلور
Carcinosin	كارسى نوسن	Carbo Veg	كار بووتىج
Cholesterinum	كوليسطرينم	Chelidonium	چىلى ۋوينىم
Croton	کروٹن	Colocynthis	كولوسنته
Dioscorea	ڈا ئیاسکوریا	Cuprum	کیوپرم
Graphites	گريفائڻس	Ferrum Phos	فيرم فاس
Kali Carb	كالىكارب	Hepar Sulph	هميپرسلف
Meg Phos	ميگ فاس	Kali Mur	کا کی میور
Millefolium	ملى فوليم	Mercurius	مرکری
Nux Vomica	تکس وامیکا	Nitric Acid	نا ئىڭرك ايسىڑ
Phosphorus	فاسفورس	Oxalic Acid	آ گزالکایسٹر
Silicea	فاسفور <i>س</i> سلیشیا	Plumbum	پلیمبرم وریٹرم البم
Aconitum		Veratrum Album	وريثرم البم
Argentum Nitricum	ارجنثم نا ئيٹريكم	Aloe	ابليو

Psorinum	سورا نکینم	Baptisia	ببطيشيا
Cantharis	كينتهرس	Baryta Carb —	برائيطا كأر
Dulcamara	ڈ لکا مار ا	China	حيا ئنا
Natrum Sulphuri	نیٹرم سلف cum	Natrum Muriaticum	نیٹرم میور
Sulphur	سلفر	Tuberculinum	ٹیو برکو لینم
Podophilum	بوڈوفائکم	Thuja	تھوجا
Opium	او پیم	Fluoricum Acidum 💃	فلورك ايب
Capsicum	كبيسيكم	Arsenicum	آ رسینک
Cina	سائنا	Colchicum	كالجيكم
Chamomilla	كيموميلا	Gelsemium	جلسيميم
Ipecacuanha	ا پي کا کِ	Ceanothus	سيا نوهس
Iris Tenax	، رسطینکس آ مرک	Magnesia Carbonic -	میگ کارر
	کے عوارض	6- معده	
	1	عدہ کےعوارض خاص توجہ کے مختاج ہ	
) ہیں۔نمایاں دوا ئیں جو	رِ گهرےاثرات رکھ ت	ظام کو ماؤف کریں وہ سارےجسم ب	معدہ کے اُ
	ى حسب ذيل ہيں:	ہر قتم کی تکلیفوں میں کا م آنے والی ہیر	معدیے
Aesculus	ايسكولس	Absinthium	ابسنتهيم
Arsenic Iodide	آرسينكآ ئيوڈائيڈ	Alumina	اليومينا
Carbo Animalis	كاربوانيميلس	Capsicum	كييسيكم
Chelidonium	چیلی ڈوینم سیمی می فیوجا	Carbo Veg	کار بووت کار بووت
Cimicifuga	سيمىسى فيوجا	China	حيا ئنا

Colocynthis کولوسنتھ	Colchicum کا کچیکم
Crotalus کروٹیلس	Conium Conium
ائیڈراسٹس Hydrastis	ثانیوسکوریا Dioscorea
آ ترُس ورسی ککر Iris Versicolor	اپي کاک
Kreosotum کرنیوزوٹ	كالى آئيوڈائيڈ Kali Iodatum
Muriatic Acid میورینگ ایسته	Mercury مرکزی
نیٹرم فاس Nat Phos	نیرم میور Nat Mur
فاسفورس Phosphorus	Nux Vomica ککس وامیکا
المجمع Plumbum جياب	Phytolacca فانكيلو لا كا
Sanguinaria سینگونیریا	Pulsatilla پلسٹیلا
آرسینک البم Arsenicum Album	امونیم کارب Ammonium Carb
لاتکو بوڈیم Licopodium	Lachesis ليكيت س
سلفيورك ايستر Sulphuric Acid	Rhus Toxicodendron رسٹاکس
ارجاثم نا ئيٹر کيم Argentum Nitricum	رائیگلیمن Cyclamen
Bismuthum pink.	اسا فوشیرا Asafotida
Lac Defloratum کیک ڈیفلوریٹم	Gratiola گریثولا
کا مطالعہ ہی کافی ثابت ہو گا باقی سب ضروری	ان دواؤں میں سے صرف چندایک

ان دواؤں میں سےصرف چندایک کا مطالعہ ہی کافی ثابت ہوگا باقی سب ضروری ادو پیکاانہی کے تحت ذکرمل جائے گا۔

معدہ اور انتر یوں کے السر کے لئے کچے کیلے کا پاؤڈر بھی چوٹی کا علاج ہے۔ کچا کیلا کے کراسے اچھی طرح خشک کر کے اس کا پاؤڈر بنالیں اور دن میں تین چار دفعہ اسے کھا نا شروع کردیں۔ جب تک کیلا بوری طرح خشک نہیں ہوتا ، بالکل کچا کیلا بھی اس کے علاج کے طور پر کھایا جاسکتا ہے۔ علاوہ ازیں اس اثناء میں السر کے لئے لٹھی کا استعال بھی مفید ہے۔ تھوڑی سے جبالیں۔ منٹھی منہ میں رکھ کراسے دانتوں سے چبالیں۔

7۔ آنکھوں کی تکالیف

آ نکھوں میں سوزش ہو جائے تو ایکونائٹ (Aconite) اور بیلاڈونا (Belladonna) ملاکر کسی بھی طاقت میں فوراً دے دینی چاہئے۔اگر فوری افاقہ نہ ہوتو ان ابواب کا مطالعہ کریں جن میں خصوصیت سے آئکھوں کی بیار یوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ابواب حسب ذمل ہیں:

Aethusa	ايتقوزا	Aesculus	ايسكولس
Apis	اييس	Alumina	ايليو مينا
Conium	كويتم	Arnica	آ رنيكا
Gelsemum	حلسيميم	Euphrasia	يوفريزيا
Millefolium	ملى فوليم	Hepar Sulph	<i>هیپر</i> سلف
		Psorinum	سورا نکینم

یہ سب بہت کام کی دوائیں ہیں۔ان کے مطالعہ کے دوران معالج کو آ نکھ کی اکثر بیار یوں کا ذکر مل جائے گا۔ ذیل میں نمونٹا آ نکھ کی بیار یوں اوران کے علاج کا نسبتاً تفصیل سے ذکر کیا جارہا ہے۔

اگرآئھوں کے وہ ریشے جن میں خون گردش کرتا ہے کمزور پڑجائیں اور ذراسا دباؤ بھی برداشت نہ ہو، آئھیں ہمیشہ سرخ رہیں تو بعض ڈاکٹر اس بیاری کوآئھوں کی بواسیر کہتے ہیں، اس میں ایسکولس (Aesculus) 30 بہت مفید ہے۔ ورنہ اس بیاری کے مزید بڑھ جانے سے آئھ ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آئھوں میں سوزش رہنے سے گومڑ بن جائیں تو اس میں بھی ایسکولس مؤثر دوا ہے۔ بعض دفعہ آئکھ کے چھپر موٹے ہوکراو پر کی طرف الٹ جاتے ہیں اور اندر کی سرخی نمایاں ہوکر آئکھیں بہت بھیا تک شکل اختیار کر لیتی ہیں، بلکیں چھڑ نے گئی ہیں۔ ایسی صور توں میں سورائینم (Psorinum)،

ہیپر سلف (Hepar Sulph)،ایلومینا (Alumina)،وغیرہ مفید دوائیں ہیں۔

ایتھوزا (Aethusa) میں زودحسی بہت پائی جاتی ہے۔ پیوٹوں کے کنارے سوج جاتے ہیں، تکلیف کی شدت سے آئکھوں کی پتلیاں ادھرادھر حرکت کرتی ہیں، آئکھیں نیچے کی طرف کھنچ جاتی ہیں۔

اییں (Apis) میں آنکھوں کے نیچے ورم آ کرساری آنکھسوج جاتی ہے، کیا کیا گوشت ابھرا ہوا دکھائی دینے لگتا ہے۔ بیلا ڈونا اور یوفریزیا سرخی کی علامت اور شدت میں مشابہت رکھتی ہیں۔ یوفریزیا(Euphrasia) میں تیز کا ٹیے والا یانی بہتا ہے۔

بیلا ڈونا آ نکھ کے بلڈ پریشر میں بھی مفید ہے۔ مسیمیم بھی آ نکھ کا دباؤ کم کرنے کے لئے مفید دوا ہے۔ کالے موتیے میں کلکیریا فاس 6x اور سیمیم ملاکر دینا مفید ہے۔

آ نکھ کے کورنیا میں بعض اوقات سفید مواد آجاتا ہے اور آہتہ آہتہ بہنے لگتا ہے، اگر انفیکشن پرانی ہوتو مواد میں زردی آجاتی ہے۔ اس میں کلکیریا کارب مفید ہے۔ آنکھوں کی تھکاوٹ اور دباؤ سے پیدا ہونے والی کمزوری میں کلکیریا کارب مفید ہے لیکن اونو سموڈ یم (Onosmodium) آنکھوں کی تھکاوٹ میں زیادہ مؤثر ہے۔

آئکھوں کے پوٹوں کی بیاری میں کاربویم سلف (Carbonium Sulph) دوا ہے۔ آئکھوں کے اور چینے لگیں یا پیپ کے دھا گے نکلیں یا آئکھوں کے اور پر گومڑنکل آئیں جن میں جلن اور خارش بھی ہو گر دوسری علامتی دواؤں سے فائدہ نہ ہوتو کاربوینم سلف دیں۔
آئکھ کے چھیر کا ایگزیما، گرمی ، بھاری بن، دکھن کا احساس، پانی بہتا ہے، آئکھیں بوجل ، پیپ کے چھوٹے دانے ، پوٹوں کا سوجنا، روشنی سے زود حسی ، نظر کی کمزوری ، رگوں کی بیچان کا فقدان کاربوینم سلف کی خاص علامتیں ہیں۔ آئکھوں کے چھیر کا تدریجی فالج جو آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ کاسٹیکم کی خصوصی علامت ہیں۔

روشنی سے بہت زودحسی اور پانی کا بہنا ،اگر سر میں چکروں کا رجحان بھی ہواور لیٹنے

سے چکرزیا دہ آئیں تو یہ تینوں علامتیں مل کر کوئیم (Conium) کی نشاند ہی کرتی ہیں۔ آئکھیں زرد، آئکھوں کے گردسیاہ جلقے، آئکھوں میں جلن اور درد جیسے کسی نے چاقو گھونپ دیا ہو،نظر کا دھندلا جانا، بینائی کی بڑھتی ہوئی کمزوری،خون بہنے کار جحان، روشنی نا قابل برداشت، یہتمام علامتیں کر ڈیلس (Crotalus) میں یائی جاتی ہیں۔

آ نکھوں کی سرخی اور زخم، پوٹوں پہدانوں یا آبلوں کا پایا جانا اور آنکھوں میں سوزش ہو تو کروٹن (Croton) مفید ہے۔ کروٹن کی مزید علامتیں یہ ہیں۔ آنکھوں کے سامنے بجلی سی لہراتی اور ستارے جیکتے ہوئے دکھائی دینا، نیچے جھکنے سے سیاہ دھے نظر آنا، درد، دباؤ، خون کا غیر معمولی اجتماع۔ جیسے ریت کے ذرات سوزش پیدا کر رہے ہوں اور روٹا (Ruta) کی طرح باریک نظر کے کام کرنے سے بہت تکلیف۔ باریک کام سے اگر آنکھوں میں درد کی بجائے سردرد ہوتو اونوسموڈیم (Onosmodium) مفید دواہے۔

آ نکھ کا چھپرا گرفالجی کمزوری کی وجہ سے گر جائے تو حسب ذیل چار دوائیں زیر مطالعہ آئی چاہئیں۔ ایگیریکس (Agaricus) ، پلمبم (Plumbum)، سینی گا (Senega) اور کاسٹیکم (Causticum)۔ کورنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے داغوں کا پایا جانا بھی سینی گا کی نمایاں علامت ہے۔

کورنیا کے السر میں سلیٹیا (Silicea) بہت مفید ہے۔ اسی طرح کلکیر یا فلور بھی آ تکھوں کی بیاریوں سے گہراتعلق رکھتی ہے۔ اچا تک سر دی لگ جائے اور آ نکھ میں در دہوتو سپائی جیلیا کے باب میں آ نکھ کی بیاریوں کا مطالعہ مفید ثابت ہوگا۔

آ نکھ کے اعصابی درد کے لئے لاک فل (Lac Felinum) بھی مفید دوا ہے جو بلی کے دودھ سے تیار کی جاتی ہے۔ آ نکھوں میں درد ہو، سرخی پائی جائے، پانی بہتا ہو، آ نکھ کھو لنے اور بند کرنے سے تکلیف میں اضافہ ہو، آ نکھوں کی جلن نیز پڑھنے سے آ نکھوں میں درد ہوتو سٹروشیم کارب(Strontium Carb) دوا ہے۔

اگرآ نکه کی بیاریوں کااثر دائیں طرف زیادہ ہو، دائیں آ نکھ میں دھند،نظر کی کمزوری

اور مواد نکلے توٹرینٹولا (Tarentula) مفید دواہے۔ آئکھوں کے سامنے سیاہ دھبے نظر آتے ہیں، آئکھ کھلنے پر نظر دھند کی محسوس ہوتی ہے، آئکھوں میں سوئیاں چھتی ہیں اور جلن ہوتی ہے تو اس کے لئے نیٹرم کارب (Natrum Carb) دواہے۔

مندرجہ بالا دواؤں کےعلاوہ ان ابواب کا مطالعہ بھی آئکھوں کےعلاج کے لئے مفید

ثابت ہوگا۔

			تا بت ہوتا۔
Calc Flour	كلكيريا فلور	Baryta Carb	برائيطا كارب
Hydrastis	ہائیڈ راسٹس	Crotalus	ڪروفيلس
Ledum	ليژم	Kali Carb	کالی کارب
Medorrhinum	ميڈورائينم	Lilium Tig	لليم ٿگ
Muriatic Acid	ميوريثك ايسله	Mercurius	مرکری
Zincum Sulph	زنكم سلف	Phosphorus	فاسفورس
Aurum Metallic	آرم مثلیکیم um	Argentum Nitricum	ارجنثم نا ئيٹر نکم
Calcarea Sulphuri	کلکیر یا سلفca	Cocculus	كأكوكس
Cicuta Virosa	سيكوڻا وروسا	Chininum Ars	حینینم آرس مینینم آرس
Cyclamen	ساليكليمن	Cuprum	کیوپرم
Graphites	گریفائٹس	Glonoine	گلونائن
Natrum Carb	نیٹرم کارب	Millefolium	ملى فوليم
Natrum Sulph	نيٹرم سلف	Natrum Phos	نیٹرم فاس
Lachesis	ليليسس	Nitric Acid	نائٹرک ایسٹر
Lycopodium	لائيكو بوڈىم	Rhus Tox	رسٹاکس
Senega	سينيگا	Sulphur	سلفر
Pulsatilla	بلستيل	Sanguinaria	سينگو نيريا
Zincum Metallio	زنکمیٹcum	Borax	بورنيس

8_ سلی امراض اور پھیپھڑوں کی تکلیفیں مثلاً دمہ کینسروغیرہ

پھیچر وں کی تکلیفیں عموماً تین قتم کے عوارض میں ملتی ہیں۔اوّل کینسر، دوم دمہ، سوم ملی امراض جن میں نمونیہ بھی شامل ہے۔ جب بھی پھیچر اے کا کوئی مریض سامنے آئے سب سے پہلے اسے پھیچر اے کے دفاع کے لئے بڑھتی ہوئی بوٹینسی میں ہیسیلینم (Bacillinum) یا ٹیو برکولینم (Tuberculinum) دینی چاہئے۔اس کا طریق استعمال ان دواؤں کے ابواب میں بالوضاحت بیان کر دیا گیا ہے۔اس علاج سے گہر سے گارے سی اثر ات مٹ جاتے ہیں اور آئندہ سل کا خطرہ نہیں رہتا۔اس تفصیل کے لئے ہیسیلینم اور ٹیو برکولینم کے ابواب کا گہری نظر سے مطالعہ کریں جن میں ہرفتم کے غدودوں کی بیاری کا ذکر بھی ملے گا۔

پھپھڑوں سے کینسر کے قلع قمع کے لئے سب سے اچھانسخہ فاسفورس اور ہرائیونیا کا اول بدل کر دینا اور اونچی طاقت لینی CM میں کارسینوئن (Carcinosin) دینی چاہئے۔ ہفتہ دس دن کے وقفہ سے چندخورا کیس دے کرا نظار کریں اور دیکھیں کہ کیا اثر ظاہر ہوا ہے۔ دمہ سے متعلق امراض میں علاج نسبتاً زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے کیونکہ ان امراض کا تعلق سوزا کی مادے سے ہے جو بعض اوقات کئ نسلوں تک جسم میں دبی ہوئی شکل میں موجودر ہتا ہے اور ایسے مریضوں کواگر چہ پیشا ب کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی مگر بار بار ہونے والا دمہ زندگی اجیرن کر دیتا ہے۔ ایسے مریضوں کے دمہ کی روک تھام کے لئے تھوجا (Thuja) ایک لا کھ طاقت میں دنی چاہئے۔ اگر تھوجا ایک مہینہ تک ہفتہ وار ایک دفعہ دینے کے نتیجہ میں فائدہ نہ پہنچائے تو اس کا متبادل ٹیو ہرکولینم استعال کریں۔ دمہ کے مریض کے متعلق ہدایات حسب ذیل ہیں۔ متبادل ٹیو ہرکولینم استعال کریں۔ دمہ کے مریض کے متعلق ہدایات حسب ذیل ہیں۔ سب سے پہلے نزلے کایا گلے کی خرابی کا فوری علاج ضروری ہے کیونکہ دمہ اکثر انہی

دو تکلیفوں کے بگڑنے سے ہوتا ہے۔ فوراً صحیح علاج کیا جائے تو دمہ ہوتا ہی نہیں۔ اگر تیز ایلو پیتھک دواؤں کے ذریعہ ان کا علاج ہوتو بسااوقات یہ بیاریاں دمہ میں تبدیل ہوجاتی ہیں اورایسے مریض کوبار بار اینٹی بائیوٹکس (Anti-Biotics) کی ضرورت پڑتی ہے اور بار بار دمہ کا حملہ ہوتا ہے۔ ہومیو پیتھک طریق پرنزلے کے علاج کے لئے فوراً انفلوئیز نیم + بیسیلینم + وقتھیر بینیم + اوسیلوکوسینم ۔ دوتین دن روز اندایک دفعہ دلائی جائیں تو خدا تعالی کے فضل سے حملہ جڑسے اکھڑ جاتا ہے۔ گلے کی خرابی کے لئے چھوٹی طاقت یعنی 6x میں بالعموم حسب ذیل دوائیں فوری اثر دکھاتی ہیں جو گلے کی خرابی کے ساتھ ہونے والے بخار میں بھی بہت مفید ہیں۔ فیرم فاس+ کالی میور+کلکیر یا فلور + سلیشیا+کالی فاس

ا کثر بچوں میں یہ نسخہ کارآ مد ثابت ہوتا ہے گراس کے ساتھ کھٹی اور بہت ٹھنڈی چیزوں سے پر ہیز ضروری ہے خصوصاً کھٹے مشروبات اور کو کا کولا وغیرہ نقصان پہنچاتے ہیں۔اگر چیپھڑوں کی خرابی کی بیاری اس دوا کے قابو میں نہآئے اور گلا بدستور متورم رہے تو اس دوا کی بجائے تمیں طاقت میں چیلی ڈونیم (Chelidonium) + کوئس کیکٹائی (Coccus Cacti) طاقت میں چیلی ڈونیم (Hepar Sulph) استعال کروائی جائے تواجھا نتیجہ دکھاتی ہے۔

اگر دمہ کی تکلیف دل کی کمزوری سے تعلق رکھتی ہوتو اس میں سپونجیا (Spongia) اچھی دوا ثابت ہوتی ہے۔ دل کی تکلیف سے جو دمہ ہوا گر اس میں سپونجیا مفید ہوتو اس کی علامت ہے کہ مریض کے سانس چلنے سے ایسی آ واز آتی ہے جیسے لکڑی پر آ را چل رہا ہو۔ دل کی کمزوری والے مریض کا علاج دل کی بیاریوں میں ڈھونڈ نا چاہئے اور اس کے لئے دل کی بیاریوں کے باب کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

پھیچرٹ کے کینسر میں برائیونیا (Bryonia) اور فاسفورس (Phosphorus) کا ذکر گزر چکاہے۔ ایک دواجو ہومیو پیتھک نہیں مگر ہومیو پیتھک علاج کوتقویت دیتی ہے وہ ہلدی ہے۔ بار ہا کے تجربہ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایک چچی کا چوتھا حصہ ہلدی دودھ یا

پانی کے ساتھ دن میں چار دفعہ استعال کرائی جائے تو چھپچر سے کے کینسر کا بہترین علاج ثابت ہوتی ہے۔

جب پھیپھڑ ہے اور انتڑیوں کی تکلیفیں جلدی امراض کے دبنے کے نتیجہ میں پیدا ہوں تو ان کے علاج کے لئے سلفر (Sulphur) ، سورائینم (Psorinum) اور دیگر جلدی امراض کی دواؤں کی ضرورت بھی پڑتی ہے جن کی تفصیل کے لئے جلدی امراض کے باب کی طرف متوجہ ہوں۔

9_ جلدی امراض

جلدی امراض کا مضمون تمام اہم بیار یوں اور اہم دواؤں کے ذکر میں جگہ جگہ پھیلا پڑا ہے۔ اسے ایک جگہ ریپرٹری کی صورت میں اکٹھا کرنا ناممکن ہے۔ کسی بھی اہم دوا کا باب پڑھ لیں اس میں لازماً جلدی امراض کا ذکر ملے گا۔ مثلاً سورائینم (Psorinum)، لیس اس میں لازماً جلدی امراض کا ذکر ملے گا۔ مثلاً سورائینم (Tuberculinum)، ویر یولینم سلفر (Sulphur)، بیسیلینم (Bacillinum)، ٹیوبرکولینم (Variolinum) اورمرکری کے مرکبات وغیرہ وغیرہ۔

وہاں جلدی امراض ایک د بی ہوئی بے چینی کے اظہار کے طور پر مٰدکور ہوں گی اور معالج کے لئے اس میں ہدایت کاعمدہ سامان ہے۔

اس ضمن میں وہائی امراض کے باب کا بھی مطالعہ کرلیں۔ان میں جلد سے تعلق رکھنے والی تمام وہائی امراض کا ذکر ہے۔ پس بیے تجویز ہی نا قابلِ عمل ہے کہ جلدی امراض کا اکٹھا ذکر جو تمام امراض پر حاوی ہوا یک جگہ ریپرٹری میں کر دیا جائے۔زیر بحث عنوان کے تحت جواشارے دے دیئے گئے ہیں وہی تمام معالجین کی ہوتسم کی رہنمائی کے لئے کافی ہوں گے۔

ا بيس Apis آرنيکا Apis آرنيکا Arsenicum Sulf آرسينک سلف Arsenicum Album آرسينک سلف Ana Galis اينا کار ځ يم

Anthracinum	انتخراسينم	Anthrakokali	انتقرا كوكلى	
Berberis	بربرس	Agaricus	ا يگير کيس	
Dolichos	ڈ الی کوس	Croton Tiglium	كروش تكيم	
Graphites	گریفائٹس	Lachesis	ليكييس	
Silicea	سليشيا	Hepar Sulph	هبيرسلف	
Petrolium	پپڑولیم	Mercurius	مرکری	
Radium Bromide	ريڈيم برومائيڈ	Rhus Tox	رسٹاکس	
Bovista	بووسثا	Sepia	سيبيا	
		Hydrocotyle	م <i>ائيڈ روکوٹائل</i>	
10_ <u>دل کی بیاریاں</u>				

دل کے روز مرہ کے حملہ کے خطرہ کے ازالہ کے لئے کریٹیکس مدر نئی کی روز مرہ کے حملہ کے خطرہ کے ازالہ کے لئے کریٹیکس مدر نئی کی جہ میں نہیں با قاعد گی سے استعمال کرنی چا ہے جو ساری عمر بھی دی جائے تو اس کا کوئی نقصان تجربہ میں نہیں آیا۔ ایکونائیٹ (Arnica)، بیلا ڈونا (Belladonna)، آر ذیکا (Arnica)، کیکیسس آیا۔ ایکونائیٹ (Spongia)، بیر برس (Berberis) اور کا دوس مریانس (Spongia)، سپائی جیلیا (Carduus Marianus) کے ابواب میں دل کی اکثر بیاریوں کا ذکر موجود ہے۔

Adrenalin	ایڈرینالین	Arsenicum	آ رسینک
Digitalis	د یج شیکس و بیجی میکس	Aurum Metallicum	، مثیلیم آرم
Carbo Veg	كاربووتج	Kalmia	كالميا
Laurocerasus	لاروسيراسس	Cactus	کیکٹس
Lilum Tig	لليئم تُك	Naja	ناجا

Millefolium ملی فولیم Phosphorus فاسفورس Phosphorus ملی فولیم Rhus Tox Plumbum رسٹاکس Psorinum سورائینم

11۔ <u>یتے کی تکالیف</u> جس کےساتھ ذیا بیطس کی پیچیدگی ہو

پتے کے درد اور تشنج میں مریض سخت جلن اور دردمحسوس کر رہا ہوتو بیلا ڈونا کی اونچی طاقت میں ایک دوخورا کیس دس پندرہ منٹ کے بعد دہرانے سے اللہ کے فضل سے آرام آجا تا ہے۔ بیلا ڈونا کے عارضی استعال کے بعد مستقل علاج جاری رکھنا چاہئے۔ سلفراور لائیکو بوڈ یم مستقل علاج جاری رکھنا چاہئے۔ سلفراور لائیکو بوڈ یم مستقل علاج کے طور پر وقاً فو قاً استعال کرنی پڑتی ہیں۔ ان دونوں کا صفراء پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ صفراء وہ زردی مائل مادہ ہے جو جگر میں بنتا ہے اور کھانا ہمضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اکثر اسی کی خرائی سے بتے میں پھریاں بننے کار ججان پیدا ہوتا ہے۔

پتے کی پتھری میں چیلی ڈوٹیم (Chelidonium) بھی بہت مفید ہے،اس کا در دبیجھے
کمر کی طرف پھیل جاتا ہے جبکہ بربرس (Berberis) کے مریض کا در دچاروں طرف پھیلتا ہے۔
چائنا (China) بھی پتے کے در د کے لئے مفید ہے۔اسی طرح نیٹر م سلف (Nat Sulph) کا قاعدہ استعال بھی پتے کی بیتھریوں کو گھلا دیتا ہے۔

اگریتے کی تکلیف کے ساتھ بینیاب میں شوگر آئے اور بینیاب کی رنگت کسی سے ملتی جاتی ہواور مقدار میں بہت زیادہ ہوتوان علامات میں خصوصی دواار جنٹم میٹلیکم (Argentum Metallicum) ہے۔کالی کا رب کے مریض میں بھی پتہ کی تکلیف اکثر ذیا بیطس کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔مثانہ بہت حساس ہوجا تا ہے اور ذراسا بھی دباؤ برداشت نہیں کرسکتا۔

الیا مریض جس میں ذہنی کمزور بوں کی علامتیں ظاہر ہو کررفتہ رفتہ بڑھ رہی ہوں اور

ساتھ شوگر (ذیابیطس) بھی ہوتو بعض اوقات ایسڈ فاس (Acid Phos) سے کممل شفا ہو جاتی ہے۔ شوگر اگر لیے غم اور فکر کے نتیجہ میں ہواور اس کے ساتھ بیتے میں سخت ڈنک لگنے کی سی دردیں ہوں نیز ٹانگوں اور بازؤوں میں بھی ہلکی سی دکھن کا حساس ہوتو ٹرینٹولا (Tarentula) بہت مفید دوا ہے جو وقتی فائدہ ہی نہیں دیتی بلکہ اللہ کے فضل سے مکمل شفا دے دیتی ہے۔ اگر ذیابیطس کی وجہ سے کندھے کے پیچھے جڑوں والا پھوڑا (Carbuncle) نکل آئے تو اس خطرناک بہاری میں بھی ٹرینٹولا دینا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔

12 _ رحم کی روز مرہ خرابیاں _ کینسراور جریان خون

رتم کی متفرق خرابیوں اور مختلف قسم کی کینسر کے علاج کے لئے مندرجہ ذیل ہومیو پیتھی ادویہ کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ کتاب میں ان دواؤں کے ابواب کا قارئین بغور مطالعہ فر مائیں۔ ماکٹار کسی میں اور مصدورہ کے معدد معدد معدد میں میں الدمیں۔

Alumen اليومن	اکٹیار کیم موسا Actaea Racemosa
آرسينك آئيوڈائيڈ Arsenic Iodatum	Argentum Met مثلیکم
Rryonia برائيونيا	يىلا ۋونا Belladonna
Calc. Carb کلکیر یا کارب	Calc. Ars کلکیر یا آرس
Calc. Phos کلکیر یافاس	Calc. Flour کلکیر یا فلور
كار بوانيميلس Carbo Animalis	Camphor بيمر
Carcinosin کارسنوس	كار بووت كا
Coccus Cacti کوکس کیکٹائی	Caulophyllum كولوفائيلم
فيرم فاس Ferrum Phos	Conium کوینم
Kali Carb کالی کارپ	جلسيميم Gelsemium

Kali Phos	كالى فاس	Kali Mur	کا لی میور
Murex	ميورنيس	Kali Sulph	كالىسلف
Psorinum	سورانينم	Nux Vomica	نكس واميكا
Pyrogenium	پائیروجینیم	Pulsatilla	بيسثيل
Senecio Aureus	سىنىشو آرس	Sabina	سبائنا
Silicea	سليشيا	Sepia	سيپيا
Stannum	سطينم	Spongia	سيونجيا
Tarentula Hisp	ٹرینٹولا ہسپانیہ	Sulphur	سلفر
، کا مطالعہ ضروری ہے۔	ں دواؤں کے ابواب	نِ خون کے امراض میں حسب ذیل	جريار
Antimonium Crud	اینٹی مونیم کروڑ	Ammonium Carb	امونيم كارب
Arsenic	آ رسینک	Arnica	آرنيكا
Hamamelis	ہیمامیلس	Baryta Carb	برائيطا كارب
Kreosotum	کرئیوزوٹ	Kali Carb	کالی کارب
Millefolium	ملى فوليم	Lachesis	ليكيبس
Phosphorus	ف اسفورس -	Natrum Mur	نیٹرم میور
Secale Car	سيكيل	Sabina	سبائنا
Sulphur	سلفر	Senecio Aureus	سنيشيو آرس
Cantharis	لينتهرس	Sulphuric Acid גל	سلفيورك ايس
Hydrocotyle	سیتھرس ہائیڈروکوٹائل	Hyoscyamus	بائيوسائيمس
Platina	بلا ٹینا	Lilium Tig	لليئم ٿگ
Graphites	گریفائٹس	Zincum	زنک

13۔ بانجھ بن اور اسقاط حمل ہے۔ دوران عمومی عوارض اور تسہیل ولا دت کی دوائیں

بانجھ بن میں اگر چہ سپیا (Sepia) کو ایک مؤثر دواسمجھا جاتا ہے اور عموماً جسم کی ساخت سے سپیا کی بہچان کی جاتی ہے لیکن بید درست نہیں۔ جب تک سپیا کا مزاج کسی عورت میں نہ پایا جائے اس کی کسی بیاری کا علاج بھی سپیا سے ممکن نہیں۔ اگر محض جسمانی ساخت سپیا میں نہ پایا جائے اس کی کسی بیاری کا علاج بھی سپیا کے نسبت کالی فاس (Kali Phos) زیادہ کار آمد ثابت ہوتی ہے۔

اعصابی تناؤ سے جوجنسی کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں ان کا بھی کالی فاس علاج ہے۔ اس طرح جن عور توں میں جمل گرنے کا مستقل رجان پایاجائے ان کے تعلق میں بھی کالی فاس کونہیں کھولنا چاہئے۔ عام طور پر حمل کے آغاز میں حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہوتو وائی برنم او پولس کھولنا چاہئے۔ عام طور پر حمل کے آغاز میں حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہوتو وائی برنم او پولس (Viburnum Opulus-Q) مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس مدر گیر کے دس پندرہ قطرے ایک گھونٹ پانی میں ملاکر پہلے اور دوسرے مہینہ میں با قاعد گی سے دینے چاہئیں۔ تیسرے مہینہ میں سائنا (Sabina) اور چو تھے اور پانچویں مہینہ میں کالی کارب (Kali Carb) زیادہ مؤثر بیان کی جاتی ہیں کالی فاس ہر مہینہ میں دی جاسمتی ہے۔

پاؤں پھیلنے یا دیگر حادثات کے اثر سے حمل ضائع ہوجانے کا خطرہ ہوتو آرنیکا (Arnica) دینا ضروری ہے، الیمی صورت میں علامتیں ظاہر ہونے سے پہلے ہی 1000 طاقت میں آرنیکا دینا چاہئے۔ اگر آرنیکا کے ساتھ کالی فاس 1000 ملا دی جائے تو اور بھی ہمتر ہے۔ اس کے علاوہ کولو فائیکم (Caulophyllum) بھی حفظ ما تقدم کے طور پر بہت مفید دوا ہے جواکثر 200 طاقت میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ جریان خون شروع ہونے پر کالی فاس کے ساتھ فیرم فاس (Ferr Phos) ملائا بہت ضروری ہے۔ نیز ملی فولیم (Millefolium) اور فاسفورس (Phosphorus) ملاکر دینے سے بعض دفعہ فوری فائدہ

ہوتا ہے۔

پیٹ میں بچے کی پوزیش درست نہ ہوتو پلسٹیلا (Pulsatilla) بہت مفید دوا ہے لیکن اگر میکا م نہ آئے تو کالی سلف (Kali Sulph) دے کر دیکے ناچاہئے جو پلسٹیلا کی مزمن ہے۔ کالی سلف ایسی عور توں کے رحم کو طاقت دیتی ہے جن میں اسقاط کامستقل رجحان ہو۔ ہر تسم کے سیلان الرحم، سوزش اور جلن میں بھی کالی سلف مفید ہے۔ رحم اپنی جگہ سے ٹل جائے ، رحم میں درد ہو، نیچے دبانے والا بو جھ محسوس ہوتا ہوتو ان سب تکلیفوں میں میہ اچھا کام کرتی ہے بشرطیکہ کالی سلف کی دیگر ضروری علامتیں بھی یائی جائیں۔

کرئیوزوٹ (Kreosotum) کی خاص علامت ہر شم کا سیلان خون ہے۔ ذراسے دباؤ سے خون جاری ہوجا تا ہے۔ مثلاً آئکھ میں ورم ہوتو معالج کے ہاتھ لگا کر دیکھنے سے بھی خون نکل آتا ہے۔ رحم میں ایسی کیفیت پیدا ہوتو ایسی عورتوں کو سلسل خون آنے کی شکایت رہتی ہے۔ حیض کے ایام گزرجانے کے باوجود بھی خون جاری رہتا ہے۔

لیڈم (Ledum) کی مریض خواتین میں حیض بہت جلد، بہت زیادہ اور گہرے سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔اگر ان علامتوں کے ساتھ لیڈم کی دوسری رہنما علامتیں موجود ہوں تو بیرحم کی اکثر بیاریوں میں مفید ثابت ہوتی ہے۔

لکئیم ٹگ (Lilium Tig) ایسی عورتوں کے لئے بہت مفید ہے جو ہسٹریائی مزاج رکھتی ہوں اور بہت پر جوش ہوں، رحم اور دل کی بیاریوں میں مبتلا رہتی ہوں، طرح کے وہم، خوف اور خدشات انہیں گھیرے رکھتے ہوں، خدشہ محسوں کریں کہ رحم اور دیگر اندرونی اعضاء با ہرنکل جائیں گے اور یوں لگتا ہو جیسے اعضاء نیچ گررہے ہیں۔ اس لئے لاشعوری طور پر مریضہ ہاتھ کے دباؤسے انہیں او پر کرنے کار جحان رکھتی ہے۔ ایسی مریضاؤں کے چیش کا خون مریضہ ہوجا تا ہے، مقدار میں کم لیکن نہایت بد بودار ہوتا ہے، سیاہ خون کے لوٹھڑے ہوں ترکت کرنے سے خون زیادہ جاری ہوتا ہے اور لیٹنے اور آرام کرنے سے ختم ہو حاتا ہے۔

اگر بیضة الرحم (Ovary) میں ڈ نک دار دردیں ہوں اور جلن کا احساس ہو۔ حیض کا

خون مقدار میں بہت زیادہ ہواور پیٹ میں درد ہو، کیکوریا جورات کوزیادہ ہوجائے، جھیلنے والا مواد خارج ہو، جو جائے، جھیلنے والا مواد خارج ہو، جو کے وقت متلی، پیٹا ب کرنے کے بعد خارش اور جلن جسے ٹھنڈے پانی سے دھونے سے آ رام آتا ہوتو یہ وہ عمومی علامتیں ہیں جن میں مرک سال (Merc Sol) مفید ثابت ہوسکتی ہے۔ اگر محض کمزوری کی وجہ سے شروع مہینوں میں حمل ضائع ہو جائے تو بھی مرک سال اس کمزوری کو دور کرکے طاقت کو بحال کرتی ہے اور عورت اس قابل ہوجاتی ہے کہ جنین کا بوجھا ٹھا سکے۔

بعض عورتوں کو شادی کے بعد بعض تکلیفیں آ گیرتی ہیں مثلاً حیض کے ایام میں بے قاعدگی، درد، اعصابی کمزوری وغیرہ ہوتوانہیں میڈورائینم (Medorrhinum) کی ضرورت پڑتی ہے۔

خیض کا خون لمباعرصہ جاری رہے، رحم اور پیٹ میں شنج ہوجائے اور بہت زیادہ مقدار میں خون بہدر ہا ہوتو پیے خاص ملی فولیم (Millefolium) کا نشان ہے۔ یہ تینوں علامتیں اکٹھی ہوجا ئیں تو الا ماشاء اللہ ملی فولیم خدا کے فضل سے فوری فائدہ دیتی ہے۔ اسی طرح اگر حمل ضائع ہونے کا خدشہ لاحق ہوجائے، معمولی حرکت سے خون جاری ہواور آرام کرنے سے رک جائے تو اس صورت میں بھی ملی فولیم مفید ہے۔ ویریکوزونیز (Varicose Veins) کی بیاری عموماً حمل کے دوران شروع ہوتی ہیں۔ اس عرصہ میں ملی فولیم دی جائے تو بیاری و ہیں رک جاتی ہے اور آ گے نہیں بڑھتی۔

عورتوں میں حیض رک جانے سے شنج اور مرگی کے دورے پڑنے لگیں یا سخت محنت مشقت کرنے کی وجہ سے رحم سے خون جاری ہوجائے تو بھی ملی فولیم (Millefolium) مفید ہے۔

یکے کی پیدائش کے بعد باقی رہ جانے والی کمزور یوں کو دور کرنے کے لئے کالی کارب مفید ہے۔
مفید ہے۔کالی کارب کے علاوہ نیٹر م میور بھی مؤثر دوا ہے جو صحت کو بحال کرتی ہے۔
اگر بچہ کی پیدائش کے بعد بخار ہو جائے تو سلفر (Sulphur) اور یا ئیر وجنیم (Pyrogenium) ملاکر دیں۔اگر رحم کے اندر یوری طرح صفائی نہ ہوئی ہوا ور اندر

کچھ باقی رہ گیا ہوتو پلسٹیلا اس گندکو باہر نکا لنے کے لئے مفید ہے۔

حیض کے ایام بے قاعدہ ہوں، سوزش پیدا کرنے والالیکوریا ہوجس سے خارش بھی ہوتی ہو، حیض سے قبل طبیعت میں افسر دگی اور غمگینی پیدا ہو، نیچے کی طرف بوجھا ور در دمحسوں ہوتی ہو جوضبے کے وقت زیادہ ہواور پیشاب کے بعد جلن ہوتی ہوتو بیعلامتیں نیٹرم میور کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

جن عور توں کو دائمی کیکوریا کی تکلیف ہوتی ہے ان کے بانجھ بن کے لئے نیٹر م کارب (Nat. Carb) مفید ہے۔ نیٹر م کارب کی خاص علامت یہ ہے کہ مریضہ کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے، دائمی بانجھ بن کا شکار ہوتی ہے اور سلسل جاری رہنے والالیکوریالاحق ہوتا ہے۔ اگر میسب علامتیں کسی مریض میں اکٹھی ہوجا کیں تو خدا کے فضل سے بیا کیلی دوابا نجھ بن کودور کرنے میں بہت مؤثر ہے۔

بانچھ بن کے لئے پلسٹیلا (Pulsatilla)، اشوکا (Ashoka)، اور گوتیم (Gossypium-Q) بھی بہترین دوائیں ہیں۔اس کے علاوہ موجودہ علامتوں کے مطابق بانچھ بن کا علاج کرنا چاہئے۔اگررتم اپنی جگہ سے ٹل جائے اوراس وجہ سے حمل نہ ٹھہر رہا ہوتو نیٹرم فاس (Nat Phos) سے بھی فائدہ ہوسکتا ہے۔ نیٹرم فاس کے مریض کے ہاتھ پاؤں سورائینم (Psorinum) کے مریض کی طرح بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں (اگر چہاس میں بعض علامتیں پلسٹیلا سے مشابہ ہوتی ہیں)۔ حیض کے ایام میں خصوصاً دن کے وقت ہاتھ پاؤں ٹھنڈے در ہے ہیں۔

حمل کے دوران عمومی مدایات اور تسہیل ولا دت کی دوا ئیں

فیرم فاس،کلکیریا فاس اورکالی فاس اگر حمل کے تیسرے، چوتھے مہینے سے 6x طاقت میں چند ٹکیاں فی خوراک شبح شام دی جاتی رہیں تو ماں اور بچے دونوں کے لئے بہترین ٹائک ہے۔ مگراس نسخہ کوایک دو ہفتہ دے کر پھر ہفتہ دس دن کا ناغہ کرنا چاہئے ۔ مسلسل دیتے چلے جانا درست نہیں۔ وضع حمل کی دردین شروع ہونے پر تسہیل ولا دت کے لئے کالی فاس (Kali Phos) 16x (Kali Phos) میگنیشیا فاس (6x (Mag Phos) کی پندرہ ہیں ٹکیاں ایک پیالی گرم پانی میں ملا کر گھنٹہ دو گھنٹہ بعد تین کے وقفہ سے دن میں آ ٹھ دس بار گھونٹ گھونٹ بلانی جا جمیس ۔ شروع میں ہر آ دھ گھنٹہ بعد تین خوراکیں اور پھروقفہ لمبا کردیں ۔

ولادت سے ہفتہ پہلے آرنیکا 1000 کی ایک خوراک اور ولادت کے فوراً بعد بھی ایک خوراک اور ولادت کے فوراً بعد بھی ایک خوراک اور ولادت کے بعدا گرافیکشن سے بخار ہوجائے جسے پرسوتی بخار کہا جاتا ہے تو بلاتا خیر سلفر (Sulphur) 200(Sulphur) ملاکر شروع میں ایک دودن دو دفعہ روزانہ یا زیادہ سے زیادہ تین دفعہ دن میں دیں۔ جب بخار ٹوٹنا شروع ہوجائے تو کم کرکے تین دن ایک دفعہ روزانہ اور آرام آنے پر ہفتہ میں ایک دوبار چند ہفتہ تک دیتے رہیں۔ اس تعفیٰ بخار کی اس سے بہتر کوئی دوامیر علم میں نہیں۔

بیچ کی پیدائش کے بعد اگر دودھ بند ہو جائے تو برائیونیا 00 2 اور فائٹولاکا 200 بند ہو جائے تو برائیونیا 00 2 اور فائٹولاکا 200 (Phytolacca) ملاکر دیں۔ایک دوبارروزانہ دینے سے جیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے۔ ان دواؤں کو 30 طاقت میں دن میں تین چاربار بھی دیا جاسکتا ہے۔

بیچ کی پیدائش کے بعدا گر سخت اداسی کا دورہ پڑے اور دل تاریکی میں ڈوبا ہوامحسوس ہوتو اگنیشیا (Ignatia) 200 کی چند خورا کیس فوری آرام پہنچاتی ہیں۔ اگر پورا فائدہ نہ ہو اگنیشیا کے بعد نیٹرم میور 200 کی ایک خوراک فائدہ کممل کردے گی۔

اگر باہر آنے جانے کا خوف دل میں بیڑھ جائے تو کلکیر یا کارب (Calcarea Carb) 1000 کی ہفتہ وارا کی خوراک دوتین ہفتہ تک دی جائے۔

ولا دت کے وقت درد ملکے اٹھ رہے ہوں تو پلسٹیلا (Pulsatilla) دن میں تین علی ایٹر بار دینا بہت مفید ہوتا ہے۔ بچہ الٹا ہوتو پلسٹیلا 200 کی ایک دوخورا کیس مفید ہوتی ہیں۔ علی را برا دینا ہوتو آرنیکا (Arnica) اور کولوفائیلم (Caulophyllum) وزیاد دن روزانہ ایک خوراک دیں۔ جب پلاسینٹا پریویا (Placenta Previa)

یعنی بچہ کی تھیلی کی نالی رخم کی گردن کے قریب جڑی ہوئی ہوتو اس انتہائی مہلک عارضہ میں بھی آر نیکا اور کولوفائیلم ملا کر 200 طاقت میں حیرت انگیز اثر دکھاتی ہیں۔ چند دن روزانہ ایک بار دی جائیں۔

حمل کے دوران کی مختلف تکلیفوں اور ولادت کے وقت کے مسائل کی بحث کالی کارب (Kali Carb)، کولوفائیلم (Causticum)، کاسٹیکم (Causticum) اور جلسیمیم (Gelsemium) کے ابواب میں ملے گی ۔ان کا بغور مطالعہ بھی ضروری ہے۔

Actaea Racemosa اکٹیار کی موسا Agnus Castus اگلنس کاسٹس ارم میور Aurum Muriaaticum بور کیس Aurum Muriaaticum کالی برومیٹم الم میور کالی برومیٹم Kali Bromitum ناسفورس کی کالی برومیٹم سکیل کار Scale Cor اپی کاک Simphori Corpos

14_ شریانوں اور وریدوں کی خرابیاں

شریانوں (Arteries) اور وریدوں (Veins) کی عارضی اور مستقل خرا بیوں کا ذکر جن میں حادثاتی اور نفسیل سے ملتا ہے۔ جن میں حادثاتی اور نفسیل سے ملتا ہے۔ جب بھی شریا نوں یا وریدوں کے بیار سامنے آئیں حسب ذیل ادویات کا مطالعہ کریں۔ان میں زیرعلاج مریض کی علامات کہیں نہ کہیں ضروریائی جائیں گی۔

Alumina	أبلو مينا	Aconitum	ا يكونا ئڻ
Arnica	آرنيكا	Ammonium Carb	امونيم كارب
Belladonna		Arsenic	آ رسینک
Carbo Animalis (كاربوالييميلس	Benzoicum Acid	بنز وئيك ايسڈ
Chininum Ars	چیننه به حیثینم آرس	Carbo Veg	كار بووتج

Crataegus	ر يٿيگس	Cimicifuga	سى مى سى فيوجا
Lachesis	ليكيس	Cuprum	کیوپرم
Opium	او پېيم	Millefolium	ملى فوليم
Strontia Carb	سٹروشیم کارب	Psorinum	سورا ئينم
Pulsatilla	پلسٹیلا	Sulphur	سلفر
Bellis Perenis	بيلس	Aurum Metalicum	آ رم شیلیکم
Haema Melis	بهيماميلس	Flouricum Acid	فلورك ايسثر
ریوں کی وجہ سے بھی ہوتا	ن د بې هوئی جلدی بيار	۔ فعہ شریا نوں کے <u>کھٹنے</u> کا رجحال	بعض,
	•	ٹاکس(Rhustox) کی ضرور	
نھیک کر دیا گیا ہوتو اس کی) کی خلاہری علامات کوڑ	ىيوں سال يہلے بھى ايسے مريض	ہوتا ہے۔اگر بیہ
قت میں حسب ضرورت	هٔ رسٹاکس 1000 طا	Varicose Veir کے لئے	وریکوزوینز (ns
ہفتہ میں ایک دو دفعہ دینا حیرت انگیز اثر دکھا تا ہے۔اس کے ساتھ ویریکوز وینز کا مروجہ علاج			
ایسکولس(Aesculus)30وغیرہ کے ذریعہ بھی کرنا جا ہئے۔			
فلورکایسٹر کلکیریا فلور فلورک ایسٹر پلسٹیلا۔			
اليف	ننی نروس سسٹم کی تؤ	15_ اعصابی ریشول یع	
ے کے گااورمتعلقہ دیگرادویہ	سانی بیار یوں پرمحیط ر	ىل دواۇل كامطالعە ہرفتىم كى اعم	درج
•	•	ے تحت مذکور ہیں۔	بھی ان دواؤں
Agnus Castus	ایگنس کاسٹس	Agaricus	ا يگير يکس
Carbo Veg	كاربوويج	Argentum Met	ارجنثم ميث
Crotalus	ڪرو ق يلس	Cocculus	كاكولس
Hyoscyamus	ما ئيوسائمس	Gelsemium	جلسيميم

Kali Phos	كالى فاس	Ignatia	اگنیشیا
Nat Mur	نیٹر م میور	Mag Phos	ميگ فاس
Picric Acid	پکرک ایسڈ	Phosphorus	فاسفورس
Ruta	روٹا	Rhustox	رسٹاکس
Spigelia	سيائی جيليا	Silicea	سليثيا
Actaea Racemosa	ا کٹیار کیی موسا	Arnica	آ رنيکا
Alumina	اليو مينا	Argentum Nitricum	ارجنتم نائثر كج
Hyparicum	ہائی پیریکم	Causticum	كاستيكم
	•	Plumbum Metallicum	يلمبم مثيليكم
ز والی خدا بین	ی کی زینان ہی کہ	1 مختان توبها و اورعوارغ	6

16۔ مختلف تو ہمات اورعوارض کی نشا ندہی کرنے والی خوابیں نیندکا فقدان یازیادہ نیند درج ذیل دواؤں کے ابواب میں خوابوں کا ذکر پڑھیں۔ ابسنتھ

Actaea Racemosa اکٹیارلیی موسا	Absinthium	ابسنتهم
Arnica آرنيکا	Agaricus	ا يگير يكس
Calc Ars کلکیریا آرس	Belladonna	بيلا ڈونا
كاربواليميلس Carbo Animalis	Calc. Carb	كلكيريا كارب
Cofea کافیا	Carbo Veg	كار بووتج
Helleborus ہیلی بورس	Drosera	ڈ روسرا
Kali Carb کالی کارب	Hyoscyamus	م <i>ا ئىيىمىس</i>
نیٹرم میور Natrum Mur	Medorrhinum	ميڈورائينم
Nux Vomica ککس وامیکا	Nat Phos	نیٹرم فاس

Pyrogenium	پائيروجينيم	Phosphorus	فاسفورس
Sabina	سبائنا	Sabadilla	سباؤ يلا
Stramonium	سٹرامونیم	Silicea	سليشيا
Sulphuric Acid	سلفيورك ايسار	Sulphur	سلفر
Thuja	تھوجا	Tarentula	ئىرىن ۇلا
مطالعه مفيدر ہے گا۔	دواؤں کےابواب کا	بےخوابی کی شکایت ہوتو درج ذیل	اگر_
Cocculus	كاكولس	Belladonna	بيلا ڈونا
Crotalus	ڪرو ٿيلس	Cofea	كافيا
Nux Vomica	تكس واميكا	Kali Phos	كالى فاس
Pessiflora Q	يبيى فلورا	Opium	اوچيم
Picric Acid	پکرک ایسٹر	Phosphorus	فاسفورس
Silicea	سليشيا	Rhustox	رسٹاکس
Ignatia	اگنیشیا	Arsenicum Album	آ رسينك البم
Chamomilla	كيموميلا	Causticum	كاستيكم
1		Cannabis Indica	كينابسانڈي
اگر زیاده نیند آتی هوتو کالی بائی کروم (Kali Bichrom)، جنسیمیم			
(Gelsemium) نکس ماسکییا (Nux Moschata) اور فیرم فاس (Ferr Phos) کا			
		ندے۔	استنعال فائدهم

17۔ نشہ کی عادت

ہرفتم کی نشے کی عادات کا ذکر حسب ذیل ادویہ میں ملے گا۔متعلقہ حصے کا بغور مطالعہ

			كرين-
Cannabis Indica	كينابسانا	Caladium	کلیڈیم
Nux Vomica	نكس واميك	Crotalus	<i>ڪروفي</i> لس
Plantago	بلانثيكو	Phosphorus	فاسفورس
Sulpur	سلفر	Platina	بإلثينم
Tabacum	طبريكم	Sulphuric Acid	سلفيورك ايسثر
	وبهنزي رط	1.21	

دماغی اور ذہنی عوارض کا علاج بہت پیچیدہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا تعلق ہوتم کے صدمات اور گہرے نفسیاتی امراض سے ہوتا ہے۔ وہ بڑی دوائیں جواس میں کام آسکتی ہیں حسب ذیل ہیں اورا نہی دواؤں کے ذکر میں بعض دیگر دوا ئیں بھی مل جا ئیں گی جن کا اس فہرست میں ذکر

Actaea Racemosa L	ا کٹیار کیی موس	Aconitum	ا يكونا ئىك
Arnica	آ رنيکا	Aethusa	ايتقوزا
Calc Ars	کلکیر یا آ رس	Belladonna	بيلا ڈونا
Cyclamen	ئىكلىمن سايىكلىمن	Chininum Ars	چیننه به چینیم آرس
Helleborus	ہیلی بورس *یکی بورس	Glonoine	گلونائن
Hyoscyamus	م <i>ا ئيومس</i>	Hydrophobinum	ہائیڈروفو بینم
Kali Phos	كالى فاس	Ignatia	اگنیشیا
Lilium Tigrinum	لليم تگرينم	Lachesis	ليكيبس

Mercsol	مركسال	Medorrhinum	میڈورائینم
Nitric Acid ユ	نا ئىڭرك ايى	Nat. Mur	نیظرم میور
Opium	اوچيم	Nux Vomica	تكس واميكا
Sepia	سيبيا	Phosphorus	فاسفورس
Staphysagria	سيپيا سڻفي سيگريا	Silicea	سليشيا
Sulphur	سلفر	Stramonium	سٹرامونیم
Graphites	گريفائڻس	Aurum	آ رم
Lac Caninum	ليك كينائينم	Iodum	آ ئيوڈم
Platina	بلاثينا	Natrum Carbonicur	نیٹرم کارب n
Pulsatilla	بيستيل	Psorinum	سورا نينم
Veratrum Album	وريثرم البم	Thoja	تھوجا
	<u> مراض</u>	19 جنس	
امشکل ہے کیونکہاس میں تشخیص	علاج سے زیادہ	 امراض کاعلاج دیگرامراض کے	جنسي
•		میلا ہواہے۔سوسےزا کد دوائیں	
		ر پر سمجھتا ہے کہ یہی دوااس کے _	•
ذکرریپرِٹری کی فہرستوں میں ماتا	دوا بھی جس کا ذ	ت ایک یا دو دواؤں کے سوا کوئی	
) وقطعی فائدہ نہیں پہنچا ^{سک} تی۔	
Agnus Castus		Abrotanum	,
Anagallis	ایناگیلس	Alumina	ايليو مينا
ئيوڈائيڈ Arsenicum Iod	آرسینک آ	Arsenic Album	آ رسینک البم برائیطا کارب کلیڈیم
Bufu	بوفو	Baryta Carb	برائيطا كارب
Calc. Carb	كلكير يا كار	Caladium	کلیڈیم

Calc. Sulph	كلكير بإسلف	Calc. Flour	كلكيريا فلور
Cannabis Sativa	كينابس سيثائيوا	Camphor	كيمفر
Capsicum	كيپسيكم	Cantharis	لينتظرس
Clematis	کلیمٹس	Chininum Ars	چینینم آرس
Coffea	كافيا	Coccus Cacti	كوكس كيكطا ئى
Croton	ڪروڻن	Conium	كوينم
Ferr. Phos	فيرِم فاس	Cyclaman	نيكليمن
Gelsemium	حكسيميم	Flouric Acid	فلورك ايسثر
Gratiola	گریشیولا	Graphitus	گريفائڻس
Hydrastis	ہائیڈرا ^{سٹ} س	Hepar Sulph	هيپرسلف
Kali Carb	كالى كارب	Kali Bichrom	كالى بائتكيروم
Kali Sulph	كالىسلف	Kali Phos	كالى فاس
Medorrhinum	ميڈ ورائینم	Lycopodium	لائيكو پوڙيم
Natrum Phos	نیٹرم فاس	Mercurius	مر کیورس
Nitric Acid	نا ئىٹرك ايسڈ	Natrum Sulph	نيثرم سلف
Nux Vomica	تكس واميكا	Nuphar Luteum	نيوفرلوطيم
Origanum	اوری گینم	Onosmodium	اونوسموڙيم
Phosphorus	فاسفورس	Phosphoric Acid	فاسفورك ايسثر
Pulsatilla	بلسٹیلا	Platina	بلاثينا
Salix Nigra	سیلکس نا ئیگرا	Selenium	سيلينيم
Silicea	سليشيا	Sepia	سيبيا
Staphysagria	سشفى سيكريا	Spongia	" پيغ سپونجيا سلف
Tarentulla	ٹیرینٹولا	Sulphur	سلفر

ٹر بیونس ٹیرسٹرس Tribulus Terrestris		Thuja	تھوجا
Zincum	زنكم	Turnera	ٹر نی را
Calcarea Phos	كلكير بإفاس	Agaricus	اگیریس
Cocculus	كا كولس	Carboneum Sulph -	كاربونيم سلفه
Natrum Mur	نيثرم ميور	Sabina	سبائنا
		Yohimbinum	يونهم بينم
20_ پراسٹیٹ گلینڈزلینی غدہ قدامیہ			

جب پراسٹیٹ گلینڈز (Prostate Glands) جسے اردو میں غدہ قدامیہ کہا جاتا ہے ہو سے اثر ورع ہو جائے تو اس کے نتیجہ میں پیشاب کی خرابی کی بعض قطعی علامتیں ملتی ہیں اور بسااوقات اس کے علاوہ جنسی کمزوریاں بھی نمایاں ہو جاتی ہیں۔ مریض محسوس کرتا ہے کہ اس کا پیشا ب کھل کرنہیں آرہا بلکہ کچھ دریے بعداس حالت میں رک جاتا ہے کہ شفی نہیں ہوتی اور محسوس ہوتا ہے کہ بیچھے اور پیشاب موجود ہے۔ فارغ ہونے کے تھوڑی دریہ بعد پھر حاجت محسوس ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوئے ہوئے کہ بیچھے اور پیشاب موجود ہے۔ فارغ ہو نے بعض مریض جن کی تکلیف زیادہ بڑھ جائے ان کو بعض دفعہ نصف نصف گھٹے بعد یا اس سے بھی کم عرصہ میں پیشاب کے لئے جانا پڑتا ہے مگر بیشاب تھوڑا آتا ہے اور حاجت رفع نہیں ہوتی۔

بیشاب کے بار ہارآنے کی حاجت ضروری نہیں کہ غدہ قدامیہ کے بڑھنے سے ہی ہولیکن اگر اس وجہ سے ہوتو غدہ قدامیہ کے علاج کے لئے حسب ذیل طریق اختیار کرنا چاہئے۔

د بے ہوئے سوزاک کا خطرہ ہوتو تھوجا (Thuja) سے علاج شروع کریں اور رفتہ رفتہ اس کی طاقت بڑھا کرایک لاکھ تک پہنچادیں۔تھوجاغد ہُ قدامیہ پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور پیشاب کی نالی کی جلن میں بھی نمایاں کام کرتی ہے اس لئے سب سے پہلے اس کی طرف دھیان جانا چاہئے۔ دیگر بیاریاں جوتھوجا کی یاد دلاتی ہیں ان میں سب سے نمایاں دمہ کی تکلیف ہے۔ اس طرح جلد پر مسول یا موہکوں کا پایا جانا بھی اس کا تقاضا کرتا ہے۔ غد وُقدامیہ کی تکلیف کے ساتھا گرتھوجا کی دیگر علامتیں خصوصاً بیشا ب کی نالی میں جلن کی علامت پائی جائے اور بیشا ب کی بار بار حاجت ہوتو تھوجا کی خاص نشانی ہے ہے کہ بیشا ب کی ایک دھار کی بجائے الگ الگ دودھارین نکتی ہیں جوذراز وراگانے کے بعد پھرایک بن جاتی ہیں۔

غدہ قدامیہ کی دوسری بڑی دواسلیٹیا (Silicea) ہے جو CM طاقت میں سب طاقتوں سے اچھااثر دکھاتی ہے مگر شرط ہے ہے کہ مریض ٹھنڈا ہواور ہاتھ پاؤں میں سردی زیادہ محسوں کرے۔ یہ دوامثانے کے کینسراورغدہ قدامیہ کے کینسردونوں پریکساں اثر کرتی ہے اگر ہفتہ دس دن کے وقفہ سے دو تین خورا کیس دی جا کیس تو اللہ تعالی کے فضل سے نمایاں فرق محسوس ہوگا۔

اس بیاری میں ایک نمایاں اثر رکھنے والی دوا کلیمٹس (Clematis) ہے۔ کلیمٹس جسم کے دائیں حصہ پرزیادہ اثر انداز ہوتی ہے اور اس کا حملہ زیادہ ترعضو کے دائیں حصے، دائیں فوطے اور دائیں طرف کی بیشا ب کی نالی پر ہوتا ہے جوگر دے سے مثانے تک جاتی ہے۔ مریض ہروقت اس میں کچھ بے چینی محسوں کرتا ہے اور بیشا ب کی حاجت اسے باربار جگاتی ہے۔ عموماً نہ بجھنے والی بیاس پائی جاتی ہے جسے ٹھنڈے پانی سے پچھسکون ماتا ہے۔ کلیمٹس ایسے مریض کو وقت فاکدہ تو دیتی ہے مگر ضروری نہیں کہ ممل شفاء کا باعث ہے۔ کلیمٹس بیشا ب کے وقفوں کو طویل کردیتی ہے اور باربار حاجت کی بجائے بعض دفعہ دو گھنٹے تک حاجت نہیں ہوتی لیکن جب ہوتی ہے تو مریض کو بہت تیزی سے بیت الخلا جانے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کے استعمال کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ کے دوسری دواؤں کی تلاش کی جائے جومرض کو جڑ سے اکھیڑ سکیں۔ بعض داون مد بھی میں میں کلیمٹس سے کیا ہے۔ اس کے استعمال کے ساتھ ساتھ ساتھ سے دون میں میں میں میں سے کلیمٹس سے سے الکیاں سے کہا ہوتی ہوتی ہے۔ اس کے استعمال کے ساتھ ساتھ ساتھ سے دون میں میں میں سے کلیمٹس سے سے کہا ہے۔ دوسری دواؤں کی تلاش کی جائے جومرض کو جڑ سے اکھیڑ سکیں۔

بعض مریضوں میں بیربھی مشاہدہ میں آیا ہے کہ کلیمٹس کے استعمال کے بعد کھلا پیشا ب آنے لگ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بار بار کی حاجت باقی رہتی ہے۔اس کا مطلب میہ ہے کہ مریض کی بیاری کا براہ راست غدہ قدامیہ یعنی پراسٹیٹ گلینڈ کے بڑھنے سے تعلق نہیں تھا جس کا دور کرنا تنہا کلیمش تعلق نہیں تھا جس کا دور کرنا تنہا کلیمش کے بس میں نہیں۔

پیشاب کی اس قسم کی بیار یوں میں بعض دیگر علامتیں بھی بہت توجہ کے لائق ہیں جو مختلف دواؤں کی نشاند ہی کرتی ہیں مگرضروری نہیں کہ ہر دوا مفید ثابت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اصل دوا کی تلاش بہت مشکل کام ہے۔ اس بیاری کی امتیازی علامتوں کاعلم ضروری ہے ور نہ طبیب کے لئے ہر مرض کی دوا کی بیجان ناممکن ہوگی۔

بیشاب سخت بد بودار ہواوراس میں کچھ نہ کچھ گاڑھا مواد خارج ہوتا ہوتو یہ علامت خصوصیت کے ساتھ بیشاب کی نالی، گرد ہے، مثانے اور فوطول یارتم کے اندر عفونت کی نشاند ہی کرتی ہے۔ اس لئے فوری طور پر عفونت کا علاج ہونا چا ہے اور جب تک مستقل عفونت کے نشان مٹ نہ جا کیں علاج جاری رہنا چا ہے۔ اس مرض میں نمایاں اثر کرنے والی دوا کیں تھوجا مٹ نہ جا کیں علاج جاری رہنا چا ہے۔ اس مرض میں نمایاں اثر کرنے والی دوا کیں تھوجا (Pyrogenium)، سلفر (Sulphur)، پائیر وجینیم (Pyrogenium)، سورا کینم (Arsenicum Album)، سافر (Ferr Phos)، آرسینک البم (Phosphorus)، کونیم (Phosphorus)، کینا بس انڈریکا (Cannabis Indica)، قاسفورس (Staphysagria)، سٹیل سرولا ٹا (Sebal Serrulata)، سٹیل سرولا ٹا (Sebal Serrulata)، سٹیل سرولا ٹا (Merc Car)، سٹیل سرولا ٹا (Metorrhinum) ہیں۔ انہی دواؤں کے ذکر میں دیگر متعلقہ دوا کیں مثلاً میڈورا کینم (Medorrhinum) وغیرہ بھی مل جا کیں گی۔

21_ جوڑوں کا در داور گنٹھیا جوڑوں کا در داور گنٹھیا جن دواؤں کے ابواب میں نمایاں طور پرنظر آئے گاوہ حسب

•	•	**	
			زيل ہيں۔ ذيل ہيں۔
Apis	اييس	Abrotanum	ابراثينم
Arnica	آرنيكا	Apocynum	ايبوسائينم
Calc. Carb	كلكيريا كارب	Bryonia	برائيونيا
Lachesis	ليكييس	Kali Carb	كالى كارب
Pulsatilla	يلسثيل	Ledum	ليڈم
Actaea Reaemosa	ا کٹیار کیی موسا	Argentum Metallic	ارجنٹم مٹیلیکم cum
Berberis	بربرس	Belladonna	بيلا ڈونا
Colchicum	كالحجيكم	Benzoicum Acidu	بنز ونیکم ایسڈم m
Eupatorium	يو يا ٽوريم	Caulophyllum	كالوفائيكم
Causticum	كاستبيكم	Agnus Castus	ایگنس کاسٹس
Lactic Acid	ليكثك ايسثر	Guaiacum	كائيكم
Mercurius	مرکری	Medorrhinum	ميڈورائينم
Phytolacca	فائييو لا كا	Natrum Sulph	نيٹرم سلف
Sabina	سبائنا	Rhus Tox	رسٹاکس
		Sulpur	سلفر
والی دیگر دواؤں کا ذکر بھی	ں سے تعلق رکھنے	وُں کے ابواب میں ان عوارخ	انهی دوا
			موجود ہے۔

22_ مِرْبُول کی تکالیف

ہڑیوں کی تکلیفوں میں سب سے خطرناک بیاریاں ہڑیوں کا کینسراور ہڈیوں کی سل ہیں۔اس کے علاوہ بہت سے خطرناک عوارض مثلاً ٹائیفا ئیڈ اور پولیو ہڈیوں پر گہرےاور دیریا اثرات چھوڑ جاتے ہیں جن میں سے بعض کاعلاج ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہوتا ہے۔

علاوہ ازیں ہڈیوں کی ساخت کی پیدائشی خرابیاں مثلاً بونا پن یا ہڈیوں کا بھر بھرا ہونا بھی الیمی بیماریاں ہیں جو گہرے، درست اور صبر آز ماعلاج کا تفاضا کرتی ہیں۔ان سب بیماریوں کا ذکراوران کے علاج کے طریق حسب ذیل دواؤں کے ابواب میں ملیں گے۔

Bryonia	برائيونيا	Baryta Carb برائيطا كارب
Calc. Fluor	كلكير بإفلور	Calc. Carb کلکیریا کارب
Phosphorus	فاسفورس	میڈورائینم Medorrhinum
Mercurius	مرکری	Silicea سلیشیا
Ruta	روڻا	يو پا ٹوريم Eupatorium
Nitric Acid	نائثرك ايسثه	Arum
Asafoetida	ابيافو ٹيڑا	Sepia سپيا
Pulsatilla	بيستيل	ارجنظم میٹیلیکم Argentum Metallicum
Calcarea Phos	كلكير بإفاس	Staphysagria سٹفی سیّریا
		Ledum لیڈم
	1	

انہی ابواب کےمطالعہ سے دیگرضروری ادویات کاعلم ہوجائے گااور بیمطالعہ انشاءاللہ سرحاصل ثابت ہوگا۔

23_ حادثات اور چوٹوں کے فوری اور دیریا اثرات کا علاج اس ضمن میں حسب ذیل ادویہ کا مطالعہ انشاء اللہ سیر حاصل ثابت ہوگا:۔

Arnica	آرنيكا	Aconitum	ا يكونا ئٹ
Bellis	بيلس	Belladonna	بيلا ڈونا
Calc Phos	كلكير يافاس	Calc. Flour	كلكير يافلور
Hypericum	ہائی پیر کیم	Carbo Veg	كار بووتج
Opium	اوپیم	Muriatic Acid	ميوريثك ايسٹر
Staphysagria	سشفى سيكريا	Ruta	روڻا
Symphytum	سمفائيتم	Stromtium Carb	سٹروشیم کارب
	م کے فالج	قتر 24_ <u>م</u>	
ہرفتم کے فالج میں کام آنے والی بڑی بڑی ادویہ حسب ذیل ہیں:۔			
	,		

Arnica	آ رنيکا	Aconitum	ا يكونا ئٹ
Causticum	كالتثيكم	Belladonna	بيلا ڈونا
Lachesis	ليكييس	Gelsemium	حلسيميم
Rhus Tox	رسٹاکس	Opium	اوپیم
Spigelia	سپائی جیلیا	Ruta	روڻا
Coccoulus	كاكولس	Alumina	اليو مينا
Tarentula	<i>ٹیر</i> ینٹولا	Conium	كوينيم
Zincum	زنک	Sulphur	سلفر
Natrum Mur	نيظرم ميور	Pulsatilla	بلسثيلا

Plumbum پلمبم Nux Vomica پلمبم Muriaticum Acid میوریئک ایسٹر Argentum Nitricum Nitricum میوریئک ایسٹر کے Scale Cor سیکیل کار Phosphorus Acid فاسفورک ایسٹر ان چند دواؤں کے مطالعہ ہی سے فالج کی مختلف قسموں اوران کے مناسب علاج کا علم ہوجائے گا۔

25_ جسمانی ساخت اوروضع قطع

ہومیو پیتھی کتب میں عموماً مریض کی جسمانی ساخت، وضع قطع اور رنگ روپ کا ذکر ملتا ہے لیکن جسمانی وضع قطع کے ذریعہ سے مرض کی اور دوا کی نشاند ہی بہت مشکل امر ہے۔ تا ہم چند بڑی بڑی دوائیں جوجسمانی وضع قطع اور ساخت سے متعلق ہیں، حسب ذیل ہیں:۔

Calc Carb کلکیر یا کارب Baryta Carb كككير بافلور Chininum Ars چینینم آرس Calc Fluor Cholestrinum گریفانٹش كوليسٹرينم Graphites نیٹرم میور Kali Carb كالحاكارب Natrum Mur Phytolacca فائتيو لاكا Plumbum Sepia سليثيا Silicea سيبيا 26_ وبائی بیاریاں

ہیضہ (Cholera):۔

ہیضہ کی وبا کے دوران حفظ ماتقدم کے طور پرسلفر (Sulphur) بہترین کام کرتی ہے۔ پہلے چندروز 200 طاقت میں دن میں ایک دفعہ دینے سے پھر ہفتہ میں دوبارہ دیتے

چلے جانے سے ہیضہ سے بچاؤ ہوسکتا ہے۔ کیمفر (Camphor) کو ہیضہ کی علامتیں ظاہر ہوتے ہی چھوٹی طاقتوں میں دیا جائے تو ہیضہ ابتدائی حالت میں ہی ختم ہوجا تا ہے۔ ہیضہ شروع ہو چکا ہوتو خصوصاً کم ہیضہ جس میں بغیر زیادہ درد کے دست آئیں اور یکدم توانائی ختم ہوکر سارا جسم ٹھنڈا ہوجائے کیمفر سے بہتر کوئی دوانہیں۔اس کی علامتوں میں اسہال کی نسبت متلی اور قے کار جمان پایا جاتا ہے۔

کیو پرم (Cuprum) بھی ہیضہ کی اہم دواؤں میں سے ہے۔اگر ہیضہ کی حالت میں معدہ اور ہاتھ پاؤں میں شے ہے۔اگر ہیضہ کی حالت میں معدہ اور ہاتھ پاؤں کی شرف میں شخ نمایاں ہواور ہاتھ پاؤں کا شنخ انگلیوں سے شروع ہوکراو پر کی طرف حرکت کر بے تو ایسے ہیضہ کے علاج میں کیو پرم ہوا ہوتی ہوگی۔لیکن جس ہیضہ کی کیو پرم دوا ہواس میں عموماً اسہال تھوڑی مقدار میں اور سخت مروڑ کے ساتھ بار بار آتے ہیں۔اگر کھلے دست ہوں اور پنڈلیوں میں بل پڑر ہے ہوں تو ایسے ہیضہ میں وریٹرم البم (Veratrum Album) تیر بہدف ثابت ہوتی ہے۔

Aresenicum Album	آ رسینک البم	Aethosa	ايتقوزا
Scale Cor	سيكيل كار	Carbo Veg	كاربووت
		Podophylum	بوڈ وفائکم
			وبائی پیپ درد:_

جس کے ساتھ متلی اور نے کرنے کار جحان ہوقطع نظراس کے کہوہ ہیضہ ہے یا کوئی اور مرض،اس میں حسب ذیل نسخہ 30 طافت میں ملا کراستعمال کیا جائے۔

کروٹن (Croton)، اپی کاک (Ipecac)، کاربووق (Carbo Veg) اور پیٹیشیا -(Baptisia)

متلی اور قے کوٹھنڈا پانی پینے سے آ رام آئے تو یہ علامت کیوپرم کی نشاندہی کرتی ہے۔ کیوپرم کا ایک عضو پر فالج ہے۔ کیوپرم کا ایک اثر کن پیڑوں پر بھی پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر ٹائیفا ئیڈ کسی ایک عضو پر فالج بن کر گرے تو اس میں بھی کیوپرم مفید بتایا جاتا ہے۔

يو يا ٹورىم

	863	(REPERT	انڈیکس تشخیص امراض (ORY
Sulphur	سلفر	Pulsatilla	پلسٹیل
Antimonium Crud	' 4	Aresenicum Album	آ رسينك البم
Colchicum	كالخييم	Argentum Nitrio	ارجنٹم نائٹر کیم cum
Nux Vomica	تكس واميكا	Iris	آ ئزس
Dioscorea	ڈ ائسکو ریا	Colocynthis	كالوسنتھ
		<u>_:(</u>	مليريا(Malaria
ملیریا کے علاج کا تفصیلی ذکر حسب ذیل دواؤں کے ابواب میں موجود ہے۔ان			
ہر پڑھنے والے کومعلوم ہو	علامتول كى تفصيل	ی تعلق والی دوائیں اور	کے مطالعہ سے دوس
			سکتی ہے۔
Arnica	آ رنيکا	Aconitum	ا يكونائك
Bryonia	برائيونيا	Arsenic	آ رسینک
Chininum Ars	چینینم آرس	China	حيا ئنا
Rus Tox	رسطائس	Tarentula	ٹیرینٹولا ہسپانیہ

Pulsatilla نیٹرم میور Natrum Mur ین تکس وامیکا ca سیڈرن Natrum Sulph. نیٹرم سلف Nux Vomica Sadrun سورانینم Psorinum ان دواؤں کا بغورمطالعہ کریں تو انشاءاللہ ملیریا کے مرض پر قابو پانے میں بہت حد تک ان دواؤں کا مہارت ہوجائے گی۔

Eupatorium پُوبر کیولینم جلسیمیم Ipecacuanha

Tuberculinum

Gelsemium

چکن یا کس اور خسر ه (Chicken Pox and Measles): _

یہ وہ جلدی بیاریاں ہیں جو جب تک ظاہر نہ ہوں اس وقت تک بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔ ان کو باہر نکالنے میں عموماً سلیشیا (Silicea) ، کالی فاس (Kali Phos) اور فیرم فاس ہیں۔ ان کو باہر نکالنے میں عموماً سلیشیا (Ferr Phos) مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایلیم سیپا (Allium Cepa) بھی خسرہ کی علامتوں میں مفید بتائی جاتی ہے۔ سلفر عمومی دوا ہے جو دونوں امراض کو باہر نکا لئے میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ اسی طرح آرسینک (Arsenic) اور سورائینم (Psorinum) وغیرہ بھی حسب حالات کام کرتی ہیں۔ انہی دواؤں کے ابواب میں دیگر دواؤں کا بھی ذکر مل جائے گا۔

Antimonium Tart اینٹی موینم ٹارٹ Apis اینٹی موینم ٹارٹ Euphrasinum یوفریزیا Calcarea Phos کالکیر یافاس Kali Bichrom میلنڈرینم مالک کالی بائنگروم Malandrinum میلنڈرینم کروڈ Kali Bichrom مرک سال Merc Sol اینٹی موینم کروڈ Sulphur سلفر Pulstailla پلسٹیلا Veriolinum وریولینم کالی کھانسی (Whooping Cough):۔

کالی کھانسی میں ڈروسر(Drosera)، ایلیم سی(پیا Allium Cepa) اور آرنیکا Arnica) عام استعال کی دوائیں ہیں۔انہیں دواؤں کے ذکر میں اس کی دوسری دوائیں اور علامات بھی ملاحظہ فرمائیں۔

Senega سینیگا Kali Carb کالی کارب Hydrocyanic Acid ہائیڈروسائینگ ایسڈ Tarentula

Coccus Cacti		
Ipecacuanha	ا پي کاک	کیو پرمٹلیکیم Cuprum Metallicum
		انفلوئنز (Infuenza): _

انفلوئيزا بخار مين سلفر (Sulphur) اوريا ئيروشينيم (Pyrogenium) كو بهت مفید بایا گیا ہے۔ان کے علاوہ انفلوئنزینم (Influenzinum)، بیسیلینم (Bacillinum)، وفتهيرينم (Diptherinum)، اوسلوكوسينم (Oscillo Coccinum) ، كالى فاس (Kali Phos)، كالى فاس فيرم فاس (Ferr Phos)، كالى ميور (Kali Mur)، سليشيا (Silicea) ، كلكيريا فلور (Calc. Flour) کا بھی مطالعہ کریں۔

Gelsemium	حبسيميم	Eupatorium	يو يا ٹورىم
Dulcamara	ڈ لکار ا	Bryonia	برائی اونیا
Carbo Veg	كاربووتنج	Rhus Tox	رسٹاکس
Natrum Sulph	نيثرم سلف	Arsenicum Album	آ رسينک البم
		·(Dysen	پچٹ نیس (tery

ر (Kurchi)، کونائٹ (Aconite)، کونائٹ (Ipecac)، کر جی (Kurchi)، کر جی (Kurchi)، کر جی ایک کاک ڈائیوسکوریا(Dioscorea)، کولوسنتھ (Colocynthis)، عموماً استعال ہوتی ہیں۔ان کے مطالعہ سے دیگر دواؤں کاعلم بھی ہوجائے گا۔

Carbolic Acid	كاربا لك ايسڈ	Aloe	ابلو
Nux Vomica	تكس واميكا	Colchicum	كالحجيكم
Arnica	آرنيكا	Sulphur	سلفر
Bufo	بوفو	Aresenic Album	آ رسینک البم
Capsicum	كييسيكم	Cantharis	كينتقرس

Gelsemium	جلسيميم	Carbo Veg	کار بووتځ
Ricsal	رک سال	Mag Carb	میگ کارب
Phosphorus	فاسفورس	Merc Car	مرک کار
		Rhus Tox	رسطائس
			·(Plague) (18)

طاعون (Plague): ـ

طاعون کے زمانہ میں مرکزی (Murcurius) اور سلفر (Sulphur) کے مرکبات استعال کئے جائیں تو بیاری غدودوں کوچھوڑ کر باہر جلدی امراض کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہیں اور طاعون سے نجات مل جاتی ہے۔

Belladona	بيلا ڈونا	Aresenic Album	آ رسينڪ البم
Hydrocyanic Acid	مائیڈروسائینک ایسڈ پیر	Crotalus Horridus U	کروٹیکس ہری ڈ
Lachesis	ليكييس	Ignatia	اگنیشیا
Phosphorus	فاسفورس	Naja	ناجا
Rhus Tox	رسطاكس	Pyrogenium	پائیروجینم

Tarentula Hispania ٹیرنٹولا ہسپانیہ

ایڈز(Aids):۔

ایڈز کی بیاری میں اونچی طاقت میں سلیشد (Silicea)، سورائینم (Psorinum)، سیفیلینم (Pyrogenium) بہت فائدہ مند ثابت (Syphilinum) اور پائیروجینیم (pyrogenium) بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔

ورم الدماغ (Meningitis):

میننجائیٹس کے حملہ میں نیٹر مسلف (Natrum Sulph)، جلسیمیم (Gelsemium)، میننجائیٹس کے حملہ میں نیٹر مسلف (Apis)، سلیشیا(Silicea) اور ایٹیس (Apis) کے علاوہ مندرجہ ذیل ادویات کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

البكونا ئترك Belladona ببلا ڈونا Aconitum برائی اونیا کلکسر پا کارپ Calcarea Carb Bryonnia Cuprum Metallicum کروٹیلس ہری ڈس Crotalus Horridus کروٹیلس ہری ڈس سيكوڻا وروسا Cicuta Virosa Glonoine مائتومس ہملی بورس Hyoscyamus Helleborus نكس واميكا مركري Mercurius Nux Vomica زنك Opium Zincum اوپیم

27_ روزمرہ کام آنے والے بعض مجرب نسخے

- یکے جو کمرہ امتحان میں جا کرسب کچھ بھول جاتے ہیں یا کنفیوز (Confuse) ہو
 جاتے ہیں۔انہیں ایتھوزا(Aethusa) 200 استعمال کرنی چاہئے۔
- ﴿ جن طالب علموں کوامتحان کا خوف ہوتو انہیں ارجنٹم نا ئیٹر کی (Argentum Nitricum) ہوتو انہیں ارجنٹم نا ئیٹر کی اورا پیھوز (Aethusa) 200 ملا کراستعال کرنی چاہئے۔
- جن میں خوداعتادی کی کمی ہو یا پبلک میں تقریر کرنے کا خوف ہوانہیں لائیکو پوڈیم کہ جن میں 200(Lycopodium)
- اورسلیشیا 6x (Kali Phos) اگر امتحان میں فیل ہونے کا خوف ہوتو کالی فاس 6x (Kali Phos) اورسلیشیا 6x (Silicea)
- جو نيچ بهت زياده توجه جا بتے ہوں انہيں پلسٹيلا (Pulsatilla + 30 (Pulsatilla + فاسفورس ⇔ جو نيچ بهت زياده توجه جا بتے ہوں انہيں پلسٹيلا (Phosphorus)
- + (Phosphorus) جو بیچ سکول جانے سے خوفز دہ ہوں انہیں فاسفورس (Phosphorus) ہے جہ کہ کہ اوپیم (Opium) استعال کرانی چاہئیں۔
- الارونے کا بہانہ بناتے ہوں انہیں سٹفی سیریا (Staphysagria)

استعال کرائیں۔

- جو بچ بہت ضدی ہوں ان کے لئے کیمومیلا (Chemomilla) مجرب نسخہ انتخبہ جو بے بہت ضدی ہوں ان کے لئے کیمومیلا (عالم
- جو بچ اکیلے رہنے سے ڈرتے ہوں انہیں فاسفورس (Phosphorus) 130 استعال کرنی چاہئے۔
- (Opium) + اوپيم (Arsenic) + اوپيم (Arsenic) + اوپيم (+ اوپيم) + اوپيم (+ ايوناث (Aconite) + ايوناث (Aconite) ملاكردين الله كفتل عيم وماً فائده ديتي بين +
- انیرم سلف (Arnica) جنیر میوٹ آ جائے تو آ رنیکا (Arnica) بنیرم سلف کا دفتہ کے نتیجہ میں اگر د ماغ پر چوٹ آ جائے تو آ رنیکا (Natrum Sulph)
- ک اگرد ماغ کا پچھ حصہ ماؤف ہوجائے تواوپیم (Opium) 1000 یااس سے بھی اونچی طاقت کی ایک خوراک فوراً دیں۔
- استعال کرائیں۔ باقی رہ جائیں تو ہیلی بورس نائیگر (Helleborus Niger) ☆
- ہ ہوش کرنے والی دواؤں کے استعال کے بعد جب مریض کو ہوش آنے پر متلی ہے ہوش کرنے والی دواؤں کے استعال کے بعد جب مریض کو ہوش آنے پر متلی شروع ہوجا کیں تو آرم میٹ (Arum Met) 200 فائدہ مند ہے۔ فاسفورس بھی زیر نظر رہے۔
- خوف کے بداثرات کو دورکرنے کے لئے ایکونائٹ CM کی صرف ایک خوراک جساوییم (CM(Opium) کے ساتھ ملا کر دیا جائے تو اور بھی زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔
- ہراپریش سے پہلے اور بعد میں آرنیکا (Arnica) کی ایک ایک خوراک دینا بہت سی پیچید گیوں سے بچالیتا ہے۔
 - 🖈 اگر چر بی زیاده کھائی گئی ہوتو بعد میں پلسٹیلا(Pulsatilla)استعال کریں۔

- اگر کاربوہائیڈریٹس (Carbohydrates) کی زیادتی ہو گئی ہو تو کاربوو ت (Carbo Veg) استعال کرنی چاہئے۔
 - 🖈 چاول اور گوشت سے الرجی ہوتونکس وامیکا(Nux Vomica) استعال کریں۔
- . انڈے سے الرجی ہوتو کلکیریا کارب(Cale Carb) کا استعال مفید ثابت ہوتا 🖈 ہے۔
 - استعال کریں۔ 🖈 انڈے کے اسہال ہوں تو چینینم آرس (Chininum Ars) استعال کریں۔
- ک سگریٹ کی عادت چیٹر وانے کے لئے سلفیورک ایسٹر (Sulphuric Acid) کا ایک قطرہ ایک گلاس پانی میں ڈال کر دن میں تین بار پئیں۔اللہ کے فضل سے اچھا فائدہ دیتی ہے۔
- ﷺ غلط دواکے ٹیکہ کا اثر دور کرنے کے لئے مکس وامیکا(Nux Vomica) 200 مفید ہے۔
- اگر پینیسلین ہے اسہال لگ جائیں تو نائیٹرک ایسٹر (Nitric Acid) یا سلفر ☆ اگر پینیسلین ہے اسہال لگ جائیں تو نائیٹرک ایسٹر (Sulphur) اونچی طاقت میں ایک خوراک استعال کرنا فائدہ کا موجب ہوتا ہے۔
- یادداشت کی کمزوری دورکرنے کے لئے کالی فاس (Kali Phos) کی ایک خوراک اور پھر پلمبم (Plumbum) کی چندخوراکیس استعال کریں۔
- چوکوئی ہرایک کوشک کی نظر سے دیکھے اوران دیکھے خطرات سے خوفز دہ ہوتو اسے لیکیسس (Lachesis) 1000 دیں۔
- ک اگرکسی کام میں دل نہ گئے، موت کا خوف ہو، حادثہ کا ڈر ہواور بے چینی بہت ہوتو آرسینک(Arsenic کی چندخوراکیں دیں۔